This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`

LANE MEDICAL LIBRARY STANFORD
H121 .G24d 1907 STOR
Diccionario de los terminos tecnicos u
24503286600

H121
G24d
1907

50

LANE

ICAL LIBRARY

SEAL OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
SEMPER VIRENS
1885

Gift
ugust von Borosini, M.D.



DICCIONARIO

DE LOS

TÉRMINOS TÉCNICOS

USADOS EN MEDICINA

DICCIONARIO

DE LOS

TÉRMINOS TÉCNICOS

USADOS EN MEDICINA

CONTIENE

la etimología griega y latina,
los nombres de las enfermedades, de las operaciones quirúrgicas y obstétricas,
de los síntomas clínicos y lesiones anatómicas,
los términos de laboratorio, etc.

POR LOS DOCTORES

M. GARNIER Y **V. DELAMARE**

MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS — EX-INTERNO DE LOS HOSPITALES DE PARIS

PREFACIO DE

G.-H. ROGER

PROFESOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS
MÉDICO DEL HOSPITAL DE LA CHARITÉ

ADAPTADO AL CASTELLANO POR EL

Dr SANTOS A. DOMÍNICI

Ex-profesor de Clínica médica y de Anatomía patológica
en la Universidad Central de Venezuela.

MADRID

BAILLY-BAILLIERE É HIJOS, EDITORES

10, PLAZA DE SANTA ANA, 10

1907

H121
G24d
1907

PRÓLOGO

Acerca de la utilidad de la obra cuya versión damos hoy al público nada podemos añadir al elocuente prefacio del Profesor Roger, á no ser que proclamemos lo que de todos es sabido: que para los médicos españoles, muy especialmente, es de urgentísima necesidad un diccionario como éste con que han dotado á los franceses los Dres. Garnier y Delamare.

La gran mayoría, si no la totalidad, de los términos médicos usados en España é Hispano-América nos llega por el canal de las publicaciones francesas, de donde generalmente los calcamos sin tratar siquiera de someterlos á las reglas más sencillas de la lengua. Si pasamos revista á los que forman este diccionario echarémos de ver que no todos han de saltar la frontera del idioma, sin mudar, aun cuando someramente, de ropaje.

Forman el mayor grupo los derivados del

griego y del latin y, ello es evidente, de estas lenguas podemos tomarlos legitimamente nosotros, como que, sin duda alguna, varios de esos términos usáronse en España con anterioridad á otras naciones.

Viene luego un grupo, pequeño aún, pero que alcanzará grandes dimensiones, dada la actual tendencia de los que cultivan en Francia el campo de la ciencia á soltarse de los lazos que imponen las leyes de la etimología. Nos referimos á los compuestos hibridos de un radical griego, ó latino, y de otro francés : jargonaphasie, haricocèle, zoogreffe, *etc. Claro está que así como adaptamos el griego, en estos casos, debemos volver exactamente al castellano el radical francés, dando así mayor luz á la expresión, y no imitar á quienes, según hemos leido tantas veces en la traducción novisima de uno de los dos grandes tratados clásicos de Medicina, dicen, por el primero de aquellos términos,* jargonafasia. *Si* jargon, *en esta acepción, vale* jerga, jerigonza, *¿ por qué no decir* jergafasia? *Así mismo, el segundo puede traducirse por* habicele (*de* haba) *y no* haricocele ; *por el propio modo que escribimos* zoo-ingerto *y* zoogrefo, *por el tercero.*

En seguida preséntase el grupo de voces enteramente francesas que se han naturalizado españolas, aunque tenemos sus correspondientes exactas y legítimas : coqueluche, grippe, muguet, tic (*del alemán* ticken), cagot (*bearnés*), *etc.*

Más modernas son, en general, las siguientes, igualmente exóticas :

Locuciones inglesas : rash, catgut, thrill, glossy-skin, shock, horse-pox, cow-pox, railway-brain, railway-spine, no-restraint, open-door, test-object, etc. *De éstas hanse calcado* dren *y* drenaje (*de* drain) ;

Locuciones alemanas : mastzellen, plasmazellen, etc.;

Italianas : influenza, malaria, etc. ;

Caucásicas : kefir, kumis ;

Arabes : loc, cabila (lepra), salam (tic de ;

Japonesas : kakke, kubisagari, ekiri, etc. ;

Y las que más recientemente nos ha traído de regiones semi-bárbaras la infatigable investigación médica :

De dialectos asiáticos : beriberi, kala azar, surra, etc. ;

De dialectos africanos : gundú, anakkre, cracra, nagana, tsetsé, etc ;

Y aún de dialectos indios americanos : pian (*de la lengua* galibi, *dialecto caribe de la Guayana francesa*).

Los conservamos sin modificación, así como la terminología médica universal emplea tal cual son los términos : vómito negro, dengue, mal de caderas, pinta, piedra, bubas, verruga, carate ó carare, cate, etc., *oriundos de España y de Hispano-América.*

Sin contar las expresiones en que campean nombres propios de persona ó de lugar (operación de Estlánder, hernia de Goyrand, sígno de Mannkopf, *etc.;* botón de Alep, úlcera del Gabón, *etc.*), *otras hay castellanizadas procedentes de dichos nombres :* cowperitis, brouseísmo, browniano, jacsoniana, adisonismo, bravesiana, *y muchas más. En éstas, digámoslo de paso, como en las expresiones latinas ó de otras lenguas, obedecemos á la Academia, que manda que del mismo modo que los nombres propios extranjeros, se acentúen con sujeción á las leyes prosódicas para las dicciones castellanas.*

Cierra la nomenclatura el grupo numeroso s voces pertenecientes al lenguaje común n Medicina tienen acepciones particu-

lares y de consiguente han adquirido méritos para figurar en un diccionario de esta clase. Tales son, por ej., ausencia, presentación, *y muchas otras. Hemos juzgado que el vocablo* marcha, *que en locuciones técnicas sólo se emplea como sinónimo de* manera de andar, paso (marcha helicópoda, marcha de Todd, *etc.*) (*francés*, démarche), *ó como equivalente á* evolución, desenvolvimiento (marcha *de una enfermedad ó de un proceso mórbido*), *tiene iguales derechos á cédula especial, y se la hemos concedido.*

Ocúrrensenos muchas observaciones tocante al modo, tan sin reparo en la actualidad, de verter al castellano las expresiones técnicas. Bien sabemos que es forzoso admitir en el idioma gran cantidad de barbarismos, cuyo sentido no es posible expresar con voces castizas: á tales hay que dar la bienvenida. Mas, ¿ por qué decir, p. ej., « *parálisis ó desviacion* conjugada », « *neumonía* masiva », « *forma* masiva *de cáncer pulmonar* », « *temblor* masivo *de un miembro* », « *pie* bot », « mamelonado », « trazado », « tiraje », etc., etc., *cuando tenemos como decir castizamente :* « *parálisis ó desviación* conjunta », « *neumonía* maciza », « *forma*

maciza *del cáncer pulmonar* », « *temblor de un miembro* en totalidad », « *pié* zambo », « mamilar ó mamilado », « trazo », « tiro », *etc.* ?

Es muy aceptable decir « *sonido* mate » (*apagado, sin brillo*) ; *sin embargo, el tan empleado* matitez *ofende los oidos. ¿ No seria preferible* macicez (*calidad de lo macizo, solidez*) *que, en suma, es lo que revela la percusión de una parte del cuerpo en que no existen gases subyacentes* ?

Á pesar de que á las veces hemos hecho escrúpulo, el deber de cronista del idioma, que es, según ya se ha dicho, el del diccionarista, hanos impuesto la obligación de no excluir voz alguna de cuantas se usan actualmente en publicaciones médicas españolas.

Deseamos que el castellano esté siempre á la par de todos los progresos científicos, en noble emulación con las demás lenguas cultas ; mas, al propio tiempo deberíamos atender á que la poca maleabilidad y flexibilidad del idioma, en cuanto á neologismos se refiere, no nos obligue á llenar los vocabularios técnicos con voces en todo y por todo extrañas á las selladas en troqueles castellanos. Creemos asimismo que de dos vocablos extranjeros sinónimos debe

preferirse el menos duro á oídos españoles : entre grippe *y* influenza, *p. ej., elíjase el segundo, que, por lo demás, es casi universal, aún en Francia, donde se usa tanto como el autóctono.*

Para terminar réstanos por hacer algunas advertencias sobre la ortografía de ciertas voces técnicas que aún son de escritura dudosa, mejor dicho, que aún se empeñan muchos en librar de las reglas clásicas actuales. Sea la primera que cuando la palabra empieza por i *seguida de vocal* : yatroquímica, yodo, yon, *etc., las escribimos con* y, *puesto que el sonido es de consonante.*

En la letra k, *inicial, hemos dejado á los nombres propios, huelga decirlo, y ciertos vocablos exóticos :* kakke, kefir, *etc. ; en los derivados del griego hémosla suplido siempre con la* c *antes de las vocales* a, o, u, *y las consonantes* l, r, *y con* qu *antes de la* e *y la* i, *con excepción de los compuestos y derivados de* kinesis (κίνησις) *en que parécenos que prevalece el uso de la* c.

Las voces procedentes del griego que antes principiaban con pn, ps, pt, *escríbense ahora sin la* p *inicial, y, de consiguiente, han de*

buscarse en la n, *la* s *y la* t. *Escribimos pues, sin* p *todos los compuestos de* pneuma, pneumon, *etc.; los de* pseudo, psora, psico, *etc.; los de* pterix, ptoma, *etc. Preséntase aquí un inconveniente, de muy poca monta, y es la confusión que podría haber entre* sicosis (*de* ψυχή, *alma*), *afección mental, y* sicosis (*de* σῦκον, *higo*), *lesión de los bulbos pilosos de la barba; empero, fácilmente lo salvariamos si para distinguirla de la primera, que de hecho pertenece al género femenino, usáramos la segunda voz como del masculino; á lo cual no se opone razón alguna de peso.*

Finalmente, en las voces que principian por uno de los radicales xanto, xeno, xero, xifo, *la* x, *aunque griega, debe tener en castellano el sonido gutural árabe de la* j, *con que en el dia se pronuncia toda* x *inicial, y, por lo tanto, las hemos inscrito bajo la letra* j.

SANTOS A. DOMINICI.

París, 1906.

PREFACIO

Si los estudiantes no saben ahora medicina, culpa no es de los que tratan de enseñársela. Hace como veinte años tropezábamos al principiar los estudios con grandes dificultades. Los tratados clásicos estaban en su mayor parte anticuados, y si es cierto que los dos grandes diccionarios que venían publicándose contenían artículos excelentes, salían á luz con tanta lentitud que parecía que los primeros volúmenes dataran de otra edad. Era pues indispensable hojear por todas partes, consultar originales, leer gran cantidad de tesis y memorias. Felizmente cada tres años dábanse á la estampa las tesis de agregación, las cuales, poniendo al corriente las cuestiones de actualidad, prestaban verdadero servicio.

Así pues, para instruirnos, estábamos obligados á considerable trabajo, aunque no lo estimo inútil. Creo más, creo que de la necesidad de ir á beber á las fuentes resultaba el que se grabaran mejor los hechos en la memoria y dejaran huella más profunda y duradera. Empero, tal serie de investigaciones bibliográficas no podia exigirse á todos, ni la emprendían sino los que querían lanzarse por la vía de los concursos.

Hoy las facilidades para el estudio son mayores. Poseemos, sin contar las publicaciones extranjeras, varios tratados y manuales, convertidos rápidamente en obras clásicas, y cuyas ediciones sucesivas las mantienen constantemente al corriente de la ciencia. Gran número de publicaciones periódicas nos informan de las adquisiciones recientes. De allí que, sin mayor esfuerzo sea hoy posible aprender medicina y seguir sus progresos.

Estos progresos, no hay para qué decirlo, son incesantes. Ninguna época ha producido igual emulación, ninguna ha visto surgir semejante cantidad de descubrimientos, grandes y pequeños, semejante acúmulo de hechos nuevos y de ideas originales. Los hechos é ideas nacidos á la vida requieren que se les exprese con nuevos términos. La contínua labor de los médicos ha originado la complicación, sin cesar creciente, del lenguaje. Todo bacteriólogo que descubre ó cree descubrir un microbio, se apresura á imponerle nueva denominación : es el único medio de establecer su derecho de paternidad. Más tarde se bautizará la bacteria ya designada, con el nombre de quien pasa por ser el primero que la vió. Luego, el dia menos pensado se advertirá que el microbio era ya conocido y catalogado desde muy atrás. De allí que se describa con varios nombres distintos. Concíbense pues, los aprietos del lector. Hé allí, por ejemplo, el colibacilo : el principiante se verá en apuros para reconocerlo

en medio de los 15 ó 20 nombres que se han impuesto á este microbio.

He escogido como ejemplo una adquisición de la bacteriología, parte de la ciencia que, en estos últimos tiempos, hase enriquecido más con hechos y nombres nuevos. Fácil sería presentar análogas consideraciones respecto á otras ramas de la medicina. Cuánta enfermedad lleva múltiples rótulos diferentes : la fiebre tifoidea se llama también fiebre continua, tifus abdominal, dotinenteria; la parálisis infantil desígnase aún con los nombres de parálisis espinal de la infancia, tefromielitis ó poliomielitis anterior aguda, parálisis atrófica grasosa de la infancia, parálisis miogenética. Así mismo, empléanse indistintamente las expresiones clínicas, anatómicas ó patogénicas, de ictericia grave, ictericia maligna, tifus hepático, atrofia amarilla aguda del hígado, ictericia infectiva, fiebre amarilla nostras, etc. No terminaría nunca si pretendiese citar las afecciones que se designan ora con nombre anatómico ó clínico, ora con uno ó varios nombres históricos. Tal acontece con el bocio exoftálmico llamado por algunos enfermedad de Basedow, por otros enfermedad de Graves, y el cual, según M. Tapret, debería llamarse enfermedad de Marsh.

Más aún : en la misma enfermedad ciertos síntomas reciben distintos nombres. Ejemplos abundan, sobre todo en patología nerviosa. Las afecciones son en efecto tan complejas que

cualquiera observador que examine cuidadosamente los enfermos terminará por descubrir siempre un signo más ó menos importante que había escapado á la atención de los predecesores; aquél le impone luego una denominación, generalemente sacada del griego, y no pasará mucho tiempo sin que se designe el síntoma con el nombre del inventor. Muy alentador es ello para quienes publican; es empero algo incómodo para quienes estudian.

La situación actual del estudiante es pues la siguiente : posee excelentes obras, mas á cada instante se ve forzado á detenerse ante las expresiones técnicas y los nombres propios con que tropieza.

Y no es éste achaque puramente estudiantil. El médico, aun instruido, aun cuando se mantenga al tanto de la ciencia, chocará alguna vez contra la expresión nueva, cuyo significado ignora ó ha olvidado.

Hay que apelar, pues, á los diccionarios. Mas, éstos son de difícil manejo y, frecuentemente, ya algo envejecidos : lo que vale decir que en muchos casos no se dará con la palabra buscada.

Para llenar este vacío y facilitar la lectura de los autores médicos, los señores Garnier y Delamare han tenido la idea de publicar un diccionario de los términos técnicos de medicina. El pequeño volumen compuesto por ellos constituye un catálogo, tan completo como sencillo, de todos los términos médicos. De

cada palabra se nos da la etimología, y, con una frase breve y concisa, indicásenos el significado. Recorriendo el libro, al punto échase de ver su utilidad. Confieso, por mi parte, humildemente, que me ha sorprendido mucho el comprobar cuán numerosos son los términos que no conozco: de diez uno, supongamos; proporción ésta que, aunque aparentemente elevada, es inferior á la realidad. Manténgola sin embargo, para que no se me considere como demasiado ignorante.

Hay sin duda entre esos términos, poco ó nada conocidos, algunos que rarísima vez se emplean; mas, basta que existan para que se los pueda encontrar en la lectura y sea necesario conocer lo que significan. Podríasenos responder, en verdad, que nuestros estudios clásicos nos permiten subir á la etimología; empero, la mayoría de nosotros hemos mirado con descuido al griego. Los que por el contrario han continuado cultivándolo deben experimentar más de un desengaño al ver con cuánto desenfado trátanse corrientemente en el lenguaje médico las reglas de la etimología.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Á pesar de su importancia, rara vez suministra la etimología indicaciones precisas. Sucede con frecuencia que voces de un mismo origen terminan por adquirir distintos significados. *Cán-*

cer, *chancro*, *carcinoma* pueden considerarse etimológicamente como sinónimos : los dos primeros son derivados del latin *cancer*, el tercero del griego καρκίνος, palabras ambas que servían para designar al cangrejo. El vocablo *gangrena* tiene análogo origen : proviene de γάγγραινα, cuya raíz es γραῦς, camarón. En el mismo orden de ideas encontramos las palabras *carbón* y *ántrax*. Gramaticalmente hablando son sinónimos; no obstante, ha prevalecido en Francia el uso de aplicar la voz de origen griego *ántrax* á una lesión inflamatoria de las glándulas sebáceas que nada tiene que hacer con las enfermedades carbonosas. Los ingleses y los alemanes han obrado de modo distinto : conservan al término *ántrax* su significado original, equivalente á nuestra pústula maligna. Están de consiguiente autorizados para dar al bacilo del carbón el nombre de *Bacillus anthracis*. Nosotros hemos adoptado también esta última denominación : compréndese desde luego cuál sería la sorpresa de la persona no enterada á quien se dijera que el *Bacillus anthracis* no es absolutamente el bacilo del ántrax.

Puesto que hablo del carbón debo citar aún una expresión muy propia para inducir á error. Con el nombre de edema maligno designase en Francia una lesión carbonosa, en Alemania la afección que llamamos gangrena gaseosa. El bacilo del edema maligno de los autores alemanes es el agente de la gangrena gaseosa ; ahora bien, los bacteriólogos franceses le im-

ponen el nombre de vibrión séptico, denominación doblemente viciosa, pues dicho bacilo ni es vibrión, ni produce septicemia.

Tantos términos malos, inexactos ó erróneos como abundan en medicina, reclaman la revisión completa de nuestras expresiones técnicas. Difícil es la tarea : derribar lo establecido por el uso es empresa trabajosa y siempre se le objetará que, acordes como estamos sobre el significado de las voces que ahora se emplean, con ellas nos entendemos. Además, el celo de los reformadores se detendrá ante el fracaso que han tenido todas las tentativas hechas en este sentido. Las voces nuevas, á menudo extravagantes, creadas por Piorry ó Spring, no han adquirido domicilio, ni han servido en la ciencia, más que para estorbarla con algunos sinónimos inútiles. Sin embargo, siendo el lenguaje médico el más incorrecto de las ciencias, sería de desearse que una convención internacional permitiera fijar la terminologia. Los naturalistas han hecho ensayos de este género y han logrado buenos resultados.

En espera del filólogo que deba ponerse á la cabeza del movimiento, por mucho tiempo continuarémos sirviéndonos de las palabras consagradas por el uso; y, cuando se esté en apremio por una expresión técnica, no habrá más que abrir el diccionario de Garnier y Delamare. Con tan pequeño volumen, creemos que este libro constituye el repertorio médico más completo que actualmente exista : contiene gran número

de palabras que dificilmente podrán hallarse en otra obra.

Por eso ha prestado ya, y continuará prestándolos, muy grandes servicios á médicos y á estudiantes.

Me ha complacido mucho el que los autores me hayan exigido que presentara al público obra tan concienzuda como documentada. El éxito más feliz ha coronado la tentativa de ambos colegas.

A pesar de haber sido muy numerosas, hanse agotado rápidamente las dos primeras ediciones y tengo la persuasión de que esta nueva edición, cuidadosamente revisada y enriquecida con gran acopio de nuevos términos técnicos, desaparecerá tan rápidamente como las precedentes. Garnier y Delamare, que han tenido la rara fortuna de ver su obra tan prontamente convertida en clásica, podrán así dar á su libro los retoques necesarios para mantenerla siempre al corriente de las nuevas adquisiciones. Doblemente grato seríame tan feliz resultado : por los autores que encontrarían en él justa recompensa á sus esfuerzos, y por los lectores que de ese modo sacarían provecho, por muchos años, de una obra verdaderamente útil.

G.-H. ROGER.

DICCIONARIO

DE LOS

TÉRMINOS TÉCNICOS

USADOS EN MEDICINA

A

ââ. Véase : *ana.*

abanico (signo del) (Babinski, 1901). Signo que consiste en movimientos de abducción de los dedos del pie, que se separan los unos de los otros en *abanico*, cuando se hace ejecutar por ciertos hemipléjicos (hemiplejia infantil) movimientos alternativos de flexión y de extensión del tronco sobre la pelvis.

abasia, *s. f.* (ἀ priv.; βάσις, marcha). Pérdida más ó menos completa de la facultad de andar, sin que estén perturbadas la fuerza muscular y la sensibilidad. Coincide generalmente con la astasia.

abceso ó **absceso**, *s. m.* (*abscessus*, de *abscedere*, separarse). Colección de pus formada á expensas de los tejidos circunvecinos, destruidos ó comprimidos.

abiogenesis, *s. f.* (ἀ pr.; βίος, vida; γένεσις, generación) (Huxley). Generación espontánea.

ablactación, *s. f.* (*ab* priv.; *lac*, leche). Cesación de la lactancia, considerada en lo que toca á la madre.

ablefaria, *s. f.* (ἀ pr., βλέφαρον; párpado). Ausencia total congénita de los párpados.

abombamiento, *s. m.* (*voussure*, francès). Exageración de la convexidad del tórax limitada á una región. Ej. : *abombamiento precordial.*

abortivo, *adj.* (*ab* priv.; *oriri*, nacer). Lo que no llega al término normal de su evolución. Ex. : *forma abortiva de las pirexias.* — *s. m.* Substancia á que se atribuye la propiedad de provocar el aborto.

aborto, *s. m.* (*aboriri*,

abortar). Expulsión del feto antes de ser viable.

abraquia, *s. f.* (ἀ priv.; βραχίων, brazo). Ausencia congénita de los brazos.

abraquiocefalia, *s. f.* (ἀ pr ; βραχίων; κεφαλή, cabeza). Ausencia congénita de los brazos y de la cabeza.

Abrams (reflejo cardíaco de) (1899). Disminución de la macicez y del volumen del corazón determinada por la excitación mécánica de la región precordial (fricción, golpes, percusión).

abrasión, *s. f.* (*ab* priv.; *radere*, raspar). Raspado ó excisión de pequeños fragmentos mucosos superficiales.

abrupción, *s. f.* (*ab* priv.; *rumpere*, romper). Fractura transversal de un hueso, con fragmentos rugosos.

absintismo, *s. m.* (*absinthium*, ajenjo). Intoxicación por el ajenjo

absorbente, *adj.* y. *s. m.* (*ab*, de; *sorbere*, beber). Nombre dado á los medicamentos destinados á absorber los líquidos ó los gases.

absorción, *s. f.* « Vocablo que sirve en fisiología para designar una serie de actos por los cuales substancias exteriores á un organismo vivo penetran en el interior de éste sin lesión traumática ». (Paul Bert.)

absorción (bandas de). Bandas obscuras que atraviesan el espectro cuando se interpone en el trayecto de los rayos luminosos algún cuerpo químico en solución muy diluida ó en estado de vapor.

abulia, *s. f.* (ἀ priv., βουλή, voluntad). Perturbación mental caracterizada por la ausencia ó la disminución de la voluntad (neurastenia, histeria).

acanthosis nigricans (ἄκανθα, espina; *nigricare*, ser de color negruzco). (Pollitzer). Sin. *distrofia papilar y pigmentaria* (Darier). Dermatosis caracterizada por una hipertrofia papilar vegetante, con pigmentación y distrofia pilar y unguinal, y la coexistencia de carcinosis abdominal.

acantopelvis, *s. f.* (ἄκανθα, espina; *pelvis*). Sin: *pelvis espinosa*. Variedad de pelvis raquítica caracterizada por la presencia de puntas y de crestas óseas situadas en las inserciones tendinosas (eminencia ileo-pectínea, pubis).

acapnia, *s. f.* (Mosso). Fenómeno que consiste en la disminución del ácido car-

bónico en la sangre. Mosso explica el mal de las montañas por la *acapnia*.

acardíaco, *adj.* (ἀ priv.: καρδια, corazón). Monstruo privado de corazón. Véase : *anido*.

acaro, *s. m.* (ἄκαρι, insectillo). Sin. *sarcoptes scabiei*. Parásito de la clase de los arácnidos, que causa las lesiones de la sarna.

acarofobia, *s. f.* Excesivo temor que experimentan ciertas personas, á contraer la sarna.

acatéctico (estado) (ἀκαθεκτέω, no poder contener) (Liebermeister, 1893). Estado particular de la célula hepática que es incapaz de retener los pigmentos biliares.

acatesia ó **acatisia**, *s. f.* (ἀ priv.: κάθιξειν, hacer sentar) (L. Haskovec, 1901). Imposibilidad para ciertos neurasténicos de permanecer sentados.

acceso, *s. m.* Nombre dado á la repetición periódica de un fenómeno mórbido que aparece bruscamente, produce una turbación violenta de la salud y es de corta duración (*acceso de fiebre*, *acceso de tos*). Las fiebres intermitentes palúdicas han sido llamadas *fiebres de accesos*.

acefalia, *s. f.* (ἀ priv.; κεφαλή, cabeza). Monstruosidad que consiste en la ausencia de una parte de la cabeza ó de la cabeza entera.

acefalocisto, *s. m.* (ἀ priv.; κεφαλή, cabeza; κύστις, vejiga). Equinococo cuya cabeza no se ha desarrollado. No es género especial al hombre como lo había creido Laennec.

acero (ruido de) (Trousseau). Ruido análogo al que se obtendría golpeando una vasija de bronce. Se puede oir en un neumotórax extenso auscultando la pared posterior del tórax mientras otra persona golpea sobre una moneda aplicada contra la pared anterior.

acérvulo, *s. m.* Nombre dado á las concreciones calcáreas que se encuentran en los folículos de la glándula pineal.

acetonemia, *s. f.* (acetona; αἷμα, sangre). Teoría que explicaba la patogenia del coma diabético por la presencia de acetona en la sangre. Lancereaux ha propuesto aplicar este nombre al « conjunto de las complicaciones que sobrevienen en el curso de la diábetes y que reconocen por causa la retención en la economía de cualesquiera productos tóxicos; así como la palabra

uremia no indica un envenenamiento por la úrea, sino por todas las sustancias excrementicias no eliminadas ya por el riñón ».

acetonuria, *s. f.* (acetona; οὖρον, orina). Eliminación de acetona por la orina. Se encuentra en ciertos diabéticos y, en muy débil grado, en los febricitantes y los carcinomatosos. Revélase por el ligero olor cloroformico que comunica á la orina la acetona.

ácidopeirástica, *s. f.* (ἄκις, punta; πειρασθαι, explorar) (Middeldorpf). Método de exploración por medio de instrumentos punzantes.

ácido-resistentes (bacilos). Grupo de bacilos que poseen la propiedad de resistir á las descoloración por el ácido nítrico al tercio después de teñidos por la solución de fucsina fenicada. El bacilo de la tuberculosis es el tipo del grupo; se reserva el nombre de ácido-resistentes á los bacilos que tienen las mismas propiedades tintoriales, sin gozar de la acción patógena del bacilo de Koch.

acidosis, *s. f.* Impregnación ácida de los tejidos. Obsérvase particularmente en los diabeticos en inminencia de coma, y se manifiesta por la presencia en la orina de acetona, de ácido diacético, de ácido β oxibutírico y de una proporción exagerada de amoniaco.

acinesia, *s. f* ἀ priv.; κίνησις, movimiento). Dificultad ó imposibilidad de ciertos movimientos á consecuencia de la atrofia de los músculos correspondientes.

acinesis, *s f.* (ἀ priv.; κινεῖν, mover) (Romberg). Parálisis.

acinética (división) (ἀ priv.: κίνησις, movimiento). Véase : *amitosica*, (*división*).

acinos, *s. m.* (ἄκινος, grano de uva). Racimo de fondos-de-saco que se abren en el mismo canal glándulas en racimo, pulmón).

aclimatamiento, *s. m.* (aclimatar). Modificación más ó menos profunda que se produce espontáneamente en los diversos seres animales y vegetales, bajo la influencia de un clima diferente á aquel en que vivieran antes, y que les permite vivir y reproducirse en estas nuevas condiciones.

acmé (período de). Período en que los síntomas alcanzan el máximum de intensidad, mientras la afección permane e como estacionaria.

acné, *s. m.* (ἀκνή, error

de copia en Aecio por ἀκμή, eflorescencia. Littré). Con este nombre designan muchos dermatólogos toda afección de la piel caracterizada por una lesión ó perturbación funcional de las glándulas sebáceas ó pilo-sebáceas. Se da más especialmente al acné inflamatorio ó botonoso, el cual se distingue por una erupción de pápulo-pústulas más ó menos salientes localizada en la cara y en la parte superior del tórax.

acné puntuado. Véase : *comedón.*

ácné rosáceo ó **rosado** ó **eritematoso.** Véase : *caparrosa.*

acnitis, *s. f* Variedad de foliculitis descrita por Barthelemy, que consiste en un tumorcito inflamatorio, el cual, primero subcutáneo, se abre luego hacia la piel y se cubre de una costrilla. Su evolución es muy lenta.

acolia, *s. f.* (ἀ priv.; χολή, bilis). Supresión de la secreción biliar.

acolia pigmentaria (Hanot). Ausencia de secreción de los pigmentos biliares. Está caracterizada por el hecho de que la ictericia desaparece aun cuando las materias fecales permanecen descoloridas (agravación del pronóstico).

acolúrica (ictericia). Ictericia ligera caracterizada por la no eliminación de pigmentos biliares por la orina, y por la presencia de estos mismos pigmentos biliares, normales ó modificados, en el suero sanguíneo.

acollis (uterus), (ἀ priv.; *collum,* cuello) Utero cuyo cuello ha sufrido una detención completa en su desarrollo.

acomodación, *s. f.* (*ad.* á; *commodus,* cómodo). 1° (oftalmología) Propiedad que posee el ojo de adaptarse á diversas distancias; 2° (obstetricia) Modificación de la actitud del feto en los tres últimos meses de la preñez. Su efecto es alojar la extremidad más gruesa del feto en la parte más ancha del útero, en particular poner la pelvis y los miembros inferiores en relación con la parte superior del útero.

acondicionamiento, adiestramiento, *s. m.* (francés, *entraînement*). « Conjunto de los medios higiénicos puestos en práctica en el hombre y en los animales con el propósito de favorecer el desarrollo de los órganos en una dirección dada. El *acondicionamiento* se aplica para la curación de ciertas enfermedades : trata-

miento de la obesidad, de la diábetes, de la debilidad orgánica.» (Gilbert.)

acondroplasia, *s. f.* (ἀ priv., χόνδρος, cartílago; πλάσσειν, formar) (Parrot, 1878). Enfermedad intrauterina del feto, caracterizada por la detención del desarrollo longitudinal de los huesos mientras el volumen de éstos, por lo contrario, ha aumentado.

acoria, *s. f.* (ἀ priv.; κόρη, pupila). Ausencia congénita del iris.

acorion, *s. m.* (ἀχὼρ, malos humores de los niños) (Schenlein). Parásito del favus

acrocefalia, *s. f.* (ἄκρος, extremidad; κεφαλή, cabeza). Sin. : *oxicefalia*, *hipsocefalia*, *pirgocefalia* (antropología). Deformación craneana debida á la sinostosis precoz de las suturas sagital y coronal, y caracterizada por el desarrollo considerable de la región occípital y el achatamiento lateral de la cabeza (cabeza en *pan de azucar*). Esta deformación puede ser causada por la sífilis hereditaria.

acrocianosis, *s. f.* (ἄκρος; κυανός, azul) (Crocq). Síndroma caracterizado por la cianosis permanente de las extremidades con pocos fenómenos dolorosos.

acrocordon, *s. m.* (ἄκρος; κορδὴ, cuerda). Nombre dado á las verrugas pediculadas.

acrodermatitis, *s. f.* (ἄκρος; δέρμα piel). Afección cutánea caracterizada por su localización en los extremos de los miembros, por las distrofias unguinales que la acompañan, por la falta de extensión á las otras partes del cuerpo, excepto la boca, y finalmente por la resistencia tenaz á todo tratamiento.

acrodinia, *s. f.* (ἄκρος, ὀδύνη, dolor). Enfermedad epidémica caracterizada por « dolores y adormecimientos en los miembros, más particularmente en las extremidades inferiores, perturbaciones digestivas, manchas eritematosas, á las veces pápulas, flictenas seguidas de descamación, y más rara vez una coloración negruzca de la epidermis. » (E. Vidal.) Esta enfermedad, observada de 1828 á 1854, parece haber desaparecido por completo.

acrofobia, *s. f.* (ἄκρος, cima; φόβος, medio). Aprehensión angustiosa que experimentan ciertos individuos (degenerados) cuando se hallan sobre una altura.

acromatina, *s. f.* (ἀ priv.; χρῶμα, color). Sin.

hialo-plasma, plasma nuclear, sustancia acromática. Sustancia líquida que se colora dificilmente y que constituye, con la cromatina, el núcleo de la célula.

acromático (huso). Sin. *huso de segmentación.* Figura fusiforme que en el curso de la cariocinesis se presenta en el cuerpo celular, formada por una serie de filamentos que parecen irradiar de los dos centrosomas. Este huso se forma á expensas de ambas redes celular y acromática nuclear.

acromatocito, *s. m.* (ἀ priv.; χρῶμα, color; κύτος, célula) (Hayem). Glóbulo rojo que, después de su transformación vesiculosa, ha perdido la materia colorante.

acromatopsia, *s. f.* (ἀ priv; χρῶμα, color; ὄψις, vista). Abolición de la percepción de los colores La retina no da sino la sensación del blanco, del negro y de los matices intermedios. — *a parcial.* Ceguera para ciertos colores. Sobre todo para con el rojo y el verde, y en este caso se llama *daltonismo.*

acromegalia, *s. f.* (ἄκρος. extremidad; μέγας, grande). Sin. *Enfermedad de Marie.* « Hipertrofia singular. no congénita, de las extremidades superiores, inferiores y celálica. » (Marie.)

acromelalgia, *s. f.* (ἄκρος; μέλος, miembro, ἄλγος, dolor). Afección caracterizada por accesos de dolores en los dedos de los pies y de las manos y por cefalalgia y vómitos. Es probablemente una forma de la eritromelalgia.

acrometagénesis, *s. f.* (ἄκρος; μετα, que indica cambio ; γένεσις, nacimiento) (Babes). Deformación desarrollada simétricamente en los cuatro miembros bajo la influencia de una anomalía congénita de la cabeza.

acromia, *s. f.* (ἀ priv.; χρῶμα, color). Disminución ó desaparición completa de la pigmentación normal de la piel.

acroneurosis, *s. f.* (ἄκρος, extremidad). Perturbaciones nerviosas de las extremidades.

acrooglicogenuria, *s. f.* Presencia del acrooglicógeno en la orina. El acrooglicógeno ó goma animal presenta algunas de las reacciones que sirven para descubrir la albúmina y puede ocasionar errores; por lo demás, es un producto muy raro.

acroparestesia, *s. f.* (ἄκρος, extremidad; parestesia) (Schultze, 1892). Afec-

ción caracterizada por adormecimientos, hormigueos, ú otras parestesias de las extremidades, acompañados de dolores paroxísticos.

acropostitis, *s. f.* (ἄκρος; πόσθη, prepucio, Inflamación del prepucio.

acrotrofoneurosis. *s. f.* Trofoneurosis de las extremidades. Nombre genérico con el cual designa Lancereaux la gangrena simétrica de las extremidades, el acromegalia.

acruoria, *s. f.* (ἄ priv.; *cruor*, sangre). Disminución considerable del cruor (parte sólida) de la sangre (cloro-is)

actinografía, *s. f.* (ακτίς, ινος, rayo; γραφειν, escribir) Fotografía que se obtiene colocando el objeto entre la placa sensible y la fuente luminosa: sólo las partes transparentes del objeto dejan pasar los rayos que van luego á impresionar la placa.

actinomiceto, *s. m.* ó **actinomyces bovis**. Hongo parásito que constituye los gránulos amarillos característicos de la actinomicosis. El centro del gránulo está compuesto por una red miceliana, de la que parten, dispuestos en radios, filamentos con forma de maza.

actinomicosis, *s. f.* (ακτίς, radio; μυκης, hongo). Enfermedad causada por el desarrollo de actinomicetos en los diferentes tejidos ú órganos de la economía (en especial en la boca); caracterizada esencialmente por la presencia, en el pus ó en los tejidos, de pequeñas granulaciones amarillas de dimensiones variables, desde las de un grano de licopodio á las de un grano de mijo.

actinoscopia, *s. f.* Estudio de la transparencia de los tejidos y de los órganos. Ejemplo: *examen de un hidrocele*.

actinoterapia, *s. f.* (ἀκτίς, ινος, rayo; θηραπεύειν, curar. Método terapéutico que utiliza las radiaciones de diversa naturaleza (rayos X, radiaciones del *radio*, etc.).

acúmetro, *s. m.* (ἀκούειν, oir; μετρον, medida). Instrumento con que se mide la agudeza auditiva.

acupuntura, *s. f.* (*acus*, aguja; *punctura*, punturа). Operación que consiste en introducir, con un fin terapéutico, agujas finas casi capilares en los tejidos ó en los órganos, las cuales permanecen en éstos por tiempo más ó menos largo.

acutus (decubitus). Véase : *decúbito agudo.*

adaptación, *s. f.* 1° Sinónimo de *acomodación* (oftalmología) — 2° a. *retiniana.* Facultad de la retina de adaptarse á alumbrados relativamente débiles, la cual permite la visión en la semi-oscuridad.

Addison (enfermedad de) (1855). Sin. *enfermedad bronceada.* Afección caracterizada por astenia profunda unida á dolores lumbares, trastornos gástricos, cierta coloración bronceada de la piel y manchas pigmentarias de las mucosas. Es debida, lo más frecuentemente, á la tuberculosis de las cápsulas suprarenales.

adenectomía, *s. f.* (ἀδήν, glándula; ἐκτομή, excisión). Ablación de las vegetaciones adenoides.

adenia, *s. f* ἀδήν, glándula (Trousseau). Sin : *linfadenia de Bonfils, linfadenia aleucemica de forma ganglionar.* Enfermedad caracterizada por la proliferación del tejido linfoide en uno ó varios grupos ganglionares.

adenitis, *s. f.* (ἀδήν, glándula. Inflamación aguda ó crónica de los ganglios linfáticos

adeno-cáncer, *s. m.* (ἀδήν, glándula; cáncer) (Gilbert). Variedad de cáncer que presenta los caracteres histológicos del adenoma, pero con la gravedad y el poder infectante propios del cáncer. Se la observa particularmente en el hígado, en donde se halla acompañada de cirrosis (cáncer con cirrosis).

adenocondroma, *s. m.* (ἀδήν, glándula; χόνδρος, cartílago. Se da á veces este nombre al tumor cartilaginoso (condroma) desarrollado sobre una glándula.

adeno-fibroma, *s. m.* (ἀδήν, glándula: *fibra*, fibra). Tumor desarrollado á expensas de los elementos de una glándula (la mamaria), cuyo tejido conjuntivo se transforma según el tipo fibroso.

adenoflegmón, *s. m,* (ἀδήν glándula; φλεγμω, quemo). Adenitis supurada, que forma un absceso endoganglionar y otro perigangionar

adenoides (vegetaciones ó tumores). Hipertrofia del tejido adenoide que constituye la amígdala faringea; se observa sobre todo en la segunda infancia.

adenoidea ó adenoidiana (facies). Aspecto especial que toma el rostro de los niños que

padecen de vegetaciones adenoides, debido al achatamiento transversal de la nariz, la desaparición de los surcos nasogenianos y nasomalares, la prominencia de los ojos, y el acortamiento del labio superior que no alcanza á cubrir sino imperfectamente los incisivos superiores : la boca permanece entreabierta, la mirada apagada, y el conjunto es el de un atontado.

adenoiditis, *s. f.* Acceso inflammatorio de las vegetaciones adenoides.

adeno-lipomatosis simétrica principalmente cervical. « Afección caracterizada por la presencia de tumefacciones lipomatosas difusas diseminadas simétricamente en los diferentes puntos del cuerpo, y en particular en la región cervical, en donde producen deformaciones características siempre semejantes á sí mismas ». (Launois y Bensaude). Parece ser una afección de los ganglios y vasos linfáticos

adeno-linfitis, *s. f.* Inflamación de los ganglios y de sus vasos linfáticos tributarios.

adeno-linfocele, *amb.* Dilatación varicosa de los ganglios linfáticos.

adenoma, s. *m.* (ἀδὴν glándula). Tumor que reproduce en su forma y estructura los elementos normales de una glándula.

adeno-mixoma, *s. m.* Tumor desarrollado á expensas de los elementos de una glándula (la mamaria), cuyo tejido conjuntivo se transforma según el tipo mucoso.

adenopatía, *s. f.* (ἀδὴν, glándula ; πάθος, enfermedad). Nombre genérico que sirve para designar las inflamaciones crónicas de los ganglios linfáticos.

adeno-sarcoma, *s. m.* Tumor desarrollado á expensas de los elementos de una glándula (la mamaria), cuyo tejido conjuntivo se transforma según el tipo embrionario.

adenotomía, *s. f.* (ἀδὴν, glándula ; τομὴ, sección). Véase : *adenectomia.*

adenotriquia, s. *f.* Véase : *folliculitis.*

adherencia, *s. f.* (*adhærere*, adherir) Unión viciosa ó accidental de superficies contiguas.

adinamia, *s. f.* ἀ priv.; δύναμις, fuerza). Extremada debilidad muscular que acompaña ciertas enfermedades y en particular ciertas formas de pirexias.

adipocira, *s. f.* (*adeps*,

grasa; *cera*, cera). Substancia gris-blancuzca, blanda y grasosa al tacto, proveniente de la saponificación de los tejidos en los cadáveres que han permanecido mucho tiempo en el agua ó la tierra húmeda.

adipopéxico, *adj.* (*adeps*; πήξις, fijación) (Gilbert). Se dice de la función de un órgano que fija las grasas dentro de sus elementos (hígado).

adiposis, *s. f.* (*adeps*, grasa). Estado mórbido caracterizado por la sobrecarga de grasa en el tejido celular.

adiposis dolorosa. Véase: *Dercum* (*enfermedad de*).

adisonismo, *s. m.* (Boinet, 1901). Nombre propuesto por Boinet para designar el síndroma atenuado de la enfermedad de Addison que á veces se encuentra en el curso de ciertas enfermedades generales (tuberculosis, cáncer, sífilis, arterio-es lerosis, etc.), cuando el proceso mórbido interesa secundariamente las cápsulas suprarenales.

aerobio, *adj.* (ἀήρ, aire; βίος, vida). Nombre dado por Pasteur á los microorganismos que no pueden vivir sin oxígeno.

aerofagia, *s. f.* (ἀήρ; φαγεῖν, comer). Deglución de aire seguida de eructaciones; síntoma de algunas gastropatías de origen histérico ó histero-neurasténico, y aun de ciertas gastritis acompañadas de perturbaciones nerviosas. — *a. voluntaria*. La de los buzos.

aerofobia, *s. f.* (ἀήρ; φόβος, temor). Horror del aire; síntoma frecuente en la rabia.

aeropiesia ó **aeropiesoterapia,** *s. f.* (ἀήρ; πίεσις, presión; θεράπεια, cura). Método terapéutico fundado sobre el empleo del aire condensado ó rarificado, y que comprende: 1° Las curas de altitud; 2° El empleo de aparatos especiales (campanas, cámaras neumáticas).

aeropiesismo, *s. m.* (ἀήρ; πίεσις) Conjunto de los accidentes provocados por la acción sobre el organismo del aire rarificado (*a. negativo*) ó muy condensado (*a. positivo*).

aeropletismógrafo, *s. m.* (ἀήρ; πληθυσμός, crecimiento; γραφή, inscripción). Aparato destinado á registrar, ó inscribir, los cambios de volumen del tórax durante la respiración.

aeroterapia, *s. f.* (ἀήρ; θεράπεια, terapéutica). Cura de aire. Método de trata-

miento de las enfermedades, y en particular de las afecciones crónicas del pulmón (tuberculosis enfisema), por el aire dotado de cualidades especiales (aire frío, aire de las montañas ó del mar, aire comprimido, aire rarificado).

aerotonómetro, *s. m.* (ἀήρ; τόνος, presión; μέτρον, medida) (Flüger). Aparato destinado á medir la tensión de los gases en la sangre y en los otros líquidos del organismo.

aerotropismo, *s. m.* (ἀήρ; τρεπειν, cambiar). Propiedad del protoplasma de reaccionar en presencia del oxígeno. — *a positivo.* Atracción del oxígeno sobre el protoplasma. — *a. negativo.* Repulsión.

afalgesia, *s. f.* Véase: *hafalgesia.*

afaquia, *s. f.* (ἀ priv.; φακός, lente) Ausencia de cristalino, traumática ú operatoria.

afasia, *s. f.* (ἀ priv.; φάσις, palabra). Para Trousseau, creador del vocablo, era la imposibilidad de traducir el pensamiento, por medio de palabras, á pesar de la intregridad funcional de la lengua y de la laringe. Desde entonces, hase extendido su significado; actualmente se expresa con dicho vocablo la falta de adaptación de la palabra á la idea, ora se trate de trasmitir una idea (*afasia motriz ó afemia* y *agrafia*), ora de recibir la idea (*sordera verbal* y *ceguera verbal*); y, de una manera más general aún, la *afasia* indica también la pérdida de la memoria de los signos que sirven al hombre para cambiar ideas con sus semejantes.

afasia óptica (Freund, 1889). Perturbación del lenguaje observada en algunos afásicos sensoriales. El enfermo no puede nombrar un objeto que se somete únicamente á su examen visual, á pesar de que lo reconoce; pronuncia inmediatamente el nombre sí lo palpa. lo gusta, lo huele. Este síntoma se acompaña á menudo de *ceguera psíquica.*

afemia, *s. f.* (ἀ priv; φήμι, hablo) (Broca, 1861). Sin: *alalia, anaudia, afasia motriz vocal.* Imposibilidad de expresar idea ó sentimiento alguno por medio de la palabra.

afiso-cauterio, *s. m.* (ἀ priv.; φύση, fuelle; cauterio) (Dechery, 1897). Cauterio que se mantiene al rojo por la combustión de una mezcla de aire y de vapores

de éter, y que se distingue del termo-cauterio por la ausencia de los tubos y bomba destinados á soplar.

afonía, *s. f.* (ἀ priv.; φωνή, voz). Pérdida más ó menos completa de la voz, causada por una lesión ó una parálisis del órgano de la fonación.

afrasia, *s. f.* (ἀ priv.; φράσις, manera de hablar). (A. de Fleury). Término bajo el cual se designó primero la *pa afasia*.

afrodisia, *s. f.* (Ἀφροδίτη, Venus). Exageración mórbida de los deseos sexuales.

afrodisiaco, *adj.* y *s. m.* (Ἀφροδίτη, Venus). Sustancia que excita el apetito genésico.

afta, *s. m.* **aftosa (estomatitis)**, (ἅπτειν, quemar). Erupción vesiculosa de la mucosa bucal seguida de alteraciones superficiales de la misma mucosa. A veces la acompañan fenómenos generales. Debe considerarse como una enfermedad contagiosa, inoculable, análoga á la fiebre aftosa de los bovideos.

afta de Bednar. Sin: *afta del paladar*. Manchas amarillas situadas á cada lado del rafe medio del velo del paladar, las cuales pueden terminar por ulcerarse. Se observan en los niños de tierna edad atacados de estados mórbidos diversos (traumatismo, atrepsia, quistes epidermoideos, etc.).

aftosa (fiebre). Enfermedad eruptiva y contagiosa propia de los bovideos, caracterizada por el desarrollo de aftas sobre la mucosa bucal y los pezones. Puede trasmitirse al carnero, al perro, al puerco y aun al hombre.

afección, *s. f.* (*afficere*, debilitar). « Proceso mórbido considerado en sus manifestaciones actuales, con abstracción de las causas. En este mismo sentido ha preconizado Landouzy el término *patía* como afijo después del nombre del órgano ». (Roger.) Ej. *cardiopatía*.

afusión, *s. f.* (*affundere*, verter sobre). Medio terapéutico que consiste en derramar de poca altura cierta cantidad de agua sobre una parte cualquiera del cuerpo.

agalactia, *s. f.* (ἀ priv.; γάλα, leche). Ausencia de la secreción láctea después del parto.

agaro ó **agar-agar**, *s. m.* Alga de la familia de las Florideas, común en los mares del Japón. Contiene un producto coloide (gelosa), y se utiliza en la preparación de medios de cultivo sólidos,

que se llaman indiferentemente *agaro* ó *gelosa*.

agenesia, *s. f.* (ἀ priv.; γένεσις, generación). 1° Impotencia; imposibilidad de engendrar. — 2° Detención parcial del desarrollo del embrión que causa ciertas atrofias de orden teratológico. — 3° (Antropología). Sin.: *homogenesia agenésica*. Nombre dado por Broca á los cruzamientos cuyos productos son absolutamente infecundos entre sí ó con individuos de una de las dos razas madres

agenosoma, *s. m.* (ἀ priv.; γεννᾷν, engendrar; σῶμα, cuerpo (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo en el cual los órganos genitales y urinarios son nulos ó muy rudimentarios.

ageusia ó **ageustia,** *s. f.* (α priv.; γεῦσις, gusto). Disminución ó abolición del sentido del gusto.

aglobulia, *s. f.* (ἀ priv.; glóbulo). Nombre que se da á veces á la disminución del número total de los glóbulos rojos. Vease: *anemia*.

aglosia, *s. f.* (ἀ priv.; γλῶσσα, lengua) Ausencia congénita de la lengua.

aglutinación de los microbios. Fenómeno que presentan ciertos microbios (bacilos tíficos vibriones coléricos) cuando se añade al cultivo de alguno de ellos en caldo, suero de un animal vacunado contra este microbio. Júntanse entonces en montoncillos que caen al fondo del tubo, y el líquido permanece claro en la parte superior; esta conglomeración en copos debe comprobarse al microscopio. La aglutinación se observa no sólo con el suero de un animal vacunado, sino aun en el curso de la infección. Esta propiedad se aprovecha para el diagnóstico de ciertas enfermedades (f. tifoidea).

aglutinina, *s. f.* Sustancia contenida en ciertos sueros, que goza de la propiedad de aglutinar ya los glóbulos rojos de la sangre (*hemoaglutinina*), ya los bacilos en un líquido.

agminado, *adj.* (*agminari*, marchar en formación). Se dice de varios órganos elementales de la misma especie cuando se hallan reunidos los unos á los otros.

agnatia, *s. f.* (ἀ priv; γνάθος, mandíbula). Ausencia congénita del maxilar inferior.

agnoscia, *s. f.* (ἀ priv.; γιγνώσκω, reconocer). Pérdida de la facultad de reconocer los objetos por medio de uno de los sentidos, á pesar de la integridad relativa del territorio cerebra

sensitivo ó sensorial correspondiente, integridad que permite la sensación (ceguera, sordera psíquicas, asimbolia, etc.).

agonía, *s. f.* (ἀγωνία, combate). Período de transición de la vida á la muerte, caracterizado por el debilitamiento de la circulación, el cual causa la irrigación insuficiente del cerebro y la disminución ó la abolición de la inteligencia

agorafobia, *s. f.* (ἀγορά, plaza; φόβος, temor). Miedo al espacio; aprehensión, á menudo acompañada de angustia y de vértigos, de atravesar las plazas, los puentes.

agrafia, *s. f.* (ἀ priv.; γράφειν, escribir) (Oyle, 1867). Sin.: *afasia motriz gráfica.* Imposibilidad de expresar por medio de palabras escritas, ó de signos, las ideas y sentimientos. — *agrafia música.*

agresina, *s. f.* (Bail, 1905). Sustancias particulares segregadas por ciertas bacterias; tienen una acción *agresiva* contra las células del organismo; paralizan los leucocitos y favorecen así la multiplicación rápida de las bacterias y el desarrollo de una toxi-infección de evolución fulminante.

agripnia, *s. f.* (ἀ priv.; ὕπνος, sueño). Insomnio.

agripnode (coma). Véase: *coma vigil.*

aicmofobia, *s. f.* (ἀιχμή, punta; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa (fobia) de tocar los objetos puntiagudos.

ahorro (alimentos de) Véase: *economía (alimentos de).*

ai doloroso (nombre debido al brusco dolor que provoca el menor movimiento). Véase: *sinovitis crepitante.*

ailurofobia, *s. f.* (αἴλουρος, gato; φόβος, temor). Miedo mórbido á los gatos.

ainhum, *s. m.* Afección exótica, que se considera como una trofoneurosis caracterizada por la amputación espontánea de un dedo de pié (generalmente el quinto). El *ainhum* no se observa sino en la raza negra y sólo en el sexo masculino.

akinesia (algera) (Mœbius, 1891) « Sindroma caracterizado por sensaciones dolorosas producidas por algunos movimientos voluntarios, los cuales dolores no se explican por lésión local alguna y entran por lo tanto en el grupo de las algias centrales » (Déjerine).

alalia, *s. f.* (ἀ priv.; λαλεῖν, hablar). Véase: *afemia.*

alantiasis, *s. f.* (ἀλλᾶς,

salchicha). Véase: *botulismo*.

alantoide, *s. f.* (ἀλλᾶς, salchicha; εἶδος, forma). Organo embrionario que aparece en el vecindario de la extremidad posterior del embrión bajo forma de una vesícula que crece rápidamente y va á tapizar la cara interna del corion. Forma la vejigá, el uraco y la placenta.

Albert (operación de) (1878). Véase : *artrodesis*.

albinia, *s. f.* Véase : *albinismo*.

albinismo, *s. m.* (*albus*, blanco). Ausencia congénita de pigmento, parcial ó general, á veces limitada al globo ocular.

albino, *adj.* El que está atacado de albinismo.

albugo, *s. m.* (*albus*, blanco). 1° Perturbación trófica de las uñas que se manifiesta por manchitas blancas, transversales, estriadas ó no. — 2° Manchas blancas de la córnea debidas al acúmulo de granulaciones grasosas en su espesor.

albuminímetro, *s. m.* Aparato empleado en clínica para medir aproximativamente la cantidad de albúmina contenida en la orina.

albuminismo, *s. m.* Exageración de la cantidad de albúmina consumida como alimento, y manifestaciones que resultan de ella.

albuminuria, *s. f.* Presencia de albúmina en la orina. A veces se toma como sinónimo de *mal de Bright*.

albuminuria intermitente cíclica. Véase: *Pavy* (*enfermedad de*).

albuminuria ortostática (ὀρθοστατεῖν, estar de pié). Teissier, 1885). Sin. : *albuminuria de la estación vertical*, *a. de postura* (Stirling). Variedad de albuminuria intermitente, en la cual la albúmina aparece únicamente en la estación vertical. Se observa en los jóvenes de cepa neuro-artrítica, no corresponde á lesión renal alguna y desaparece con la edad. La *albuminuria ortostática* puede presentarse también al principio ó al fin de las nefritis.

albumosuria, *s. f.* Sin. : *propeptonuria*. Presencia en la orina de propeptona ó albumosa. Estas son productos de la digestión incompleta de las materias albuminoides y constituyen un producto intermediario entre las sintoninas y las peptonas. No se coagulan por el calor, mas sí en frío por el ácido nítrico.

alcalinimetría, *s. f.* Valuación de la alcalinidad

de un líquido orgánico y más particularmente de la sangre.

alcaptonuria, *s. f.* (Bœdecker, 1859). Presencia de alcaptona en la orina. Las orinas alcaptonúricas reducen el licor de Fehling; pero no desvían el plano de polarización ni fermentan bajo la influencia de la levadura. Reducen en frio el nitrato de plata amoniacal. La *alcaptonuria* no corresponde á estado patológico determinado y aun puede observarse en individuos perfectamente sanos.

alcoholado, *s. m.* Sin.: *tintura alcohólica*. Medicamento que se obtiene disolviendo en alcohol (solución, maceración, lixiviación) los principios activos de sustancias medicinales. Las tinturas de sustancias vegetales están *al quinto* (1 de sustancia para 5 de alcohol). Las tinturas de sustancias animales están *al décimo*.

alcoholato, *s. m.* Medicamento líquido que resulta de la destilación del alcohol sobre una ó varias sustancias aromáticas (licores de mesa).

alcoholatura, *s. f.* Medicamento que se obtiene por la maceración, por partes iguales, de una planta fresca en alcohol.

alcoholismo, *s. m.* Conjunto de los accidentes mórbidos producidos por el abuso de bebidas alcohólicas. — *a. agudo*. — *a. crónico*.

alcoholomanía, *s. f.* (alcohol; μανία, locura). Período latente de intoxicación alcohólica crónica, durante el cual no manifiesta su acción el alcohol más que por la costumbre y la necesidad de él.

alecíticos (óvulos) (ἀ priv.; λέκιθος, yema de huevo). Sin.: *óv. holoblásticos*. Nombre dado á aquellos huevos cuyo vitelo nutritivo (deutoplasma ó lecito), muy poco abundante, no forma una masa separada, y los cuales se segmentan en totalidad (huevos de segmentación total é igual. Mamíferos).

Alep (botón de). Véase: *Botón de Oriente*.

aleucémia (linfadenia) (ἀ priv.: λευκός, blanco; αἷμα, sangre). Forma de la linfadenia caracterizada por la proliferación de tejido linfoide sin aumento notable del número de los glóbulos blancos en la sangre.

Alexander (operación de). Véase: *Alquié-Alexander (operación de)*.

alexia, *s. f.* (ἀ priv.; λέξις, palabra). Véase: *ceguera verbal*. — *a. music*. Vease: *ceguera music*

alexina, *s. f.* (ἀλέξειν, rechazar) (Buchner). Sin. : *citasis, complemento.* Nombre dado á ciertas sustancias albuminoides dotadas de propiedades bactericidas, que se encuentran en el suero de la sangre normal.

alexifármaco, *s. m.* (ἀλέξειν, rechazar; φάρμακον, veneno): Antídoto. « Los *alexifármacos* de los antiguos eran tónicos, excitantes, sudoríficos. » (Littré).

alfos, *s. m.* (ἀλφός. empeine blanco). Viejo vocablo sinónimo de *psoriasis.*

algesímetro, *s. m.* (ἀλγησις, dolor; μέτρον medida). Aparato con que se mide la intensidad de la excitación necesaria para producir una impresión dolorosa.

algesiógeno, *adj.* (ἀλγησις. γεννᾷν, engendrar). Lo que provoca dolor.

algia, *s. f.* (ἄλγος, dolor). Dolor de un órgano ó de una región, que no responde á lesión anatómica alguna. — Empleada como afijo, esta palabra encierra la idea de un dolor sin lesión. Ej. : *artralgia, neuralgia.*

algias histéricas, a. hipocondriacas. Dolores localizados en un punto variable, sin determinación anatómica ó fisiológica.

algidez, *s. f.* (*algidus,* que hiela). Estado mórbido caracterizado por el enfriamiento de las extremidades con sensación de frio y tendencia al colapso, sin que la temperatura central corresponda necesariamente con el descenso de la temperatura periférica. Ej :*periodo álgido del cólera, fiebre álgida, acceso álgido* (variedad de fiebre intermitente ó perniciosa).

algofilia *s. f.* (ἄλγος, dolor; φιλία, amistad). Inclinación mórbida á las sensaciones dolorosas; se la observa en ciertos degenerados y dementes.

algostasia provisoria (ἄλγος, dolor στάσις, detención) (Verneuil). Disminución, y aun a veces abolición completa, de la sensibilidad al dolor, que se observa en el momento de un gran traumatismo (aplastamiento de un miembro), de una herida por arma de fuego ó arma blanca. Débese ya á la conmoción general que compaña al traumatismo, ya á una emoción violenta (herida de guerra) que disminuye la receptividad del sistema nervioso central.

Alibert (enfermedad de), Véase : *micosis fungoide.*

alible, *adj.* (*alere,* nutrir). Propio para la nutri-

ción. — *Sustancia alible*. Para algunos autores: sustancia enteramente asimilable.

alienación mental (*alienus*, extraño). Nombre genérico dado, à partir de Pinel, á tòdas las formas de locura.

alimentación forzada (francés, *gavage*). Introducción de alimentos en el estómago por medio de un tubo Se la emplea ya para sobrealimentar algunos enfermos (tuberculosos), ya para alimentar á los que por invencible desgana, vómitos incoercibles ó en ciertas formas de demencia, se privan de comer.

alocinesia, *s. f.* (ἄλλος, otro; κίνησις movimiento). Perturbación de la motilidad que consiste en mover un miembro cuando se quiere hacer obrar el miembro simétrico.

alopatia, *s. f.* (ἄλλος, otro; πάθος; enfermedad). «Método de tratamiento en el cual se emplean medicamentos que producen en el hombre sano fenómenos mórbidos distintos à los que se observan en el enfermo.» (Littré.

aloquiria, *s. f.* (ἄλλοχχερ, la otra mano) (Obersteiner). Perturbación de la sensibilidad que consiste en localizar en un punto simétrico sensaciones percibidas en un lugar cual quiera de la superficie cutànea. El enfermo punzado en el brazo derecho, p.. ej., acusa dolor en el punto simétrico del brazo izquierdo.

alorritmia, *s. f.* (ἄλλος; ῥυθμός, ritmo (Sommerbrodt). Nombre que comprende las diversas arritmias periòdicas del corazón y del pulso, tales como el pulso bi ó tri-gémino, el ritmo pareado, etc.

alotriofagia *s. f.* (ἀλλότριος, extraño; φαγεῖν, comer). Véase: *pica*.

alotriosmia *s. f.* (ἀλλότριος, extranjero; οσμὴ, olor). Trastorno del olfato, que consiste en percibir sensacions olfativas paradójicas: el olor percibido es distinto al de la sustancia sometida à la olfacción. Ej.: el pan huele à madera quemada.— Cuando la *alotriosmia* está limitada à ciertos olores, se la llama à veces *daltonismo olfativo*.

alopecia, *s. f* (ἀλώπεξ, zorro; porque el zorro está sujeto à una enfermedad que le hace perder el pelo (Littré). Caida general ó parcial del cabello ó de los vellos.

Alquié-Alexander (operación de) (Alquié,

1840 ; Alexander, 1881). Operación que consiste en acortar los ligamentos redondos del útero á nivel de sus inserciones pubianas, y la cual tiene por objeto corregir la retroflexión ó la retroversión uterinas.

alto mal. Nombre dado al gran ataque convulsivo de epilepsía.

alternativa (locura). Modalidad particular de locura periódica en la cual alternan regularmente los accesos maniaco y melancólico. Véase : *periódica (locura)*.

alterna (hemiplejia). Véase : *Millard-Gubler (sindroma de)*.

alucinación, *s. f.* (*allucinare*, engañarse). « Convicción intensa de percibir una sensación en momentos en que no se halla al alcance de los sentidos objeto exterior alguno capaz de provocar dicha sensación. » (Esquirol.)

alucinación hipnagógica (ὕπνος, sueño ; ἀγωγός que trae) (Baillarger). Nombre dado á las visiones fugitívas que á veces preceden inmediatamente el sueño.

alveolar (punto) (antropología). Nombre con que se designa en cráneometría el punto medio del borde anterior del arco alveolar en el maxilar superior.

alveolitis, *s. f.* 1° Véase : *periostitis alveolodentaria*. — 2° Inflamación de los alveolos pulmonares en la neumonía y la bronconeumonía.

alvinas (deyecciones) (*alvus*, bajo vientre), Materias fecales.

amarillo (tifus). Véase : *fiebre amarilla*

amaurosis, *s. f.* (ἀμαυρόω. oscurezco). Ceguera ó turbación profunda de la visión que no puede atribuirse á lesión determinada.

amaxofobia, *s. f.* (ἅμαξα, carro : φόβος, temor). Aprehensión angustiosa (fobia) en presencia de carruajes.

amazia, *s. f.* (ἀ priv ; μαζός o μαστός, mama). Ausencia congénita de la glándula mamaria.

ambliopía, *s. f.* (ἀμβλύς, obtuso ; ὤψ, ojo) Disminución de la agudeza visual no relacionada con lesión definida alguna.

amboceptor, *s. m.* (*Ambo*, ambos : *capere*, tomar) (Ehrlich). Véase : *sensibilisatriz* En la teoría de la inmunidad de Ehrlich la sustancia sensibilisatriz serviría de intermediaria entre la alexina y la molécula

orgánica, y las reuniría, gracias á los dos receptores que posee.

Amboine (botón de) Véase: *verruga*.

ambulatoria (fiebre tifoidea). Véase: *tifus ambulatorio*.

amelia, *s. f.* (ἀ priv; μέλος, miembro) Deformidad congénita caracterizada por la ausencia de los cuatro miembros.

amenorrea, *s. f.* (ἀ priv; μήν, mes; ῥεῖν, correr). Ausencia ó disminución del flujo menstrual, fuera del estado de preñez, y durante la edad propia á la menstruación.

ametropía, *s. f.* (ἀ priv; μέτρον, medida; ὤψ, ojo). Término con que se designan las dos anomalías de la refracción: *miopía é hipermetropía*.

amiba *s. f.* Organismo rudimentario formado de una sola célula, que cambia de lugar por medio de seudopodos, esto es, de prolongaciones cuyo volumen aumenta poco á poco á expensas de la masa total del organismo.

amibocito, *s. m.* (amiba; κύτος, célula). Célula animal ó vegetal, que reviste la forma y posee los caracteres de las amibas.

amiboideos ó **amiboides (movimientos).** Movimientos análogos á los de las amibas.

amiboismo, *s. m.* Propiedad de que gozan ciertos elementos celulares del organismo (leucocítos, células migradoras), de emitir seudopodos y moverse como amibas (diapédesis).

amigdalitis, *s. f.* Inflamación de las amígdalas.

amígdalotomo *s. m* (ἀμυγδάλη, amígdala: τέμνω, corto). Instrumento destinado á practicar la ablación de las amígdalas.

amígdalotomía *s. f.* Ablación de las amígdalas.

amígdalotripsia, *s. f.* (ἀμυγδάλη; τρίβω, trituro). Procediniento de ablación de las amígdalas hipertrofiadas, que consiste en triturarlas entre los dientes de una pinza especial.

amiláceos ó **amiloideos (cuerpos).** Cuerpos que presentan la estructura de los granos de almidón y las reacciones de la materia amilácea, y que se encuentran en los centros nerviosos, la próstata y los pulmones. Su naturaleza es desconocida aún.

amilasis, *s. f.* Sin.: *fermento amilolítico*. Fermento contenido en el jugo pancreático destinado á solubilizar los feculentos en el

proceso de la digestión intestinal.

amiloide (degeneración ó enfermedad) (ἄμυλον, almidón: εἶδος, forma). *Sin. degeneración cérea, infiltración amiloide, amilosis, leucomatosis.* Lesión que consiste en la infiltración de los tejidos por una sustancia especial, amorfa, translúcida, que tiene la propiedad de teñirse de moreno oscuro por el yodo Dicha lesión es de origen vascular y parece no atacar los elementos nobles de los órganos; no es pues, propiamente hablando, una degeneración. Es siempre secundaria a otras afecciones y en particular á las supuraciones prolongadas, á la tuberculosis, á la sífilis; no da lugar sino á síntomas vulgares y en clínica a penas puede sospecharse.

amilosis, *s. f.* Véase: *amiloide degeneración*).

amimia, *s. f.* (ἀ priv.; μῖμος, mimo). Pérdida más ó menos completa de la utilización de los ademanes y gestos, ya como símbolos directos de un sentimiento, ya como símbolos indirectos de una idea. — *amimia receptiva.* Perturbación de la comprensión de los ademanes y gestos. — *amimia motriz.* Trastorno de la ejecución. — *amimia musical.* Imposibilidad de tocar un instrumento músico.

amiostenia *s. f.* (ἀ priv.; μῦς. musculos; σθένος, fuerza). Debilitamiento de los movimientos voluntarios (estigma de la histeria).

amiotaxia, *s. f.* (ἀ priv.; μῦς; τάξις, orden) (Rossolino de Moscú). Sin.: *movimientos atetoides, movimientos coreiformes.* Convulsiones involuntarias de origen reflejo, causadas lo más á menudo por neuritis múltiples, y observadas á veces en la tabes.

amiotrofia, *s. f.* (ἀ priv.: μῦς; τροφή, alimento). Atrofia muscular. (Generalmente no se emplea este término sino refiriéndose á los músculos estriados de la vida de relación). — *amiotrofia primitiva progresiva.* Véase: *atrofia muscular progresiva.*

amitósica (división) ἀ priv.; μίτος, pelotón). Sin.: *división de Remak, división acinética.* División directa de las células (amibas, leucocitos). El núcleo presenta constantemente el mismo aspecto en el curso de la división y no parece tomar parte activa en el desdoblamiento de la célula.

amnesia, *s f.* (ἀ priv.;

μνῆσις, memoria). Pérdida total ó parcial de la memoria. La *amnesia* se dice *sistemática* cuando toca á un grupo de ideas; *localizada* cuando se refiere á un período de tiempo dado.

amnios, *s. m.* (ἀμνίον). La más interna de las membranas que rodean al feto.

amniotitis *s. f.* Inflamación del amnios. Causa probable del hidramnios y de las adherencias amnióticas.

amoniemia *s. f.* Presencia de carbonato de amonio en la sangre. Esta sustancia sería debida á la transformación de la úrea por un fermento especial. Frerichs atribuye á la *amoniemia* los síntomas de la uremia.

amoniuria, *s f.* Eliminación de amoniaco por la orina.

amoniuria experimental (prueba de la). (Gilbert y Carnot). Prueba propuesta para explorar el funcionamiento de la célula hepática En el caso de insuficienciade ésta, el amoniaco, ingerido bajo la forma de acetato, en vez de transformarse en úrea. se elimina en sustancia por la orina.

amorfismo de los dientes. Modificación de la forma de los dientes, generalmente de origen sifilítico (dientes en tricornio, en clavija, en hacha).

amplexión, *s f.* (*amplexari*. abrazar) Método de investigación que consiste en abarcar la caja torácica con los dos manos colocadas, la una hacia adelante, lo otra hacia atrás, y en comparar el desarrollo relativo de cada uno de los lados del tórax.

amputación, *s. f.* Operación que consiste en la ablación de un miembro, de un segmento de miembro ó de una parte saliente (lengua, mama, pene).

amputados (ilusiones de los). Sensaciones generalmente dolorosas que los amputados localizan en el miembro ausente, y las cuales se deben á irritación de los nervios de este miembro, ya en la cicatriz, ya en un punto de su trayecto.

amusia, *s. f.* (ἀ priv.; μοῦσα, música). Perturbación de la facultad musical análoga á la afasia y que coincide á menudo con ésta. — *Amusia motriz*. Imposibilidad de cantar un aire. *Amusia receptiva ó sensorial*. Imposibilidad de distinguir los sonidos.

Amussat (operación de). Véase : *colotomía*.

ana (ἀνὰ). Término empleado en la redacción de las prescripciones (ãã) y que, colocado después de la enumeración de dos ó más sustancias, significa : *de cada una.*

anabiosis, *s. f.* (Preyer). Vuelta de la vida latente á la vida activa.

anabolismo, *s. m.* (ἀνὰ, que indica distribución; βάλλειν, lanzar) (Duncan Bulkey). Transformación de los materiales nutritivos en tejido vivo. Es la primera fase del metabolismo.

anacloridria, *s. f.* (ἀ priv.; cloridria). Ausencia completa de ácido clorídrico libre en el jugo gástrico.

anacrotismo, *s. m.* (ἀνὰ, arriba. κρότος, latido). Sin. : *levantamiento anacrótico.* Sobre el trazo esfigmográfico del pulso distinguense á veces en la linea de ascensión, ó en la precedente inmediata, levantamientos que indican la prolongada duración del paso de la sangre del ventrículo izquierdo á la aorta. El *anacrotismo* se observa en estado normal en el pulso aórtico.

anaerobio, *adj.* (ἀ priv.; ἀὴρ, aire; βίος, vida). Nombre dado por Pasteur á los micro-organismos que pueden vivir sin oxígeno.

anafrodisia, *s. f.* (ἀ priv.; Ἀφροδίτη, Venus). Ausencia ó disminución de la sensibilidad genésica.

anafrodisiaco, *adj.* Sustancia que se recomienda como capaz de amortiguar los deseos venéreos (alcanfor, nenúfar).

anafrodita, *adj.* La persona insensible á los placeres genésicos, ó impotente para la generación.

anafiláctica (propiedad) ó **anafilaxia**, *s. f.* (Portier y Richet, 1902) (ἀνὰ priv ; φυλάσσω, preservar). Propiedad que poseen ciertos venenos de disminuir la inmunidad, en vez de reforzarla, cuando son inyectados á dosis no mortales.

anaglicosuria, *s. f.* Cesación momentánea de la glicosuria en los diabéticos.

anakhré. Véase : *gundú.*

analepsia, *s. f.* (ἀναλαμβάνειν, recuperar). Restablecimiento de las fuerzas en un convaleciente.

analgesia, *s f.* (ἀ priv.. ἄλγος, dolor). Abolición de la sensibilidad al dolor.

anamnesia, *s. f.* (ἀνὰ, de nuevo ; μνῆσις, memoria). Vuelta á la memoria de las ideas olvidadas. Reminiscencia.

anamnésticos, *s. m.*

pl. (ἀνὰ, de nuevo; μνῆσις, memoria) Informes suministrados por el enfermo mismo, ó por los suyos, sobre el principio de la enfermedad hasta el momento en que se halla sometido á la observación del médico.

ananabasia, *s. f.*

ananastasia, *s. f.* (ἀνὰ, según; abasia, astasia) (Régis). Obsesiones ansiosas de los neurasténicos. Difieren de la *abasia* y de la *astasia* por su intermitencia y sobre todo por las angustias que las acompañan.

anapeirática (parálisis) (ἀναπειρᾶν, ensayar de nuevo). Parálisis consecutiva á la repetición frecuente de los mismos movimientos. Complica á veces los calambres profesionales (calambre de los escribanos).

anaplastia, *s. f.* (ἀναπλάσσειν, rehacer). Véase : *autoplastia.*

anapnógrafo, *s. m.* (Bergeron y Kastus). Espirómetro perfeccionado que permite inscribir sobre una banda de papel los resultados obtenidos al medir la capacidad vital de un pulmón.

anartria, *s. f.* (ἀ priv.; ἄρθρον, articulación). Afasia motora subcortical. No difiere de la afasia cortical motora sino porque se conservan la lectura y la escritura.

anasarca, *s. f.* (ἀνὰ, alrededor; σὰρξ carne). Hidropesía del tejido celular que produce la hinchazón general del cuerpo y de los miembros.

anaspadias, *s m.* (ἀνὰ. arriba; σπάω, divido). Deformación de la uretra, cuyo meato se abre en la cara dorsal del glande ó del pene.

anastomosis, *s. f.* (ἀνὰ, con; στόμα, boca). Comunicación entre dos vasos y, por extensión, entre dos conductos de la misma naturaleza, y entre dos nervios.

anatomía patológica. Estudio de las modificaciones estructurales de los órganos. que resultan de las acciones y reacciones mórbidas.

anaudia, *s. f.* Véase : *afemia.*

anazoturia, *s. f.* (ἀ priv.; azoturia). Disminución considerable, ó aun ausencia completa, del ázoe en la orina (úreas. uratos).

androginia, *s. f.* (ἀνὴρ, ἀνδρός, hombre: γυνῆ, mujer), Seudohermafrodismo parcial en el hombre. Los individuos que presentan esta deformación son criptórquidos

que tienen ciertos caracteres externos de mujer; mas, el escroto se halla soldado y el pene termina en un glande perforado.

androginoide, *s. m.* (ἀνὴρ, ἀνδρός γυνὴ; εἶδος, forma). Individuo del sexo masculino (criptórquido), en quien el segmento inferior del aparato genital ha evolucionado según el tipo femenino.

andrología, *s. f.* (ἀνὴρ, ἀνδρός; λόγος, discurso). Estudio del hombre, y más particularmente de las enfermedades especiales al hombre, por analogía con *ginecología*.

anectasina, *s. f.* (ἀνὰ, priv.; ἔκστατις, dilatación). Nombre dado á las toxinas microbianas que se oponen á la vaso-dilatación.

anelectrotonus, *s. m.* Estado eléctrico, al anodo, de un nervio ó de un músculo, sometido por cierto tiempo á la acción de una corriente eléctrica.

Anel-Hunter (método de). Tratamiento de la aneurisma arterial circunscrita por la ligadura encima del saco. Se llama más particularmente *metodo de Anel* á la ligadura cerca del saco, y *método de Hunter* á la ligadura distante.

anematopoyesis, *s. f.* (ἀ priv.; hematopoyesis) (Hayem). Ausencia de hematoblastos en la sangre, y, por consiguiente, disminución rápida de los hemátidos.

anemia, *s. f.* (ἀ priv.; αἷμα, sangre) Sin.: *oliguemia*. *espanemia*. Empobrecimiento de la sangre, caracterizado por la disminución notable de uno, de varios, ó de todos sus elementos (*anemia total*, *anemias parciales*). — Este término se aplica á menudo, cuando se emplea sin epíteto, á la *anemia parcial* caracterizada por la disminución de los glóbulos rojos. También se usa para designar el estado del organismo privado de sangre, y desde este punto de vista la *anemia* puede ser general ó local.

anemia de los mineros. Véase: *anquilostomasia*

anemia esplénica (Strümpell). Afección caracterizada por la hipertrofia del bazo y la disminución de los glóbulos rojos de la sangre; pue ehallarse acompañada ya de linfocitemia, ya de mieemia, ó no presentar cambio alguno en la fórmula leucocitaria.

anemia infantil

seudo-leucémica. Sin. : *linfadenia esplénica de los niños de pecho.* Enfermedad caracterizada por la hipertrofia del bazo y del hígado, y por la disminución considerable del número de los glóbulos rojos. Se transforma frecuentemente en linfadenia leucémica.

anemia perniciosa progresiva. Sin. : *Enfermedad de Biermer.* Enfermedad caracterizada por una anemia extremada (disminución y deformación de los glóbulos rojos), hemorragias, trastornos gástricos, y la terminación casi siempre fatal.

anencefalia, *s f.* (ἀ priv. ; ἐγκέφαλος, encéfalo). Monstruosidad caracterizada por la ausencia de cerebro y de médula espinal. El cráneo y el canal vertebral hállanse abiertos en toda su extensión

anepatía ó **anhepatía,** *s. f.* (ἀ priv.; ἧπαρ, hígado) (Gilbert). Disminución ó abolición de la actividad funcional del hígado.

anestesia, *s.f.* (ἀ priv.: αἴσθησις, sensibilidad). Privación de la sensibilidad general ó especial en una superficie más ó menos extensa del revestimiento cutáneo ó mucoso, bajo la dependencia de un estado mórbido, ó provocada artificialmente por un agente anestésico.

anestesia dolorosa. Hiperalgesia combinada á la anestesia tactil en el mismo territorio nervioso.

anestésico, *adj.* y *s. m.* Sustancia tóxica que se emplea para obtener la insensibilidad local ó general, inofensiva y pasajera.

anestia, *s. f.* ἀ priv.; ἐσθης, vestido) (Régis). Obsesión mórbida que consiste en que al enfermo le es imposible ponerse los vestidos.

aneumatosis (ἀ priv.; πνεῦμα, ατος, soplo). Véase : *atelectasia.*

aneurisma, *amb.* (ἀνεύρυσμα, de ἀνεύρυνειν, dilatar). « Tumor producido en el trayecto de una arteria por la dilatación de sus membranas (*aneurisma arterial circunscrita ó verdadera*); hase empero extendido este nombre á los tumores formados por la sangre derramada fuera de una arteria (*aneurisma difusa ó falsa*) y á las dilataciones del corazón. » (Littré)

aneurisma arterio-venosa. Sin. : *aneur. por transfusión, aneur. varicosa, flebarteria simple de Broca, várice aneurismal.* Comuni-

cación permanente de una arteria y de una vena con un saco aneurismal (*aneur. varicosa*). ò sin dilatación de los vasos (*fl barteria simple*).

aneurisma cirsoide (κιρσός, várice. εἶδος, forma). Sin. : *aneurisma por anastomosis* (Bell), *angioma ramoso. tumor cirsoide, tumor eréctil pulsátil, várice arterial* (Dupuytren). Dilatación, con alargamento de los troncos, ramos y ramúsculos, de uno ò de varios departamentos arteriales

aneurisma disecante. Variedad de aneurisma en que la sangre, después de haber roto las dos túnicas internas de la arteria, distiende y despega la túnica celulosa, sin desgarrarla.

anexitis, *s. f.* (Bouilly). Inflamación de los anejos del útero (trompas, ovario).

anfiáster (estadio del). Sin.: *diáster.* Estadio de la cariocinesis caracterizado por una estrella cromática doble cuyos rayos están reunidos por un huso acromático.

anfiblástula, *s. f.* (ἀμφὶ, de una y otra parte: βλαστός, germen). Nombre dado á la *blástula* del huevo de segmentación total y desigual (huevo de rana).

anfíbolo, (ἀμφίβολος, ambiguo) (Wunderlich). Período de la fiebre tifoidea, situado entre el estadio de estado y la desfervescencia, y caracterizado por el hecho de que la temperatura, muy elevada en la noche, desciende en la mañana hasta cerca de la normal; de donde la incertidumbre del pronóstico. pues la enfermedad parece como muy grave en la noche, y en la mañana se la podría considerar como terminada.

anfigástrula, *s. f. Gástrula* del huevo de segmentación total y desigual.

anfolofotrico, *adj.* (ἀμφὶ, de ambas partes; λόφος, melena; θρὶξ cabellos) (Ellis). Se dice de los bacilos que presentan en cada uno de las extremos un penacho de pestañas vibrátiles.

anfófilas (granulaciones). Sin. : *granulaciones seudo-eosinófilas*. Granulaciones que fijan no sólo la eosina, sino también los colores básicos Se las encuentra en ciertas células del conejo y del cochinillo de Indias.

anfórico (soplo). Sin. : *respiración anfórica, soplo metálico.* Variedad de soplo que recuerda el sonido que se produce soplando en

una ánfora ó en un gran cántaro vacíos.

anfotrico, *adj.* (ἀμφὶ, de ambas partes, θρὶξ, cabello) (Ellis). Se dice de los bacilos provistos de una pestaña vibrátil en cada uno de los extremos.

angiectasia, *s. f.* (ἄγγεῖον, vasos. ἔκτασις, dilatación). Nombre genérico que designa todas las dilataciones vasculares.

angina, *s. f.* (ἄγχω, estrangulo). Inflamación del istmo de las fauces y de la faringe. Comprende numerosas variedades según el sitio y la naturaleza de la infección (*angina tonsilar*, *a. faringea*, *a. diftérica*, etc.). Dase aún excepcionalmente el nombre de *angina*, como por lo demás lo hacían los médicos antiguos á una serie de afecciones muy diferentes las unas de las otras, sin otro carácter común que la dificultad angustiosa de la respiración (*angina de pecho*, *angina laringea edematosa*).

angina de pecho (angor pectoris) (Rougnon, Heberden, 1768). Síndroma caracterizado por crisis paroxísticas de dolores violentos en la región precordial, acompañadas de horrible angustia y de sensación de muerte inminente.

angina laringea edematosa (Trousseau). Véase : *edema de la glotis*.

angiocarditis, *s f.* (ἀγγεῖον, vaso; καρδία, corazón). Inflamación del corazón y de los vasos, que Bouillaud consideraba como el substratum de las fiebres llamadas esenciales.

angiocolitis, *s. f.* (ἀγγεῖον. vaso; χολὴ, bilis). Inflamación de las vías biliares.

angioleucitis, *s. f.* (ἀγγεῖον; λευκὸς, blanco). Véase: *linfangitis*, — *angioleucitis total* (Chassaignac). Supuración simultánea de los tres territorios linfáticos (reticular, truncular, ganglionar).

angiolítico (sarcoma) ἀγγεῖον; λίθος, piedra). Variedad de sarcoma descrita por Cornil y Ranvier, situada en la caja craneana ó el canal medular, y caracterizada por la presencia de concreciones calcáreas de origen vascular (análogas á los flebolitos).

angiomalacia, *s. f.* (ἀγγεῖον; μαλακία blandura). Disminución de la elasticidad de un vaso.

angioma, *s. m.*. **angionoma**, *s. m.* **angiosis**, *s. f* (ἀγγεῖον) Producción patológica constituida por la aglomeración de vasos sanguíneos de nueva forma-

ción, que forman una tumefacción circunscrita. No es propiamente un tumor, sino una deformación del sistema vascular, de origen congénito lo más á menudo. — *angioma cavernoso*. Sin. : *tumor eréctil* (Dupuytren), *fongus hematode*. Angioma formado por un sistema lacunar análogo al cavernoso de los órganos eréctiles. — *Angioma ramoso*. Véase : *aneurisma cirsoide*. — *Angioma simple*. Sin. : *nevus congénito*, *telangiectasia*. Angioma cuyos vasos de nueva formación, que constituyen el tumor, son semejantes á los vasos normales.

angioneurectomía, *s. f.* (ἀγγεῖον; νεῦρον, nervio; ἐκτομή. ablación). (Albarrán, Motz, 1898). Resección de los vasos y los nervios del cordón espermático, dejando intacto el canal deferente. Hase preconizado esta operación, que produce la atrofia del testículo, en los casos de hipertrofia prostática.

angioneurosis cutánea. Edema agudo de la piel. Véase : *Quinche* (*enfermedad de*)

angioneurótico (edema) (Strübing, 1886). Variedad de edema agudo de origen neuropático que se presenta y desaparece en algunas horas; se localiza en la piel ó en las mucosas (laringe).

angiopancreatitis, *s. f.* Inflamación ascendente de las vías pancreáticas, punto de partida ordinario de las pancreatitis

angioparalítico, *adj.* Se dice de una afección acompañada de parálisis vasomotora. La *eritromelalgia* puede ser considerada como una neurosis de las extremidades de forma angioparalítica.

angiopatía, *s. f.* (ἀγγεῖον; πάθος, afección). Nombre genérico con que se designan las afecciónes vasculares.

angioqueratoma, *s. m.* (Mibelli). Sin. : *telangiectasia verrugosa*, *verruga telangiectásica*, *linfangectasia de las manos y los piés*. Pequeñas eminencias de tinte rojo sombrío ó violáceo, de superficie rugosa, de consistencia córnea, que aparecen en las extremidades, más especialmente sobre los dedos.

angiospasmo, *s. m.* (ἀγγεῖον; σπάω, contraigo). Espasmo de los vasos acompañado de aumento de la tensión arterial.

angiospástico, *adj.* Se dice de una afección que está acompañada de es-

pasmo de los vasos. La *enfermedad de M Raynaud* puede considerarse como una neurosis de las extremidades de forma angiospástica.

angiostenosis, *s. f.* (ἀγγεῖον; στενός). Estrechez de los vasos.

angioténica (fiebre) (angiotenia) (ἀγγεῖον; τείνειν, tender) (Pinel, 1813). Nombre dado á las enfermedades febriles de corta duración también llamadas *fiebre efímera, f. inflamatoria, f. sinoca*, las cuales tendrían como característica anatómica la rubefacción de la endoarteria. Esta teoría ha sido abandonada desde que se comprobó que la lesión invocada por Pinel es efecto de la imbibición cadavérica.

angiotribo, *s. m.* (ἀγγεῖον; τρίβω, trituro) Instrumento que sirve para triturar los vasos y practicar la hemostasis.

angiotripsia, *s. f* Procedimiento de hemostasis ó de obliteración de un conducto (apéndice), que consiste en la aplicación de una pinza fuerte que aplasta los tejidos.

ángulo facial (antropología) Angulo formado por la intersección de dos rectas que circunscriban la cara, su apertura está en relación con el desarrollo del encéfalo. Como puntos de relación para su trazo se emplean generalmente los de Cloquet ligeramente modificados por Topinard: la línea inferior va del agujero auditivo al punto alveolar, y la línea facial va de este punto (vértice del ángulo) al punto supra-orbitario.

ángulo parietal (de Quatrefages) (antropología). Angulo formado por el encuentro de dos rectas que unan los extremos del diámetro transverso máximo de la cara (bizigomático) y del diámetro frontal transverso máximo. Este ángulo cae ya por encima de la cabeza (*ángulo parietal positivo*), ya por debajo (*á. p. negativo*). En el primer caso se dice que los arcos zigomáticos son *fenózigos*; en el segundo, que son *criptózigos*.

ángulo esternal ó **de Louis**. Anomalía del tórax; ángulo prominente formado, en ciertos individuos por el encuentro del manubrio con el cuerpo del esternón, y cuyo vértice corresponde á la soldadura de estas dos piezas óseas.

angustia, *s. f.* (*angustia*). Estrechamiento, estrechez. Ejemplo: *angustia del sistema arterial.*

anhelación, *s. f.* (*anhe-*

latio). Respiración corta y frecuente.

anhidrosis ó **anidrosis**, *s f.* (α priv.; ἵδρως, sudor). Disminución ó insuficiencia de la secreción sudoral.

anhidrótico ó **anidrótico** *adj.* y *s. m.* Medicamento que disminuye la secreción sudoral.

anhisto ó **anisto**, *adj.* (ἀ priv., ἱστός, tejido). Que no tiene textura definida.

anido ó **aneido**, *s. m.* (ἀ priv.; εἶδος, forma) (J. Geoff. Saint-Hilaire). Sin.: *acardiaco*. Monstruo unitario onfalósito, caracterizado por una organización muy simple, apenas esbozada, y que generalmente no posee órgano de la circulación.

anilinófilas (células). Nombre con que Ehrlich designa ciertas células que se coloran fácilmente por los colores de anilina, y las cuales no son probablemente sino los clasmatocitos de Ranvier.

animismo, *s. m.* (*anima*, alma). Doctrina fisiológico-médica que hace intervenir el alma en los cuerpos organizados, considerados como inertes, y pretende explicar así no sólo los fenómenos intelectuales sino también los hechos vitales, fisiológicos ó patológicos.

anisocitosis, *s. f.* (ἀ priv.; ἴσος igual; κύτος, célula). Estado pa ológico de los glóbulos rojos. en el cual estos elementos presentan dimensiones en extremo variables en vez de tener todos el mismo diámetro.

anisocoria. *s. f.* (ἀ priv.; ἴσος. igual κόρη, pupila). Desigualdad pupilar.

anisocromia, *s. f.* (ἀ priv.; ἴσος, igual. χρῶμα, color). Desigualdad de coloración de los glóbulos rojos de la sangre.

anisometría, *s f.* (ἀ priv.; ἴσος; μέτρον medida). Desigualdad de dimensiones de los glóbulos rojos de la sangre.

anisometropía, *s. f.* (ἀ priv.; ἴσος; μετρον; ὄψ, ojo). Desígnase así la desigualdad de refracción de los dos ojos, siendo el uno amétrope, el otro emétrope, ó bien ambos desigualmente hipermétropes ó desigualmente miopes.

anisótrope, *adj.* y *s. m.* (ἀ priv.; ἴσος; τρεπειν, girar). Nombre que se da en óptica á las sustancias que gozan de birefringencia. Examinadas á la luz polarizada, cuando los dos prismas de Nicol están cruzados, dichas substancias son luminosas

en un campo obscuro. Ejemplo : los segmentos sombríos de la fibra muscular.

anodo, *s m.* (ἀνά, arriba; ὁδός, vía). Electrodo positivo.

anodino, *adj.* y *s. m.* (ἀ priv.; ὀδύνη, dolor). Medicamento destinado á calmar el dolor.

anoftalmía, *s. f.* (ἀ priv.; ὀφθαλμός, ojo). Ausencia congénita de un ojo.

anopsia, *s. f* 1° (ἀ priv.; ὄψις, vista). Privación de la vista. — 2° (ἄνω, hacia arriba; ὤψ, ojo). Estrabismo en el cual el globo ocular se halla desviado hacia arriba.

anorexia, *s. f.* (ἀ priv.; ὄρέξις, apetito). Pérdida ó disminución del apetito.

anorquidia, *s. f.* (ἀ priv.; ὄρχις, testículo). Ausencia congénita de una ó de ambas glándulas espermáticas, ó también de una parte cualquiera del aparato seminal.

anosmia, *s. f.* (ἀ priv.; ὀσμή, olfato). Disminución ó pérdida completa del odorato.

anoxemia ó **anoxicmia,** *s. f.* (ἀ priv.; ὀξύς, oxígeno; αἷμα, sangre) (Jourdanet). Disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre, debida á la baja de la tensión del mismo en el aire ambiente. Se observa en los descensos rápidos de la presión atmosférica (mal de las montañas).

anquiloblefarón, *s. m.* (ἀγκυλή, freno; βλέφαρον, párpado). Soldadura parcial ó total, congénita ó adquirida, de los bordes palpebrales.

anquiloglosis ó **anciloglosis,** *s. f.* (ἀγκύλη; γλῶσσα, lengua). Adherencia viciosa, adquirida ó congénita, de la lengua.

anquilope, *s. m.* (ἀγχί, próximo; ὤψ, ojo). Nombre dado anteriormente á los abcesos situados en el ángulo interno del ojo, independientes del saco lagrimal.

anquiloqueilia, *s. f.* (ἀγκυλή, freno; χεῖλος, labio). Soldadura accidental de los labios, sin pérdida de sustancia y sin adherencia con los maxilares.

anquilorrinia, *s. f.* (ἀγκύλη; ῥίν, nariz). Adherencia de las paredes nasales entre sí.

anquilosis, *s. f.* (ἀγκύλωσις, curvatura). Disminución ó imposibilidad absoluta de los movimientos de una articulación naturalmente móvil

anquilostomasia ó **anquilostomiasis,** *s. f.* (de anquilostomo, ἀγκυλή, freno; στόμα, boca). Sin. : *anemia de los mineros, de los ladrilleros, de los obre-*

ros del San Gotardo; caquexia acuosa; clorosis de Egipto ó tropical; hipohemia intertropical. Enfermedad provocada por pequeños nematodes (anquilostomos) que se fijan en gran número en la mucosa del intestino delgado y producen hemorragias abundantes y contínuas.

anquilostomosis, *s. f.* Véase *anquilotomiasis*.

ansiedad paroxística pura (Brissaud). Variedad de angustia esencial debida á una perturbación pasagera de la irrigación bulbar. Se presenta de improviso, particularmente de noche, acompañada de temblores, sudor frío, palidez lívida, y recuerda á la vez la angina de pecho y el asma.

antedesviación del útero. Término general que comprende todos los cambios de posición del útero hacia adelante, totales ó parciales.

anteflexión del útero. Desviación del útero: el fondo del órgano se encuentra inclinado hacia adelante mientras el cuello conserva sa posición normal.

anteposición del útero. Cambio de lugar, en totalidad, del útero, el cual se halla colocado por delante de sa eje normal.

anteversión del útero. Desviación del útero; el fondo del órgano se encuentra inclinado hacia adelante mientras el cuello sube hacia atrás y se apoya contra el recto: el útero presenta una gran rigidez que lo inmoviliza en esta posición.

anticuerpo, *s. m.* Nombre dado á ciertas sustancias que se encuentran en el suero de un animal á consecuencia de la inyección de elementos figurados vivos (células de tejidos, microbios) ó de sus productos de elaboración (secreciones celulares, toxinas), ó de compuestos orgánicos (albúminas, nucleinas), y que obran sobre estos elementos ya inmovilizándolos, ya aglutinándolos, ya disolviéndolos. Ellos son los agentes de la inmunidad adquirida.

antídoto, *s. m.* (ἀντι, contra; δοτὸς, dado). Contraveneno.

antielmíntico, *adj.* (ἀντι, contra, ἑλμινς, lombriz). Vermífugo.

antiespasmódico, *adj.* (ἀντι; σπαω, contraigo). Que combate el estado espasmódico, esto es, las contracturas, calambres y convulciones.

antiflogístico, *adj.* (ἀντι; φλοξ, φλογὸς, llama).

Que obra contra la inflamación.

antífona, *s. f.* (ἀντι; φωνὴ, voz). Obturador del conducto auditivo externo destinado á amortiguar los sonidos violentos (artilleros).

antífteros, *s. m, pl.* (ἀντι; φθείρειν, corromper). (Audibert, 1903). Audibert da este nombre á las granulaciones de las células eosinófilas, las cuales, según él, tendrían una acción ligeramente antitóxica

antiperistáltico, *adj.* (ἀντι; περὶ, al rededor; στέλλειν, estrechar) Epíteto dado á los movimientos y contracciones de abajo hacia arriba del intestino ó del estómago.

antipirético, *adj.* y *s. m.* (ἀντὶ; πυρετός, fiebre). Medicamento que combate la fiebre.

antisepsia, *s. f.* (ἀντὶ; σῆψις, putrefacción). Método que consiste en combatir ó evitar las enfermedades sépticas ó infectivas, tanto médicas como quirúrgicas, por la destrucción sistemática de las bacterias que las producen.

antiséptico, *adj.* y *s. m.* Sustancia que destruye los microbios ó impide su desarrollo.

antisudoral, *adj.* y *s. m.* (ἀντὶ; *sudor*). Medicamento moderador de la producción del sudor.

antitérmico, *adj.* y *s. m.* (ἀντι; θερμὸς, calor). Medicamento destinado á bajar la temperatura.

antitoxina, *s. f.* (ἀντὶ; τοξικὸν, veneno). Sustancia que parece impregnar los diferentes tejidos de un animal inmunizado contra una enfermedad infectiva.

antracosis, *s. f.* (ἄνθραξ, ακος, carbón). Lesiones causadas en el pulmón por la inhalación y la fijación de las partículas de carbón esparcidas en la atmósfera. — *Antracosis fisiológica*. — *Antracosis patológica*.

ántrax, *s. m.* (ἄνθραξ, carbunclo). Inflamación que empieza en el aparato glandular pilo-sebáceo como un forúnculo, pero que se distingue de éste por la multiplicidad de los focos purulentos y por su tendencia á la difusión y á la mortificación.

antropología, *s. f.* (ἄνθρωπος hombre; λόγος, discurso). « Estudio del grupo humano considerado en conjunto, en sus detalles y en sus relaciones con el resto de la naturaleza. » (Broca.)

antropometría, *s. f.* (ἄνθρωπος, μέτρον, medida). Parte de la antropología que tiene por objeto la mensu-

ración de las diversas partes del cuerpo.

antropofobia, *s. f.* (ἄνθρωπος; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa (fobia) que ciertos neurópatas experimentan en medio de las turbas ó en presencia de determinados individuos.

antro - salpingitis, *s. f.* Sin. : *otitis seca esclerematosa* Duplay). Otitis media crónica que se presenta en los artríticos, caracterizada por un proceso escleroso que nace en la cavidad de la caja, gana en seguida el laberinto y produce la sordera.

antrotomía, *s. f.* Trepanación de la apófisis mastoide.

ano artificial ó **contra natura.** Orificio anormal del intestino, situado en la pared abdominal, que permite la salida de las materias fecales é interesa de tal forma la pared del asa intestinal que ambos cabos del intestino se abren en la piel separados por una especie de espolón. Puede ser espontáneo, traumático ó quirúrgico.

anuria, *s. f.* (ἀ priv.; οὖρον, orina). Detención de la secreción urinaria.

aortitis, *s. f.* Inflamación de la túnica interna de la aorta.

apendicalgia, *s. f.* (apéndice; ἄλγος, dolor). Dolores apendiculares debidos, no á una apendicitis, sino á la tensión de adherencias viejas.

apendicectomía, *s. f.* (apéndice; ἐκτομή, ablación). Sin. : *prosfisectomía*. Operación que consiste en extirpar el apéndice ileocecal.

apendicemia, *s. f.* (Dieulafoy, 190). Toxemia de origen apendicular.

apendicitis, *s. f.* Inflamación del apéndice.

apendicocele, *s. f.* Hernia del apéndice

apendicostomía, *s. f.* (apéndice; στόμα, boca) (Robert F. Weir). Operación que consiste en fijar el apéndice fuera de la pared abdominal, abrir su extremo libre y pasar por él un tubo de desagüe por el cual poder irrigar directamente el ciego y el colon ascendente. Esta operación menos grave que la tiflostomía ha sido preconizada contra las colitis y en especial contra la disentería.

apendicular, *adj.* Lo referente al apéndice ileocecal.

apepsia, *s. f.* (ἀ priv.; πέψις, digestión) (Hayem). Perturbación del proceso químico de la digestión, caracterizada por la desapari-

ción de la reacción fermentativa, esto es, por la supresión de las funciones del estómago.

apexiano, *adj.* (*apex*, vértice). Sinónimo : *mucronal*. Que se relaciona con la punta del corazón.

apirexia, *s. f.* (ἀ priv.; πῦρ, fiebre; ἔχειν, tener). Ausencia de fiebre.

aplasia, *s. f.* (ἀ, priv.; πλάσσειν, formar). Variedad de la atrofia : trastorno en la evolución de un tejido ó de un órgano, á consecuencia de la falta de reproducción de los gérmenes celulares, en el curso de la vida extrauterina. Ej. *aplasia ósea*, *aplasia arterial*.

aplasia moniliforme. Distrofia familial del sistema piloso, caracterizada por la presencia en el pelo de dilataciones y estrecheces que alternan con regularidad.

aplastamiento lineal. Sin. *histotripsia*, *sarcotripsia*. Método de amputación inventado por Chassaignac, que consiste en seccionar los tejidos aplastándolos progresivamente con una cadena.

apnea, *s. f.* (ἀ priv.; πνεῖν, respirar). Detención más ó menos prolongada de la respiración.

apoplejía, *s. f.* (ἀπποπλήσσω, yo lleno de estupor). Sinónimo : *ataque ó ictus apoplético*. Suspensión brusca y más ó menos completa de todas las funciones del cerebro; la caracterizan la pérdida súbita del conocimiento y de la motilidad voluntaria con persistencia de la circulación y de la respiración. — Como la causa de la *apoplejía* es muy frecuentemente una hemorragia cerebral, hase tomado dicho término como sinónimo de hemorragia parenquimatosa (Rochoux, 1814) ; de allí las expresiones : *apoplejía de la retina*, *ap. placentaria*, *ap. pulmonar*, *ap. renal*, *ap. esplénica*.

apoplejía histérica (Debove y Achard, 1886). Forma del sueño histérico de principio brusco; muy rara vez está acompañado de hemiplejía.

aposqueparnismos, *s. m.* (ἀπό, que indica ablación; σκεπαρνον dedoladera). Herida del cráneo por un instrumento cortante que ha desprendido completamente una laminilla ósea superficial. — Dedolación.

apostema, *s. f.* (ἀφίστημι, divido). Abceso.

apocema ó **apócima** (ant. pócima), *s. f.* (ἀποζεῖν, hacer hervir). Sin. : *tisana compuesta*. Cocimiento ó infusión de varias sustancias

vegetales, á las que puede añadirse algún otro medicamento.

apraxia, *s f.* (ἀ priv.; πρᾶξις, acción. Pérdida de la comprensión del empleo de los objetos usuales. Ej.: confusión entre un plato y una cacerola

aproctia, *s. f* (ἀ priv.; πρωκτὸ, ano). Ausencia congénita del ano.

aprosexia, *s. f.* (ἀ priv.; προσέχειν, estar atento) (Guye, 1887). Síndroma caracterizado por la disminución de la memoria, la imposibilidad de fijar la atención, la inaptitud para el trabajo y la pereza intelectual. Se le observa en casos de insuficiencia nasal.

aprosopia, *s. f.* (ἀ priv.; πρόσωπον, cara). Ausencia congénita de la cara.

apsitiria, *s. f.* (ἀ priv.; ψίθυρειν, murmurar) (Solis Cohen. Variedad de afonía caracterizada por la imposibilidad de emitir el más leve murmullo No se observa sino en la afonía histérica

aquo-capsulitis, *s. f.* Véase: *queratitis puntuada.*

aracnitis ó **aracnoiditis**, *s. f.* Inflamación de la aracnoides. Véase: *meningitis.* — *aracnitis crónica.* Véase: *parálisis general progresiva.*

aracnodactilia, *s. f.* (ἀράχνη, araña; δάκτυλος, dedo) (Achard, 1902). Largura exagerada de los dedos del pié y de la mano con delgadez de los huesos, sin perturbación nerviosa ni retracción tendinosa, que recuerda el aspecto de las patas de araña.

Aran-Duchenne (tipo). Véase: *atrofia muscular progresiva.*

arco senil. Sin: *gerontoxon.* Opacidad blanco-grisácea dispuesta en forma de círculo alrededor de la córnea. Es frecuente en los ancianos.

area Celsi (*area*, alopecia) Se llama á veces así á la pelada, erróneamente, según Kaposi, pues en las descripción que hace Celso de las alopecias es imposible reconocer aquella enfermedad. El nombre de *area Johns oni*, propuesto por Sauvages, sería más exacto.

arenación, *s. f.* (*arena*). Operación que consiste en cubrir con arena caliente y seca una parte ó la totalidad del cuerpo.

areocele, *amb.* (ἀραιὸς, liviano; κήλη, hernia). Tumor gaseoso del cuello, formado por un derrame limitado de aire dentro de una bolsa adventicia natural ó artificial.

Areteo (tipo de). Tipo del joven predispuesto á la tisis. « Son delgados, delicados, angostos como una tabla; tienen los omóplatos alados, prominente la garganta, la piel blanca, el pecho estrecho ». (Areteo).

argiria, *s. f.* (ἄργυρος. plata). Lesión cutánea, manifiesta por una coloración anormal de los tegumentos que se ponen pizarreños, ú oscuros, con reflejos metálicos azules: dicha coloración es más marcada en las partes expuestas á la luz, pero existe también sobre las mucosas y es debida á la impregnación de la piel por la plata metálica. Consecuencia de la administración prolongada de nitrato de plata, es indeleble.

argirismo, *s. m.* Conjunto de los fenómenos tóxicos provocados por el empleo prolongado de las sales de plata (nitrato) : disnea, palpitaciones, hidropesías y sobre todo argiria.

Argyll-Robertson (signo de) (1869). Discordancia entre los dos reflejos pupilares : el reflejo á la luz ha desaparecido, mientras que el de la acomodación persiste. Es uno de los principales síntomas de la tabes.

aritenoiditis, *s. f.* Inflamación de la región aritenoidea que se observa sobre todo en las laringitis tuberculosas.

aritmomanía, *s. f.* (ἀριθμός, número; μανία, manía). « Necesidad invencible de ejecutar distintas operaciones aritméticas, ó cierto número de veces, siempre el mismo, los actos más diversos. » (Blocq y Onanoff.)

Armanni (lesión de). Lesión del epitelio renal en la diábetes sacarina; consiste en la degeneración hialina de las células.

arquenterio, *s. m.* (ἄρχος, primero; ἔντερον, intestino). Sinónimia : *intestino primitivo, protogáster.* Cavidad de la gástrula.

arqueoplasma, *s. m.*, (ἀρχαῖος, antiguo; πλασσεῖν, formar). Tumefacción abdominal generalmente profunda, que permanece estacionaria por mucho tiempo y que se debe ordinariamente á un cuerpo extraño intestinal ó á un acúmulo de materias fecales.

arquiblástula, *s. f.* (ἀρχός; βλαστός, germen). Nombre dado á la *blástula* del huevo alecítico ó de segmentación total (mamíferos, anfioxus).

arquigástrula, *s. f.* (ἀρχός; γαστήρ, estómago

Nombre dado á la gástrula del huevo alecítico.

arquiplasma ó **arcoplasma**, *s. m.* (ἀρχός; πλάσμα, de πλάσσειν, dar forma). Sustancia transparente y homogénea, que constituye las esferas directrices de las células en la cariocinesis.

arritmia, *s. f.* (ἀ priv.; ῥυθμὸς, ritmo). Irregularidad y desigualdad de las contracciones del corazón.

arsenicismo, *s. m.* Envenenamiento por el arsénico.

arsonvalización, *s. f.* (d'Arsonval). Aplicación de corrientes eléctricas de alta frecuencia con un fin terapéutico ó experimental.

arterio-esclerosis, *s. f.* Lesión de las arteriolas, y en particular de las arteriolas viscerales, caracterizada por un engrosamiento escleroso de la túnica interna con tendencia á la obliteración (endarteritis obliterante). Se la ha considerado como la causa de ciertas esclerosis viscerales (nefritis intersticial, miocarditis crónica, etc.).

arteriorrafia, *s. f.* (ἀρτηρία, arteria; ; ῥαφή, sutura). Tratamiento de las aneurismas por la sutura del orificio de las arterias que se abren en el saco y la obturación de éste por medio de puntos de seda gruesa, conservando, si fuere posible, la luz del vaso dilatado (aneurismas sacciformes).

arteriotomía, *s f.* (ἀρτηρία; τομή, sección). Sangría de las arterias.

arterio-jerosis, *s f.* (ἀρτηρία; ξηρὸς, duo) (Boy-Teissier). Lesión de las arterias, distinta á la de la arteritis crónica y debida á la senilidad. Véase : *Jerosis*.

arteritis, *s. f.* Nombre genérico dado á las lesiones arteriales de origen inflamatorio.

artralgia, *s. f.* (ἄρθρον, articulación; ἄλγος, dolor). Dolor articular sin lesión apreciable de la articulación.

artrectomía, *s. f.* (ἄρθρον; ἐκτομή, ablación) (Volkmann). Sin. : *sinovectomía* (Ollier). Operación que consiste en abrir anchamente una articulación enferma y extirpar completamente la cápsula y las fungosidades que puede contener, respetando los extremos articulares.

artritis, *s. f.* (ἄρθρον). Nombre genérico de todas las afecciones inflamatorias agudas ó crónicas que atacan las articulaciones.

artritis seca ó **deformante**. Sin. : *artrocacis senil reumatismo óseo parcial, reumatismo articular crónico parcial.* Variedad de afección articular crónica caracterizada por la alteración de las superficies articulares, la tendencia á la deformación, la localización en una sola ó en un número reducido de articulaciones y su frecuencia en los viejos.

artrítide, *s. f.* Nombre dado por algunos autores á las manifestaciones cutáneas que están bajo la dependencia del artritismo.

artritismo, *s. m* Sin : *diátesis artrítica* ó *braditrófica.* Diátesis dependiente del retardo en los cambios nutritivos, la cual se manifiesta en la clínica por diferentes estados mórbidos : obesidad, diábetes, cálculos urinarios, gota, etc.

artrocacis senil (ἄρθρον, articulación; κακόν, malo). Véase : *artritis seca.*

artrocentesis, *s. f.* (ἄρθρον; κεντεῖν, punzar). Punción de una articulación.

artrodesis, *s. f.* (ἄρθρον; δέσις, acción de ligar). Sinónimo : *operación de Albert* Operación que tiene por objeto provocar la anquilosis de una articulación.

artrodinia, *s. f.* (ἄρθρον; ὀδύνη, dolor). Dolor articular Cullen designó con este nombre el *reumatismo crónico.*

artrofito, *s. m.* (ἄρθρον; φυτὸν, planta). Sin. : *cuerpo extraño orgánico* (Cruveilhier). *cuerpo móvil y flotante* (Nélaton), *cartílago móvil* (Velpeau). Cuerpo extraño articular que se ha formado dentro de la articulación á consecuencia de una lesión traumática ó patológica de esta.

artrolisis, *s. f.* (ἄρθρον; λύειν, desatar). Operación que consiste en seccionar la cápsula y los ligamentos de una articulación anquilosada con el objeto de volverle su movilidad.

artrología. *s. f.* (ἄρθρον; λόγος, discurso). Parte de la anatomía que trata de las articulaciones.

artropatía, *s. f.* (ἄρθρον; πάθος, enfermedad). Nombre genérico que comprende todas las afecciones articulares. — *artropatías nerviosas.* Perturbaciones tróficas que se observan en las afecciones de los nervios periféricos ó de los centros nerviosos.

artro-tifus, *s. m.* Variedad de fiebre tifoidea co

determinaciones articulares predominantes.

artrotomía, *s. f.* (ἄρθρον, articulación; τομή, incisión). Abertura quirúrgica de una articulación.

ascárides, *s. f. pl.* (ἀσκαρίζειν, brincotear). Familia de lombrices del orden de los nematodes entre las que se encuentra el *ascárides lombricoides* : lombríz cilíndrica, grisácea ó rojiza, de 20 á 40 centímetros de largo, parásito del intestino.

ascitis, *s. f.* (ἀσκὸς, odre). Sin. : *hidroperitonitis*. Acumulación de serosidad en la cavidad peritoneal.

asemia, *s. f.* (ἀ priv.; σῆμα, signo). Véase : *asimbolia*.

asepsia ó **asepsis**, *s. f.* (ἀ priv.; σῆψις, putrefacción). Método que consiste en prevenir las enfermedades sépticas ó infectivas, evitando por medios higiénicos la introducción de microbios en el organismo. Difiere de la antisepsia profiláctica en que no emplea agentes terapéuticos.

asfixia, *s. f.* (ἀ priv.; σφύξις, pulso). Por mucho tiempo esta palabra tuvo la significación de : Muerte por cesación de los latidos cardíacos. — Actualmente se entiende por *asfixia* la dificultad para respirar ó la detención de la respiración por obstáculo mecánico (submersión, estrangulación, gases irrespirables pero no tóxicos, compresión del tórax, estenosis laringea, etc.). Por extensión aplícase este nombre á todos los estados en que la hematosis se hace mal.

asfixia de los recién nacidos Falta de oxigenación de la sangre fetal, motivada ya por compresión del cordón, ya por pobreza de oxígeno de la sangre materna. Es la causa más frecuente del estado de muerte aparente de los recién nacidos.

asfixia local de las extremidades. Perturbación vaso-motora observada en la *enfermedad* de *Maurice Reynaud* ó *gangrena simétrica de las extremidades*. Esta asfixia se halla caracterizada por la cianosis de los tegumentos con anestesia dolorosa.

asialia, *s. f.* (ἀ priv.; σίαλον, saliva). Ausencia de saliva.

asilabia, *s. f.* (ἀ priv.; συλλαβή, sílaba) (Bertholle). Variedad de afasia sensorial en la que el enfermo, atacado de ceguera verbal, puede reconocer las letras, pero es

incapaz de formar sílabas con ellas.

asimbolia, *s. f.* (ἀ priv.; σύμβολον, símbolo) (Finkelburg). Sin.: *asemia*. Turbación del lenguaje. « Nombre genérico de todos los trastornos de la utilización de los signos, ya para expresar, ya para comprender las ideas y los sentimientos. » (Blocq y Onanoff).

asimilación, *s. f.* *assimilare*, asimilar). Fenómeno vital en virtud del cual los seres organizados transforman en su propia sustancia las materias que absorben.

asinclitismo, *s. m.* (ἀ priv.; sinclitismo). Falta de conjunción del eje pelviano y el eje de la cabeza fetal durante el encajamiento.

asinergia, *s. f.* (ἀ priv.; sinergia). « Fenómeno particular que no es ni parálisis ni incordinación, sino que consiste en una perturbación en la facultad de asociación de los movimientos elementales para los actos complejos. » (Babinski). La *asinergia* se observa en ciertas afecciones del cerebelo (*asinergia cerebelosa*).

asistolia, *s. f.* (ἀ priv., συστολή, sistole) (Beau, 1856). Sindroma caracterizado por la insuficiencia cardio-vascular con perturbación profunda de las circulaciones general y local.

asma *s. f.* (ἀσθμαίνειν, perder el aliento). Sinónimo por mucho tiempo de sofocación, dicho término designa ahora una forma particular de disnea paroxística. — 1° *asma esencial* ó *verdadera*. « Neurosis que se manifesta por crisis de disnea espasmódica, las más veces acompañadas de perturbaciones vaso-secretoras de las mucosas de la vias aéreas. » (Brissaud). — 2° *asma sintomática*, *seudo-asma*. Disnea que reviste la forma del asma esencial, pero que depende de una lesión visceral (bronquitis, perturbación cardíaca, insuficiencia renal, etc.)

asma tímica. Véase : *Kopp* (*asma de*)

aspalosoma, *s. m.* (ἄσπαλος, topo; σῶμα; cuerpo). Monstruo caracterizado por una « eventración mediana ó lateral que ocupa principalmente la porción inferior del abdomen; los aparatos urinario, genital é intestinal se abren al exterior por tres orificios distintos ». (J Geoffroy Saint-Hilaire).

aspergilosis, *s. f.* Enfermedad causada por el

desarrollo de un hongo, *aspergillus fumigatus*. en el organismo del hombre y de los animales. Se presenta en el hombre generalmente bajo la forma de una tuberculosis del pulmón (seudo-tuberculosis aspergilar).

aspermatismo, s. *m.* (ἀ priv. ; σπέρμα. semen). Imposibilidad ó dificultad para la eyaculación de la esperma. Se toma à veces en el sentido de *impotencia*.

asquemasia *s. f.* (ἀ priv. ; σχῆμα. actitud) (Bonnier, 1905). Sin. : *cenestesiopatia*. Perturbación en la cual ciertas partes de nosotros mismos cesan de figurar en la noción que tenemos de nuestro cuerpo

astacoide, *adj* (ἀστακός; langosta) Quinquaud) Se dice de un *rash* rojo vivo que colora los tegumentos con un tinte uniforme que recuerda al de una langosta cocida. Este *rash* se observa en la viruela hemorrágica.

astasia, *s. f.* (ἀ priv ; στάσις, estación). Pérdida más ó menos completa de la facultad de conservar la ...tación vertical. Coincide ...si siempre con la abasia.

astasia-abasia, *s. f.* (Brocq). Sin.; *ataxia por falta de coordinación automática* (Jaccoud), Impotencia motriz de los miembros inferiores debida à la falta de la coordinación propia à la estación (*astasia*) y á la marcha (*abasia*)

asteatosis, *s. f.* (ἀ priv. ; στέαρ, ατος, grasa). « Estado particular de la piel, caracterizado por una notable insuficiencia, ó una privación absoluta, de las secreciones grasosas que se producen normalmente en su superficie. » (Brocq).

astenia, *s. f.* (ἀ priv. ; σθένος, fuerza) 1° Depresión del estado general que trae como resultado insuficiencias funcionales múltiples. Ej. : *formas asténicas de las enfermedades*. — 2° Debilitamiento de las funciones de un órgano. Ej. : *astenia cardio-vascular*, *astenia tráqueo-brónquica*.

astenopia, *s. f.* (ἀσθενής, débil ; ὤψ, ojo). Sin. : *copiopia*. Estado en el cual la vista es incapaz de aplicación sostenida. — *astenopia acomodativa*. La que se presenta en la hipermetropía debida á la fatiga causada por la acomodación. — *astenopia muscular*. La que se observa en la miopía y las neurosis, por insuficiencia de los músculos rectos

internos, y que está acompañada á menudo de diplopía.

áster cromático, *s. m.* Sin.: *roseta cromática.* Nombre dado á la figura de estrella, formada por el filamento cromático del núcleo al principio de la cariocinesis.

asterion, *s. m.* (*aster*, estrella). Punto de la superficie externa del cráneo en que se encuentran las tres suturas parieto-mastoidea, lambdoide y occípito-mastoidea.

astigmatismo, *s. m.*, (ἀ priv.; στίγμα, punto). Defecto de curvatura de los medios refringentes del ojo, que hace imposible la convergencia á un solo punto de los rayos homocéntricos (partidos de un punto).

Astley-Cooper (hernia de). Hernia crural con saco multilobulado.

Astley-Cooper (testículo irritable de). Véase: *testículo irritable.*

astomia, *s. f.* (ἀ priv.; στόμα, boca). Ausencia congénita del orificio bucal y de la cavidad correspondiente.

astrafobia, *s. f.* (ἄστρον, astro; φόβος, temor). Temor mórbido á los relámpagos y al trueno.

astringente, *adj.* y *s. m.* (*astringere*). Medicamento que ejerce sobre los tejidos vivos una especie de constricción fibrilar más ó menos visible.

ataque *s. m.* Nombre dado á la repetición de un estado mórbido que aparece bruscamente, dura un tiempo variable, está caracterizado por síntomas agudos y deja á veces, después de su desaparición, secuelas más ó menos graves (ataque de gota, de apoplejía, de epilepsía).

ataraxia *s. f.* (ἀ priv.; τάραξις, emoción). Tranquilidad moral.

atavismo, *s. m.* (*atavus*, abuelo). Sinónimo: *herencia ancestral* ó *hacia atrás.* 1° « Conjunto de las potencias hereditarias de la raza. » (Baudement). El *atavismo* mantiene los caracteres fundamentales de una raza á través las generaciones sucesivas y á pesar de los cruzamientos. — 2° « Reaparición en un descendiente de un carácter cualquiera de los ascendientes, carácter que ha permanecido latente en una ó varias generaciones intermedias. » (Legendre). El *atavismo* es lo más frecuentemente directo, es decir, del abuelo al nieto.

ataxia, *s. f.* (ἀ priv.;

τάξις, orden), Incoordinación. No se emplea ya este término más que para designar la incoordinación motriz en los movimientos voluntarios, que hace contraste con la integridad de la fuerza muscular.

ataxia locomotriz progresiva (Duchenne de Boulogne, 1858). Véase: *tabes dorsal.*

ataxia sico-motriz (Lunier). Véase: *parálisis general.*

ataxia estática (Friedreich). Estado caracterizado por movimientos incoordinados que se producen aun cuando el enfermo se halle en reposo, movimientos áveces muy extensos, que dan entonces al enfermo el aspecto de un coreico (instabilidad coreiforme), y los cuales se deben à la falta de sinergia de los músculos encargados de asegurar el equilibrio.

atáxicos (fenómenos). Conjunto de fenómenos nerviosos observados en las formas graves de las piraxias, y que consisten sobre todo en una agitación extrema y convulsiva, con insomnio é irregularidad en la marcha habitual de la enfermedad.

ataxo-adinámico, *adi.* Se dice de la forma de una enfermedad aguda en que se combinan la adinamia y los fenómenos atáxicos.

atelectasia, *s. f.* (ἀτελής, incompletó; ἔκτασις, distensión). Sin.: *estado fetal, carnificación, neumonía marginal, aneumatosis.* Estado del pulmón, en que los alveolos se hallan privados de aire y los capilares fuertemente congestionados, que ofrece una gran semejanza con el pulmón del feto. Su causa más frecuente es la bronco-neumonía de los recién nacidos.

atelencefalia, *s. f.* (ἀτελής; ἐγκέφαλον, encéfalo). Desarrollo incompleto del encéfalo.

atelia, *s. f.* (ἀ priv.; θηλή, pezón). Ausencia congénita del pezón.

ateloprosopia, *s. f.* (ἀτελής, incompleto; πρόσωπον, rostro). Deformación congénita de la cara.

atenuación de las bacterias. Disminución ya de las funciones todas de estos micro-organismos, ya de sólo algunas, y en particular de su virulencia.

ateromasia, ó **ateromasis,** *s. f.* Afección determinada por el ateroma arterial.

ateroma, *s. m.* (ἀθήρα, papilla). Nombre dado ante-

riormente á los quistes sebáceos à causa de la papilla blancuzca que contienen.

ateroma arterial. Lesión crónica de las arterias, caracterizada por la formación de focos que contienen un pus grumoso; esta lesión coincide ordinariamente con otras variedades de arteritis crónica (esclerosis, placas calcáreas), por lo que, por extensión, se llama también *ateroma arterial* la arteritis crónica misma, y en particular sus formas generalizadas que producen el endurecimiento de las arterias de grueso y mediano calibre.

atetoides (movimientos). Véase.; *amiotaxia.*

atetosis, *s. f.* (ἀ priv.; τίθημι, coloco). Movimientos involuntarios que afectan sobre todo las extremidades de los miembros y la cara; sus caracteres son: la incoordinación, la exageración de la amplitud y la extremada lentitud, que los distingue de los movimientos coreiformes. Acompañan la *atetosis* cierto estado espasmódico y á menudo alguna debilidad intelectual.

atialismo ó aptialismo, *s. m.* (Hutchinson y Hadden, 1889). Sin.: *jerostomia.* Supresión de la secreción salivar. Puede ésta desaparecer sin causa conocida en las personas de edad avanzada, particularmente en los neurasténicos y melancólicos.

aticitis, *s. f.* Variedad de otitis media en la cual predomina la inflamación de aquella parte de la caja llamada *ática.*

atiroidia, *s. f.* (ἀ priv.; tiroide). Ausencia completa de la secreción tiroidea, causa del mixedema y del cretinismo.

atlodimo, *s. m.* (ἄτλας, atlas; δίδυμος, gemelo) (Isidoro G. Saint-Hilaire). Monstruo que presenta dos cabezas contiguas sobre un cuerpo único

atonía, *s. f* (ἀ priv.; τόνος, resorte). Disminución de la tonicidad normal de un órgano contráctil.

atrabilis, *s. f.* (*atra*, negra; *bilis*). Papilla negruzca que se encuentra en el cadáver, en el centro de las cápsulas supra-renales, proveniente de la putrefacción de la sustancia medular de éstas.

atraso mental. Estado de los niños *atrasados.* Lo caracterizan la debilidad mental, la instabilidad síquica y la incapacidad de responder nor-

malmente à las excitaciones suministradas por el medio educativo ordinario. Los niños atrasados son á menudo degenerados que presentan antecedentes hereditarios alcohólicos ó sifilíticos, ó son adenoidianos y á veces mixedematosos.

atremia, *s. f.* (ἀ priv.; τρέμω, me muevo). (Neftel). Forma hereditaria de neurastenia, caracterizada por el debilitamiento profundo de la energía moral, astenia muscular capaz de llegar á la impotencia motora completa de los miembros inferiores; los enfermos, sin estar paralizados, permanecen acostados meses y años enteros.

atrepsia, *s. f.* (ἀ priv.; θρέψις, nutrición). Sin.: *algidez progresiva de los recién nacidos.* (Hervieux). Estado de decadencia orgánica profunda en que caen los recién nacidos à consecuencia de diversas afecciones, y en primer término de la diarrea crónica. Parrot, á quien se debe el vocablo, entendía designar con él una enfermedad que tenía por causa esencial la perturbación profunda del trabajo nutritivo y por manifestaciones variadas la hipotermia, la diarrea, los vómitos, las aftas (*muguet*), los eritemas, las convulsiones, etc.

atresia, *s. f.* (ἀ priv.; τρῆσις, agujero). Oclusión completa ó incompleta, congénita ó adquirida, de un orificio natural.

atriplicismo, *s. m.* (*atriplex*, armuelle). Conjunto de los accidentes debidos á la intoxicación por la armuelle, y atribuidos ya á la planta misma, ya á un insecto parásito suyo.

atriquia, *s. f.* (ἀ priv.; θρὶξ, θριχός pelo). Ausencia completa, lo más frecuentemente congénita, del pelo.

atrofia, *s f.* (ἀ priv.; τροφή, alimento). Falta de nutrición de los órganos y de los tejidos, caracterizada por la disminución notable de su volumen y de su peso. Por extensión, dicho término se enplea á menudo para designar la disminución de volumen de un órgano, en relación con lesiones anatómicas variables. Ej.: *cirrosis atrófica.*

atrofia muscular progresiva (Aran, Duchenne). Sin.: *amiotrofia primitiva progresiva.* Tipo mórbido aislado por Duchenne de Boulogne, y caracterizado por una atrofia muscular que empieza por los músculos de las manos. Este tipo no se considera hoy como una entidad mór-

bida: se halla bajo la dependencia de una lesión de los cuernos anteriores de la médula.

atrombasia, *s. f.* (ἀ priv.: θρόμβος, coágulo) (P. E. Weil, 1905). Falta de producción del fibrín-fermento, por la cual se ha tratado de explicar la ausencia de coagulación sanguínea en los hemofílicos.

audífono, *s. m.* (*audire*, oir; φωνὴ, voz). Aparato que se emplen en los casos de sordera extrema y que comunica las vibraciones sonoras al nervio auditivo por el intermedio de los huesos de la cara.

audi-mudez, *s. f.* Mudez congénita y sin sordera, no ligada á estado mental alguno.

audición coloreada. Fenómeno que consiste en asociar la percepción de una imagen coloreada á la audición de ciertos sonidos.

augnato, *s. m.* (αὐ, que indica duplicamiento; γνάθος, mandíbula) (G. Saint-Hilaire). Monstruo doble parasitario, caracterizado por la implantación sobre el maxilar inferior del autósito, del parásito representado por una parte fetal rudimentaria (mandíbula).

aura, *s. f.* (*aura*, soplo). Sensación subjetiva pasajera que precede al ataque de histerismo, de epilepsía, la crisis de asma, etc. Esta sensación varía mucho según los sujetos, y puede ser auditiva, visual, objetiva, gustativa, cutánea, ovárica, abdominal, cefálica, síquica.

auricular (punto) (antropología). Centro del orificio del conducto auditivo externo.

aurista, *s. m.* (*auris*, oreja). El que se ocupa especialmente en el tratamiento de las enfermedadas de los oídos.

auscultación, *s. f.* (*auscultare*, escuchar). Modo de exploración clínica que consiste en escuchar los ruidos que se efectúan en el interior del organismo, ya aplicando directamente la oreja sobre la parte que se explora (*auscultación inmediata*), ya interponiendo un estetoscopio entre la oreja y el enfermo (*auscultación mediata*).

ausencia, *s. f.* La manifestación más benigna de la epilepsía (pequeño mal). Consiste en la pérdida, brevísima, del conocimiento, sin caída, y frecuentemente seguida de atontamiento.

auto-acusador, *s. m.* Nombre dado en siquiatria no sólo al individuo que

confiesa haber cometido un crimen sino también al enfermo que hace de sí mismo un juicio desfavorable y expresa ideas generales de incapacidad y de culpabilidad.

auto-antisepsia, *s. f.* Sin. : *antisepsia fisiológica del organismo.* Conjunto de medios de que dispone el organismo para luchar contra los microbios que se hallan en contac o con el revestimiento cutáneo ó mucoso (aparato digestivo, respiratorio, etc.).

autoclave, *s. m.* (αὐτὸς, por sí mismo; *clavus*, clavo, que se cierra). Aparato que sirve para esterilizar los medios de cultivo ó cualquiera otro objeto, por el vapor de agua bajo presión.

autocópica (trofoneurosis) (αὐτὸς; κόπτειν, cortar). Amputación espontánea de los miembros.

autofagia, *s. f.* (αὐτὸς, á sí mismo; φαγεῖν, comer). Fenómeno fisiológico en virtud del cual el individuo sometido á la inanición prolonga la existencia á expensas de su propia sustancia. — *autofagia artificial.* Método que consiste en sostener animales privados de alimentos haciéndoles beber su propia sangre, que se les extrae por sangrías sucesivas.

autofonía, *s. f.* (αὐτὸς; φωνεῖν, hablar). 1° Nombre dado por Hourmann (1839) á un modo de auscultación que consiste en que el médico escucha la resonancia de su propia voz mientras mantiene aplicada la oreja contra la pared torácica del enfermo. Este procedimiento no ha dado resultado apreciable. — 2° Fenómeno subjetivo que consiste en la resonancia penosa de la voz, que es la obsesión del enfermo, y que se observa en varias afecciones de oido medio.

autografismo, *s. m.* Véase : *dermografia.*

auto-infección, *s f.* Infección de un individuo por los micro-organismos que se hallan en sas propias cavidades naturales.

auto-intoxicación, *s. f.* Sin. : *nosotoxirosis, toxemia.* Conjunto de accidentes provocados por venenos que nacen en el organismo, venenos elaborados ya por los microbios contenidos en el tubo digestivo, cuya virulencia hase exaltado, ya por algunos órganos glandulares, cuya función se ha alterado; estas sustancias tóxicas, á consecuencia de la insuficiencia de los emuntorios naturales, se acumulan en la sangre.

autolisis, *f. m.* (αὐτὸς;

λύειν, disolver). Autodigestión de los tejidos abandonados á sí mismos, fuera de toda intervención microbiana (desaparición de las diastasas y aparición de cuerpos amidados. de peptonas, etc.). Este fenómeno puede observarse, en el curso de enfermedades crónicas, en ciertas vísceras que se hallan en vía de degeneración.

automatismo, *s. m.* (αὐτόματος. espontáneo). Realización de diversos actos sin la participación de la voluntad.

automatismo comicial ambulatorio, (Charcot). Accesos de duración variable (á veces de mucho dias, en los cuales ciertos neurópatas emprenden verdaderas fugas, con tendencia á la deambulación. Estos, á pesar de la inconsciencia y el olvido completo de lo que han hecho, presentan la apariencia de individuos normales.

autonomasia, *s f.* (Luys). Variedad de afasia en la cual las palabras olvidadas son especialmente los sustantivos

autoplastia, *s. f.* (αὐτός, sí mismo; πλάσσειν, hacer). Operación que consiste en reemplazar una parte que falta, con tejido tomado del enfermo mismo ó de otro individuo.

auto-proteolisis, *s, f.* Véase : *autolisis.*

autopsia, *s. f.* (αὐτός; ὄψις, vista). Inspección y descripción de todas las partes de un cadáver.

auto-representación, *s. f.* Véase : *autoscopia interna.*

autoscopia, *s. f.* (αὐτός; σκοπεῖν examinar). Fenómeno por el cual un sugeto se ve á sí mismo ya exteriormente, ya interiormente. — 1° *autoscopia externa.* Sinonimia : *deuteroscopia*, *alucinación autoscópica* ó *especular* (Féré). El individuo, ordinariamente un neurópata ó un loco, ve su propia imagen delante de sí. — 2° *Autoscopia interna.* Sinónimo : *autorepresentación.* El individuo (histérico en estado de hipnosis) adquiere conciencia de sus órganos internos, describe su forma, situación y funcionamiento.

autósito, *s. m.* (αὐτοσίτος, que se procura él mismo el alimento). Uno de los tres órdenes de monstruos según la clasificación de Isidoro G. Saint-Hilaire. Monstruo capaz de vivir vida extra-uterina

auto-sugestión, *s. f.* « Sugestión nacida espontá-

neamente en una persona, fuéra de toda influencia extraña apreciable ». (Bernheim).

auto-tifización (teoría de la). Teoría sostenida por Peter, según la cual la fiebre tifoidea sería debida á la exacerbación de la virulencia de los microbios ordinarios del intestino.

autotomía, *s. f.* (αὐτὸς; τέμνω, yo corto). Acto por el cual muchos animales lagarto, cangrejo, araña, langosta) se escapan al enemigo que los ha apresado por un miembro ó por la cola, provocando por vía refleja la ruptura de la extremidad cautiva.

auto-toxina, *s. f.* (Komach y Kurpjuweit, 1905). Veneno fabricado por las bacterias, que se opone al desarrollo de ellas.

auto-transfusión, *s. f.* Compresión metódica de los cuatro miembros de su extremidad á la raiz por medio de una venda de tela. Este medio terapéutico ha sido propuesto por Coiffier para reemplazar en ciertos casos la transfusión.

Avellis (sindroma de). Asociación de una hemiplejia del velo del paladar con una parálisis del nervio recurrente del mismo lado.

avulsión, *s. f.* (*avulsio*). Arrancamiento.

axoplasma, *s. m.* Nombre dado al hialoplasma del cilindro-eje. El *axoplasma* se extiende en capa delgada y hialina sobre el cilindro-eje y se insinúa entre sus fibrillas.

azoamilia, *s. f.* (ἀ priv.; ζῶον, animal; *amylum*, almidón) (Lépine). Estado de la célula que pierde más glicógeno que el que adquiere

azoemia ó **azotemia**, *s. f.* (ázoe; αἷμα, sangre). Acúmulo en la sangre de productos de excreción azoados (úrea, uratos) á consecuencia de la falta de permeabilidad renal para dichas sustancias.

azoospermia, *s. f.* (ἀ priv., ζῶον, animal; σπέρμα, semen). Ausencia de espermatozoides en el semen.

azoorrea ó **azotorrea**, *s. f.* Síntoma de insuficiencia pancreática que consiste en el aumento de la cantidad de ázoe contenido en las heces comparada con el ázoe de la alimentación; puede a veces reconocerse clínicamente por la aparición en las heces de pedazos de carne no digeridos.

azouria ó **azoturia**, *s. f.* (ázoe; οὐρεῖν, orinar).

Eliminación exagerada de ázoe por la orina (úrea, urato).

azul de metileno (prueba del) (Achard y Castaigne, 1897). Sin. *prueba de la glaucuria*. Examen de la permeabilidad del filtro renal, basado sobre la eliminación por la orina del azul de metileno inyectado bajo la piel. La eliminación prolongada del azul es el indicio de la poca ó ninguna permeabilidad renal.

azul (enfermedad). Véase : *cianosis.*

B

Babesiosis, *s. f.* (del médico rumano Babes). Véase : *piroplasmosis*

Babinski (signo de). Véase : *fenómeno de los dedos del pié.*

Babinski (sindroma de). Asociación de signos pupilares (desigualdad, signo de Argyll-Robertson) con lesiones aórticas (insuficiencia, aneurisma). Este síndroma es de origen sifilítico y constituye á menudo una manifestación precoz de la tabes.

Babinski-Nageotte (sindroma de) (1902). Sindroma observado en algunos casos de lesiones bulbares unilaterales, caracterizado, clínicamente, por vértigos, hemiplejia y anestesia del lado opuesto á la lesión ; hemiasinergia, lateropulsión y miosis del lado de la lesión.

Baccelli (signo de). V. *pectoriloquia afónica:*

bacilemia, *s. f.* (*bacillus*; αἷμα, sangre). Nombre dado por Benda á la infección tuberculosa generalizada, de marcha más ó menos rápida.

bacilización, *s. f.* Invasión del organismo ó de una de sus partes por los bacilos (ordinariamente por el de la tuberculosis).

bacilo, *s. m.* (*bacillus*, bastoncillo). Nombre dado á los microbios que presentan la forma de bastoncillo.

baciloscopia, *s. f.* (*bacillus*; σκοπεῖν, examinar). Investigación de los bacilos en un órgano, ó en los excreta de un enfermo (esputos, pus, heces, etc.).

bacilosis, *s. f.* Nombre dado á veces á la tuberculosis pulmonar (debida al bacilo de Koch).

baciluria, *s. f.* Presencia de bacilos (en particular del bacilo de la tuberculosis) en la orina.

bacillus anthracis. Véase: *bacteridia carbonosa.*

bacteria, *s f.* (βακτερία, bastón). Nombre dado á seres unicelulares, desprovistos de clorofila, cuyos individuos son visibles sólo al microscopio. Están caracterizados por la reproducción por escisión, de donde el nombre de *esquizofitos* ó *esquizomicetos* que se les ha dado también. El género *bacteria* contiene varias especies; las dos principales son el coccus y el bacilo.

bacteriáceas, *s. f. pl.* (βακτερία, bastón). Nombre de la segunda familia de las bacterias : bacterias con elementos en forma de bastoncillos ó de filamentos más ó menos largos.

bactericida, *adj.* (βακτερία; *cædere*, matar). Que mata las bacterias.

bacteridia carbonosa. Sinónimos : *bacilo del carbón, bacillus anthracis* Bacteria que provoca en el hombre el carbón ó pústula maligna, y en el carnero la enfermedad conocida con el nombre de *sang de rate.*

bacteriemia, *s. f.* (βακτερία; αἷμα, sangre). 1° Presencia de bacterias en la sangre. — 2° Proceso mórbido debido á la invasión de la economía por un germen infectivo que no suscita reacción local alguna (*septicemia*), ó que determina reacciones diseminadas (*piohemia*).

bacteriolisis, *s. f.* (βακτερία; λύειν, disolver). Disolución de las bacterias; acción ejercida sobre los microbios por ciertos líquidos del organismo.

bacteriología, *s. f.* (βακτερία; λογος, discurso). Estudio de las bacterias.

bacteriopéxico, *adj.* (βακτερία; πήξις, fijación). (Gilbert). Se dice de la función de un órgano ó de un tejido que fija en él las bacterias (hígado).

bacterioterapia, *s. f.* (βακτερία; θεράπεια, tratamiento). (Cantani). Empleo terapéutico de ciertos cultivos de microbios vivos ó muertos, basado sobre el antagonismo de ciertos microbios. Ej. : Empleo de la levadura de cerveza en la forunculosis.

bacteriotoxina, *s f.* Toxina de origen bacteriano. Véase : *toxina.*

bacterium coli commune. Véase : *colibacilo*.

bacteriuria, *s. f.* (βακτερία; οὐρεῖν, orinar). Presencia de bacterias, en gran cantidad, en la orina recién emitida, sin la coincidencia de proceso inflamatorio alguno de las vías urinarias.

Baer (ley de). La embriogenia es la recapitulación de la filogenia.

balanitis, *s. f.* (βάλανος, glande). Inflamación de la mucosa del glande.

balano-postitis, *s. f.* (βάλανος; πόσθη, prepucio). Inflamación del glande y del prepucio.

baloteo ó **bamboleo**, *s. m.* Movimiento de vaivén comunicado por el dedo ó la mano á un cuerpo sólido flotante en un líquido (víscera ó neoplasma en la ascitis, parte fetal en las aguas del amnios).

balneación, *s. f.* (*balneus*, baño). Empleo del baño en terapéutica. Inmersión y permanencia más ó menos prolongada del cuerpo ó de una de sus partes en un medio cualquiera distinto al atmosférico.

balneoterapia, *s. f.* (*balneus*; θεράπεια, tratamiento). Método de tratamiento de las enfermedades por baños generales ó locales, que obran ya por su temperatura, ya por su duración, ya por su composición, ya por varios de estos factores á la vez.

Bamberger (movimiento cardio-neumático de). Aspiración de la lengüeta pulmonar izquerda que va á llenar el vacío producido, en el momento de la sístole, al nivel de la punta del corazón.

Bamberger (pulso bulbar de). Pulsación del bulbo de la vena yugular que, acompañada de un chasquido, se percibe á veces muy claramente detrás de la clavícula en los atacados de insuficiencia tricuspídea ; es isócrona con la sístole ventricular.

bandera (ruido de). Signo estetoscópico debido al frote de un colgajo membranoso en un bronquio suficientemente voluminoso. Indica la existencia de una bronquitis seudomembranosa.

Bandl (anillo de). Límite superior del canal cérvico-uterino. Lo señala hacia el séptimo mes de la preñez un reborde circular debido á la diferencia de espesor de la pared á ese nivel.

Banti (enfermedad

de). (1894). Afección caracterizada por aumento de volumen del bazo acompañado de cirrosis hépática. En la concepción de Banti la esplenomegalia sería primitiva y el hígado sería atacado secundariamente á consecuencia de la acción nociva de los productos mórbidos que la vena esplénica lleva del bazo al hígado. Para Gilbert y Lereboullet, al contrario, la lesión del hígado sería siempre primitiva, y los hechos descritos por Banti corresponderían al cuadro de la cirrosis biliar.

baranestesia, *s. f.* (βάρος, peso; ἀ priv.; αἴσθησις, sensibilidad) (Marinesco, 1905). Abolición de la sensibilidad de los tejidos profundos á la presión.

Bard-Pic (síndroma de). Triada sintomática que consiste en: ictericia crónica progresiva, dilatación enorme de la vesícula biliar, enflaquecimiento y caquexia rápidos. Se observa en el cáncer de la cabeza del páncreas.

barestesia, *s. f.* (βάρος, peso; αἴσθησις, sensibilidad) Marinesco, 1905) Sensibilidad á la presión de los tejidos profundos (huesos, tendones, aponeurosis, músculos).

baripoestesia, *s. f.* (βαρος: υπό, debajo; αἴσθησις). Marinesco, 1905). Disminución de la sensibilidad á la presión.

Barlow (enfermedad de). Sinonimia: *escorbuto infantil, raquitismo hemorrágico.* Afección de la primera infancia, caracterizada anatómicamente por hemorragias subperiósteas, y clínicamente por una anemia notable y fuertes dolores atribuidos á los huesos. Considerada por algunos autores, como una forma especial de raquitismo, acércase más, para otros, al escorbuto, como lo demuestra la feliz influencia del tratamiento anti-escorbútico.

barotropismo, *s. m.* (βάρος peso; τρέπειν, volver). Propiedad del protoplasma de responder á los contactos y á las vibraciones.

bartolinitis, *s. f.* Inflamación de la glándula de Bartholin, generalmente de origen blenorrágico.

Basedow (enfermedad de). Véase: *bocio exoftálmico.*

basion, *s. m.* (βάσις, base) (antropología). Borde anterior del agujero occipital sobre la línea media.

basiotribo, *s. m.* (βάσις, base; τρίβω, trituro). Instrumento compuesto de tres ramas articulables: una mediana (perforador) destinada á perforar el cráneo del feto,

y dos en forma de forceps reunidas por un tornillo triturador.

basiotripsia, *s. f.* (βάσις; τρίψις, trituramiento). Operación que consiste en triturar la cabeza del feto, en la base, por medio del basiotribo.

basófilo, *adj.* Se dice de las granulaciones leucocitarias que se coloran por los colores básicos.

basofobia, *s. f.* (βάσις, marcha; φόβος, temor). Aprehensión mórbida de caerse al caminar; dicho temor, que experimentan algunos enfermos, notablemente los atáxicos, aumenta en ellos la dificultad para la marcha.

batea ó **batel (vientre en)**. Aspecto particular del vientre cuya parte central se ahueca formando una depresión encuadrada por las últimas costillas y los huesos ilíacos. Se le observa en gran número de enfermedades, particularmente en el cólera, la meningitis tuberculosa, el cólico de plomo, etc.

baticardia, *s. f.* (βαθύς, profundo; καρδία, corazón) Situación anormal del corazón colocado muy abajo, la cual se debería al relajamiento de los grandes vasos. Determina palpitaciones, disnea é intermitencias del pulso.

batracio (vientre de). Aspecto particular que ofrece el vientre de los que padecen de una vieja ascitis; caracterizado por el ensanchamiento de las partes laterales que le da la semejanza con el vientre de rana.

batracosioplastia, *s. f.* (βάτραχος rana; πλάσσειν, formar). Operación destinada á curar la ranilla y á impedir su renovación. Consiste en incindir el quiste y suturar los dos labios de la incisión á la mucosa.

Battey (método de) (1872). Castración de los ovarios aplicada como tratamiento de los fibromas uterinos y preconizada igualmente contra la neurastenia y la histeria. Se laha abandonado hoy.

Baumés (ley de) (1840). Sinónimo : *ley de Colles*. Ley que rige la sífilis por concepción : una madre puede dar á luz un niño sifilítico por parte del padre, sin presentar ella accidentes específicos. Hállase, sin embargo, al abrigo del contagio y puede amamantar á su hijo, aun cuando éste presente accidentes bucales.

Bayle (enfermedad de). Véase : *parálisis general*.

bayoneta (dedo en).

Deformación observada en algunos hemipléjicos atacados de contracturas con flexión del miembro superior. Las terceras falanges del índice y del dedo medio están en flexión palmar, las segundas en hiperextensión con sublujación, y las primeras están en flexión.

Bazin (tipo). Variedad de *micosis fungoide*, que presenta en su evolución clínica cuatro períodos: exematoso, liquenoide, período de tumor y período de ulceración.

Beard (enfermedad de). (1880). Véase: *neurastenia.*

béquico, *adj.* (βηξ, tos). Que se emplea contra la tos.

Béclard (hernia de). Hernia á través del orificio de la safena.

Beigel (enfermedad de). Nudosidades que se observan sobre los cabellos artificiales, producidas por el acúmulo de un parásito llamado hongo de los moños.

Bell (parálisis de) (1825). Parálisis del nervio facial.

Bell (signo de). En la parálisis facial de tipo periférico, el globo ocular se dirige involuntariamente hacia arriba y afuera cuando el enfermo se esfuerza en bajar el párpado superior paralizado.

Belmas (método de). Sin: *método alsaciano.* Tratamiento de la aneurisma arterial circunscrita por compresión total indirecta (entre el corazón y el saco aneurismal) y alternativa, es decir, por la disminución de la corriente sanguínea sin interrumpirla por completo.

belonefobia, *s. f.* (βελόνη, aguja; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa á tocar alfileres ó agujas.

Bence-Jones (enfermedad de) (1847). Enfermedad caracterizada por la coexistencia de una afección ósea (sarcomatosis, mielomatosis) y de albumosuria.

Bence-Jones (reacción de). Reacción de una especie de albumosa. La orina albumosúrica calentada después de filtrada, se enturbia á los 60° para aclararse á la ebullición. El enfriamiento hace aparecer nuevamente el precipitado. Esta reacción, sumamente rara, caracteriza una variedad de albumosa que se encuentra en la enfermedad de Bence-Jones.

Benckiser (anomalía de). Véase: *vedamentosa del cordón (inserción).*

Benedikt (sindroma de) (1889). Parálisis del motor ocular común (tercer par), acompañada de hemiplejia cruzada y de temblor. Este sindroma se debe á una lesión localizada en el pedúnculo cerebral á nivel del núcleo del óculo-motor, en el punto de emergencia de este nervio.

Beniqué (bujía de). Catéter de estaño que presenta una doble curvatura destinada á adaptarse al trayecto de la uretra, y que se emplea para tratar las estrecheces. La diferencia de diámetro entre dos números consecutivos es de 1/6 de milímetro; corresponde á la mitad de la hilera Charrière, de modo que un número 30 Beniqué vale uno 15 Charrière. (Se designa comúnmente estas bujías con el nombre de su inventor Beniqué.)

Bergeron (corea ó enfermedad de). Forma de corea eléctrica que ataca sobre todo á los niños, y en la cual las sacudidas se repiten de una manera rítmica á intervalos más ó menos próximos. Se relaciona frecuentemente con trastornos gástricos.

beriberi, *s. m.* (*beri*, vocablo zingalés que significa debilidad). Sin.: *kakke*. Enfermedad epidémica en el Japón, las Indias, las Antillas y el Congo, caracterizada clínicamente por signos motores, sensitivos, circulatorios y secretorios, y anatómicamente por su localización casi esclusiva en los nervios periféricos. Se presenta bajo dos formas: 1° *beriberi hidrópico* ó *húmedo*, que se manifiesta por edemas más ó menos extensos y derrames en las serosas. — 2° *beriberi seco*, *paralítico* ó *atrófico*, caracterizado por parálisis, predominante sobre todo en los miembros inferiores, y signos que recuerdan los de la neuritis alcohólica.

Bernard (signo de J) (190?). Tumorcitos del tamaño de una avellana que se perciben por la palpación cuidadosa de la fosa iliaca derecha en los niños atacados de fiebre tifoidea. Dicho signo, bastante fugaz, se presenta al fin del primer septenario y desaparece unos días después.

Bernhardt (enfermedad de). Véase: *neuralgia parestésica*.

bestialidad, *s. f.* Sin: *sodomia*. Se llama así en medicina legal el acto venéreo practicado por un hombre ó una mujer con un animal.

bicorne (útero) (*bis*, dos veces; *cornu*, cuerno). Deformación caracterizada por el desdoblamiento de la mitad superior del útero, mientras que el cuello y la parte inferior del cuerpo del órgano están normales. Esta deformación se debe á la unión incompleta de los dos canales de Müller.

Bier (método de) (1899). 1° Véase : *raquicocainización*. — 2° Aplicación metódica de la hiperemia venosa, producida por una venda de cautcho ceñida sobre un segmento de miembro, para el tratamiento de las supuraciones agudas ó crónicas que están por debajo del lazo elástico.

Biermer (enfermedad de) (1868). Véase : *anemia perniciosa progresiva*.

Biermer (signo de). Signo observado en el hidro-neumotórax. La resonancia metálica, á consecuencia de la movilidad del líquido, cambia de tonalidad según la posición del enfermo.

Biett (gorguera ó cerco de). Ligero levantamiento epidérmico que se presenta á menudo al rededor de las lesiones cutáneas de la sífilis secundaria, con la forma de una gorguerilla blanca, que resalta sobre la coloración roja ó cobriza de la lesión.

bifocular (auscultación) (Rosenthal, 1905). Auscultación simultánea de dos focos (pulmonares ó cardiacos) por medio de dos estetoscopios (llamado *estetoscopio bifocular*) cuyos dos tubos terminan en la misma trompetílla auricular gracias á una ramificación en Y.

biforis (uterus) (*bis*; *fores*, puerta). Deformación del útero cuyo cuello presenta dos orificios, vestigio del doble orígen del órgano.

bigémino (pulso) (*bis*; *geminus*, doble). Sin.: *pulso geminado ó digitálico* (Durozier). Se dice del pulso cuando presenta dos pulsaciones que se siguen muy de cerca, periódicamente separadas de otras dos semejantes por un intervalo más ó menos largo. Es característico de la intoxicación por la digital.

bigeminia, *s. f.* ó **bigeminismo,** *s. m.* Asociación de dos sístoles, compuesta de una sístole fuerte seguida de una débil.

bilharzia hæmatobia. Sin. *distomum hæmatobium*. Parásito unisexuado del orden de los Trematodes, de 12 milímetros de

largo, que vive en la porta y sus ramas. Los huevos, provistos de una punta acerada, determinan graves lesiones en los órganos á donde los lleva el curso de la sangre.

bilharziosis, *s. f.* Conjunto de accidentes provocados por la *bilharzia* y sobre todo por sus huevos. Se traducen principalmente por hematurias (*hematuria de Egipto*). — La *bilharziosis* no ha sido observada sino en Africa. Casi se halla demostrado hoy que la *bilharzia* es absorbida en estado de larva con las aguas potables.

biliar intermitente (fiebre). Véase: *intermitente biliar* (*fiebre*).

bilifeica (ictericia). Sin.: *ictericia verdadera*. Ictericia debida al paso á dentro de la sangre, de los pigmentos normales de la bilis; está acompañada casi siempre de la eliminación por las orinas de estos mismos pigmentos biliares.

biligénesis; biligenia, *s. f.*; **biligénica (función).** Elaboración de la bilis.

biliosa hemoglobinúrica (fiebre). Afección de los paises cálidos, caracterizada por la hipersecreción biliar (vómitos, ictericia), y hemoglobinuria más ó menos abundante, acompañada á veces de hemorragias. Independiente del paludismo para unos autores, sería para otros, al contrario, una manifestación palustre.

biliosséptica (fiebre) (Chauffard). Fiebre causada por la infección de las vías biliares, de tipo intermitente ó remitente.

bilocular (útero) (*bis*; *loculus*) Sin.: *uterus bipartitus* ó *septus*. Deformación del útero, que conserva en toda su altura un tabique, vestigio de su doble origen (canales de Müller).

binocular, *adj.* (*bis*; *oculus*, ojo). Que resulta del empleo simultáneo de ambos ojos. Ej. *visión binocular*, *campo visual binocular*.

biología, *s. f.* (βίος, vida; λόγος, discurso). Estudio de la vida. « Ciencia de las relaciones de los organismos con el medio ambiente y con los organismos presentes y pasados. » (H. de Varigny).

bioplasma, *s. m.* Véase: *protoplasma*.

bioplástico (poder). Propiedad de las células vivas de reparar las pérdidas que han sufrido.

biopsia, *s. f.* (βιος, vida; ὄψις, vista). Operación que

consiste en tomar del individuo vivo un fragmento de órgano, con el fin de someterlo al examen microscópico.

biotaxia, *s. f.* (βίος, vida; τάξις, ordenamiento). Sin.: *taxinomia*. « Ciencia que tiene por asunto los seres organizados considerados en estado estático, y por objeto la coordinación gerárquica de todos los organismos conocidos, en una serie general destinada en seguida a servir de base indispensable para el conjunto de las especulaciones biológicas. » (Littré.)

biparietal (diámetro). Nombre dado, en obstetricia, al diámetro de la cabeza fetal que pasa por las dos eminencias parietales.

bipartitus (uterus) (*bis*; *partitus*). Véase: *bilocular* (*útero*).

bisinosis, *s. f.* (βύσσος, algodón). Neumonoconiosis especial à los obreros que trabajan el algodón y están expuestos à respirar su polvillo (cardadores; batidores, etc.).

bismutismo, *s. m.* Accidentes tóxicos observados à veces à consecuencia de apósitos de bismuto (Kocher). Consisten en estomatitis, perturbaciones digestivas intensas y albuminuria con cilindros en la orina.

bisturí, *s. m.* (*bastoria*, bastón). Instrumento de cirujía en forma de cuchillo, cuya lámina es del mismo tamaño del mango, y está fija en él ó puede cerrarse dentro de éste.

bisturnaje, *s. m.* (*bistournage*). Procedimiento de castración que consiste en torcer los cordones sin abrir las bolsas.

bitonal (voz). Véase: *diplofonia*.

biureto (reacción del). Coloración violeta-púrpura que se obtiene tratando en frío el *biureto* por un álcali (lejía de soda ó de potasa) y un poco de sulfato de cobre. Esta reacción se obtiene no sólo con el *biureto*, sino también con las sustancias que tienen análoga constitución (*peptonas*, *propeptonas* ó *albumosas*), y es característica de estas sustancias.

blastema, *s. m.* βλαστός, germen). Sin.: *citoblastema*. Sustancia líquida ó semilíquida situada entre los elementos celulares de los tejidos. Esta materia viva no figurada tendría, según Ch. Robin, la propiedad de organizarse en núcleo, células y elementos figurados, tales

como fibras conjuntivas y fibras elásticas. La teoría del *blastema* no se admite ya hoy.

blastodermo, *s. m.* (βλαστός, germen; δέρμα, piel). Membrana formada por la yuxtaposición de las células producidas por la segmentación del huevo fecundado. Se divide en dos hojillas : el *endodermo* y el *ectodermo*, entre las cuales aparece en seguida una tercera, el *mesodermo*.

blastómero, *s. m.* (βλαστός. célula; μέρος, parte). Nombre dado á los segmentos ó células primitivas del huevo durante el período llamado de *segmentación*.

blastomiceto, *s. m.* (βλαστός, germen ; μύκης, hongo). Familia de hongos que se reproducen por yemación, y se presentan ya bajo la forma de levadura, ya bajo la de filamentos micelianos ya bajo ambas á la vez. Los más notables son la levadura de cerveza y el *oïdium* (muguet).

blastomicosis, *s. f.* Infección por los blastomicetos.

blastóporo, *s. m.* (βλαστός. germen; πόρος. poro). Nombre dado por Rey Lankester á la solución de continuidad de la capa ectodérmica, orificio que se halla cerrado por el tapón de Ecker, ó tapón endodérmico.

blástula, *s. f.* Sin. : *blastodermo monodérmico*. Nombre dado al huevo fecundado cuyo blastodermo no presenta aún sino una sola hojilla que limita una cavidad central muy extensa

blefaritis, *s. f.* (βλέφαρον, párpado). Inflamación del borde libre de los párpados, en la cual pueden participar todos los elementos que constituyen este reborde palpebral, piel, conjuntiva, pestañas y glándulas. Resulta de allí gran número de formas, de las cuales la más común es la *blefaritis ciliar*.

bléfarocalasis, *s. f.* (βλέφαρον; χάλασις, relajamiento) (Fuchs) Atrofia del dermo de los párpados superiores, acompañada de relajamiento del tejido celular sub-cutáneo. De ella resulta la formación de un ancho repliegue cutáneo que cae hasta el reborde ciliar y molesta la visión directa y hacia arriba.

bléfarofimosis, *s. m.* βλέφαρον; φίμωσις, ligadura). Insuficiencia de la hendidura palpebral. Es congénita ó causada por una inflamación óculopalpebral.

bléfaroftalmía, *s. f.* (βλέφαρον ; ὀφθαλμός, ojo).

Inflamación simultánea de los párpados y de la conjuntiva

bléfaroplastia, *s. f.* (βλέφαρον; πλάσσειν, formar). Operación que tiene por objeto reparar un párpado destruido ó deformado por una cicatriz.

bléfaroptosis, *s. f.* (βλέφαρον; πτῶσις caída). Sin. : *ptosis* Caída del párpado superior. Es completa ó incompleta según quita ó no quita la vista. Este síntoma puede ser causado por una lesión palpebral (se emplea entonces el término *bléfaroptosis*), ó por una lesiòn nerviosa del III^er^ par ó de los centros (en este caso se emplea de preferencia la palabra *ptosis*).

bléfarorrafia, *s. f.* (βλέφαρον; ῥαφή, sutura). Sutura de los párpados. Operación cuyo objeto es estrechar la hendidura palpebral.

bléfarospasmo, *s. m.* (βλέφαρον. σπασμός, espasmo) Contracción espasmódica del orbicular de los párpados. — *bléfarospasmo tónico.* Espasmo permanente sintomático ó esencial. — *bl. clónico.* Parpadeo rápido y repetido.

bléfarostato, *s. m.* (βλέφαρον; στατής, que detiene). Instrumento destinado á mantener ambos párpados separados.

bléfarotíc, *s. m.* (Meige). Tic convulsivo de los párpados. Véase : ***bléfarospasmo clónico.***

blenorragia, *s. f.* (βλέννα, moco; ῥαγή, erupción), Sin. : *gonorrea, purgación*, etc. Enfermedad infectiva cuyo agente patógeno es el gonococo. En el hombre se manifiesta sobre todo bajo forma de uretritis; en la mujer, de vulvitis, vaginitis ó metritis.

blenorrea, *s. f.* (βλέννα, moco; ῥεῖν, correr). Nombre dado á veces á las *uretritis* crónicas. — Etimológicamente se puede llamar así todo derrame crónico de moco-pus. Ej. ***blenorrea del saco lagrimal***, en el segundo período de la dacriocistitis.

Blocq (enfermedad de). Véase : ***astasia-abasia.***

boca de lobo. Nombre dado á veces al labio leporino complejo bilateral y total.

bocio, *s. m.* Tumor tiroideo benigno. A veces se da este nombre á todas las tumefacciones de la glándula tiroide, cualquiera que sea su naturaleza.

bocio agudo ó epidémico. Tumefacción de la glándula tiroide que se presenta bajo forma de pe-

queñas epidemias en las regiones en que existe el bocio endémico. El *bocio agudo* desaparece casi siempre muy rápidamente cuando los enfermos abandonan la región contaminada.

bocio endémico. Enfermedad endémica en ciertas regiones montañosas (Alpes, Pirineos), caracterizada por el desarrollo de una tumefacción tiroidea y por trastornos somáticos é intelectuales más ó menos marcados. Cuando la afección aparece en el niño, suprímese la función tiroidea y se ve desarrollarse el cretinismo.

bocio exoftálmico. Sin. *enfermedad de Basedow* ó *de Graves*. Enfermedad caracterizada por hipertrofia de la glándula tiroide, taquicardia, exoftalmía y un temblor especial.

Bockart (impétigo de). Sin.: *impétigo circumpilar de los niños*. Dermatosis caracterizada por vesicopústulas que se desarrollan al rededor de un pelo, y situadas en la red mucosa de Malpighi, por fuera del espacio comprendido entre el pelo y su vaina folicular; sería causada por el estafilococo.

bola histérica. Sin.: *globo histérico*. Sensación experimentada muy á menudo por los histéricos al principio del ataque; les parece que un cuerpo redondo sube del epigastrio á la laringe, se detiene y los ahoga.

bolo, *s. m.* (βῶλος, pedazo, bocado). Porción de electuario que debe tomarse en una sola vez, después de cubrirla con polvos inertes. Difiere de la píldora por su volumen más considerable y su más blanda consistencia. — *bolo alimenticio*. Nombre dado á la porción de alimentos deglutida en una sola vez.

bolsa de las aguas. Nombre dado en obstetricia á la protuberancia que forman en la vagina las membranas del huevo cuando el cuello está dilatado.

Bonfils (enfermedad de). Véase: *linfadenia aleucémica*.

Bonnaire (maniobra de) (obstetricia). Procedimiento de dilatación forzada y rápida del cuello uterino en el curso del parto distócico. Los dedos índice y medio de cada mano introducidos en el cuello, y pegados el uno del otro, obran como las dos ramas de una pinza dilatadora.

boquera, *s. f.* Enfermedad contagiosa infectiva,

sin gravedad alguna, caracterizada por una exulceración situada en la comisura de los labios, bilateral, que evoluciona en dos ò tres semanas; mas, recidiva frecuentemente. Se observa sobre todo en los niños.

borismo, *s. m.* El conjunto de trastornos tóxicos provocados por la ingestión de ácido bórico ó de bórax mez clados fraudulentamente con los alimentos y bebidas. Desórdenes gástricos, vértigo, eritemas varios y aún albuminuria.

borborigmo, *s. m.* (βορβορυγμός, murmullo). Gargullido producido en el abdomen por los gases intestinales.

Botal (agujero de). Orificio por el que comunican en la vida intra-uterina las dos aurículas cardíacas y por el cual pasa, directamente al corazòn izquierdo y á la gran circulación, la sangre arterializada proveniente de la placenta por la vena umbilical y la vena cava inferior.

botón de Biskra. Sin.: *botón de Oriente, b. de Alep, b. de un año, b. del Nilo, b. de Delhi, b. de Gafsa, b. de los países cálidos, b. de los Zibanos, chancro del Zahara.* Afección contagiosa, endémica en tos países cuyo nombre lleva, caracterizada por la aparición, sobre las partes descubiertas, de una ó de varias eminencias papulosas, rojas, de base infiltrada, que terminan por una ulceración que mana cierta serosidad sucia. Es causada por un protozoario descubierto por Wright semejante á los piroplasmas.

botón diafragmático (Guéneau de Mussy). Punto « situado casi exactamente en la intersección de dos líneas, de las cuales una fuera la continuación de la parte ósea de la décima costilla, y la otra la del borde externo del esternón ». (G. de Mussy.) En la pleuresía diafragmática la presión de este punto determina vivo dolor.

botriocéfalo, *s. m.* (βόθριον, foseta, κεφαλή, cabeza). Parásito intestinal del orden de los Cestodes, que se distingue por una cabeza sin ganchos, provista de dos fosetas laterales, un cuerpo largo, en forma de cinta, con el poro genital situado en medio de cada anillo. Pasa al hombre por el intermedio de diversos pescados en los cuales comienza la evolución (Suiza).

botriomiceto, *s. m.* (βότρυς, racino de uva; μύκης, hongo) (Bollinger).

Masas muriformes que son el elemento característico de la *botriomicosis*, consideradas ya como un hongo parásito, ya como una neoformación de los tejidos por la influencia de un microbio particular.

botriomicoma, *s. m.* Sin. : *tumor frambesiforme* Tumorcillos que se observan en la *botriomicosis*.

botriomicosis, *s. f.* Enfermedad próxima à la actinomicosis y caracterizada por là presencia. en el pus ó los tejidos, de granos amarillos de aspecto muriforme. Es sobre todo frecuente en el caballo (*hongo de castración*); puede encontrarse también en el hombre, en quien toma ordinariamente el aspecto de un tumorcito pediculado, semejante á una frambuesa, situado casi siempre en la mano ó en los dedos.

botryogenes (micrococcus) (βότρυς; γεννάν, engendrar) (Rabe). Microbio que se desarrolla en los cultivos cuando se siembran los gránulos amarillos de la botriomicosis, y que parece la causa de la formación de éstos. Dicho microbio se aproxima por muchos caracteres al estafilococo, tanto que algunos autores los creen idénticos.

Bottini (operación de). Incisión de la próstata con el galvanocauterio, indicada en los casos de retención de orina por hipertrofia prostática.

botulismo, *s. m.* (*botulus*, morcilla). Intoxicación consecutiva á la ingestión de salchichas alteradas.

Bouchard (línea de). Línea que va del ombligo al punto más próximo del reborde de las falsas costillas izquierdas. Cuando se percibe por debajo de esa línea el claqueo ó clapoteo estomacal, es signo de que el estómago está dilatado.

Bouchard (nudosidades de). Engrosamientos de los huesos de los dedos, al nivel de la articulación de la falange con la falangina, señalados por Bouchard en los enfermos que padecen de dilatación del estómago.

Bouchard (signo de). Nombre dado por Bazy á un procedimiento que permite reconocer si el pus contenido en una orina proviene de la vejiga ó del riñón. Si proviene el pus del riñón, de la orina adicionada de unas gotas de licor de Fehling se escapan por la agitación, finas burbujas de gas que arrastran á la

superficie el coágulo formado por el calor.

Boudin (ley de). Antagonismo de la tuberculosis y del paludismo.

Bouillaud (leyes de) (1836-1840). 1° En el reumatismo articular agudo, violento, generalizado, la *coincidencia* de una endocarditis, de una pericarditís ó de una endo-pericarditis es *la regla*, y la no coincidencia la excepción. — 2° En el reumatismo articular agudo, suave, parcial, apirético, *la no coincidencia* de una endocarditis, de una pericarditis ó de una endopericarditis es *la regla*, y la coincidencia la excepción.

Bozzolo (signo de). Signo que se observa en ciertos casos de aneurisma de la aorta torácica y consiste en pulsaciones visibles en las ventanas de la nariz.

bradiartria, *s. f.* (βραδύς, lento; ἄρθρον articulación). Sin. : *bradilalia.* Habla escandida, monótona y lenta.

bradicardia, *s. f.* (βραδύς; καρδία, corazón). Lentitud de los latídos cardiacos observada en diversos estados mórbidos (ictericia convalescencia de las enfermedades graves).

bradidiastolia, *s. f.* (βραδύς; διαστολή, diástole). Prolongación considerable de la pausa diastólica, fenómeno opuesto al de la *embriocardia.*

bradifasia, *s. f.* (βραδύς; φάσις, palabra). Lentitud en la pronunciación de las palabras.

bradilalia, *s. f.* (βραδύς; λαλεῖν hablar). Véase : *bradiartria.*

bradipepsia, *s. f.* (βραδύς; πέψις, cocción, digestión) Digestión lenta.

braditrofia *s. f.* **braditrófica (diátesis)** (βραδύς; τροφή, alimento) (Landouzy). Lentitud de la nutrición Esta perturbación nutritiva mantiene bajo su dependencia las enfermedades del grupo artrítico : litiasis renal y biliar, obesidad, diábetes, asma, gota, reumatismo articular, agudo ó crónico, hemorroides, ciertos exemas y ciertas neuralgias

braidismo, *s. m.* Término con que se designa á veces el *hipnotismo,* del nombre de Braid, quien primero publicó, en 1741, un trabajo en que trataba de aplicar el hipnotismo al tratamiento de las enfermedades.

Brandt (método de) (1877). Método de tratamiento de la fiebre tifoidea

por el empleo sistemático y exclusivo de los baños frios.

branquioma maligno (branquia) (Veau, 1900). Nombre propuesto para designar los tumores mixtos del cuello desarrollados á expensas de restos embrionarios inclusos en la época de la regresión de los arcos branquiales. La proliferación abundante de sus elementos epiteliales permite clasificarlos entre los tumores malignos.

braquicardia, *s. f.* (βραχύς, corto; καρδία, corazón). Lentitud del ritmo cardiaco.

braquicéfalo, *adj.* (βραχύς; κεφαλή, cabeza). Nombre dado por Retzius á las razas humanas cuyo cráneo se halla troncado atrás. Su mayor longitud no excede en más de 1/8 la mayor anchura.

braquidactilia, *s. f.* (βραχύς; δάκτυλος, dedo). Deformación de los dedos que no tienen su longitud normal. Es causada ó por unadetención en el desarrollo ó por una amputación congénita.

braquimetropía, *s. f.* (βραχύς; μέτρον, medida; ὤψ, ojo). Nombre dado por Donders á aquel estado del ojo en que la imagen del objeto, supuesto en el infinito, se forma por delante de la retina, de donde resulta la miopía.

braquiotomía, *s. f.* (βραχίων, brazo, τέμνειν, cortar). Desarticulación del hombro del feto en ciertos casos de distocia.

braquipnea, *s. f.* (βραχύς, corto; πνοή, respiración). Respiración corta y lenta.

Brasdor (método de). Tratamiento de la aneurisma arterial circunscrita por la ligadura puesta inmediatamente encima del saco.

Braune (canal de). Nombre dado á veces al *canal cérvico-uterino*

Bravais-jacksoniana (epilepsía) (Bravais, 1827). Véase : *jacksoniana (epilepsia)*.

bregma, *s. m.* (βρέχειν, humedecer, á causa de la fontanela (Littré) ó βρέγμα, mugre). Región del cráneo situada en el punto de intersección de las suturas sagital y coronaria, ocupada en el feto y el recién nacido por la fontanela anterior.

Bremer (signo ó reacción de). Signo suministrado por el examen de la sangre en los diabéticos. Los hemátidos que en estado normal se tiñen por

los colores ácidos, colóranse entonces, al contrario, por los básicos. Esta reacción no es característica de la diabetes : se observa también en la sangre leucémica.

Bright (mal de), brightismo, *s m.* Enfermedad descrita por Bright (1827), caracterizada clínicamente por hidropesías múltiples y persistentes y albuminuria, y anatómicamente por una lesión de los riñones. Más tarde esta palabra hase convertido en sinónimo de *nefritis crónica.*

Brinton (enfermedad de). Véase : *linitis plástica.*

Briquet (gangrena de). Sin. : *gangrena de las extremidades brónquicas dilatadas.* Variedad de gangrena de los bronquíos asociada á la bronquectasia. La dilatación brónquica es una causa de gangrena, y por otra parte la gangrena, destruyendo los tejidos, produce á su vez la dilatación brónquica.

Briquet (sindroma de). Parálisis diafragmática de origen histérico.

Broca (afasia de). Véase : *afemia.*

Brodie (enfermedad de). (1837). Véase : *coxalgia histérica.*

bromatología, *s. f.* (βρῶμα, ατος, alimento ; λογος, discurso). Tratado de los alimentos. Estudio de una sustancia considerada desde el punto de vista alimenticio.

bromidrosis, *s. f.* (βρῶμος, hediondez ; ἱδρως, sudor) Sin. : *osmidrosis.* Afección caracterizada por la más ó menos abundante secreción de un sudor de olor desagradable. Es general ó local (axila, planta de los pies).

bromismo, *s m.* Accidentes tóxicos provocados por el bromo y sus compuestos, en especial por el bromuro de potasio. La administración prolongada de éstos puede determinar el *bromismo crónico* caracterizado por dipepsia, bronquitis y erupciones cutáneas ; su ingestión á muy fuerte dosis provoca el *bromismo agudo,* caracterizado por cefalalgia, perturbaciones cerebrales é hipotermia.

bronceada (enfermedad). Véase : *Addison (enfermedad de).*

broncocele, *s. m.* (βρόγχος, bronquio, κήλη, hernia). Tumor gaseoso del cuello que comunica con un bronquio.

broncofonía, *s. f.* (βρόγχος ; φονή, voz). Sin. : *voz brónquica ó tubaria.*

Signo suministrado por la jauscultación y constituido por a fuerte resonancia de la voz en el interior del pecho.

broncolitia, *s. f.* (βρόγχος; λίθος, piedra). Sin. : *litiasis brónquica, tisis calculosa.* Nombre dado á la producción de cálculos en los bronquios.

bronconeumonía, *s. f.* Sin.: *neumonía obullilar, neumonía catarral.* Afección caracterizada anatómicamente por la inflamación del parenquima pulmonar y de los bronquios. Es ordinariamente secundaria, ya á una afección de las vias respiratorias, ya á una enfermedad general Su causa es un micro-organismo de naturaleza variable.

broncoplejia, *s. f.* (βρόγχος, bronquio; πλήσσειν, herir). Parálisis de los bronquios.

broncorragia, *s. f.* (βρόγχος; ῥήγνυμι, rompo). Hemorragia de los bronquios

broncorrea, *s. f.* (βρόγχος; ῥεῖν, correr). Hipersecreción patológica de moco bronquial que se observa en las bronquitis crónicas.

broncoscopia, *s. f.* (βρόγχος; σκοπεῖν, examinar) (Killian). Examen de la cavidad de los bronquios por medio de un tubo introducido ya por la boca, ya por el orificio de una traqueotomía. La *broncoscopia* permite descubrir los cuerpos extraños de las vías aéreas.

broncostenosis, *s. f.* (βρόγχος: στενός, estrecho). Disminución de calibre de un punto cualquiera del arbol brónquico, capaz de determinar disnea y estridor.

bronco-tifus, *s. m.* (Gilbert, 1890) Variedad de fibre tifoidea, cuya localización es casi exclusivamente bronquial, descrita sobre todo en los niños.

bronquectasia,, ó **bronquectasis**, *s f.* (βρόγχος, bronquio; ἔκτασις, dilatación). Dilatación de los bronquios.

bronquiolitis, *s. f.* (bronquiolo). Nombre dado á veces á la inflamación de las últimas ramificaciones brónquicas

bronquitis, *s. f.* Sin.: *tráqueo-bronquitis.* Inflamación de la mucosa bronquial. — *bronquitis capilar.* Sin. : *catarro sofocante* (Laënnec). Inflamación aguda de la mucosa de las últimas ramificaciones brónquicas.

brousefismo, *s. m.* (Broussais). Teoría médica según la cual todas los fenó-

menos mórbidos, aun las flegmasias crónicas y los tumores, tienen por punto de partida la inflamación.

browniano (movimiento). (Brown, 1827). Movimiento oscilatorio, de duración indefinida, que presentan todas las partículas de materia cuyo diámetro es igual ó inferior à 4 μ, movimiento independiente de la naturaleza del cuerpo y de las condiciones externas. Es tanto más rápido cuanto menor es el cuerpo. Sería el primer grado del movimiento molecular que imagina la teoría unicista de la materia.

brownismo, *s. m.* (Brown, médico escosez del siglo XVIII). Doctrina que enseña que la vida no se mantiene sino por la excitabilidad; las enfermedades se deben à exceso ó à carencia de dicha excitabilidad.

Brown-Séquard (método de). Método terapéutico que consiste en administrar, en caso de atrofia ó supresión funcional de un órgano, este mismo órgano, tomado de un animal, en sustancia ó bajo forma de extracto. Este método se basa sobre la idea de la secreción interna de las glàndulas, demostrada par Brown Séquard: el órgano sano administrado lleva al organismo el principio que le falta, y además excita la secreción glandular del mismo órgano.

Brown-Séquard (síndroma de). Sin.: *hemiparaplejia espinal.* Hemiparaplejia con hemianestesia del lado opuesto, provocadas por una lesión unilateral de la médula.

Brun (enfermedad de de). Neumopaludismo.

Bryson (signo de). Falta de ampliación torácica durante la inspiración Este signo se observa en el *bocio exoftálmico.*

bubas, *s. f. pl.* Véase: *pián.*

bubón, *s. m.* (βουβών, ingle). Palabra con que primero se designó la adenitis inguinal y luego todas las tumefacciones ganglionares. — Actualmente se la aplica más bien à las adenopatías específicas. Ej. *bubón de la sífilis, del chancro blando, de la peste.*

bubonocele, *s. m.* (βουβών, ingle; κήλη, hernia). Sin.; *hernia inguinopubiana.* La hernia que después de haber recorrido el trayecto inguinal, asoma por el anillo inguinal externo.

Budd (cirrosis de) (1857). Nombre dado por Hanot à las esclerosis del hígado debidas à la autointoxicación de origen intesti-

nal, con exclusión de todo alcoholismo.

buftalmia, *s. f.* (βοῦς, buey; ὀφθαλμός, ojo). Aumento considerable del volumen del ojo. Véase: *hidroftalmia*.

Buhl (ley de). Ley según la cual toda tuberculosis generalizada tendría por punto de partida un foco local más ó menos antiguo.

bujía, *s. f.* Instrumento formado por un tallo delgado y cilíndrico, flexible ó rígido, que se introduce en la uretra, ó en cualquiera otro canal natural, para explorarlo ó dilatarlo.

Bülau (procedimiento de). Modo de tratamiento del empiema pleural por desagüe y aspiración permanentes.

bulbitis, *s. f.* Llaman así algunos clínicos la supuración persistente de la mucosa uretral en el fondo de saco bulbar, en las viejas blenorragias crónicas.

bulimia, *s. f.* (βου, partícula aumentativa; λιμός, hambre). Sensación de hambre excesiva y necesidad de absorber grandes cantidades de alimentos. Este síntoma se encuentra lo más á menudo en las afecciones del sistema nervioso.

bulosos (extertores). Véase: *globulosos extertores*.

bursitis, *s. f.* Designación propuesta por Lejars para la inflamación de las bolsas serosas, en sustitución del término *higroma* que significa en realidad: colección serosa enquistada.

Burton (bordado de). Sin.: *bordado plumbico*. Raya violácea ó negruzca situada sobre las encías al nivel del cuello de los dientes. Es indicio de la intoxicación crónica por el plomo y se observa sobre todo en las intoxicaciones profesionales (pintores, plomeros, etc.).

C

cabeza de Medusa. Nombre dado al desarrollo considerable que toma á veces la red venosa subcutánea peri-umbilical, con dilatación serpentina de los vasos, en la cirrosis de Laënnec.

cacoquimia, *s. f.* (κακός, malo; χυμός, humor). Véase: *caquexia*.

cacosmia, *s. f.* (κακός, malo; ὀσμή, olor). 1° Desviación del sentido olfativo que hace que agraden á los enfermos ciertos olores desagradables ó fétidos (histeria, vesania). 2° Percepción habitual de malos olores: *cacosmia subjetiva* ó alucinación del olfato; *cacosmia objetiva*, debida à la existencia de una afección de las vias aéreas ó digestivas superiores que determinan un olor desagradable perceptible aún para otras personas.

cadera (mal de). Tripanosomosis endémica en la América del Sur.

caduca (membrana) (*cadere*, caer). Envoltura del huevo formada a expensas de la mucosa uterina.

cagot, *s. m.* (*canes Gothi*, perros de Godo ó *cacon*, leproso en celto-bretón). Nombre dado en los Pirineos à individuos que para ciertos autores serian cretinos, que ofrecen, según Magitot, signos de lepra atenuada, y que para otros son los últimos representantes de una raza desaparecida (Godos, Sarracenos) No se mezclan con el resto de la población y se distinguen por ciertos caracteres hereditarios.

cajones ó arcones (enfermedad de los). Paraplejia observada en los obreros que trabajan en aire comprimido. La determina una hematomielia debida à la descompresión brusca producida en el momento en que salen de los cajones.

calambre, *s. m.* Contracción involuntaria, dolorosa y transitoria de un músculo ó de un grupo muscular. — *calambres de los mineros*. Convulsiones acompañadas de dolores vivos, que se observan en el hidrargirismo crónico, particularmente en los mineros de Almaden.

calambres funcionales profesionales. Véase : *espasmos funcionales*.

calcificación, *s. f.* (*calx*, cal; *ficare*, frecuentativo de *facere*, hacer). Sin.: *infiltración calcárea*, *transformación calcárea*, *degeneración calcárea*. Depósito de carbonato y de fosfato de cal en los tejidos y los órganos. Ej. *calcificación de los cartilagos*.

cálculo, *s. m.* (*calculus*). Concreción pétrea formada de sales orgánicas ó inorgánicas que suele formarse en los receptáculos glandulares ó en los canales excretores.

caldo de cultivo. Caldo preparado con carne, esterilizado y destinado al cultivo de los microbios.

calentura, *s. f.* (de *calentar*). 1° Fiebre. — 2° Delirio furioso que se observa en los navegantes por los mares tropicales. Coincide con alucinaciones de la vista y el deseo irresistible de arrojarse al mar. La *calentura* es causada por la insolación ó por la acción del calor.

calicosis, *s. f.* Sin. : *mal de San Roque, tisis de los talladores de piedra.* Neumonoconiosis provocada por la inhalación del polvo de sílice (talladores de piedra, picapedreros, camineros, porcelaneros, etc.

calismo, *s. m.* (del árabe *kali*, potasa, soda, etc). Sin. : *potasismo.* Conjunto de los accidentes tóxicos causados por la potasa : perturbaciones gástricas, lentitud del corazón, caquexia alcalina.

calofrío, *s. m.* Temblor desigual é irregular acompañado con sensación de frio : marca el principio de la fiebre. Escalofrío.

calorímetro, *s. m.* (*calor* ; μέτρον, medida). Instrumento destinado á medir el número de calorías que se desprenden de un cuerpo.

calorimetría animal. Medida del calor que irradia un animal vivo en un tiempo dado.

calostro, *s. m.* Véase : *colostro.*

Calot (método de). Enderezamiento brusco, bajo el cloroformo, de las jibosidades del mal de Pott, por medio de la tracción de las extremidades, combinada á la presión directa sobre la jiba. Se mantiene en seguida al enfermo dentro de un corsé de yeso.

calvicie, *s. f.* (*calvus*). Ausencia más ó menos completa y definitiva de los cabellos.

callo, *s. m.* (*callus*). 1° Sin. : *tilosis gonfosa* (Alibert). Lesión cutánea caracterizada por un espesamiento circunscrito de las capas córneas de la epidermis, el cual se hunde mas ó menos en el dermo (clavo o raiz). — 2° Neoformación ósea que suelda los fragmentos de un hueso fracturado.

callosidad, *s. f.* Induración del revestimiento cutáneo debida á una presión ó á un frote prolongado, y formada por el acúmulo de capas estratificadas de epidermis córnea. Las *callosidades* son generalmente de orígen profesional, y sirven según su localización, de

marcas distintivas de los diversos oficios.

campanil ruido de (Friedreich y Eisenlohr). Resonancia metálica de los ruidos normales del corazòn en algunos casos de neumopericardias.

camisa de fuerza. Especie de camisola fuerte provista de lazos, propia para mantener los locos y los atacados de delirio agudo.

campímetro, *s. m.* (*campus*, campo; μέτρον, medida). Instrumento destinado á medir la extensión del campo visual, y compuesto esencialmente de un arco de círculo movible al rededor de un eje.

campo operatorio. Zona cutánea en que se practica una operación, y, por extensión, las compresas esterilizadas que sirven para limitar esta zona.

campto-dactilia, *s. f.* (καμπτός curva; δάκτυλος, dedo) (Landouzy). Deformación de los dedos caracterizada por la flexión permanente de uno (el auricular) ó de varios dedos de la mano; ordinariamente esta flexión es la de la articulación de la segunda con la primera falange. Sería estigma de artritismo.

canaliculitis, *s. f.* Inflamaciòn de los conductos glandulares.

canaliculitis tarsiana. Sin.: *acnémeibomiano* (Panas). *tarsitis periglandular* (Horner). Inflamación de los canalículos excretores de las glándulas de Meibomio, que se presenta en los atacados de blefaritis y se traduce por una elevacioncita cònica de color rojo vivo, sobre el borde interno ó cortante del párpado.

cáncer *s. m.* (*cancer*, cangrejo). Nombre dado á los tumores malignos que se extienden rápidamente y tienden á generalizarse. — Aunque no designa una forma histológica especial de tumor, esta palabra se aplica sobre todo á los epiteliomas.

cancroide, *s. m.* (cáncer; εἶδος, forma). Epitelioma de la piel que presenta una marcha menos rápida que las otras variedades de cáncer. Su sitio más frecuente es la cara y más particularmente los labios.

canicie. *s. f.* (*canus*, blanco). Deformidad congénita ó adquirida, parcial ó general, caracterizada por la descoloración de los pelos, que se vuelven blancos.

canteplastia, *s. f.* (κανθός, ángulo del ojo; πλάσσειν, formar). Operación

que consiste en prolongar hacia fuera la abertura palpebral por la incisión de la comisura externa del ojo. Está indicada cada vez que el orificio palpebral se halla insuficientemente hendido.

caparrosa. *s. f.* Sin. *acné rosáceo, rosado ó eritematoso* Lesión cutánea localizada á la cara, caracterizada por congestión con dilatación vascular, que se complica casi siempre con alguna alteración de las glándulas sebáceas (seborrea simple, pápulo-pústulas de acné, ó también rinofima).

capilar (bronquitis). Véase: *bronquitis.*

caprina (voz). Véase *egofonia.*

capsulitis, *s f.* 1° Sin.: *perioftalmitis, tenonitis* Inflamación de la cápsula de Tenón, que rara vez va hasta la supuración, caracterizada por dolor peri-orbitario, diplopia, quémosis, y que termina por resolución. — 2° Algunas veces llámase también así una alteración de la cápsula del cristalino.

càpsulorrafia, *s. f.* (*capsula;* ῥαφή, sutura). (Mauclaire). Sutura de la cápsula articular del hombro; operación que se pratica en los casos de lujación recidivante del hombro.

capuchón caudal, capuchón cefálico. Nombre dado á los dos repliegues amnióticos (posterior y anterior), que, al principio del dessarrollo, cubren la cola y la cabeza del embrión.

caput distortum, caput obstipum. Véase: *torticolis.*

caquexia, *s. f.* (κακός, malo; ἕξις, disposición). Sin. *cacoquimia.* Palabra sin significación bien precisa, que designa generalmente una turbación profunda de todas las funciones del organismo. Es «el término común á todos los sufrimientos y el resultado de todas las enfermedades ». (Areteo).

caquexia paquidérmica (Charcot). Mixedema espontáneo de los adultos.

caquexia estrumipriva ó **tiroipriva.** Véase : *mixedema operatorio.*

carare ó **carate,** *s. m.* Dermatosis micósica, propia de la América ecuatorial, caracterizada por la formación de manchas eritemato-escamosas de contornos cíclicos y de desarrollo excéntrico continuo. Tiende á generalizarse y á cubrir toda la superficie cutánea. Parece debida al desarrollo de un hongo, que unos di-

cen *trichophyton* y otros *aspergillus*.

caratejos; *s. m.* Los que padecen de carate.

carbón. *s. m.* **carbonosa** (**fiebre**) (*carbo*). Enfermedad infectiva común al hombre y á los animales, provocada por la introducción en el organismo de un microbio especial, la *batecridia carbonosa*. Empieza ya por la pùstula maligna, ya por el edema maligno, más rara vez por localizaciones intestinales ó pulmonares, y excepcionalmente sin lesión apreciable (septicemia carbonosa).

carcinoma, *s, m,* (καρκίνος. cangrejo). Tumor epitelial cuyo estroma fibroso encierra alveolos que forman un sistema cavernoso y contienen células libres en un líquido más ó menos abundante.

carcinosis, *s. f.* Llámase así la enfermedad caraterizada por el carcinoma. — *Carcinosis miliar-aguda*. Generalización del carcinoma, que invade rápidamente la mayor parte de las vísceras bajo forma de un semillero de granulaciones.

cardadores de lana (**enfermedad de los**) Bronconeumonía primitiva causada por la bacteridia carbonosa.

Cardarelli (**enfermedad de**). Véase: *subglositis difteroide*.

cardiacalgia, *s. f.* (καρδία, corazón; ἄλγος, dolor). Nombre dado por Germán Sée á las variedades de angina de pecho no acompañadas de estenosis de las coronarias (*falsas anginas de pecho* de Huchard).

cardíaco, *adj.* (καρδία, corazòn). Lo que pertenece al corazón ó depende de él.

cardialgia, *s. .f* (καρδία;; ἄλγος, dolor) Véase: *gastralgia*.

cardiectasia ó **cardiectasis**, *s. f.* (καρδία; ἔκτασις, dilatación). Dilatación parcial ó total del corazón.

cardio - esclerosis, *s. f.* Esclerosis del corazón.

cardiógrafo, *s. m.* (καρδία; γράφειν escribir). Aparato destinado á estudiar los latidos del corazón por el método gráfico.

cardiograma, *s. m.* (καρδία; γράμμα, escrito). Curva ó trazo obtenidos con el cardiógrafo.

cardio - hepatomegalia, *s. f.* (Merklen). Aumento de la superficie de macicez correspondiente á la región cardio-hepática, observada en los individuos atacados de asistolía.

cardiolisis, *s. f.* (καρ-

δία; λύειν, liberar) (Brauer, 1903). Operación que se practica en la sínfisis cardiaca con adherencias del pericardio á la pared torácica. Consiste en la reseción de las costillas correspondientes, con el fin de movilizar el corazón y de suprimir el exceso de trabajo que le imponen las adherencias.

cardiopatía, *s. f.* (καρδία; πάθος, enfermedad) Nombre genérico de todas las afecciones del corazón.

cardioplejia *s. f.* (καρδία; πλήσσειν, herir). Parálisis del corazón.

cardioptosis, *s. f.* (καρδία; πτώσις, caída) (Rummo, 1900). Descenso del corazón consecutivo al alargamiento de sus medios de suspension. La *cardioptosis* parece debida á una predisposición congénita y aparece en los jóvenes.

cardiopuntura, *s. f.* (καρδία; *punctura*). Procedimiento de experimentación para estudiar los movimientos cardiacos de un animal, clavando en el corazón agujas provistas de banderitas.

cardiorrafia, *s. f.* (καρδία; ῥαφή, sutura). Sutura de las heridas del corazón.

cardiorrexia, *s. f.* (καρδία; ῥῆξις, ruptura). Ruptura del corazón.

cardiospasmo, *s. m.* (*cardia*; σπασμός, espasmo) (von Mikulicz, 1904). Contracción espasmódica del cardias, que se opone al paso de los alimentos del esófago al estómago, y que puede producir al cabo de algún tiempo esofagitis, dilatación del esófago y desnutrición general.

cardiotopometría, *s. f.* (Rummo, 1900). Mensuración del área de la macicez cardiaca.

cardiovolumetría, *s. f.* (Rummo, 1900). Mensuración del volumen del corazón.

carditis, *s. f.* Nombre dado por los autores antiguos á la inflamación de las paredes del corazón, afección que corresponde á la que actualmente se llama *miocarditis*.

cardi-valvulitis, *s. f.* (Bouillaud). Sin.: *endocarditis valvular*. Inflamación de la parte del endocardio que reviste las diferentes válvulas del corazón; es la forma más frecuente de la endocarditis.

careniforme (frente). La frente que en la línea media, en todo el trayecto de la sutura mediofrontal, presenta un levantamiento en forma de quilla (sifilis hereditaria).

careniforme (tórax). Deformación raquítica del tórax caracterizada por la prominencia del esternón y el achatamiento lateral de las costillas.

carfologia, *s. f* (κάρφος, copo; λέγειν, recoger). Sin. *crocidismo*. Movimientos contínuos y automáticos de las manos, las que parecen buscar y coger copos que revolotean en el aire, ó las que recorren maquinalmente la cama atrayendo ó rechazando las coberturas, etc. Este gravísimo síntoma acompaña á menudo el delirio tranquilo de algunas pirexias; obsérvase también en las meningitis, el delirium tremens etc.

carie, *s. f.* (*caries*). Osteítis crónica, de naturaleza tuberculosa, caracterizada por la formación de secuestros y la destrucción progresiva del tejido óseo.

carie dentaria. Afección que consiste en la formación de cavidades en uno ó varios dientes, y en la destrucción progresiva de estos órganos.

cariocinesis, *s. f.* (κάρυον, núcleo; κίνησις, movimiento). Sin. : *Cinesis. división cinética*, *división directa*, *división mitósica*, *mitosis*. Modo de división de la célula, caracterizado por una série de modificaciones de la cromatina del núcleo.

cariogamía, *s. f.* (κάρυον; γάμος, matrimonio). Nombre dado á los fenómenos cariocinéticos que se suceden en el óvulo en el momento de la fecundación.

cariolisis, *s. f.* (κάρυον; λύειν, disolver). Designación primera dada á la división indirecta (cariocinesis), porque el núcleo parecía disolverse, para formarse nuevamente después de la segmentación de la célula.

cariomicrosoma, *s. m.* (κάρυον; μικρός, pequeño; σῶμα, cuerpo). Granulillos de cromatina cuya reunión en rosario contribuye á formar el cariomitoma.

cariomitoma, *s. m.* (κάρυον; μίτος filamento). Sin. : *filamento cromático* ó *nuclear*. Filamento provisto de una gran afinidad por las materias colorantes y que forma la armazón del núcleo de la célula.

cariosquisis, *s. f.* (κάρυον; σχίζειν, separar). Fenómeno de excreción ó de osmosis, en virtud del cual la célula deja escapar una parte de los elementos que la constituyen. Ej. Según Lilienfeld, el fermento que

provoca la coagulación de la sangre sale del núcleo de los leucocitos por *cariosquisis*.

carminativo, *adj.* y *s. m.* (*carminare*, limpiar). Medicamento que tiene la propiedad de hacer expulsar los gases y las lombrices intestinales.

carnificación, *s. f.* (*caro*, carne; *ficare* frecuentativo de *facere*, hacer), **carnización**, *s. f.* Aspecto particular del parenquima pulmonar, cuyo color y consistencia semejan los de la carne muscular. La *carnificación* se presenta á menudo en las congestiones pulmonares crónicas de los cardiacos y en la bronconeumonía sub-aguda. Dicho aspecto es idéntico al del pulmón atelectásico; pero el término *atelectasia* debe aplicarse sólo en los casos en que la carnificación es debida á que los alveolos, privados de aire, están retraídos. — Ciertos autores reservan la palabra *carnificación* á la atelectasia, y la de *carnización* á las lesiones de la bronco-neumonía.

carpectomía, *s. f.* Resección total ó parcial de los huesos del carpo.

Carrión (enfermedad de). Véase: *verruga*.

carus, *s. m.* (κάρος, adormecimiento profundo). Ultimo grado del coma, caracterizado por la abolición completa de los reflejos y la existencia de perturbaciones respiratorias y circulatorias acentuadas.

casco neurasténico. Cefalea comparada por los enfermos á la sensación que daría un casco pesado y muy apretado; se localiza sobre todo en la nuca y el occipucio. Es uno de los estigmas de la *neurastenia*.

caseificación, *s. f.* **caseosa (degeneración)** (*caseus* queso) (Vetter, 1803). Variedad de necrosis que ataca el centro de los tubérculos, caracterizada por la formación de una materia gris amarillenta, compacta, granulosa, y que ofrece al corte el aspecto de un pedazo de queso de Roquefort.

castración, *s. f.* Operación por la que se priva á un individuo de la facultad de reproducirse. Este término se emplea á menudo en el sentido más restringido de ablación de ambos testículos ó de ambos ovarios, y aún de uno solo de estos órganos (*castración incompleta*).

catabolismo, *s. m.* (κατά, que indica la idea de

bajar; βάλλειν, lanzar) (Duncan Bulkley). Transformación en energía de los materiales asimilados por los tejidos. Es una de las fases del metabolismo.

catacrotismo, *s. m.* (κατά, abajo; κρότος, latido). Sin.: *levantamiento catacrótico*. En un trazo del pulso tomado en el esfimógrafo, obsérvanse, sobre la línea de descenso, levantamientos (*catacrotismo*) de los que el más importante es el *dicrotismo*.

cataforesis, *s. f.* (κατά, abajo; φέρειν, llevar). Sin.: *electroforesis*. La introducción en el organismo de sustancias medicamentosas por medio de corrientes contínuas

catafórico (estado). Llamábase antes así el estado de adormecimiento profundo intermedio entre el sopor y el coma propiamente dicho.

catalepsia, s. *f.* (καταλαμβάνειν, suspender). Sindroma caracterizado por la pérdida momentánea de la contractilidad voluntaria de los músculos de la vida animal, y la aptitud de los miembros y del tronco á conservar las actitudes que se les imprime. Es la *flexibilitas cerea* de los antiguos autores. — La *catalepsia* se observa en el sueño hipnótico y sobre todo en el gran ataque histérico; puede también observarse sola y constituir una neurosis especial.

cataleptiformes (actitudes) (Bernheim). Véase: *catalepto-catatonia*.

catalepto-catatonia, *s. f.* (Dufour). Sindroma cerebral observado en las pirexias y notablemente en la fiebre tifoidea, y el cual está caracterizado por estupor con catalepsia.

catalisis, *s. f.* (καταλύειν, disolver) (Berzelius). Sin.: *acción catalítica*. Acción físico-química, bastante oscura que, antes de la introducción de la doctrina microbiana en patología, debía explicar los fenómenos de fermentación y de putrefacción. Sábese hoy que dichos fenómenos son causados por los micro-organismos y las sustancias que estos elaboran.

catamenial, *adj.* (καταμήνια, menstruos; de κατα, por; μήν, mes). Lo que atañe á los menstruos.

cataplasma, s. *f.* (καταπλάσσειν, embadurnar). Tópico de la consistencia de una papilla espesa, compuesto lo más á menudo de harina de linaza ó de fécula de papas.

cataplejia, *s. f.* (κατά, sobre; πλήσσειν, herir). 1° Nombre dado al estado cataléptico en los animales (Preyer). — 2° Apoplejía fulminante (Littré).

catarata, *s. f.* (καταῤῥάκτης, caída de agua : creíase que la catarata era debida à la caída de un humor dentro de los ojos). Afección ocular que produce la opacidad del cristalino ó la de su cápsula : de donde la división en *catarata lenticular*, c. *cápsulo-lenticular* y c. *capsular*. La catarata puede ser congénita, traumática ó espontánea.

catario (estremecimiento) (*catus*, gato). Estremecimiento vibratorio perceptible á la mano aplicada sobre el pecho. Se le observa en ciertas lesiones de los orificios del corazón (estrechez aórtica, lesiones mitrales, persistencia del agujero de Botal, etc.). — El *estremecimiento catario* debe su nombre á su semejanza con el ronrón del gato.

catarro, *s. m.* (κατά, abajo; ῥέω, corro). Designación dada por los antiguos á todas las inflamaciones agudas ó crónicas de las mucosas con hipersecreción de las glándulas de la región inflamada.

catártico, *adj.* y *s. m.* (κάθαρσις, purga). Purgante intermediario entre los laxantes y los drásticos.

catatonia, *s. f.* (κατά; τόνος tensión) (Kahlbaum, 1874). Forma de enagenación mental caracterizada por catalepsia, melancolía y estupor, y que termina ordinariamente por la demencia. Ciertos autores consideran la *catatonia* como un síndroma que se observa en el curso de afecciones mentales diversas.

catéter, *s. m.* (καθιέναι, sumergir). Este vocablo designaba antes todo instrumento destinado á explorar un canal cualquiera; más tarde Celso lo reservó para los exploradores de la uretra y de la vejiga únicamente. A partir de Voillemier, designa sólo un instrumento metálico cuya forma es parecida á la de la sonda ordinaria y que se emplea como sonda acanalada para guiar el litotomo en las tallas subpubianas.

cateterismo, *s. m.* Introducción de una bujía ó de una sonda en un canal ó conducto natural del organismo (esófago, trompa de Eustaquio, uretra, etc.).

cat-gut, *s. m* (del inglés *cat*, gato; *gut*, tripa). Hilo empleado en cirujía

para suturar las heridas. Presenta la ventaja de poder ser reabsorbido con facilidad, siendo únicamente formado de sustancias orgánicas.

Cathelin (método de). Véase : *epidural (método).*

catipnosis, *s, f.* (κατά, bajo : ὕπνος, sueño) (Van den Corput). Véase : *sueño (enfermedad del).*

cativi, *s. m.* Véase : *pinta.*

catodo, *s. f.* (κατά ; ὁδός, vía). Electrodo negativo.

causalgia, *s. f.* (καῦστις, calor ardiente ; ἄλγος, dolor). Complexo sintomático formado por la combinación de una alteración especial de la piel, que se pone roja y luciente, y de hiperestesia (sensación de ardor). La *causalgia* sobreviene á consecuencia de heridas nerviosas.

cáustico, *adj.* y *s. m.* (καίω, yo quemo). Sin. *caterético, escarótico.* Sustancia química que mortifica los tejidos.

cauterio, *s. m.* (καίω, yo quemo). Instrumento destinado á quemar los tejidos : *cauterio actual, termocauterio, galvano-cauterio.* — 2° Nombre dado á la ulceración artificial que se establece por medio de un cáustico.

cauterización, *s. f.* Destrucción de un tejido vivo por medio de un cáustico ó de un cauterio.

caverna, *s. f.* Sin. *espelunca* (ant.). Excavación situada en el espesor de un parenquima, particularmente en el pulmón, y que se produce por la evacuación de un abceso, de un tubérculo reblandecido, de una escara de gangrena, etc.

cavernoso (angioma). Véase : *angioma.*

cavernoso (estertor) Véase : *gargullido.*

cavernoso (soplo). Sin. : *respiración cavernosa.* Soplo respiratorio análogo al ruido que se obtiene soplando dentro de las dos manos dispuestas en cavidad. Se encuentra en las cavernas pulmonares y las dilataciones brónquicas.

cavernuloso (estertor). Estertor húmedo de burbujas más pequeñas que las del estertor cavernoso, sin mezcla de soplo. Es característico de las pequeñas cavernas pulmonares.

Cazenave (lupus de). Véase : *lupus eritematoso.*

cebocéfalo, *s. m.* (κῆβος, mono ; κεφαλή, ca-

beza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo que presenta el aparato nasal completamente atrofiado y muy próximas la una de la otra ambas cavidades orbitarias, todo lo cual le da cierta semejanza con el mono.

ceceo, *s. m.* Vicio de pronunciación que consiste en pronunciar la S como Z.

ceco-colostomía, *s. f.* (*cæcum*, intestino ciego; κῶλον, colon; στόμα, boca). Entero-anastomosis entre el ciego y el colon descendente; operación preconizada en los casos de obstáculo infranqueable (cáncer) en el intestino grueso.

cecoplicatura, *s. f.* (*cæcum*; *plicare*, plegar). Plegadura de la pared del ciego con invaginación del fondo dentro del intestino grueso. Operación preconizada en la tosis del ciego con distensión.

cecotomía, *s. f.* (*cæcum*; τομή, sección). Abertura quirúrgica del ciego.

cefalalgia, *s. f.* (κεφαλή, cabeza; ἄλγος dolor). Nombre con que se designan todos los dolores de cabeza, cualquiera que fuere su naturaleza.

cefalea, *s. f.* Tomada á menudo como sinónimo de cefalalgia, esta palabra designa un dolor de cabeza violento y tenaz.

cefalematoma, *s. m.* (κεφαλή, cabeza; αἵματομα, tumor sanguíneo). Tumor formado por un derrame sanguíneo entre los huesos del cráneo y su periósteo. Se le observa en el recién nacido, á consecuencia de un traumatismo accidental ú operatorio.

cefálico (índice) (antropología). Relación del diámetro transverso máximo del cráneo con el diámetro antero-posterior máximo.

cefálico (soplo). Soplo breve, suave, que se percibe al nivel de la fontanela anterior en el recién nacido.

cefalidrocele traumática (κεφαλή, cabeza; ὕδωρ, agua; κηλή, tumor). Tumor situado bajo el cuero cabelludo y que contiene líquido cefalo-raquídeo; se desarrolla á veces en el niño á consecuencia de un traumatismo del cráneo que ha producido la solución de continuidad de la envoltura ósea (fractura, disyunción de las suturas, etc.).

céfalo-espinal (índice) (antropología) Relación que existe entre la superficie del agujero occipital, expresada en milímetros cuadrados, y la capacidad craneo

expresada en centímetros cúbicos. Según Mantegazza, la cifra de este índice es tanto más elevada cuanto más desarrolladas son las razas á que se refiere.

cefalogiro, *adj.* (κεφαλή; *gyro*, giro). Que hace girar la cabeza. Nombre que da Grasset á los centros, los nervios y los músculos rotadores de la cabeza.

cefaloma, *s. m.* Véase: *encefaloide.*

cefalomelo, *s. m.* (κεφαλή; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo que presenta un miembro suplementario inserto sobre la cabeza.

cefalometría, *s. f* (κεφαλή; μέτρον, medida). Mensuración metódica de la cabeza.

céfalo-orbitario (índice) (antropología). Relación que existe, en el esqueleto, entre la suma del volumen de las dos órbitas y la capacidad cerebral. Según Mantegazza, este índice es tanto más débil cuanto más elevadas son las razas á que se refiere.

cefalópago, *s. m.* (κεφαλή; παγείς, unidos) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo formado por dos individuos que, con ombligos distintos, están unidos por la extremidad cefálica y de los cuales la faz ventral del uno continúa la faz dorsal del otro.

cefalotlasia, *s. f.* (κεφαλή; θλάω, yo muelo). Véase: *cefalotripsia.*

cefalotomía, *s. f.* (κεφαλή; τομή, sección). Véase: *craneotomía.*

céfalotoracopago, *s. m.* (κεφαλή; θώραξ, pecho; παγείς, unidos). Nombre dado al grupo de los monstruos dobles caracterizados por dos cabezas fusionadas en una sola, dos troncos soldados por el tórax é independientes por debajo del ombligo, los cuales presentan cuatro brazos y cuatro piernas (sincefalianos, janiceps).

cefalotribo, *s. m.* (κεφαλή; τρίβω, trituro). Nombre dado á una serie de instrumentos, en forma de fórceps, cuyas dos ramas pueden aproximarse por medio de un tornillo, y que sirven para extraer la cabeza fetal después de haberla triturado.

cefalotripsia, *s. f.* Operación que consiste en triturar la cabeza fetal con el cefalotribo.

ceguera, *s. f.* (*cæcitas*). Privación de la vista.

ceguera literal. Variedad de ceguera verbal caracterizada por la abolición de la facultad de leer

las letras alfabéticas; mientras que en la ceguera verbal el enfermo puede á menudo deletrear las palabras que no sabe leer.

ceguera musical. Variedad de ceguera verbal en la cual el enfermo no reconoce la anotación música.

ceguera verbal (Küssmaul, 1876). Sin.: *alexia*. Imposibilidad de comprender las ideas expresadas por la escritura.

...cele (κήλη, tumor, hernia). Afijo que designa casi siempre los tumores formados por la hernia de un órgano. Ej. *enterocele*, *epiplocele*.

celíaco, *adj.* (κοιλία, vientre, intestino). Lo referente á los intestinos.

celiotomía, *s. f.* (κοιλία, vientre; τομή incisión). Sin. *laparotomía abdominal*. Operación que consiste en abrir la cavidad abdominal.

celoma, *s. m.* (κοίλωμα, cavidad), Sin : *cavidad celómica* ó *pleuro-peritoneal*. Cavidad comprendida entre las dos hojillas del mesodermo.

celomielia, *s. f.* (κοίλος, hueco; μυελός, médula). Nombre propuesto por H. Roger para designar las cavidades patológicas de la médula espinal.

celorrafia, *s. f.* (κήλη, tumor; ῥαφή, sutura). Véase: *orquidopexia*.

celosoma, *s. m.* (κήλη, hernia; σῶμα, cuerpo). (I.G. Saint-Hilaire). Monstruo que presenta una eventración lateral ó mediana, con fisura, atrofia o aun ausencia total del esternón y desalojamiento herniario del corazón,

celotomía, *s. f.* (κήλη, hernia; τομή, sección). Operación de la hernia estrangulada. Después de la incisión de la piel y del saco, se libera el estrangulamiento y practícase la cura radical.

Celso (cuadrilátero de). Se da este nombre á los cuatro síntomas de la inflamación que Celso agrupó en la fórmula siguiente: » *Notœ vero inflammationis sunt quatuor, rubor et tumor, cum calore et dolore.* »

célula, *s. f.* (*cellula*, disminutivo de *cella*, celda), Elemento anatómico de los seres organizados (animales y vegetales). Las plantas y los animales están formados de células y de derivados celulares.

célula gigante. Masa protoplasmática de forma irregular, provista de gran número de núcleos que se halla en el centro

folículo tuberculoso. Se pueden descubrir en su interior numerosos bacilos de la tuberculosis. — *célula gigante de la médula ósea.* Nombre dado á veces á los *mieloplaxos* y á los *megacariocitos.*

celulífugo, *adj.* (*cellula*; *fugere*, huir). Que se aleja de la célula. — *conducción celulífuga.* Conducción que lleva la excitación de la célula nerviosa hacia los centros por un prolongamiento central.

celulípeto, *adj.* (*cellula*; *petere*, acercarse). Que se dirige hacia la célula. — *conducción celulípeta* Conducción que lleva la excitación de una superficie sensible hacia la célula nerviosa por un prolongamiento periférico.

celulitis, *s. f.* 1° Nombre dado por algunos autores á la inflamación difusa del tejido celular (*celulitis pelviana difusa* de Bouilly). — 2° Inflamación de las células mastoideas (*celulitis posterior*).

cenestesia, *s. f.* (κοινός, común; αἴσθησις, sensibilidad). Sentimiento vago que tenemos de nuestro ser independientemente del concurso de los sentidos; ó más bien (Deny y Camus), sentimento que tenemos de nuestra existencia gracias á la sensibilidad orgánica vaga y débilmente consciente que en estado normal se deprende de todos nuestros órganos y tejidos, sin exceptuar los de los sentidos.

cenestesiopatía, *s. f.* (*cenestesia*; πάθος, sufrimiento). (Deny y Camus. 1905). Turbación de la cenestesia en el sentido que estos autores dan á este vocablo. Bonnier ha propuesto con el mismo significado el término *asquematia.*

cenofobia, *s. f.* (κενός, vacío; φόβος, miedo). Temor á los espacios.

centrifugador, *s. m.* Instrumento de laboratorio que por la fuerza centrífuga separa las partículas sólidas que están suspendidas en un líquido (elementos celulares ó figurados, bacteterias).

centrolecítico (huevo) (κέντρον, centro; λέκιθος, yema de huevo). Huevo cuyo deutoplasma se halla acumulado en el centro.

centrosoma, *s. m.* (κέντρον, centro; σῶμα, cuerpo). Sin.: *corpúsculos polares.* Nombre dado á corpúsculos que presentan gran afinidad por los reac-

tivos colorantes y están situados en el centro de cada esfera directriz. Estos corpúsculos forman los dos extremos del huso acromático durante la cariocinesis.

centrotomía, *s. f.* (κέντρον, punta; τομή, sección) (Le Dentu). Operación de la fístula estercoral por medio del enterotomo de Dupuytren.

cerato, *s. m.* (κηρός, cera). Medicamento externo cuya base es la cera y el aceite.

cérea (degeneración). Modo de degeneración especial de las células que se vuelven transparentes. Su naturaleza es desconocida.

cerebelosa (ataxia ó marcha). Manera de andar que se observa en la mayor parte de los enfermos del cerebelo (y en particular del vermis). La caracteriza una titubeación análoga á la de la embriaguez.

cerebeloso (síndroma). Conjunto de las perturbaciones nerviosas determinadas por las lesiones del cerebelo: nistagmo, vértigos, vómitos, andar de ebrio.

cerebelo-espasmódico (andar). Manera de andar que participa del andar cerebeloso y del andar espasmódico. Del primero tiene la instabilidad de la estación vertical y la titubeación; del segundo, la exageración de los reflejos y la rigidez de las piernas. Se observa sobre todo en la esclerosis en placas.

cerebrastenia, *s. f.* (*cerebrum*; ἀ priv; σθένος, fuerza). Forma clínica de la neurastenia en la que predominan: cefalea, insomnio, depresión de las facultades mentales, fobias y abulia. Es más frecuente en los hombres y sobreviene principalmente á consecuencia de fatigas intelectuales.

cerebro-espinal (eje). Conjunto de los centros nerviosos (encéfalo y médula).

cerebromalacia, *s. f.* (*cerebrum*; μαλακός, blando). (Grasset). Véase: *reblandecimiento cerebral*.

cerebroma, *s. m.* (Hayem). Sin.: *neuroglioma*. Tumor cuyos elementos pertenecen al tipo nervioso; el estroma está formado por neuroglia, y sus mallas encierran neuroblastos embrionarios, grandes células multipolares, ó, más rara vez, tubos nerviosos.

cerebroscleros

s. f. (*cerebrum*; σκληρός. duro) (Grasset, 1904). Lesión del cerebro determinada por la arterio-esclerosis, caracterizada por focos lacunares; se manifiesta por pequeños ataques, hemiplejias transitorias, emotividad exagerada, y termina ora por un ataque de apoplejía, ora por la caquexia cerebral y la decrepitud.

cervical, *adj.* (*cervix*). Lo qne atañe á la región del cuello, ó bien al cuello uterino y á su cavidad.

cervicitis, s. *f.* (*cervix*, cuello) Inflamación del cuello uterino; metritis localizada al cuello.

cesárea (operación) (*cædere*, cortar). Sin.: *gastro-histerotomía*, *histerotomía abdominal*, *histerotomotocia*, *laparo-histerotomía*. Operación que consiste en practicar la abertura de la pared abdominal y del útero grávido con el fin de extraer el feto vivo.

cestode ó **cestoide,** *s. m.* (κεστός, estoneado). Orden de lombrices de la clase de los Platelmintos que comprende la Tenia y el Botrio céfalo.

cianodermia, *s. f.* (κύανος, azul; δέρμα, piel). Véase: *cianosis*.

cianofilia, *s. f.* (κύανος; φιλία, amistad). Variedad de policromatofilia caracterizada por la aptitud del protoplasma de ciertos hemátidos á colorearse por el azul de Loeffler. Se la observa en la anemia.

cianopatía, *s. f.* (κύανος; πάθος, padecimiento). Véase: *cianosis*.

cianosis, *s f.* (κύανος, azul). Sin.: *enfermedad azul*, *ictericia violada*, *dishematosis*. Coloración azul de los tegumentos debida á una perturbación circulatoria, á un obstáculo á la hematosis ó á una alteración de la hemoglobina de origen tóxico. Empleada sola, esta palabra sirve para designar más especialmente todos los estados mórbidos provocados por la comunicación anormal de las cavidades cardiacas, acompañadas de coloración azul de los tegumentos.

cianosis enterógena (Stokvis, 1902). Síndroma caracterizado por la coloración azul de los tegumentos y de las mucosas, ligada á perturbaciones dispépticas de origen intestinal. La coloración azul es debida á la alteración de la hemoglobina, que se transforma en metemoglobina y en sulfo-hemoglobina.

cianuria, *s. f.* (κύανος, azul; οὖρον, orina). Emisión de orinas azules.

ciática, *s. f.* (ἰσχίας, afección de la cadera). Síndroma cuyo elemento principal es un dolor muy vivo á lo largo del trayecto del nervio ciático y de sus ramas. Puede corresponder anatómicamente á lesiones reales de los nervios (*ciatica* por neuritis), ó al contrario puede el nervio aparecer no alterado (*neuralgia ciática*). Depende de múltiples causas (diábetes, tuberculosis, etc).

ciática espasmódica (Brissaud). Variedad de ciática acompañada de fenómenos espasmódicos muy notables : exageración de los reflejos, trepidación epileptoide y contractura de los músculos de la cadera y de las masas sacrolumbares, que producen la escoliosis homóloga (es decir, la curvatura de la columna lumbar con la concavidad dirigida hacia el lado enfermo).

cicatrícula, *s. f.* 1° Cicatriz pequeña. — 2° Nombre dado al *vitelo formativo* de los huevos de segmentación parcial. La *cicatrícula* se presenta con la forma de una manchita blancuzca en la superficie de la yema, en los huevos de las aves.

cíclico, *adj.* (κύκλος círculo). Se dice de una enfermedad que se manifiesta habitualmente por la misma sintomatología, y en la que, por lo tanto, se pueden prever las etapas sucesivas de su evolución

ciclitis, *s. f.* (κύκλος círculo). Variedad de iritis ó de irido-coroiditis localizada en el círculo ciliar.

ciclocéfalo, *s. m.* (κύκλος globo del ojo ; κεφαλή cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuyos dos ojos están confundidos en uno solo y cuyo aparato nasal se halla completamente atrofiado.

ciclopia, *s. f.* (κύκλος; ὤψ, ojo). Deformación congénita caracterizada por la fusión de las dos órbitas y la existencia de un ojo único.

cicloplejia, *s. f.* (κύκλος; πλήσσειν, herir). Oftalmoplejia total, á la vez de la musculatura interna y externa del ojo ; los ojos quedan inmovilizados en posición media, la pupila fija, dilatada.

cifo-escoliosis, *s. f.* Doble desviación de la columna vertebral, de convexidad posterior y lateral.

cifosis, *s. f.* (κυφός, encorvado). Desviación de la columna vertebral de convexidad posterior.

cilindro-cefalia *s. f.* (κύλινδρος, cilindro; κεφαλή,

cabeza) (antropología). Deformación craneana caracterizada por el alargamiento del cráneo en forma de cilindro (ordinariamente artificial).

cilindros urinarios Cilindros microscópicos de sustancia proteica que se producen en los tubos uriníferos, cuya forma toman. Se les encuentra en el depósito de la orina, durante la vida, y en los cortes de los riñones, al examen anatomopatológico, en los enfermos atacados de nefritis. Su composición es variable: *cilindros epiteliales*, *mucosos*, *hialinos*, *fibrinosos*, *grasosos*.

cilindroides, *s. m. pl.* (Rovida). Variedad de cilindros urinarios (cilindros mucosos).

cilindroma, *s. m.* Sin.: *epitelioma con cuerpos oviformes* (Billroth), *mixosarcoma*, *sifonoma* (Houle), *tumor heteradénico con cuerpos oviformes*. Tumor de tejidos múltiples, casi siempre encapsulado, cuyo sitio preferido es la cara, caracterizado por la formación de cilindros epiteliales que contienen corpúsculos refringentes oviformes. Entre dichos cilindros se desarollan mamelones de tejido conjuntivo translúcido que los comprimen y atrofian.

cilindruria, *s. f.* Presencia en la orina de cilindros de origen renal.

cilosoma, *s. m.* (κυλλός, cojo, manco; σῶμα, cuerpo) Monstruo caracterizado por una « eventración lateral que ocupa principalmente la región inferior del abdomen, y por la ausencia ó desarrollo muy imperfecto del miembro pelviano correspondiente al lado ocupado por la eventración » (I. G. St-Hilaire).

cimbocefalia, *s. f.* (κύμβος, alforja; κεφαλή, cabeza). Sin.: *quimbocefalia*, *cráneo en alforja* (antropología). Deformación del cráneo que presenta una profunda depresión por detrás del bregma (deformación artificial).

cinanquia sublingual tifoidea, (κύων, perro; ἄγχειν, estrangular: el enfermo saca la lengua como un perro jadeante. Littré). Véase: *Ludwig* (*angina de*).

cinantropía, *s. f.* (κύων, perro; ἄνθρωπος, hombre). Monomanía en que el paciente se cree metamorfoseado en perro.

cinasa ó **cinasis**, *s. f.* (κίνησις, movimiento). Fermento soluble cuya pre-

sencia es indispensable para que obre otro fermento.

cinesia, *s. f.* (κίνησις, movimiento). Término general, con el cual se designa la gimnástica médica, el masaje y los ejercicios higiénicos.

cinesialgia, *s. f.* (κίνησις; ἄλγος, dolor). Nombre dado por Gubler á la ruptura de fibras musculares profundas en el centro de un músculo espeso.

cinesis, *s. f.* Véase: *cariocinesis.*

cinescopia, *s* f. Sin.: *método de Holth.* Método de determinación de la refracción ocular.

cinesismo, *s. m.* (κίνησις, movimiento). Sin.: *ponosis.* (Revilliod). Autointoxicación debida á la fatiga y á los excesos físicos. Se manifiesta sobre todo por sofocación, delirio é hipertermia.

cinesiterapia, *s. m.* (κίνησις; θεραπεία, tratamiento). Nombre con que se designan todos los modos de tratamiento que obran sobre el organismo imprimiéndole movimientos, ya activos, ya pasivos: electricidad, amasamiento, gimnástica.

cinesódico (nervio) (κίνησις; ὁδός, vía). Nervio motor ó centrífugo.

cinestésica (función). Véase: *sentido muscular.*

cinestesiómetro, *s. m.* Aparatito imaginado por Grasset y cuyo objeto es indicar la sensación más leve de aligeramiento.

cinética (división). Véase: *cariocinesis.*

cinetoplasma, *s. m.* Nombre dado por Marinesco á los gránulos eromófilos de la célula nerviosa, porque desempeñarían un papel en la actividad del elemento nervioso.

cínico (espasmo). (κύων, perro). Contracción convulsiva de los músculos caninos.

cinofobia, *s. f.* (κύων; φόβος, temor). Miedo mórbido á los perros.

cinorexia, *s. f.* (κύων; ὄρεξις, apetito). Hambre canina. Bulimia.

cionitis, *s f.* (κίων, campanilla). Inflamación de la campanilla.

cionotomo, *s. m.* (κίων; τομή, sección). Cisallas que sirven para cortar la campanilla.

cípridofobia, *s. f.* (Κύπρις; φόβος, temor). Temor mórbido á las enfermedades venéreas.

cípridología, *s. f.* (Κύπρις, ἴδος, Venus; λόγος, discurso) (Queyrat). Sin.:

venéreologia. Estudio de las afecciones venéreas (sífilis, blenorragia, chancroide, etc).

cípridopatía, *s. f.* (Κύπρις; παθός. afección). Enfermedad venérea.

circinado, *adj.* (*circinus*, círculo). Se dice de las lesiones elementales de la piel cuando se agrupan de modo que figuran fragmentos de círculo cuyo centro está relativamente indemne.

circular (locura). Modalidad especial de locura periódica en la cual los períodos de manía y de melancolía se suceden sin intervalo lúcido intercalar.

circulares del cordón.. Arrollamiento del cordón umbilical al rededor del cuello del feto durante el parto.

circulus viciosus. Se designa así el reflujo del contenido gástrico por el cabo superior de la anastomosis intestinal en los casos de gastro-enterostomía. Los alimentos vuelven al estómago en vez de seguir el trayecto intestinal.

circumfusa, *s. m. pl.* (en latin: las cosas esparcidas al rededor, de *circum*, alrededor, *fundere*, esparcir). Término con que se designan en higiene los agentes físicos exteriores (clima, atmósfera, habitación, etc.), considerados desde el punto de vista de su influencia sobre el organismo humano.

circuncisión, *s. f.* (*circum*, al rededor; *cædere*, cortar). Operación que consiste en la escisión total ó parcial del prepucio.

cirrosis, *s. f.* (κιρρός, rojo: color de las granulaciones de la *cirrosis de Laënnec*). Nombre dado á muchas afecciones hepáticas cuyo carácter común es « la proliferación del estroma conjuntivo según un tipo anatómico y fisiológico » (Chauffard). Esta proliferación conjuntiva puede estar acompañada de diferentes modificaciones de las células, de donde las variedades : *cirrosis grasosa*, *c. pigmentaria*. Puede ser determinada por causas distintas : *cirrosis alcohólica*, *c. tuberculosa*, *c. palúdica*. — Se da á veces por extensión el nombre de *cirrosis* á algunas esclerosis de otras vísceras (*cirrosis del riñón*).

cirrosis atrófica. Esclerosis del hígado acompañada de disminución de volumen del órgano; puede ser la faz terminal de otras variedades de cirrosis. — *Cirrosis atrófica alcohólica ó cirrosis de Laënnec.* Variedad la más frecuente y

la primera descrita; está caracterizada anatómicamente por la presencia en el hígado de granulaciones amarillo-rojizas, y clínicamente por una ascitis abundante y rápido decaimiento.

cirrosis biliar hiperesplenomegálica (Gilbert y Fournier). Forma anatomo-clínica de cirrosis, esencialmente caracterizada por ictericia crónica é hipertrofia esplénica considerable, sin que el hígado se halle sino poco, y á veces poquísimo, aumentado de volumen.

cirrosis hipertrófica biliar. Sin.: *enfermedad de Hanot*. Afección caracterizada por la esclerosis del hígado, con aumento de volumen del órgano, hipertrofia del bazo y ataques de ictericia. Influye menos que las otras variedades de cirrosis sobre el estado general.

cirrosis hipertrófica difusa (Gilbert y Garnier). Variedad de cirrosis hipertrófica caracterizada anatómicamente por la difusión del tejido conjuntivo en el interior del lobulillo, y clínicamente por su evolución subaguda, poca ó ninguna ictericia y ascitis poco considerable. Sería de origen alcohólico ó tuberculoso.

cirsocele, *s. f.* (κιρσός, várice; κήλη, tumor). Véase: *varicocele*.

cirsoide (tumor) (κιρσός; εἶδος, forma) Véase: *aneurisma cirsoide*.

cirsotomía, *s. f.* (κιρσός; τομή, sección). Extirpación de las várices.

cirtómetro, *s. m.* (κύρτος, jaula; μέτρον, medida) (Woillez). Instrumento destinado á medir el perímetro torácico y que permite trazar sobre el papel el contorno de este perímetro.

cirujía, *s. f.* (χεῖρ, mano; ἔργον, obra). Rama de la terapéutica cuyo propósito es curar con procedimientos manuales.

cisiparidad, *s. f.* (*scindere*, hender). Véase: *fisiparidad*.

cistalgia, *s. f.* (κύστις, vejiga; ἄλγος, dolor). Sin.: *cistodinia*. Neuralgia de la vejiga.

cistectomía, *s. f.* (κύστις; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en extirpar una parte ó la totalidad de la vejiga.

cisticerco, *s. m.* (κύστις, vejiga; κερκος, cola). Nombre dado á las tenias vesiculares durante la fase evolutiva que sigue al estado de larva. Este período lo

caracteriza la formación de una vesícula caudal que no tarda en desarrollarse considerablemente. Los cisticercos de ciertas especies son precisamente los llamados quistes hidáticos.

cisticercoide, *adj.* y *s. m.* Nombre dado por Leuckart á las tenias que en estado de larva no tienen vesícula caudal.

cisticercosis, *s. f.* Enfermedad causada por el desarrollo de cisticercos en el organismo, y en particular de *cysticercus cellulosæ*. larva de *tænia solium*; esta *cisticercosis* se llama tambien *laceria* (lepra del cerdo).

cisticercus cellulosæ. Véase : *laceria* 2°.

cístico, *adj.* (κύστις, vejiga). Lo referente á la vesícula biliar.

cisticotomía, *s. f.* (cístico; τομή, sección). Incisión del canal cístico.

cistinefrosis, *s. f.* (Kust-r). Véase : *riñón sacciforme*.

cistinuria, *s. f.* Eliminación de cistina por la orina. A menudo acompañada de eliminación de arenilla cistínica, puede dar lugar á la formación de cálculos en la vejiga. La *cistinuria* se observa en individuos de nutrición perezosa.

cistirragia, *s. f.* Véase : *cistorrogia*.

cistitis, *s. f.* (κύστις, vejiga). Inflamación aguda o crónica de la vejiga.

cistocele, *s. f.* (κύστις; κήλη, hernia). Hernia de la vejiga. Esta palabra no se aplica sólo á los casos en que una parte de la vejiga ha penetrado en un trayecto herniario, sino designa también aquellos en que la vejiga hace más ó menos bulto dentro de la vagina.

cistodinia. *s. f.* (κύστις; οδύνη, dolor). Véase : *cistalgia*.

cisto-epitelioma del ovario. Sin. : *cistoma del ovario*, *epitelioma mucoide* (Malassez), *quiste prolígero* (Pozzi) *quiste prolífero* (Cornil y Ranvier). Nombre dado á una variedad de quistes del ovario de naturaleza epitelial, formados muy probablemente por la proliferación del epitelio germinativo.

cisto-fibroma del útero. Fibroma uterino que contiene cavidades quísticas.

cistoma del ovario. Véase : *cisto-epitelioma*.

cistopexia, *s. f.* (κύστις; πέξις, fijación). Fijación de la pared anterior de la vejiga á la pared abdominal, por encima de la sínfisis pubiana.

cistoplastia, *s. f.* (κύστις; πλάσσειν, formar). Operación cuyo objeto es cerrar la fístula vésico-vaginal.

cistoplejia, *s. f.* (κύστις; πληγή, golpe violento). Parálisis de la vejiga.

cistorrafia, *s. f.* (κύστις; ραφή, sutura). Sutura de la vejiga después de avivar la pare t vaginal; operación preconizada por G. Marchant en ciertos casos de cistocele vaginal.

cistorragia, *s. f.* (κύστις; ῥηγνυμι, rompo). Hemorragia vesical.

cistosarcoma, *s. m.* Nombre dado generalmente á tumores complejos, en que pueden encontrarse la mayor parte de los tejidos (carcinoma, sarcoma, encondroma, etc.), con cavidades quísticas. Dichos tumores son casi siempre congénitos.

cistoscopia, *s. f.* Examen de la vejiga por medio del cistoscopio.

cistoscopio, *s. m.* (κύστις; σκοπεῖν, examinar). Instrumento que permite examinar la mucosa de la vejiga alumbrando la cavidad de ésta.

cistostomía suprapubiana. (κύστις; στόμα, boca). Sin.: *operación de Poncet.* Creación de una, uretra hipogástrica en los casos de obstrucción prostática en que no es ya aplicable el cateterismo.

cistotomía, *s. f.* (κύστις; τομή, incisión). Véase: *talla.*

citasis, *s. f.* (κύτος, célula) (Metchnikoff). Véase: *alexina.*

citemia, *s. f.* (κύτος, célula; αἷμα, sangre). Presencia en la sangre de células pertenecientes á otros tejidos normales ó patológicos.

citemolisis, *s. f.* (κύτος; αἷμα; λύειν, disolver). Destrucción de los glóbulos rojos.

citemolítico, *adj.* Se dice de las sustancias que destruyen el glóbulo rojo.

citoblastema, *s. m.* (κύτος, célula; βλαστός, germen). Véase: *blastema.*

citoblasto, *s. m.* (κύτος, βλαστός, germen). Nombre dado al núcleo de la célula en la teoría del *blastema*, no admitida ya hoy.

cito-diagnóstico, *s. m.* (Widal). Método de diagnóstico basado sobre la investigación, en los derrames líquidos de las serosas, de las diversas formas celulares que suele encontrarse en ellos.

citolisis, *s. f.* (κύτος; λύειν, disolver). Disolución ó destrucción de las células.

citología, *s. f.* (κύτος; λόγος, discurso). Estudio de la célula considerada desde el punto de su constitución íntima, de su morfología y de su evolución.

citomicrosoma, *s. m.* Sin. : *microsoma*, *plastidulo*. Granulaciones que, dispuestas en rosario, forman el citomitoma.

citomitoma, *s. m.* (κύτος; μίτος, filamento). Sin. : *mitoma*. Nombre dado á los filamentos que forman el espongio-plasma de la célula.

citopéxico, *adj.* (κύτος; πήξις, fijación) (Gilbert). Se dice de la función de un órgano (hígado) que fija en su intimidad las células normales ó patológicas (células cancerosas) que le son llevadas por la sangre.

citoplasma, *s. m.* Véase : *protoplasma*.

citoterapia, *s. f.* (κύτος; θεράπεία, tratamiento). Nombre dado á los procedimientos terapéuticos que nacen del estudio de las citotoxinas.

citotóxico, *adj.* Se dice de una sustancia capaz de destruir tal ó cual especie de células, y que se desarrolla en el suero de un animal á consecuencia de inyecciones repetidas de estas mismas células (espermatozoides) provenientes de un animal diferente.

citotoxina, *s. f.* 1° Toxina de origen celular. — 2° Sustancia contenida en ciertos sueros y que gozan de propiedades citotóxicas. Es en este segundo sentido como se emplean las expresiones de *espermotoxina*, *nefrotoxina*.

cladótrix, *s. m.* (κλάδος rama; θρίξ, cabello). Bacteria que presenta la forma de largos filamentos más ó menos ramificados.

clamp, *s. m.* (del inglés *to clamp*, fijar). Variedad de pinza que tiene dientes muy largos y una muesca para fijarla.

clangoroso (ruido) (Guéneau de Mussy). Timbre sonoro, de resonancia metálica, que toma á veces el segundo ruido del corazón (aortitis crónica).

clapeo ó clapoteo. *s. m.* (del alemán *klappen*, hacer ruido). Ruido obtenido imprimiendo con la punta de los dedos pequeñas sacudidas bruscas y repetidas á la pared abdominal relajada, cuando el estómago ó el intestino dilatados contienen cierta cantidad de líquido y de gases. La inves-

tigación de este signo permite apreciar el grado de dilatación de aquellos órganos.

claqueo ó **claquido valvular.** Ruido producido por el choque de las válvulas sigmoideas de la aorta y de la arteria pulmonar al principio de la diástole.

Clarke (lengua de). Aspecto particular de la lengua que presenta surcos más ó menos profundos que circunscriben mamelones irregulares. Estas lesiones son características de la glositis profunda terciaria.

clasmatocitos, *s. m. pl.* (κλάσμα, fragmento; κύτος, célula). Variedad de células descubierta por Ranvier en el tejido conjuntivo. Estas células son leucocitos modificados; presentan prolongamientos moniliformes que pueden desprenderse (*clasmatosis*) y formar grupos de granulaciones al rededor de cada una de aquellas.

clasmatosis, *s. f.* (Ranvier). Véase : *clasmatocito.*

clastomanía. *s. f.* (κλάειν, quebrar; μανία, manía). Impulsión que lleva á ciertos degenerados á quebrar los objetos.

Claudio Bernard-Horner (sindroma de). Véase : *ocular simpático (sindromá).*

claudicación intermitente isquémica (*claudicare,* cojear) (Charcot). Síntoma observado en la arterio-esclerosis y debido à la alteración de los vasos del miembro inferior. Al cabo de algunos instantes de marcha el enfermo experimenta adormecimiento doloroso y rigidez en uno de los miembros inferiores, que lo fuerzan á detenerse y desaparecen después de algunos momentos de reposo.

claustrofobia, *s. f.* *claustra,* lugar cerrado; φόβος, temor). Angustia particular que ciertos neuropatas experimentan en los lugares cerrados. Se observa sobre todo en vagón.

clavo histérico. Dolor vivo, localizado generalmente en un punto histerógeno, que los histéricos comparan á la sensacion producida por un clavo encajado en ese punto.

clavo tísico. Dolor vivo sentido por los tísicos en un punto muy limitado del tórax (generalmente hacia el vértice del pulmón), debido á un foco de pleuresía seca. A veces espontáneo, lo más á menudo se le provoca á la presión.

cleidorrexia, *s. f.* (κλειδίον, clavícula; ῥηξις, ruptura) (obstetricia). Fractura de ambas clavículas en el parto de cabeza, que se produce cuando, estando encajados en totalidad ó en parte los brazos del feto, el partero ejecuta tracciones brutales.

cleidotomía, *s. f.* (κλειδίον; τομή, sección) (Phœnomenoff, 1895) (obstetricia). Operación que consiste en seccionar una de las clavículas ó ambas, cuando la anchura del diámetro bisacromial ó la estrechez de la pelvis impiden el paso de los hombros.

cleptomanía, *s. f.* (κλέπτω, yo robo; μανία, manía). Sin.: *clopemanía*. Tendencia mórbida á robar, síntoma que se observa en varias especies de locura (parálisis general, locura histérica, locura puerperal, etc.).

cleptofobia, *s. f.* (κλέπτω, yo robo; φόβος temor). Temor enfermizo, con obsesión, de cometer un robo.

climatología, *s. f.* Estudio de los diferentes climas y de su acción sobre el organismo sano ó enfermo.

climatoterapia, *s. f.* (κλίμα, ατος, clima; θεραπεία, tratamiento). Aplicación á la cura de las enfermedades de la acción producida sobre el organismo por los diferentes climas.

clínica, *s. f.* (κλίνη, cama). 1° Conjunto de los conocimientos que se adquieren en el lecho del enfermo por la observación directa de los fenómenos mórbidos. — 2° Enseñanza del arte médico tal como se le da en el lecho del enfermo, y por consiguiente sin órden didáctico.—3° Servicio de hospital en que la enseñanza se da á la cabecera del enfermo.

clinocefalia, *s. f.* (κλίνη, cama; κεφαλή, cabeza (antropología) Deformación del cráneo que presenta un achatamiento ó aun una incurvación de la bóveda, comparada con la forma de una silla.

clinodactilia, *s. f.* (κλίνη; δάκτυλος, dedos). Desviación de los dedos del pie hacia la cara dorsal, la cara plantar ó lateralmente.

clinoterapia, *s. f.* (κλίνη; θεράπεια, tratamiento). Método de tratamiento por el reposo en la cama (sicosis).

clitoridectomía *s. f.* (κλειτορίς, clítoris; ἐκτομή, excisión). Ablación del clítoris. Operación practicada en algunos casos de onanismo rebelde.

cloasma, *s. m.*

(χλοάζειν, empalidecer, verdecer). Lesión de la piel consistente en manchas pigmentarias de formas irregulares, tamaño variable, y contornos geográficos, cuyo sitio más frecuente es la cara. Se desarrolla en estados mórbidos muy diversos (afecciones uterinas, anemia grave, etc.), pero es sobre todo sintomática del embarazo (máscara de las preñadas).

clonismo *s. m.* **clónica (convulsión)** (κλόνος, agitación). Convulsión caracterizada por una serie de contracciones musculares rápidas, más ó menos regulares, que producen grandes movimientos.

clonus del pié, de la mano. Sin. : *trepidación epileptoide ó espinal, fenómeno del pié.* Fenómeno provocable cuando hay exageración de los reflejos; doblando rápidamente el pié sobre la pierna, las contracciones sucesivas de los extensores y de los flexores producen la trepidación rápida del pie. Este fenómeno se observa más rara vez en la mano.

clopemanía, *s. f.* (κλοπή, robo; μανία, manía). Véase : *cleptomanía.*

Cloquet (hernia de). Hernia perineal.

cloralismo, *s. m.* Conjunto de los accidentes mórbidos provocados por la absorción del cloral á muy fuerte dosis (*cloralismo agudo*), ó por el hábito de este medicamento (*cloralismo crónico, cloralomanía*). Dichos accidentes son análogos á los del alcoholismo.

cloralomanía, *s. f.* Hábito morbido del cloral. La necesidad de este medicamento se transforma poco á poco en una impulsión tanto más imperiosa cuanto más fuerte es la intoxicación.

cloridria, *s. f.* (Hayem). Término que sirve para designar la suma del ácido clorídrico libre y del cloro combinado con las materias orgánicas, cuando se hace el examen del jugo gástrico después de una comida de prueba.

cloro-anemia, *s. f.* Anemia sintomática de ciertas enfermedades generales. Ej. *cloro-anemia tuberculosa, cloro-anemia sifilítica, cloro-anemia brightica ó cloro-brightismo.*

cloro-brightismo, *s. m.* (Dieulafoy, 1893). Clorosis verdadera acompañada de perturbaciones atribuibles á la uremia (Dieulafoy), ó variedad de cloro-anemia dependiente de una nefritis (Hayem).

clorocito, *s. m.* (χλωρός, verde; κύτος, célula) (Hayem). Glóbulo rojo que ha perdido una parte de su materia colorante después de sufrir la transformación vesiculosa.

cloroformización, *s. f.* Procedimiento de anestesia general que consiste en hacer respirar á un individuo una mezcla de aire y de vapores de cloroformo.

cloroformo á la reina. Modo de administración del cloroformo empleado en obstetricia, que consiste en hacer respirar el anestésico en el momento de las contracciones dolorosas, sin tratar de obtener el sueño completo. Se atenúan así los dolores sin modificar las contracciones ni hacer más lento el trabajo. Este método fué puesto de moda en Inglaterra por Símpson, después del parto de la reina Victoria; de donde el nombre.

cloroma, *s. m.* (χλωρός, verde) (King). Sin.: *cáncer verde* (Aran). Afección caracterizada clínicamente por exoftalmía, sordera, hinchazón de las regiones temporal y occipital, y anatómicamente por linfomas periósteos de color verduzco, cuyo sitio ordinario son la órbita y el cráneo; mas pueden generalizarse á los otros huesos y á las vísceras. Suele acompañarse de leucemia linfática de marcha rápida.

cloro-paludismo, *s. m.* (Sakorraphos, 1905). Síndroma que recuerda el conjunto sintomático de la clorosis grave; se observa en los jóvenes atacados de paludismo crónico.

clorosis, *s. f.* (χλωρός, verde) (Varandal, 1620). Sin.: *anemia esencial*. Enfermedad caracterizada por la disminución del número de los glóbulos rojos y el descenso de su riqueza en hemoglobina, y, desde el punto de vista sintomático, por un tinte amarillo verdoso de los tegumentos y perturbaciones de los diferentes aparatos. Se encuentra sobre todo en el sexo femenino y en el momento de la pubertad. Se considera como una enfermedad de evolución.

cloruremia, *s. f.* (cloruro; αἷμα, sangre). Presencia de cloruros en exceso en la sangre.

coaglutinación, *s. f.* Nombre dado á la propiedad que posee el suero de ciertos enfermos (infección paratifoidea, por ejemplo) de aglutinar no sólo el bacilo correspondiente á la enfermedad sino también otro bacilo paratífico y aún el bacilo de Eberth mismo.

coagulación, *s. f.* Transformación de una sustancia líquida en una masa sólida ó semi-sólida de consistencia más ó menos blanda y gelatinosa.

coágulo, *s. m.* Masa esponjosa formada por la fibrina de la sangre, que retiene en sus mallas los glóbulos rojos, los cuales le communican su coloración.

coalescencia, *s. f.* (*cum*, con; *alere*, nutrir.) Adherencia de dos superficies contiguas (cicatrización, adherencias viciosas, etc.).

coaptación, *s. f.* (*cum*, con; *aptare*, ajustar). Reducción de una fractura ó de una lujación.

coartación, *s. f.* (*coarctare*, estrechar). Estrechez de un conducto natural.

coartotomía, *s. f.* (*coarctare*; τομή, sección) (Reybard). Uretrotomía interna.

cocáceas, *s. f. pl.* (*coccus*). Nombre de la primera familia de las bacterias. Bacterias de elementos esféricos.

cocainismo, *s. m.* Intoxicación por la cocaína.

cocainomanía, *s. f.* Hábito mórbido del uso de la cocaína en inyecciones subcutáneas. La necesidad del medicamento se ha transformado en una impulsión tanto más imperiosa cuanto más fuerte es la intoxicación.

coccicéfalo, *s. m.* (κόκκυξ, coccis; κεφαλή, cabeza). (I. G. St-Hilaire). Monstruo acéfalo en quien los huesos primeros de la columna tienen la forma de un coccis.

coccidia, *s. f.* Parásito unicelular del grupo de las Psorospermias, observado sobre todo en el hígado del conejo, en donde determina lesiones á las veces quísticas, á las veces de apariencia neoplásica. Algunas observaciones parecen probar que las *coccidias* se desarrollan igualmente en el hígado del hombre Para ciertos autores estos parásitos representarían gran papel en la patogenia del cáncer.

coccidiosis del hígado. Afección hepática determinada por las coccidias y que clínicamente semeja ya al quiste hidatídico, ya la angiocolitis catarral ulcerosa. Muy rara en la especie humana, ha sido estudiada sobre todo en el conejo.

coccigodinia, *s. f.* (κόκκυξ, coccis; ὀδυνη, dolor) (Simpson). Dolor limitado al coccis y debido, ora á una neuralgia de los ramos posteriores de los nervios sacros, ora á una lesión del coccis. Se le observa se

todo en las metritis con retroversión y en las afecciones de los anexos.

coccigotomía, *s. f.* (κόκκυξ; τομή, sección) (obstetricia). Sección del coccis Operación destinada á darle ensanche al canal pelviano en ciertos casos de estrechez de la pelvis.

coccus ó **coco**, *s. m.* (*coccus*, grano rojo). Sin.: *micrococo*. Bacteria de forma redonda.

cocobacilo, *s. m.* Sin.: *bacteria ovoide*. Pequeño bacilo muy corto y de forma ovalar.

codorniz (ruido de). Véase: *llamada ó tambor* (*ruido de*).

cofia, *s. f.* Fragmento de las membranas del huevo, que se desprende al romperse éstas y cubre la cabeza del feto durante la expulsión.

cofosis, *s. f.* (κῶφος, sordo). Abolición completa del sentido del oído.

coherente, *adj* (*cum*, con; *hærere*, unir). Se dice de una erupción cuyos elementos primitivamente distintos se unen secundariamentes los unos con los otros (viruela coherente).

colagago, *adj.* y *s. m.* (χολή, bilis; ἄγω, expulso). Purgante que provoca la evacuación de la bilis.

colangiostomía, *s. f.* (χολή, bilis; ἄγγεῖον, vaso; στόμα, boca). Abocamiento á la piel de un conducto biliar. Operación que se practica cuando los canales colédoco y hepático se hallan irremediablemente obstruidos.

colangiotomía, *s. f.* (χολή, bilis; αγγεῖον, vaso; τομή, sección). Abertura quirúrgica de un conducto biliar.

colangitis, *s. f.* Véase: *angiocolitis*.

colapso, *s. m.* (*collapsus*, caida) (Cullen). Disminución brusca ó rápida de la actividad cerebral. — Hoy se prefiere designar con ese término á la caída rápida de las fuerzas con aflojamiento de las funciones cardíacas (*colapso cardiaco*)

colapso álgido. Complexo sintomático caracterizado por aflojamiento del pulso y de la respiración, enfriamiento periférico y postración general de las fuerzas.

colapso pulmonar. Isquemia y palidez del pulmón, cuyo parenquima se halla comprimido por un derrame pleural ó un tumor de la región.

colateral (hemiplejia). Véase: *hemiplejia colateral*.

colecistectasia, *s. f.* (χολή; κύστις, vejiga; ἔκτασις,

dilatación). Distensión de la vesícula biliar.

colecistectomía, *s. f.* (χολή; κύστις; ἐκτομή, ablación). Operación que consiste en extirpar la vesícula biliar.

colecistenterostomía ó colecisto-enterostomía, *s. f.* (χολή; κύστις; ἔντερον, intestino; στόμα, boca). Operación cuyo objecto es establecer una comunicación directa entre la vesícula biliar y el intestino.

colecistitis, *s. f.* Inflamación de la vesícula biliar.

colecistolitotricia (ó **tripsia**), *s. f.* (χολή; κύστις; λίθος, piedra; *terere*, moler, ó τρῖψις, trituración). Operación que consiste en triturar, á través de las paredes de la vesícula ó del canal cístico, los cálculos allí alojados, y en empujarlos hasta el interior del intestino.

colecistopexia, *s. f.* (χολή; πύστις; πήξις, fijación). Sin. *operación de Czerny.* Operación que consiste en fijar la vesícula biliar á la pared abdominal.

colecistorrafia, *s. f.* (χολή; κύστις; ῥάπτειν, coser). Sutura de una herida, operatoria ó no, de la vesícula biliar.

colecistostomía, *s. f.* (χολή; κύστις; στόμα, boca). Abertura de la vesícula biliar seguida de sutura de los labios de la incisión vesicular á los labios de la incisión cutánea.

colecistotomía, *s. f.* (χολή; κύστις; τομή, sección). Incisión de la vesícula biliar con el fin de evacuar el pus ó los cálculos que contiene.

colectomía, *s. f.* (κῶλον; ἐκτομή, ablación). Resección de una parte del colon.

colédoco-duodenostomía interna (χοληδόχος, colédoco; *duodeno*; στόμα, boca). Operación indicada en los casos de encajamiento de un cálculo en la porción terminal del colédoco. Consiste en abrir el duodeno al nivel de la ampolla de Väter, buscar el relieve formado por el cálculo y cortar sobre él para extraer el cuerpo extraño.

colédoco-enterostomía, *s f.* (χοληδόχος; ἔντερον, intestino; στόμα, boca). Operación que consiste en establecer, por medio de incisiones cuyos labios se suturan entre sí, una comunicación entre el colédoco y el intestino.

colédocolitotricia (ó **tripsia**), *s. f.* (χοληδόχος; λίθος, piedra; *terere*, moler, ó τρῖψις, trituración). Trituración, á través de la pa-

del colédoco, de los cálculos alojados en él, y expulsión de los fragmentos dentro del intestino.

colédocostomía, *s. f.* (χοληδόχος; στόμα, boca). Abertura del canal colédoco y sutura de los labios de la incisión del canal á los de la incisión cutánea.

colédocotomía, *s. f.* (χοληδόχος; τομή, sección). Incisión del colédoco con el fin de extraer de su interior cuerpos extraños que lo obstruyen.

colelitiasis, *s. f.* Formación de cálculos biliares.

colelito, *s. m.* (χολή, bilis; λίθος, piedra). Cálculo biliar.

colelitotricia ó **colelitotripsia**, *s. f.* (*colelito*: *terere*, moler ó τριψίς. trituración). Operación que consiste en triturar un cálculo en el interior del colédoco ó del canal cístico, á través las paredes del canal, ya con una pinza, ya con los dedos.

colemia, *s. f.* (χολή. bilis; αἷμα, sangre. Presencia en la sangre de los elementos de la bilis.

colemia simple familiar (Gilbert y Lereboullet). Enfermedad familial caracterizada por la presencia en el suero sanguíneo de pigmentos biliares en cantidad mayor que en el estado fisiológico, sin coluria y con tendencia á las pigmentaciones cutáneas.

colemimetría, *s. f.* (χολή; αἷμα: μέτρον, medida). Evaluación del pigmento biliar contenido en el suero sanguíneo, por medio de un aparato especial llamado *colemimetro*.

coleocele, *s. f.* (κολεός. vagina; κήλη, hernia). Hernia vaginal.

coleoptosis, *s. f.* (κολεός, vagina: πτῶσις, caida). Prolapso de la vagina.

coleostegnosis, *s. f.* (κολεός; στέγνωσις, estrechamiento). Estrechez de la vagina.

cólera, *s. m.* (etimología discutida: 1° χολή, bilis; ῥέω, fluyo; 2° χολέρα. canal, alusión al derrame incesante de las evacuaciones. Littré; 3° hebraico: *choli-ra*, mala enfermedad. Desnos). Sin. *cólera asiático*. *cólera morbus*. Enfermedad epidémica debida á la infección del organismo por una bacteria especial, el bacilo coma. Está caracterizada por un flujo gastro-intestinal abundante y la deshidratación de todos los tejidos, que provocan la perturbación profunda de todas las funciones.

cólera de los dedos. Equímosis seguidas de ulcera-

ciones muy dolorosas que se presentan en los curtidores y surradores.

cólera infantil. Sin. *enteritis coleriforme*. Enfermedad especial á la primera infancia, provocada por la mala alimentación y caracterizada por la pronta aparición de vómitos y de diarrea, con decaimiento rápido y término mortal en la mayoría de los casos.

cólera nostras. Enfermedad generalmente esporádica que se presenta hacia el fin del verano en nuestros países. Su sintomatología semeja mucho á la del cólera asiático, tanto que algunos autores consideran como una misma ambas afecciones.

coleriforme, *adj.* Se dice de las diarreas y enteritis en que el flujo intestinal se parece al que se observa en el cólera.

colerina, *s. f.* Diarrea que se observa frecuentemente durante las epidemias de cólera. Se la considera actualmente ora como la diarrea premonitoria ó primer período del cólera, ora como una forma atenuada de esta enfermedad.

coleroide, *adj.* Véase: *coleriforme*.

colerragia, *s. f.* (χολή, bilis; ῥήγνυμι, desgarro). Abundante derrame de bilis que se produce á veces al nivel de las incisiones de abcesos yquistes hepáticos, y en general en toda herida del hígado.

colesteatoma, *s. m.* (χολή; στέαρ. στέατος, sebo) (Müller). 1° Se designan con este nombre dos variedades de neoplasma: I. *col. perlado*. Sin. *epitelioma pavimentoso perlado* (Cornil y Ranvier). Tumorcillos epiteliales benignos, lobulados y enquistados, caracterizados por la presencia de gránulos formados de laminillas epidérmicas redondas y desecadas; el corte de estos tumores es brillante como colesterina, de donde el nombre propuesto por Müller. II. *colesteatoma macizo*. Tumor excepcional en el hombre, pero frecuente en el caballo. Resulta de la proliferación de las células endoteliales que tapizan los espacios sub-aracnoideos. Son endoteliomas infiltrados de colesterina. — 2° Los otologistas dan también el nombre de *colesteatoma* á masas colesteáricas que se aglomeran en la cavidad del oído y nada tienen de neoplásicas.

colibacilo, *s. m.* Sin. *bacillus coli communis*, *bacterium coli commune*. Bacilo parásito normal del intestino

del hombre y de los animales. Sus caracteres principales son la movilidad y la ausencia de coloración por el método de Gram. No patógeno en estado normal, es capaz en ciertos casos de adquirir gran virulencia; engendra entonces afecciones muy variadas: diarrea infantil, cólera nostras, etc.

colibacilosis, *s f.* Conjunto de los accidentes mórbidos causados por el colibacilo.

cólico, *s. m.* (κῶλον, colon). Este vocablo, que primitivamente designaba una afección dolorosa del colon, se aplica actualmente á los dolores situados en la mayor parte de las vísceras abdominales. Ej.: *cólicos apendiculares, hepáticos, nefríticos, espermáticos, uterinos*, etc.

cólico de plomo ó **saturnino**. Dolor abdominal muy vivo que se irradia del ombligo hacia los lomos, los muslos y las bolsas, acompañado de retracción del vientre (vientre en batea) y de los órganos abdominales, de hiperestesia cutánea, de constipación tenaz y de vómitos. Es uno de los síntomas más frecuentes del saturnismo.

colicuativo, *adj.* (*colliquescere*, licuarse). Se dice de ciertas secreciones de una abundancia anormal, que parecen resultar de la licuación de los tejidos, y que agotan profundamente los enfermos. Ej.: *sudores colicuativos*.

colirio, *s. m.* (κολλύρα, pasta no fermentada; los colirios eran primitivamente medicamentos sólidos). Medicamento destinado á ser aplicado sobre la conjuntiva.

colitis, *s. f.* (κῶλον, colon). Inflamación del colon.

colitis muco-membranosa ó **seudo-membranosa**. Véase: *enteritis muco-membranosa*.

coloboma, *s. m.* (κολοβόω, yo mutilo). Deformación congénita que consiste en una fisura situada al nivel de los párpados, del iris, de la coroide ó de la retina. Puede interesar la cara y extenderse verticalmente del labio superior al párpado inferior.

colo-colostomía, *s. f.* (κῶλον, colon; στόμα, boca). Operación que consiste en hacer comunicar, por medio de dos incisiones, cuyos labios se suturan entre sí, dos asas del intestino grueso.

coloide (sustancia) (κόλλα, cola; εἶδος, forma). Materia gelatinosa análoga á

la mucina, pero más consistente y no precipitable como ésta por el ácido acético. Es un producto de degeneración celular, ya fisiológica, como en la glándula tiroide, ya patológica (bocio, degeneración coloide de ciertos tumores).

coloidoma miliar. (Besnier). Sin.: *colloid millium* (Wagner). *hialoma* (Leloir-Vidal). Degeneración coloide del dermo. Afección muy rara de la piel, caracterizada por la formación de pequeñas eminencias brillantes, translúcidas, del tamaño de una cabeza de alfiler; producidas por la degeneración coloide de las capas superficiales del dermo.

colonectasia ó **colonectasis**, *s. f.* (κῶλον, colon; ἔκτασις dilatación). Dilatación del colon.

colonoplicación, *s. f.* (colon; *plicare*, plegar) (Bastianelli, 1905). Operación que consiste en hacer pliegues al colon con el objeto de disminuír su volumen en los casos de mega-colon.

colopatía, *s. f.* (κῶλον; πάθος, enfermedad). Afección del colon Como el término no prejuzga acerca de si es ó no inflamatoria la afección, Le Gendre lo prefiere para designar cierta colitis muco-membranosa en que el papel principal es el del elemento neuropático.

colopexia, *s. f.* (κῶλον; πήξις, fijación). Fijación del colon (S ilíaca) á la pared abdominal anterior para corregir el prolapso del recto.

colo-rectostomía, *s. f.* (κῶλον; *rectum;* στόμα, boca). Operación que consiste en establecer, por medio de incisiones cuyos labios se suturan entre sí, una comunicación entre una asa del intestino grueso (generalmente la S ilíaca) y el recto.

colorimetría, *s. f.* (*color*; μέτρον, medida). Véase: *cromometría*.

colo-sigmoidostomía, *s. f.* Entero-anastomosis entre el colon ascendente, ó el transverso, y el asa sigmoidea del intestino grueso.

colostomía, *s. f.* (κῶλον; στόμα, boca). Véase: *colotomía*.

colostro, *s m.* Primera leche de la parida. Es el « resultado de una secreción aun no establecida, ó, también, interrumpida por una causa intercurrente como la vuelta de las reglas ó la preñez en una nodriza ». (M. Duval). Es más usado actualmente: *calostro*.

colosucorrea, *s. f.* Hipersecreción de la mucosa del intestino grueso.

colotifoidea, *s. f.* **colotifus**, *s. m.* Nombre dado á las formas de la fiebre tifoidea en que las ulceraciones están situadas en el intestino grueso.

colotomía, *s. f.* (κῶλον; τομή, sección). Sin.: *colostomia*. Creación de un ano artificial abriendo y suturando al exterior el colon descendente (*colotomía lumbar*, operación de Amussat) ó la Sillaca (*colotomía iliaca*, operación de Littré).

colpeurínter, *s. m.* (κόλπος, vagina; εὐρυντήρ, ensanchador). Especie de pesario de cautcho que se introduce en la vagina y se infla con agua Su inventor lo había destinado á provocar el trabajo en el parto prematuro artificial: se le emplea aún á veces para reducir el útero invertido.

colpocele, *s. m.* (κόλπος, vagina; κηλη, hernia). Hernia vaginal.

colpoceliotomía, *s. f.* (κόλπος: κοιλία, vientre; τομή, sección). Operación que consiste en abrir la cavidad peritoneal por la vagina

colpocistostomía, *s. f.* (κόλπος; κυστις, vejiga; στόμα, boca). Talla vesical practicada à través del tabique vésico-vaginal.

colpocleisis, *s. f.* (κόλπος; κλεῖσις, cerradura). Operación que consiste en obliterar la vagina por avivamiento y sutura de sus paredes; se practica en ciertos casos de fístulas vésico-vaginales, uretro-vaginales, éntero-vaginales.

colpodesmorrafia, *s. f.* (κόλπος; δεσμός, lazo; ῥαφή, sutura) (Freund). Véase: *colpostrictura*.

colpohiperplasia quística (κόλπος; ὑπέρ, demasiado; πλάσσειν, formar) (Winkel). Véase: *paquivaginitis quística*.

colpo-histerectomía, *s. f.* Histerectomía vaginal.

colpo-histeropexia, *s. f.* (κόλπος; ὑστέρα, matriz; πῆξις, fijación). Sin.: *histeropexia vaginal, vagino-fijación del cuello*. Operación cuyo objeto es fijar el cuello del útero á la pared vaginal. Se practica contra la retroflexión uterina.

colpo-histerostomía, *f. s.* (κόλπος; ὑστέρα; στόμα, boca). (Wenners trôm). Operación destinada á extraer el feto del útero enclavado en la pequeña pelvis ó en retroflexión. Consiste en la incisión de las paredes vaginales y uterinas mantenidas en contacto la una de la otra.

colpo-perineoplas-

tia, *s. f.* (κόλπος; περίνεος, periné; πλάσσειν, formar). Operación destinada á aumentar el espesor del periné disminuyendo el orificio vulvar. Su objeto es poner remedio al prolapso de la vagina.

colpo-perineo-rrafia, *s. f.* (κόλπος; περίνεος; ῥαφή, sutura). (Hegar). Operación destinada á reformar, en totalidad ó parcialmente. el periné, suturando parte de la pared vaginal previamente avivada. Su objeto es poner remedio al prolapso de los órganos genitales.

colpoproctectomía, *s. f.* (κόλπος; πρωκτὸς, recto; ἐκτομή, resección) (Herzen, 1894). Sin.: *diacolpoproctectomía*. Operación cuyo objeto es llegar al recto por su cara anterior después de la incisión longitudinal total del tabique recto-vaginal y aún del triángulo recto-vaginal

colpoptosis, *s. f.* (κόλπος πτῶσις, caída). Prolapso de la vagina.

colporrafia, *s. f.* (κόλπος ῥαφή, sutura). Véase: *elitrorrafia*.

colpostrictura, *s. f.* (κόλπος; *strictura*, estrechez). (Jacobs). Operación que consiste en estrechar la vagina por medio de una serie de suturas que recorren circularmente las paredes del órganc.

colpotomía, *s. f.* (κόλπος; τομή, sección). Incisión del fondo de saco posterior de la vagina, practicada generalmente con el fin de evacuar las colecciones supuradas de la pequeña pelvis.

Colrat (prueba de) (1875). Sin.: *prueba de la glicosuria alimenticia*. Prueba que consiste en hacer ingerir ayunas una cantidad determinada de glicosa ó de sacarosa, y en buscar luego el azúcar en las orinas La prueba es positiva en los casos de insuficiencia hepática con permeabilidad renal normal.

columnización de la vagina (Bozeman). Taponamiento completo de la vagina empleado para combatir la congestión y la inflamación del útero y de los tejidos vecinos.

coluria, *s. f.* (χολή, bilis; οὖρον, orina). Presencia en la orina de los componentes de la bilis; generalmente acompaña la ictericia, pero puede existir sin la menor coloración ictérica de los tegumentos (*coluria* sin ictericia).

colutorio, *s. m.* (*colluere*, lavar). Medicamento líquido destinado á el

sobre las encías y las paredes de la cavidad bucal.

Colles (ley de). Véase: *Baumès (ley de).*

Colles (pústulas ó enfermedad de) (1822). Variedad de septicemia con determinación cutánea, caracterizada por síntomas generales y una erupción de pústulas cuyo pus contiene estafilococos dorados. Esta afección difiere de la viruela por la rapidez de su evolución, la ausencia de carácter epidémico, y el aspecto de las pústulas que son más superficiales.

coma, *s. m.* (κοιμαω, duermo). Estado mórbido caracterizado por un sueño profundo con pérdida total ó parcial de la inteligencia, de la sensibilidad y de la motilidad, y conservación de las funciones respiratoria y circulatoria.

coma diabético. Síndroma que se observa á veces en el curso de la diábetes sacarina, caracterizado por un conjunto de síntomas nerviosos graves, de los cuales el más importante es el coma, y que termina casi siempre por la muerte. Es la manifestación sintomática de una toxemia cuyo agente sería la acetona (véase *acetonemia*), el ácido diacético ó varios ácidos á la vez (láctico, oxibutírico, diacético) (teoría de la intoxicación ácida).

coma vígil (*vigilia*). Sin.: *coma agripnode*. Variedad de coma acompañada de delirio; el enfermo se agita y habla dormido, pero abre los ojos á la menor llamada.

coma-bacilo. Véase: *vírgula (bacilo)*

comedón, *s. m.* (*comedere*, comer). Sin.: *acné puntuado*. Lesión de las glándulas sebáceas, caracterizada por una elevacioncita blancuzca que lleva en su centro un punto negro. Su sitio preferente es la cara y especialmente la nariz. Coexiste ordinariamente con las otras variedades de acné y con la seborrea.

comicial (mal) (*morbus comitialis*). Véase: *epilepsia*.

comida ficticia. Experiencia que consiste en hacer deglutir alimentos á un perro provisto de una fístula gástrica, y cuyo esófago se abre al exterior á un lado del cuello, de manera de impedir que los alimentos lleguen al estómago. La *comida ficticia* provoca abundante secreción del jugo gástrico que es fácil recoger en estado de pureza (Pawlow).

comitata (fiebre) (*comitari*, acompañar). En la

clasificación de las fiebres palúdicas de Torti; se da este nombre á una variedad de accesos perniciosos cuya gravedad resulta del predominio de un síntoma ó de la adjunción de fenómenos anormales (en oposición á la *fiebre solitaria*).

complemento, *s. m.* (Ehrlich). Véase: *alexina*.

complexo, *s. m.* Conjunto de fenómenos patológicos que concurren al mismo efecto total. Ej.: *complexo inflamatorio*. Se trata de todos los fenómenos mórbidos en general y no sólo de los clínicamente perceptibles (síntomas), tal cual ocurre con el sindroma.

complicación, *s. f.* Síntoma, distinto de las manifestaciones habituales de una enfermedad, que sobreviene en el curso de dicha enfermedad y es consecuencia de las lesiones provocadas por ella. Las *complicaciones* agravan generalmente el pronóstico.

concreción, *s. f.* (*concrescere*, condensarse) Cuerpo extraño sólido que en el curso de diferentes afecciones se forma á veces dentro de los tejidos ó los órganos. El significado de esta palabra es más lato que el de *cálculo*.

condiloma, *s. m.* (κονδύλωμα). Pequeño tumor situado en los pliegues radiados del ano, formado por la hipertrofia del dermo, y consecutivo á ulceraciones sifilíticas.

condritis, *s. f.* (χόνδρος, cartílago). Inflamación de un cartílago.

condro-fibroma, *s. m.* Véase: *fibro-condroma*.

condroide (tejido). Variedad particular de tejido conjuntivo que presenta la resistencia y el aspecto microscópico del cartílago (Nódulo del tendón de Aquiles de la rana).

condroma, *s. m.* (χόνδρος, cartílago). Tumor formado de tejido cartilaginoso. El condroma no se desarrolla nunca á expensas de los cartílagos preexistentes.

condro-sarcoma, *s. m.* Tumor mixto constituido por tejido cartilaginoso y elementos embrionarios.

conejera, *s. f.* Foco purulento que da dificilmente salida al pus.

confusión mental. Sin.: *estupidez*. Sindroma psíquico caracterizado por torpor intelectual, ausencia casi total de ideas é imposibilidad de coordinar y apreciar las sensaciones percibidas, sin turbación emotiva como en la melancolía.

congelación, *s. f.* Efectos del frío sobre los tejidos.

congénito, *adj.* (*cum*, con; *genitus*, engendrado). Que depende de la organización del individuo tal cual se halla al nacer éste. Ej *hernia inguinal congénita*.

congestión, *s. f.* (*congerere*, acumular). Véase: *hiperemia*.

conidia, *s. f.* (disminutivo de κόνις, polvo). Variedad de *esporos* que se encuentra en los hongos y se forma por yemación ó tabicamiento de la extremidad de una rama miceliana ó hifo.

conjunción, *s. f.* (*conjugare*, reunir) (fisiología). Fusión completa de dos organismos unicelulares en uno solo.

conjuntivitis, *s. f.* Inflamación de la conjuntiva.

conminutiva (fractura) ó **conminución**, *s. f.* (*conminuere*, romper). Fractura que consta de numerosos fragmentos.

conmoción, *s. f.* Sacudimiento de un órgano por un choque ó una violencia sobre una parte lejana ó próxima. Suspende las funciones del órgano de una manera temporaria, ó permanente, sin destruir su estructura.

cono terminal (síndroma del). Conjunto de los fenómenos paralíticos que se observan en los casos de lesiones del cono terminal de la médula espinal: desórdenes de los esfínteres y de la eyaculación, anestesia de las mucosas uretral y rectal, anestesia cutánea de las regiones perineal y rectal.

consanguinidad, *s. f.* (*cum*, *sanguinis*, sangre). Relación existente entre dos individuos que tienen un procreador común. La *consanguinidad* es tanto más fuerte cuanto menos alejados están los individuos, de ese procreador común.

consensual (reflejo). La luz que hiere un ojo determina en el ojo del lado opuesto, aun cuando éste se halle en la oscuridad, un reflejo pupilar igual al que se produce del lado alumbrado. La contracción pupilar obtenida cuando la luz hiere un solo ojo es más débil que la que se produce cuando hiere los dos á la vez.

constipación, *s. f.* (*constipare*). Dificultad para evacuar el vientre.

constitución, *s. f.* Se entiende actualmente por *constitución* « todo lo que se refiere á las variaciones del individuo en la osamenta y la arquitectura del cuerpo,

en la proporciòn de los órganos, de los aparatos, del organismo entero; en la adaptaciòn física de cada parte á su función; en la repartición de la materia ya en la totalidad del organismo, ya en cada elemento. La constitución atañe, pues, á la estructura del cuerpo, es una característica estática. » (Bouchard).

constitución médica. Aspecto, manera de ser de las enfermedades reinantes considerados como modificables por las influencias cósmicas (doctrina de Hipócrates).

consunción, *s. f.* (*consumere*, consumir). Enflaquecimiento y pérdida de fuerzas que se observan en todas las enfermedades graves y prolongadas.

contagio, *s. m.* (*cum*, con; *tangere*, tocar). 1° Transmisión de una enfermedad de una persona á otra. 2° La causa material de la transmisión (sustancias orgánicas, tales como escamas, exudados que sirven de vectores á los microbios).

contagión, *s. f.* Véase : *contagio* 1°.

contagiosidad, *s. f.* Cualidad de lo que es contagioso.

contínua (fiebre). Se dice de una enfermedad febril en que la fiebre persiste sin interrupción y no cesa sino con ella. — Esta expresión sirve á veces para designar la *fiebre tifoidea.*

contracción, *s. f.* Modificación en la forma de ciertos tejidos bajo la influencia de excitaciones diversas.—*Contracciones musculares.* Acortamiento de la fibra muscular con aumento de su espesor.

contractilidad, *s. f.* Propiedad vital de cambiar de forma, que poseen ciertos tejidos.

contractura, *s. f.* (*contrahere*). Contracción prolongada é involuntaria de uno ó de varios músculos sin lesión de la fibra muscular.

contra-estimulismo, *s. m.* Véase. : *rasorismo.*

contra-indicación, *s. f.* Circunstancia que impide aplicar el tratamiento que á primera vista parecería el más eficaz para atacar la enfermedad.

contundente, *adj.* Que produce contusiones.

contusión, *s. f.* Lesión producida por la presiòn ó el choque de un cuerpo obtuso, con ó sin desgarradura de los tegumentos (herida contusa ó contusión simple).

convulsión, *s. f.* (*convellere*, sacudir). Contrac-

ciones involuntarias é instantáneas, debidas al aumento mórbido de la actividad muscular, que determinan movimientos localizados á uno ó varios grupos musculares, ó generalizados á todo el cuerpo. Según la duración de las contracciones distínguense dos variedades de *convulsiones*: *clónicas* y *tónicas*. Véase: *clonismo* y *tonismo*.

copremia, *s. f.* (κόπρος, excrementos; αἷμα, sangre) (Barnes). Accidentes tóxicos provocados por la reabsorción de las materias excrementicias en la constipación tenaz.

coprolalia, *s. f.* (κόπρος; λαλεῖν, hablar). Impulsión mórbida á lanzar interjecciones sucias ó indecentes (uno de los estigmas síquicos de los degenerados).

coprología, *s. f.* (κόπρος; λόγος, discurso). Estudio de las materias fecales.

coprostasia ó **coprostasis**, *s. f.* (κόπρος; ἵστημι, detengo). Constipación.

cópula ó **copulación**, *s. f.* (*copulare*. unir). Ayuntamiento carnal (cópula) y, más particularmente, proceso por el cual los elementos sexuales machos se ponen en contacto con los elementos hembras en el interior de los órganos genitales correspondientes.

coqueluche, *s. f.* (del francés *coqueluche*, que viene de *coqueluchon*, el capuchón con que se cubrían la cabeza los enfermos). Sin.: *pertusis*, *tos ferina*. Enfermedad epidémica, contagiosa, caracterizada por accesos de tos bajo forma de quintas, separadas una de otra por una inspiración larga y sibilante.

coqueluchoide (tos). Tos quintosa, análoga á la de la coqueluche, que se observa en los casos de compresión del nervio neumogástrico (adenopatía tráqueobrónquica).

corazón forzado (Beau). Ataque de asistolía que se presenta bruscamente á consecuencia de un esfuerzo violento ó de una fatiga prolongada.

cor bovinum (corazón de buey). Nombre dado al corazón que presenta una hipertrofia total considerable, sin modificación de su forma general.

cordel (signo del) (Pitres). Modo de exploración del tórax que consiste en tender un hilo de la horquilla esternal á la sínfisis pubiana: el apéndice jifoide se encuentra desviado á la izquierda ó á la derecha de

esta línea en caso de derrame pleural.

corditis, *s. f.* (*chorda* cuerda). Inflamación de las cuerdas vocales.

corditis tuberosa. Sin.: *laringitis granulosa.* Afección laríngea caracterizada por la presencia de pequeñas elevaciones rosadas, lisas ó aterciopeladas, sobre la faz superior de las cuerdas vocales. Se manifiesta por varias perturbaciones de la fonación.

cordonal(neurona). Neurona cuyo cilindro-eje « participa en mayor ó menor longitud á la constitución de los cordones blancos de la médula. » M. Duval).

cordón sanitario. Línea de vigilancia establecida en el límite de un país ó provincia donde reina una enfermedad pestilencial. No puede ser franqueada sino bajo ciertas condiciones que determinan los reglamentos sanitarios.

corea, *s. f.* (χορεία, baile) Nombre dado á cierto orden de manifestaciones nerviosas caracterizadas esencialmente por contracciones tónicas de los músculos, que pueden ser lentas (*corea gesticulatoria*) ó al contrario bruscas (*coreas eléctricas*). — Cuando se emplea sola, esta palabra designa una enfermedad especial, llamada también *corea de Sydenham, danza de san Vito,* caracterizada por contracciones musculares involuntarias persistentes en el reposo, y por la incoordinación de los movimientos voluntarios. Es una afección de la segunda infancia, de naturaleza aun poco conocida y cuyo origen infectivo parece probable.

corea eléctrica ó **corea falsa.** Véase: *mioclonia.*

corea fibrilar (Morvan). Forma de corea eléctrica « caracterizada por contracciones fibrilares que aparecen primero en los músculos de la pantorrilla y de la parte posterior de los muslos, y de allí pueden extenderse á los músculos del tronco y aún de uno de los miembros superiores; pero respetan siempre los músculos del cuello y de la cara ». (Morvan.)

corea hereditaria, c. crónica, c. de los viejos, c. de Húntington. Afección que reviste la forma sintomática de la corea vulgar, pero se distingue por la duración indefinida, el carácter de enfermedad hereditaria, familial, y finalmente por su aparición en la edad adulta. Algunos

autores la consideran como una variedad de la corea de Sydenham, mientras otros la tienen por una enfermedad completamente distinta.

corea histérica, gran corea, corea mayor, corea rítmada ó rítmica. Manifestación particular del histerismo, que se presenta bajo forma de accesos, durante los cuales los enfermos ejecutan una serie de movimientos que siguen un orden constante y recuerdan muy de cerca actos profesionales. Se han descrito muchas variedades de acuerdo con la naturaleza de los movimientos ejecutados, — *corea maleatoria*. El enfermo parece golpear sobre un yunque, como el herrador — *corea rotatoria*. El paciente mueve constantemente la cabeza á derecha é izquierda — *corea saltatoria*. El enfermo, al ponerse de pié, salta constantemente, etc.

corea mental. Enfermedad de la infancia caracterizada por gran instabilidad mental, é imposibilidad de fijar la atención, que hacen del niño un ser exclusivamente reflejo, variable, inconstante é inconsciente. Está acompañada á menudo de insuficiencia síquica y de retardo en el desarrollo físico.

corea paralítica ó blanda. Corea complicada de fenómenos paralíticos, ya cuando la parálisis se generaliza desde el principio (*verdadera corea blanda*), ya cuando se trata simplemente de parálisis que se presenta en un coreico.

corea variable de los degenerados (Brissaud). Afección que se ha asimilado á la enfermedad de los tics convulsivos; mas, distinta por el carácter coreiforme de los movimientos y su modificación bajo la influencia de la voluntad y la del tiempo.

corectopia, *s. f.* (κόρη, pupila; ectopia). Anomalía congénita de la pupila, que se encuentra colocada fuera del centro del iris.

coreiformes (movimientos). Véase : *amiotaxia*.

corelisis, *s. f.* (κόρη, pupila; λύσις, solución). Operación que consiste en romper las adherencias de la cara posterior del iris y de la cristaloide (sinequias) por medio de un gancho ó de una espátula (después de hacer la punción de la córnea).

corimbacterio, *s. m.* Nombre dado en Alemania á un grupo de bacterias que comprende el bacilo de la

difteria y los bacilos seudodiftéricos.

corio-epitelioma, *s. m.* Véase: *deciduoma.*

corionitis, *s. m.* Véase: *esclerodermia.*

corioplaxa, *s. m.* Células conjuntivas hipertrofiadas provistas de varios núcleos, que han sido señaladas en ciertas formas de lepra tegumentaria.

corio-retinitis, *s. f.* Retinitis complicada de coroiditis.

coriza, *s. m.* (κόριζα). Sin.: *rinitis, catarro nasal.* Inflamación aguda ó crónica de la mucosa de las fosas nasales.

cornaje, *s. m.* Término tomado á la medicina veterinaria, con que se designa un silbido laringo-traqueal bastante pronunciado para ser oído á cierta distancia.

Córning (método de). (del nombre del cirujano americano que primero inyectó en 1885 una solución de cocaína en el canal raquídeo para obtener la anestesia del segmento inferior del cuerpo). Véase: *raquicocainización.*

coroiditis, *s. f.* Inflamación de la coroide ocular. Frecuentemente repercute sobre el iris (*irido-coroiditis*).

corona de Venus (*corona Veneris*). Círculo formado al rededor de la frente por sifílides secundarias.

corona seborreica (Unna). Aspecto particular que toman ciertas formas de seborrea (costras grasosas del cuero cabelludo), cuando la lesión, del cuero cabelludo invade la frente, en donde la limita un borde neto, cubierto de escamas amarillentas que forman una especie de corona de 1 á 2 centímetros de ancho.

coronaritis, *s. f.* Arteritis de las arterias coronarias que á menudo produce la estenosis de estos vasos y determina, según algunos autores, accesos de angina de pecho.

correctivo, *adj.* y *s. m.* Sustancia que se añade á un medicamento para suavizar ó modificar su acción.

Córrigan (enfermedad de) (1832). Insuficiencia aórtica, y más especialmente insuficiencia aórtica de origen endocardítico.

Córrigan (pulso de). Pulso fuerte, rebotante, que recuerda la súbita distensión de un resorte, inmediatamente seguida de notable depresión. El trazo esfigmográfico presenta una ascensión brusca, un gancho, y un descenso rápido inter-

rumpido ordinariamente por un dicrotismo muy marcado. Este pulso pertenece á la insuficiencia aórtica.

corrugación, *s. f.* (*cum*, con, *ruga*, arruga). Fruncimiento de la piel á consecuencia de la contracción del músculo cutáneo subyacente (dícese sobre todo del escroto).

corsé (enfermedad del) (Hayem). Deformación del hígado determinada por el corsé. Si la constricción ejercida por éste es suprahepática, produce la tosis del hígado; si es hepática, el hígado se alarga y se deja deprimir por la compresión de las costillas.

Cotard (delirio de las negaciones de). Afección mental generamente consecutiva á accesos sucesivos de melancolía, ó á la hipocondría sistemática. Está caracterizada por ideas de negación y de no existencia de ciertos órganos, de ansiedad, de insomnio y de constipación. La terminación es á menudo fatal.

cotiledón placentario (κοτυληδών, cavidad) Nombre dado á los lóbulos de la cara uterina de la placenta.

Courvoisier y Terrier (ley de). La vesícula biliar se halla atrofiada en el caso de obstrucción del colédoco por un cálculo, y distendida en las obstrucciones producidas por cualquiera otra causa (cáncer).

cowperitis, *s. f.* Inflamación de las glándulas de Cowper (ó de Méry, bulbo-uretrales) casi siempre de origen blenorrágico.

cow-pox, *s. m.* (inglés *cow*, vaca: *pox*, viruela. Vacuna de la vaca. Véase: *vacuna*.

coxalgia, *s. f.* (*coxa*, cadera; ἄλγος, dolor). Algunos autores designan con este nombre todas las artritis coxo-femorales, cualquiera que sea su naturaleza Ordinariamente se reserva este nombre á las artritis tuberculosas únicamente (*coxotuberculosis* de Lannelongue).

coxalgia histérica. Sin. *enfermedad de Brodie*. Contractura histérica de los músculos del muslo, que da al miembro la actitud de la coxalgia.

coxa-valga, *s. f.* Desviación del miembro inferior en abducción y rotación externa, con limitación de la rotación interna, y alargamiento del miembro. Esta desviación se debe al enderezamiento del cuello femoral.

coxa-vara, *s. f.* De-

viación del miembro inferior en adducción y rotación externa, á consecuencia de la flexión del cuello femoral, cuyo ángulo con la diáfisis disminuye, aproximándose del ángulo recto y á veces llegando á ser agudo (raquitismo).

coxitis, *s. f* (*coxa*, cadera). Artritis aguda coxofemoral. Ej. : *coxitis gonorreica*.

coxo-tuberculosis, *s. f.* Nombre con que Lannelongue designa la coxalgia tuberculosa para evitar la confusión con las otras artritis de la cadera.

cra-cra, *s. m.* (*kra-kra*, indígena de la costa occid. de Africa). Véase : *crawcraw*.

cranectomía, *s. f.* (κρανίον, cráneo ; ἐκτομή, resección) (Lannelongue) Operación que consiste en sacar al cráneo cintas óseas á lo largo de las regiones fronto-parietales, en el caso de osificación prematura de los huesos del cráneo, para permitir el desarrollo del cerebro.

cráneoclasia, *s. f.* (κρανίον; κλαεῖν, quebrar). Extracción de la cabeza fetal por medio del cráneoclasto.

cráneoclasto, *s. m.* Instrumento cuyo objeto es extraer la cabeza después de reducir su volumen, sin triturarla por completo.

cráneo-hidrorrea, *s. f.* Véase : *hidrorrea nasal*.

cráneología, *s. f.* (κρανίον; λογός, discurso . 1° Véase : *frenología*. — 2° Parte de la antropología que se refiere al estudio del cráneo.

cráneomalacia, *s. f.* (κρανίον; μαλακός, blando). Véase : *cráneotabes*.

cráneometría, *s. f.* (κρανίον; μέτρον, medida). Ramo de la antropometría que se propone la mensuración de los huesos del cráneo en el esqueleto y en el vivo.

craneópago, *s. m.* (κρανίον; παγεῖς, unidos). Nombre dado al grupo de mónstruos dobles unidos por la extremidad cefálica.

cráneorrea, *s. f.* (κρανίον; ῥεῖν, fluir) (Freudenthal). Afección caracterizada clínicamente por la fluxión del líquido céfalo-raquídeo por la nariz, y por signos de compresión cerebral; y anatómicamente por la comunicación espontánea ó traumática entre el cráneo y la rino-faringe, y por un proceso irritativo de los espacios aracnoideos de la fosa cerebral media.

cráneoscopia, *s. f.* (κρανίον; σκοπεῖν, examinar). Véase : *frenología*.

cráneosquisis, *s. f.* (κρανίον; σχίζειν, dividir). Deformación craneana debida á la falta de osificación de la línea media.

cráneotabes, *s. f.* (κρανίον; *tabes*, reblandecimiento) (Elsässer). Deformación de los huesos del cráneo en los raquíticos, que se muestra sobre todo por espacios depresibles y blandos en el occipucio y los parietales. Esta falta de consistencia se debe á un adelgazamiento de los huesos en esos puntos.

cráneotomía, *s. f.* (κρανίον; τομή, sección). Operación que consiste en perforar el cráneo del feto.

craquido pulmonar. Ruido mórbido perceptible lo más á menudo en la inspiración, y que, como lo indica su nombre, consiste en una serie de pequeños craquidos, diferentes de los estertores, que dan la sensación de burbujas, y del frote pleural, debido al deslizamiento de una superficie no pulida sobre otra igualmente no pulida.

crasis, *s. f.* (κρᾶσις, mezcla). Constitución. Ej. : *crasis sanguínea*. Véase : *galenismo*.

crateriforme, *adj*. En forma de copa.

craurosis de la vulva (Breiski, 1885). Afección mal conocida, caracterizada por la atrofia de los tegumentos de los órganos genitales externos de la mujer, acompañada de prurito intenso. Para algunos autores sería sifilítica.

craw-craw, *s. m.* Lesión cutánea debida á una filaria (*filaria perstans*) y constituida por manchas rojas que se cubren de vesículas, luego de pústulas que contienen el parásito y finalmente de costras.

creatinemia, *s. f.* (Jaccoud), Presencia de productos de combustión incompleta (creatina, creatinina, leucina, tirosina, etc.) en la sangre. Para Schottin ella sería la causa de la uremia.

crecimiento (fiebre de). Sin. : *osteitis hiperémica no supurada, osteitis plástica del crecimiento*. Movimiento febril, á veces acompañado de síntomas generales y de dolores en las epífisis; que coincide con el crecimiento rápido y exagerado de los jóvenes, y es debido á lesiones óseas próximas á los cartílagos yusta-epifisiarios. Se la considera como el primer grado de la *osteomielitis*.

cremación, *s. f.* (*cremare*, quemar). Combustión

é incineración de los cadáveres.

cremnofobia, *s. f.* (κρεμνάω, yo cuelgo; φοβός, temor). Aprehensión angustiosa á la vista de un precipicio. Temor al vacío.

cremómetro, *s. m.* (*cremum*, crema; μέτρον, medida). Instrumento para medir la crema de la leche.

cremosa (estomatitis). Véase : *muguet*.

crepitante (estertor), crepitación pulmonar. Sin. : *estertor vesicular*. Estertor pulmonar que semeja, según Laënnec, al ruido producido por la sal cuando se la quema á un calor suave. No se oye sino á la inspiración, y se observa sobre todo en la neumonía.

crepitación, *s. f.* Ruido especial producido por el frotamiento de los dos fragmentos de un hueso fracturado (*crepitación ósea*); por la trituración de los coágulos sanguíneos de un hematoma (*crepitación sanguínea*); por la presión sobre un enfisema subcutáneo; por el frote de un tendón inflamado contra la pared rugosa de la sinovial (*crepitación de nieve*).

crestas de gallo. Vegetaciones (papiloma) de origen venéreo situadas en el surco balano-prepucial.

cretinismo, *s. m.* Enfermedad endémica en ciertas regiones montañosas (Alpes, Pirineos), caracterizada por una detención de desarrollo del organismo, por turbaciones marcadas de las facultades intelectuales ó por la ausencia de éstas. Depende de la degeneración de la glándula tiroide. Dicha afección se confunde con el bocio endémico y es su tipo más acabado.

cretino, *s. m.* (etimología discutida : 1° *creta*, á causa del tinte cretáceo; 2° *christiani*, bienaventurados). Individuo afectado de cretinismo.

cretinoide (estado). Estado particular análogo al cretinismo, provocado por la ausencia congénita, la ablación ó la atrofia de la glándula tiroide. Véase : *mixedema*.

crianestesia, *s. f.* (κρυός, frio; anestesia). Anestesia al frio.

criestesia, *s. f.* (κρυός, frio; αἴσθησις, sensibilidad). (Dieulafoy). Impresionabilidad particular al frio que se observa en los brighticos.

crimoterapia, *s. f.* (κρυμός, gran frio; θεραπεία, tratamiento). Sin. : *frigoterapia*. Método terapéutico que utiliza las temperaturas muy bajas, aquellas para las cuales el cuerpo humano es dia-

térmano, es decir deja pasar las vibraciones caloríficas sin detenerlas (aplicación del método de Pictet).

crioscopia, *s. f.* (κρυός, frio; σκοπεῖν, examinar) (Raoult). Método utilizado en química biológica para determinar el peso molecular de las sustancias disueltas. Está fundado sobre la determinación del punto de congelación de una disolución, y la comparación de este punto con el punto de congelación del líquido disolvente. Raoult ha demostrado que el descenso del punto de congelación es directamente proporcional à la cantidad de sustancia disuelta, é inversamente al peso molecular de esta sustancia.

criptocéfalo, *s. m.* (κρυπτος, oculto: κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuya cabeza está representada por algunas piezas no aparentes al exterior.

criptoftalmía, *s. f.* (κρυπτός; ὀφθαλμός, ojo). Deformación congénita de los globos oculares, que están reducidos á una pequeña vesícula sobre la cual se insertan los músculos y la que se halla oculta bajo los tegumentos.

criptogenético ó **criptogénico**, *adj.* (κρυπτός; γένεσις, generación). Se dice de una afección cuya naturaleza escapa á nuestros medios de investigación. Ej.: *anemia criptogenética*: anemia cuya causa es desconocida (por oposición á las anemias sintomáticas). — *septicemia criptogénica*. Nombre dado en Alemania á las septicemias cuyo punto de partida no se reconoce sino en la autopsia.

criptomenorrea, *s. f.* (κρυπτός; menorrea). Ausencia aparente de menstruación debida à la retención de la hemorragia menstrual por la atresia de un punto cualquiera del canal genital.

criptorquidia, *s. f.* (κρυπτός; ὄρχις, testículo). Ausencia de los testículos de las bolsas por hallarse detenidos en el abdomen.

cripto-tuberculosis, *s. f.* Tuberculosis disimulada, que se manifiesta por lesiones atribuidas á otra enfermedad.

criptózigo, *s. m.* (κρυπτός, oculto; ζύγος, yugo, zigoma). Véase: *ángulo parietal*.

crisis, *s. f.* (κρίσις, de κρίνειν, juzgar). Cambio rápido que se produce en el estado de un enfermo y anuncia casi siempre la curación. La *crisis* se manifiesta por fenómenos particulares.

caída brusca de la temperatura, diuresis y sudores abundantes.

cristalofobia, *s. f.* (κρύσταλλος, vidrio; φόβος, miedo). Angustioso temor de tocar objetos de vidrio.

crítica (edad). Véase: *menopausa.*

crocidismo, *s. m.* (κροκιδίζειν, coger ligeros copos). Véase: *carfologia.*

cromática (estrella) (χρῶμα, color). Sin.: *disco* ó *placa ecuatorial.* Estrella formada por los cromosomas dispuestos á lo largo de los filamentos del huso acromático, al nivel del ecuador (*cariocinesis*).

cromática (red). Red formada en el núcleo de la célula por las anastomosis de filamentos que presentan gran afinidad por las materias colorantes.

cromático (filamento). Véase: *cariomitoma.*

cromatina, *s. f.* (χρῶμα, color). Sin.: *nucleina.* Sustancia que presenta gran afinidad por las materias colorantes y que se encuentra bajo forma de gránulos en el filamento cromático del núcleo celular.

cromatófilos (gránulos, grumos ó elementos). Véase: *cromófilos (grumos).*

cromatolisis, *s. f.* (χρῶμα, color; λύειν, disolver). (Flemming, 1885). Modificación, degeneración y desaparición de la cromatina dentro del núcleo de la célula. La *cromatolisis* caracteriza una de las últimas fases de la evolución celular. Se emplea á veces este término erróneamente para designar la cromofilisis.

cromatómetro, *s. m.* (χρῶμα; μέτρον, medida). Véase: *cromoptómetro.*

cromidrosis, *s. f.* (χρῶμα: ἱδρώς, sudor). Turbación funcional de las glándulas sudoríparas caracterizada por el hecho de estar el sudor diversamente coloreado (amarillo, verde, negro, rojo). La cantidad de sudor es, generalmente, exagerada. La *cromidrosis* se observa sobre todo en los histéricos.

cromoblasto, *s. m.* (χρῶμα; βλαστός, célula). Sin.: *célula pigmentaria dérmica.* Nombre dado á ciertas células conjuntivas que presentan en su protoplasma granulaciones generalmente de color negro intenso.

cromo-diagnóstico, *s. m.* (Sicard). Diagnóstico de las lesiones de los centros nerviosos por el examen de la coloración del líquido cé-

falo-raquídeo. El *cromodiagnóstico* no ha sido hasta ahora empleado sino para el diagnóstico de las hemorragias: el aspecto rojo ó ambarino del líquido significa hemorragia por debajo de la dura-madre (cerebral ó meningea).

cromoflisis, *s. f.* (χρῶμα, color; φίλος, amigo: λύειν, disolver) (Retterer). Modificación, degeneración y desaparición de los corpúsculos de sustancia cromófila que se encuentran en el cuerpo de las células nerviosas. Marinesco designa erróneamente este fenómeno con el nombre de cromatolisis, aun cuando no se trate de la cromatina nuclear.

cromófilos (grumos). Sin.: *gránulos cromáticos*. Nombre dado á corpúsculos intracelulares que tienen gran afinidad por las materías colorantes.

cromógeno, *s. m.* (χρῶμα, color; γεννᾶν, engendrar). Nombre dado á ciertas sustancias incoloras por sí mismas; pero capaces bajo diversas influencias (oxidación) de dar nacimiento á productos coloridos. Ej.: *cromógeno de la urobilina*.

cromolisis, *s. f.* (χρῶμα; λύειν, disolver). Término empleado por los oftalmologistas para designar la decoloración de la retina (neuritis óptica).

cromometría de la sangre (χρῶμα; μέτρον, medida). Sin.: *colorimetría*. Evaluación de la hemoglobina de la sangre por medio de un aparato (cromómetro) que permite comparar el color de la sangre que se examina, con los tintes de una escala correspondientes á valores hemo-glóbicos conocidos, apreciados en glóbulos normales.

cromoptómetro, *s. m.* (χρῶμα: ὤψ, ojo; μέτρον). Instrumento con el que se reconoce y se mide la discromatopsia y la acromatopsia parcial (daltonismo).

cromosomas, *s. m. pl.* (χρῶμα; σῶμα, cuerpo). Nombre dado á los segmentos del filamento cromático. Estos segmentos se disponen en estrellas ó placas ecuatoriales y luego se desdoblan longitudinalmente en dos cromosomas gemelos (*cariocinesis*).

cromoterapia, *s. f.* (χρῶμα; θεραπεύειν, tratar). Terapéutica por los colores. Esta palabra se emplea sobre todo en medicina mental: se ha observado que la luz azul es calmante y la roja excitante.

cronógrafo, *s. m.* (χρόνος, tiempo; γράφειν,

inscribir) (Marey). Instrumento destinado á inscribir sobre un cilindro registrador fracciones de segundos. Permite apreciar la duración exacta de las fases de un movimiento inscrito al mismo tiempo sobre el mismo cilindro.

crunomanía, *s. f.* (χρούειν, pegar contra; μανία. manía). Impulsión que lleva á ciertos degenerados á golpearse la cabeza.

crúor, *s. m.* (*cruor*, sangre). Parte sólida de la sangre en estado fisiológico (según M. Duval). — Se designa con este nombre también el líquido rojo muy rico en glóbulos obtenido por la expresión del coágulo (Frederiqs). — También se ha llamado así el coágulo mismo.

crup, *s. m.* (expresión de origen escocez) (Home, 1765). Laringitis seudomembranosa, casi siempre de naturaleza diftérica.

crupal, *adj.* Se dice de una inflamación acompañada de falsas membranas. Ej. : *enteritis crupal.* — Para los autores alemanes la inflamación crupal sería caracterizada por la formación de un exudado fibrinoso sin alteración notable del epitelio. Ej. : *neumonía crupal* (neumonía fibrinosa).

cruro-pelvímetro, *s. m.* Instrumento que sirve para fijar matemáticamente las relaciones de la pelvis con los miembros inferiores.

Cruveilhier (enfermedad de). Ulcera simple del estómago.

cuadrigémino (pulso) (*quatuor; geminus*, gemelos). Se llama así el pulso cuando presenta periódicamente un grupo de cuatro pulsaciones separado de otro semejante por un intervalo más ó menos largo.

cuadriplejia ó **cuadruplejia,** *s. f.* (*quatuor*, cuatro ; πλήσσειν, herir). Véase : *tetraplejia.*

cuarentena, *s. f.* Estada en un lazareto, que se impone á los viajeros y mercancías procedentes de países en que reina alguna enfermedad pestilencial, antes de permitirles comunicar con los habitantes del país adonde van. El conocimiento del modo de propagarse esas enfermedades, así como las medidas eficaces de desinfección, han permitido reducir la duración actual de las *cuarentenas* y reemplazarlas casi siempre con la simple inspección sanitaria.

cuartana (fiebre). Fiebre intermitente en la que los accesos vuelven cad

cuarto dia, dejando entre sí dos dias de intervalo.

cúbito valgo. Exageración de la ligera abducción que presenta normalmente el antebrazo. Se observa sobre todo en las nujeres y está entonces en relación con la anchura de la pelvis.

cúbito varo. Deformación del codo que tiene por resultado poner en adducción el antebrazo. Se observa á veces en la fractura de la tróclea.

cubomanía, *s. f.* (κύβος, juego de dados; μανία, manía). Impulsión mórbida hacia el juego.

cucurbitino, *s. m.* (*cucurbita*, curga). Los anillos de tenia expulsados separadamente (á causa de la semejanza con semillas de cucurbitáceas).

cuerda dorsal (*chorda dorsalis*). Sin. : *notocordio*. Cordón celular que se extiende, en toda la longitud del embrión, sobre el eje nervioso. Este cordón es la primera señal de la columna vertebral.

cuerno cutáneo. Lesión rara de la piel, constituida por un espesamiento circunscrito de las capas córneas de la epidermis, el cual reposa sobre papilas hipertrofiadas y forma emi-nencias duras, rectas ó encorvadas sobre sí mismas. Estos cuernos se desarrollan á veces sobre las mucosas (glande, prepucio).

cuero nuevo (ruido de). (Collin, 1824). Frote intenso observado en la pericarditis seca.

cuerpo extraño. Cuerpo inerte alojado en un punto del organismo, ora llegado del exterior (proyectil), ora formado en el mismo lugar (cálculo, fragmento óseo); pero que no es, ó no es ya más, parte de la economía y no participa de su vida.

cuerpo fibroso. Véase: *fibroma*.

cuerpo granuloso. Elementos celulares que se encuentran en gran número de lesiones del sistema nervioso (reblandecimiento cerebral, etc.) : son leucocitos de grandes dimensiones cargados de granulaciones grasosas.

cuerpo lúteo. Sin. : *oariulo* (Rodin), *metoarion* (Raciborski). Vestigio de la vesícula de Graaf después de su ruptura y de la caída del óvulo. Cuando la ovulación ha sido seguida de fecundación el cuerpo amarillo es mucho más voluminoso y más persistente (*cuerpo lúteo* de la preñez) que cuando no ha habido fecun-

dación (*cuerpo lúteo* de la menstruación).

cuerpo muriforme. Nombre dado al grupo de células que forman el vitelo cuando ha terminado la segmentación.

Cuignet (método de). Véase : *esciascopia.*

cumis, *s. m.* (*koumis*). Leche fermentada de yegua.

cúneo-histerectomía, *s. f.* Excisión de una cuña de pared uterina sin tocar á la mucosa. Esta operación hecha por la vía vaginal ó abdominal tiene por objeto enderezar el eje uterino en los casos de flexión de este órgano.

cuotidiana (fiebre) (*quotus dies*, cada dia). Forma de fiebre intermitente en la que los accesos se repiten todos los dias. Se llama *cuotidiana simple*, *doble*, *triple*, según el número de accesos cuotidianos.

cura de terreno. Véase : *Œrtel* (*método de*).

cura radical. Operación destinada á remediar de manera completa y definitiva una deformación (hernia) ó una lesión (hidrocele).

curarizante, *adj.* Se dice de las sustancias que obran como el curare, suprimiendo la acción de los nervios motores sobre los músculos.

curetaje, *s. m.* (francés, *curettage*). Véase : *raspado.*

Curschmann (espirales de). Sin. : *exudado espiroide.* Pelotones de filamentos mucosos arrollados en espiral y atravesados por una cavidad central llena de aire, que se observa en la expectoración de los asmáticos.

cutáneo (signo del) (Babinski). La contracción del músculo cutáneo es más enérgica del lado sano que del lado paralizado, en la hemiplejia orgánica.

cute, *s. m.* Véase : *carare.*

cutitis, *s. f.* (*cutis*). Nombre dado por Blandin á la inflamación del dermis en la erisipela.

Czerny (operación de). Véase : *colecistopexia.*

CH

chalán (signo del) (Marjolin). Signo causado por la ligera claudicación que señala á menudo el principio de la coxalgia. Consiste en la desigualdad del ritmo de la marcha, más perceptible al oído que á la vista. (Es así como los chalanes reconocen el más ligero grado de cojera en los caballos.)

chalazión, *s. m.* (χάλαξα, granizo). Tumorcillo palpebral de origen inflamatorio, adherente al cartílago tarso y sin conexión con la piel.

chalazodermia, *s. f.* (χάλασις, relajamiento; δέρμα, piel). Sin. : *dermatolisis*. Estado particular, ordinariamente congénito, de la piel de ciertas regiones (palpebral, facial, abdominal, genital, que consiste en la formación de pliegues espesos, que caen cubriendo las regiones situadas por debajo.

chancro, *s. m.* (*cancer*). Nombre dado actualmente á dos ulceraciones venéreas muy distintas. — 1° *chancro indurado*. Sin. : *ch. infectante, ch. hunteriano*. Accidente primitivo de la sífilis, que resulta de la inoculación del virus. — 2° *chancro blando ó simple*. Sin. : *chancrillo, chancroide*. Enfermedad específica local que consiste en una úlcera especial que segrega pus inoculable.

chancrillo ó **chancroide,** *s. m.* Véase : *chancro blando*.

Chaput (botón anastomótico de). Anillo elíptico de estaño cuya sección presenta la forma de una U de concavidad vuelta hacia fuera. Su objeto es mantener en contacto los labios de ambos orificios cuando se practica la gastroénterostomía ó la ênteroanastomosis. Ofrece más ancha comunicación que el botón de Murphy; su aplicación es más fácil y más segura.

Charcot (enfermedad de). Véase : *esclerosis lateral amiotrófica*.

Charcot-Leyden (cristales de). Sin : *cristales asmáticos* (Leyden). Cristales octaédricos formados probablemente por osfatos, encontrados por Leyden

en la expectoración de los asmáticos, y por Charcot en el bazo y la médula de los huesos leucémicos.

Charcot-Marie (signo de). Temblor menudo y rápido que es uno de los signos cardinales del bocio exoftálmico.

Charcot-Marie (tipo). Variedad de atrofia muscular progresiva que invade sucesivamente los pies, las piernas, las manos, etc., y está acompañada de temblor fibrilar y de reacción de degeneración.

Chaussier (areola vesicular de). Círculo de vesículas que rodean la escara central de la pústula maligna.

Chaussier (signo de). Dolor en el hueco epigástrico en la albuminuria gravídica.

Cherchewski (enfermedad de). Atonía intestinal frecuente en los neurasténicos y capaz de simular, en los casos intensos, la obstrucción intestinal.

Cheyne-Stokes (respiración de). Variedad especial de ritmo respiratorio, caracterizada por un período de apnea más ó menos largo, al cual sigue una serie de respiraciones de amplitud creciente, seguida de otra serie de amplitud decreciente, y termina por una nueva pausa. Este tipo se observa sobre todo en la uremia.

Chicago (operación de). Véase : *raqui-cocainización.*

chis chas metálico. Ruido perceptible á la auscultación, análogo al que produciría la caída de algunos granos de plomo en una copa metálica. Es una variedad del retintín métálico.

choque operatorio, choque traumático. Estado mórbido especial consecutivo á los grandes traumatismos, caracterizado por estupor sin pérdida completa del conocimiento y por descenso bastante considerable de la temperatura.

Chvostek (signo de) (1878). Excitabilidad mecánica de los nervios y de los músculos en la tetania, fuera de los accesos.

D

dacnomanía, *s. f.* (δάκνειν, morder; μανία. manía). Impulsión, de ciertos degenerados, á morder.

dacnomomanía, *s. f.* Impulsión, de ciertos degenerados, á morderse ellos mismos.

dacrioadenitis, *s. f.* (δάκρυον, lágrima; ἀδήν, glándula). Inflamación de la glándula lacrimal.

dacriocistitis, *s. f.* (δάκρυον; κύστις, vejiga). Inflamación del saco lacrimal. Casi siempre se halla acompañada de inflamación del canal nasal.

dacriolito, *s. m.* (δάκρυον; λίθος, piedra). Cálculo formado en los conductos lacrimales (lo más á menudo en el conducto inferior).

dacrion, *s. m.* (δάκρυον) (antropología). Punto situado al lado de la raíz de la nariz, en el que se encuentran el frontal, el unguis y la apófisis ascendente del maxilar superior.

dacriops, *s. m.* (δάκρυ; ὤψ, ojo). Nombre dado por los autores antiguos á los quistes de la porción palpebral de la glándula lacrimal.

dáctilo (ruido de) (Peter). Ritmo de los ruidos cardíacos en la estrechez mitral, cuando se ausculta en la base. Por el desdoblamiento del segundo tiempo se oyen tres ruidos, los dos últimos de los cuales son breves y seguidos; de donde la comparación con el dáctilo, compuesto de una larga y dos breves, — ∪ ∪.

dactilitis, *s. f.* (δάκτυλος, dedo). Panadizo. Inflamación de un dedo. — Casi no se emplea el término sino para designar la localización de accidentes terciarios en los dedos : *dactilitis sifilítica.*

daltonismo, *s. m.* Desorden de la vista, quec onsiste en la abolición de la percepción de ciertos colores, generalmente el rojo y el verde. (Descrito por Dalton, físico inglés, que padecía de esta afección).

Damoiseau (curva de) (1842). Curva parabólica de convexidad superior que forma el límite superior de los derrames pleuríticos.

Dance (signo de). Depresión del flanco derecho observada á veces en los niños atacados de invaginación intestinal crónica.

Darier (enfermedad de). Véase : *psorospermosis folicular vegetante.*

darvinismo, *s. m.* (Darwin). Teoría que explica el *transformismo* por la selección natural debida á la lucha por la existencia.

decalvación, *s. f.* (*decalvatio*, acción de raparse la cabeza). Sin.: *deglabración.* Acción de encalvecer.

decidua, *s. f.* Véase : *caduca.*

deciduoma maligno (decidua, caduca). Sin. : *corio-epitelioma.* Variedad de tumor maligno del útero que se desarrolla después del parto ó de un aborto, y que toma origen probablemente á expensas de restos de caduca retenidos en el útero.

decocción, *s f.* (*decoquere*, cocer). 1° Ebullición en un líquido, de sustancias medicamentosas, para extraer los principios activos. — 2° Líquido que resulta de esta operación.

decolación, *s. f.* (*de*, partícula separativa; *collum* cuello). Sin. : *derotomía, destroncación.* Operación que consiste en seccionar el cuello de un feto muerto, cuando la extracción es imposible de otra manera.

decúbito, *s. m.* Término que designa la actitud del cuerpo ostendido sobre un plano horizontal : *decúbito dorsal, d. ventral, d. lateral.*

decúbito agudo, ú **ominoso** (Charcot). Las escaras de marcha rápida que se observan en las neuropatías graves y sobre todo en los hemipléjicos. Su sitio indica que son provocadas á la vez por el decúbito del enfermo y por la localización de la lesión nerviosa.

decusación, *s. f.* (*decusatio*). Cruzamiento en X. — Esta palabra sirve sobre todo para designar el entrecruzamiento de las pirámides del bulbo.

dedo de resorte. Detención brusca en el movimiento de flexión ó de extensión de un dedo, seguida de una especie de salto que termina súbitamente el movimiento, como si el dedo estuviera movido por un resorte. Los dedos más á menudo atacados de esta afección son el pulgar y el anular.

dedo muerto. Adormecimiento doloroso con hormigueo y calambres, acompañado frecuentemente de palidez y de insensibilidad de los extremos de los dedos. Esta perturbación vaso-motora ha sido señalada en cierto número

de afecciones generales ó locales (enfermedad de Raynaud, nefritis crónica, etc.).

dedoladera (vendaje en). Vendaje arrollado oblicuamente de manera que cada vuelta de la venda cubra los dos tercios de la vuelta precedente.

dedo en martillo ó **dedo cuello de cisne.** (Nelaton). Desviación de los dedos del pie, que consiste en la extensión forzada de la primera falange con flexión de las dos últimas.

dedos del pié (fenómeno de los) (Babinski). Extensión del dedo gordo, y accesoriamente de los otros cuatro, bajo la influencia de la excitación de la planta del pié, que normalmente provoca la flexión. Este signo se halla en relación con una lesión del manojo piramidal.

dedolar, *v.* (*dedolare*). Cortar con el instrumento cortante mantenido muy oblicuamente de manera de no quitar sino las partes superficiales. Ej. : *disecar dedolando.*

defecación, *s. f.* (*de*, fuera de; *fœces*, heces). 1° Expulsión de las heces por el extremo inferior del recto. — 2° Separación de los sedimentos que se forman en un líquido y decoloración de este líquido por medio del negro animal, del sub-acetato de plomo ó de otra sustancia.

defervescencia, *s. f.* (*defervescere*, enfriarse). Disminución ó desaparición completa de la fiebre.

deficiens (uterus) (*deficiens*, que falta). Ausencia total congénita del útero.

degeneración, *s. f.* Alteración orgánica de un tejido ó de un órgano, cuyo resultado es dificultar ó suprimir su funcionamiento.

degeneración mental. Sin. : *disgenesia cerebral.* Degeneración del individuo, resultante de la transmisión hereditaria tanto de las alteraciones físicas como de las máculas sicológicas y morales.

degeneración (reacción de). Véase : *reaccion de degeneración.*

deglabración, *s. f.* (*deglabrare*, caerse el pelo). Véase : *decalvación.*

Deiters (prolongamiento de). El prolongamiento nervioso único emanado de cada célula nerviosa. Llega á ser el cilindro-eje de una fibra nerviosa.

Deiters (síndroma del núcleo de) (P. Bonnier, 1903). Síndroma atribuido á una lesión del nú-

cleo de Deiters (bulbo), caracterizado por vértigo con flaqueza parcial ó total del aparato de sustentación, perturbaciones óculo-motoras reflejas, estado nauseoso y angustioso, fenómenos auditivos pasajeros y manifestaciones dolorosas en ciertos dominios del trigémino.

Déjerine-Klumpke (sindroma de). Parálisis radicular inferior del plexo braquial (asociación de perturbaciones oculares y de fenómenos paralíticos del brazo).

Déjerine-Sottas (tipo). Variedad de amiotrofia que comienza en la infancia, caracterizada por la atrofia muscular progresiva de las extremidades, asociada á los síntomas del tabes vulgar, á la cifo-escoliosis y á una hipertrofia de los troncos nerviosos accessibles al tacto.

delantal, *s. m.* (antropología). Nombre dado á la porción de los pequeños labios que, en las negras y sobre todo en las Hotentotas, pende de la vulva y puede alcanzar de 15 á 18 centímetros de longitud.

delirio, *s. m.* (*de*, fuera de; *lira*, la línea). Turbación de las facultades intelectuales. Alteración de conciencia.

delirio agudo (Calmeil). Forma de locura de evolución rápida, con fiebre y síntomas generales que podrían tomarse por una flegmasia local ó general (fiebre tifoidea en particular). La caracterizan una agitación extrema, alucinaciones, sitiofobia, y termina lo más á menudo por colapso y muerte. Por el examen histológico se comprueba la cromatolisis, y luego la destrucción completa de las células nerviosas y de sus prolongamientos. Se admite que esta afección es de naturaleza toxi-infectiva y que puede ser causada por diferentes gérmenes patógenos.

delirio crónico (Magnan), **delirio sistemático progresivo** (Cullerre). Véase : *persecución* (*delirio de*).

delirio del tacto. Horror al contacto de ciertos objetos ó de determinados individuos.

delirio metabólico ó **de transformación.** Delirio proveniente de la perversión de la cenestesia ó sentido de la vida. El paciente se cree cambiado en otra persona, en animales, en objetos, y presenta igualmente perturbaciones de la noción del tiempo y del espacio.

delirium tremens. Delirio alcohólico agudo con agitación y temblor.

demencia, *s. f.* (*de*, fuera de; *mens*, mente). Disminución considerable ó pérdida completa de las funciones intelectuales, acompañada ó no de perversión de los instintos. La *demencia* puede tener causas variables y presentarse á cualquiera edad. Es una regresión, mientras la idiotez es una detención de desarrollo.

demencia paralítica (Baillarger). Véase : *parálisis general.*

demencia precoz. Véase : *hebefrenia.*

demencias vesánicas. Nombre genérico con el que « se designan generalmente los estados de decaimiento permanente, progresivo y definitivo de las facultades intelectuales, morales y afectivas, que son consecutivos á las sicosis » (Deny).

demodex folliculorum. Parásito vermiforme del orden de los Acarios que se encuentra en las glándulas sebáceas y en los folículos pilosos.

demografía, *s. f.* (δῆμος, pueblo; γράφειν, escribir). Estadística aplicada al estudio colectivo del hombre. Estudia el estado y los movimientos de la población.

demonomanía *s. f.* (δαίμων, demonio; μανία). Delirio sistemático, de orden religioso, cuyo principal objeto es el temor del infierno y del demonio. — La *demonomanía* comprende como variedades : la *demonopatía*, caracterizada por la convicción de estar poseido del diablo, y la *demonolatría*, en la que el enfermo se cree destinado al culto del demonio.

dengue, *s. m.* Enfermedad epidémica y contagiosa especial de los países cálidos, caracterizada por dolores musculares y articulares y un exantema polimorfo.

dentinarios (gránulos). Pequeñas concreciones calcáreas que infiltran ciertos odontomas odontoplásticos no dentificados, y que comunican á estos tumores una dureza ósea.

deontología, *s. f.* (δέον, deber; λόγος, discurso). « Parte de la medicina que trata de los deberes (y, según algunos, de los derechos) de los médicos » (Littré).

depilación, *s. f.* (*de* priv.; *pilus*). Arrancamiento del pelo, ó su caída.

depleción, *s. f.* Disminución de la cantidad de líquido, y en especial de

sangre, contenido en la economía ó acumulado en un órgano.

depletivo, *adj.* y *s. m.* (*deplere*, vaciar). Medicamento destinado á disminuir la cantidad de líquido contenido en el organismo.

depravación, *s. f.* Estado en el que los deseos sensoriales se hallan pervertidos. Ej. *depravación del gusto, del olfato*, etc.

depurativo, *adj.* y *s. m.* Medicamento que se consideraba antes como capaz de purgar los humores de sus principios nocivos.

deradelfo, *s. m.* (δέρη, cuello; ἀδελφός, hermano) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruos dobles monocéfalos que presentan los caracteres siguientes: troncos separados por debajo del ombligo, reunidos por encima, tres ó cuatro miembros torácicos, una sola cabeza, sin parte alguna supernumeraria exterior.

Dercum (enfermedad de) (1888) Sin. *adiposis dolorosa*. Afección caracterizada clínicamente por la presencia de masas adiposas dolorosas, dispuestas sobre el tronco y los miembros, obesidad, perturbaciones sensitivas y síquicas, astenia muscular y término fatal; anatómicamente por la calcificación parcial ó total de la glándula tiroide con ó sin atrofia.

derencéfalo, *s. m.* (δέρη, cuello; εγκέφαλος, encéfalo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruos que tienen el cráneo anchamente abiertos arriba y atrás. La detención de desarrollo puede extenderse hasta las vértebras cervicales. No existen ni cerebro ni médula en el sitio de la deformación.

derivación (abceso de) (Dieulafoy). Véase: *fijación (abceso de)*.

dermalgia ó **dermatalgia**, *s. f.* (δέρμα, piel; ἄλγος, dolor) Dolor espontáneo sentido en la piel fuera de toda lesión apreciable del tegumento ó del sistema nervioso. Ciertos autores extienden este nombre á todos los dolores cutáneos sin lesiones de la piel, y describen así una *dermalgia* sintomática de las afecciones nerviosas (tabes).

dermatitis, *s. f.* (δέρμα, piel). Sin. *dermitis*. Inflamación de la piel.

dermatitis contusiforme. Véase: *eritema nudoso*.

dermatitis exfoliatriz de los recién nacidos. (Ritter, 1879). Septicemia cutánea de origen mal determinado, caracteri-

za la por una descamación abundante, complicada con fisuras, erosiones, abcesos y aún lesiones viscerales capaces de producir la muerte.

dermatitis herpetiforme (Duhring) ó **dermatitis polimorfa dolorosa crónica de ataques sucesivos** (Brocq). Afección cutánea caracterizada por una erupción polimorfa cuyo elemento más importante es la vejiga, por fenómenos dolorosos, su duración muy larga, y finalmente, por la conservación de un buen estado general. Entra en el grupo de las afecciones vejigosas ó penfigoides.

dermatofobia, *s. f.* (δέρμα, φόβος, temor). « Excesivo temor que provoca en algunos individuos la existencia de lesiones cutáneas ó la posibilidad de su desarrollo » (Thibierge).

dermatofitia, *s. f.* (δέρμα; φυτόν, planta). Véase: *dermatomicosis.*

dermatología, *s. f.* (δέρμα; λόγος, discurso). Parte de la patología que trata de las enfermedades de la piel.

dermatolisia, *s. f.* (δέρμα; λύειν relajar). Véase: *chalasodermia.*

dermatolisis, *s. f.* Sin. *paquidermatocele.* Tumor voluminoso de la piel, de naturaleza conjuntiva, que se relaciona con la afección descrita bajo el nombre de *fibroma molluscum*, y acompañada á menudo de gran número de tumorcillos de la misma naturaleza, pero de mucho menor volumen.

dermatoma, *s. m.* (Besnier). Nombre que dan algunos autores á los neoplasmas cutáneos.

dermatomicosis, *s. f.* (δέρμα; μύκης, hongo). Sin. *dermatofitia.* Nombre genérico de las enfermedades de la piel causadas por hongos parásitos (dermatofitos).

dermatomioma, *s. m.* (δέρμα; μύς, músculo). Mioma de la piel desarrollado á expensas de las fibras musculares lisas, y, por consiguiente, que se observa sobre todo en los puntos en que éstas son más abundantes (senos, partes genitales).

dermatomiositis, *s. f.* (Unverricht, 1891). Afección de causa mal conocida, constituida por la inflamación simultánea de ciertos grupos musculares y de los tegumentos que los cubren.

dermatoneurosis, *s. f.* « Afección cutánea secundaria á una manifestación del sistema nervioso central,

ganglionar ó periférico » (Leloir). Las *dermatoneurosis* pueden ser *sensitivas* (dermalgias), *motoras* (piel anserina), *vaso-motoras* (enfermedad de Raynaud, urticaria), *tróficas* (trofoneurosis cutáneas, en las cuales entran afecciones de aspecto sintomático muy variable, y cuyo tipo es el mal perforante).

dermatorragia, *s. f.* (δέρμα. piel; ῥήγνυμι, yo desgarro). Hemorragia cutánea.

dermatosclerosis, *s. f.* Véase : *esclerodermia.*

dermatosis, *s. f.* Nombre genérico de todas las afecciones de la piel.

dermatoterapia, *s. f.* (δέρμα, piel; θεραπεύειν tratar). Nombre empleado á veces para designar el tratamiento de las enfermedades de la piel.

dermatozoonosis, *s. f.* (δέρμα: ζῶον, animal). Afección de la piel provocada por animales parásitos

dermitis, *s. f.* Véase : *dermatitis*

dermocimo, *s. m.* (δέρμα; κῦμα, feto) (I. G. Saint-Hilaire). Tumor subcutáneo formado por una masa en que se encuentran vestigios de feto. I. G. Saint-Hilaire lo considera como un monstruo parasitario. Actualmente se le tiene más bien por un quiste dermoideo.

dermografía, *s. f.* ó **dermografismo**, *s. m.* (δέρμα; γραφή, escritura). Sin. *autografismo, dermatosis estéreográfica.* Propiedad que posee la piel de ciertos individuos de tumefacerse cuando se pasa sobre el tegumento la punta de un instrumento obtuso; se ve aparecer en los puntos tocados un vivo rubor y luego una elevación blanco-rosada, urticariana, que sigue exactamente la línea trazada por el instrumento. De allí la posibilidad de hacer sobre la piel inscripciones más ó menos duraderas. La *dermografía* se muestra sobre todo en los neurópatas.

dermoide ó **dermoideo (quiste)** (δέρμα; εἶδος, forma). Quiste cuya pared posee la estructura de la piel. Puede contener diferentes órganos derivados del dermo ó de la epidermis (glándulas pilo-sebáceas y sudoríparas, pelos, uñas, dientes, etc.).

dermoide ó **dermoideo (tumor)**. Producción congénita, no quística, de estructura dermoide, situada sobre una mucosa, lo más á menudo sobre la conjuntiva (*d. ocular*), á veces sobre la mucosa bucal ó la mucosa de las vías urinarias.

derodimo, *s. m.* (δερή,

nuca; δίδυμος, doble). (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble que presenta dos cabezas sobre un solo cuerpo. Posee dos columnas vertebrales vecinas que sólo se separan en la región cervical.

derotomía, *s. f.* (δερή; τομή, sección). Véase: *decolación.*

desarticulación, *s. f.* Amputación á nivel de una articulación ó en la contigüidad.

desasimilación, *s. f.* Fenómeno vital en virtud del cual ciertos principios que participan en la composición de un ser vivo, se separan de la sustancia de este y son eliminados del organismo.

desbridamiento, *s. m.* Operación que tiene por objeto hacer desaparecer la estrangulación de un órgano, ó de parte de un órgano, por la sección de *la brida* que lo comprime. Ej.: *desbridamiento de las hernias.* — También se da este nombre á la ancha abertura de los focos purulentos.

descamación, *s. f.* (*de,* priv.; *squama,* escama) Exfoliación de la epidermis bajo forma de escamas pulverulentas ó de placas más ó menos extensas.

descamación marginal aberrante de la lengua. (Brocq). Sin. *pitiriasis lingual, lengua en carta geográfica* (Archambaud), *glositis exfoliatrix marginada* (Fournier), *exema en áreas ó exema marginado descamativo de la lengua* (Besnier). Afección de la mucosa lingual, de naturaleza mal conocida, mas no sifilítica, que se observa de preferencia en los niños, caracterizada por una descamación que se efectúa en placas aberrantes, limitadas hacia el lado por donde se extienden, por un rodete blanco circinado.

descapsulación total del riñón. Véase: *Edebohls* (*operación de*).

descemetitis, *s. f.* Véase: *queratitis puntuada.*

descloruración (cura de) (Widal). Método dietético que tiene como base la restricción de los cloruros alimenticios y se aplica á la cura de las hidropesías de origen renal ú otro.

desfallecimiento, *s. m.* Primer grado del sincope.

desfibrinación, *s. f.* Sustracción de la fibrina de la sangre por el batido. La sangre desfibrinada consta de suero y glóbulos y no es coagulable.

desflexión, *s. f.* Exten-

sión de la cabeza del feto durante el parto.

desfloración, *s. f.* Acción de quitar á una doncella la virginidad.

desfloraje ó **desfloro**, *s. m.* Modo de masaje que consiste en pasar ligeramente la mano entera ó los extremos de los dedos, ó bien la cara dorsal de las falanges, con el puño cerrado, sobre la parte que se trata. Obra rechazando hacia las venas y los vasos linfáticos el líquido derramado en el tejido celular sub-cutáneo.

desinfección, *s. f.* Operación que tiene por objeto limpiar los tegumentos (manos, campo operatorio, cavidad orgánica), las paredes de una pieza (sala de hospital, de operación, habitaciones), los vestidos, tapices, colgaduras, colchones, etc., de los gérmenes que en ellos se encuentran. Para ello se emplean medios mecánicos (lavado con jabón y cepillo), ó medios físicos (calor seco ó húmedo) ó medios químicos (antisépticos).

desmineralización, *s. f.* Eliminación por los excreta de una cantidad exagerada de sustancias minerales (fósforo, potasa, cal, soda, etc.), observada en las caquexias, principalmente en la tuberculosis.

desmiógnato, *s. m.* δέσμιος, unido; γνάθος, mandíbula) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble parasitario caracterizado por una cabeza supernumeraria é imperfecta, unida al feto principal por ligaduras musculares y cutáneas, no óseas, bajo el cuello.

desmoide (reacción). (Sahli) (δέσμος, lazo). Procedimiento de examen del quimismo gástrico, basado sobre la ingestión por el paciente de un saquito cerrado por un lazo de catgut que es disuelto por el jugo gástrico. El saquito contiene una sustancia fácil de descubrir en la orina (yodoformo ó azul de metileno), en la que no aparece sino cuando la digestión gástrica se efectúa normalmente (*reacción desmoide positiva*).

desmon, *s. m.* (δέσμος, lazo) (London). Véase: *sensibilizatriz*.

desmopatía, *s. f.* (δέσμος, lazo; πάθος, afección). Afección de los ligamentos.

desmorfinización, *s. f.* Tratamiento de la morfinomanía por la supresión, brusca, rápida ó lenta, de la morfina.

desmorrexia, *s. f.*

(δέσμος; ῥῆξις, ruptura). Ruptura de los ligamentos.

desnutrición, *s. f.* Desorden de la nutrición en que la desasimilación es mucho mayor que la asimilación.

destete, *s. m.* Acción de apartar el niño de la lactancia por el pecho de la madre ó de otra criadora.

destroncación, *s. f.* Véase : *decolación*.

desviación conjunta de los ojos. Desviación de ambos ojos en el mismo sentido. Se observa sobre todo en la apoplejía y entonces acompañada de desviación de la cabeza en el mismo sentido (*desviación conjunta de la cabeza y de los ojos*).

deuteropatía, *s. f.* (δεύτερος, segundo; πάθος, enfermedad). Afección secundaria á otra enfermedad.

deuteroscopia, *s. f.* (δεύτερος. σκοπειν, examinar). Véase : *autoscopia externa*.

deutoneurona, *s. m.* Segundo y último neurona de la cadena centrípeta ó centrífuga del arco reflejo.

dextrocardia, *s. f* (*dexter*, á la derecha: καρδία, corazón). Cambio de lugar del corazón que se encuentra empujado hacia la derecha por un tumor intratorácico ó un derrame pleural izquierdo, ó bien atraído hacia ese lado y mantenido por adherencias pleurales ó por la esclerosis del pulmón.

dextrógiro, *adj.* (*dexter*, á la derecha; *gyro*, giro). Que hace girar hacia la derecha. Ej. : fibras del oculo-motor común que determinan la rotación de los ojos hacia la derecha. Dextrosis ó glicosis, azúcar que desvia el plan de polarización á la derecha.

diábetes, *s. f.* (διαβαίνειν, pasar á través). Término genérico bajo el cual se designan varias especies mórbidas distintas, cuyos caracteres comunes son : aumento del hambre y de la sed, exageración de la cantidad de orina emitida, con modificación de su composición química, finalmente, caquexia consuntiva que termina por la muerte. — Se emplea á veces la palabra *diábetes*, sin calificativo, para designar la forma más frecuente : *la diábetes sacarina*.

diábetes azotúrica. Afección caracterizada por los síntomas ordinarios de la diábetes, sin glicosuria, pero con aumento de la excreción de la úrea en la orina.

diábetes broncea-

da. (Hanot y Chauffard, 1882). Sin. : *cirrosis pigmentaria diabética*. Enfermedad caracterizada por la coexistencia de una cirrosis hipertrófica, de una diábetes sacarina de intensidad media, y de melanodermia generalizada.

diábetes frustrada (Achard). Forma suave de la diábetes sacarina, en la que la glicosuria sólo aparece después de una inyección hipodérmica de glicosis, á consecuencia de la desaparición del poder glicolítico de los tejidos.

diábetes hidrúrica. Afección caracterizada por los síntomas ordinarios de la diábetes, sin glicosuria, y con aumento considerable de la eliminación de agua, como única modificación química de las orinas.

diábetes insípida. Variedad de diábetes caracterizada por la ausencia de azúcar en la orina, en oposición á la diábetes sacarina. La *diábetes insípida* comprende dos afecciones diferentes : la *d. hidrúrica* y la *d. azotúrica*.

diábetes sacarina. Afección caracterizada por glicosuria persistente con hiperglicemia, asociadas á los síntomas ordinarios de la diábetes. Presenta distintas variedades : — la *diábetes artrítica*, enfermedad de la nutrición; — *diábetes pancreática* y *d. nerviosa*, afecciones en que los síntomas ordinarios de la diábetes sacarina dependen de la existencia de lesiones del páncreas y del bulbo (piso del 4° ventrículo); — *diábetes renal*, en que el filtro renal deja pasar el azúcar normalmente contenido en la sangre, ó lo fabrica con elementos contenidos en ella; — *diábetes tóxicas*, provocadas por sustancias que obran ya sobre el bulbo, ya sobre el riñón (floridzina).

diabétide, *s. f.* (Fournier). Accidentes cutáneos observados en el curso de la diábetes, de los cuales unos están en relación con la alteración general de la economía (ántrax, gangrenas, etc.), y otros son debidos á la acción irritante local de las secreciones cargadas de azúcar (erupciones exematiformes de los órganos genitales en la glicosuria).

diablo (ruido de). Sin. : *ruido de torno*. Ruido vascular contínuo, con reforzamiento, de timbre bajo, que se produce en la yugular interna. Se le oye cuando se apoya suavemente el estetoscopio sobre esta vena en las cloróticas.

diaceturia, *s f.* Presencia en la orina de ácido diacético (revelada por la reacción de Gerhardt). Indicaría una intoxicación por el ácido diacetúrico, que para ciertos autores sería la causa del coma diabético (teoría de la diaceturia).

diacolpoproctectomía, *s. f.* Véase : *colpoproctectomía.*

diácope, ó **diacopea**, *s. f.* (διά. pref. disyuntivo; κόπτειν. cortar). Herida oblicua del cráneo, ó de cualquier hueso, por instrumento cortante que ha tallado un colgajo óseo sin desprenderlo por completo.

diacrítico, *adj.* (διά; κρίνειν, distinguir). Véase : *patognomónico.*

diadococinesia, *s. f.* (διάδοχος, que sigue; κίνησις, movimento) (Babinski, 1902). Facultad de hacer que los movimientos se sigan rápidamente, como la pronación y la supinación del puño. Esta función se turba en los cerebelosos y en la esclerosis en placas.

diaforesis, *s. f.* (διαφορέω, esparcir). Transpiración. Sudores abundantes.

diaforético, *adj.* Sudorífico.

diafragmatocele, *s. m.* (διάφραγμα. diafragma; κήλη, hernia). Hernia de las vísceras abdominales á través de un orificio del diafragma.

diagnosis ó **diagnóstica**, *s. f.* (διάγνωσις, discernimiento). « Conocimiento adquirido por la observación de los signos diagnósticos ». (Littré).

diagnóstico, *s. m.* (διά, á través; γνῶναι, conocer). Acto por el cual el médico, agrupando los síntomas que ofrece el enfermo, los atribuye á una enfermedad clasificada en la nosología.

dialisis, *s. f.* (διά, á través; λύειν, disolver). Método de separación de las sustancias disueltas, que consiste en hacerlas pasar á través de una membrana especial (papel pergamino).

diapédesis, *s. f.* (διαπεδάω, yo atravieso). Nombre dado á la emigración de los leucocitos, de los capilaress Gracias á sus movimientos amiboides, los glóbulos blancos atraviesan las paredes vasculares por orificios casi imperceptibles y se transforman en células emigradoras.

diaplejia, *s. f.* (διά; πλήσσειν, herir). (Spring). Nombre dado á las parálisis generalizadas (por contraposición á las *monoplejias*).

diapnoico ó **diapnó**

tico, *adj.* (διαπνοή, transpiración). Sudorífico suave.

diarrea, *s. f.* (διαῤῥεῖν, fluir de todas partes). Síntoma que consiste en la frecuencia de deposiciones líquidas.

diarrea infantil. Nombre genérico bajo el cual se reunen, en patología infantil, todos los estados mórbidos cuyo principal síntoma es la diarrea, sin prejuzgar nada sobre su naturaleza. — Según el aspecto de las deposiciones se las ha dividido en *diarreas amarillas*, y *diarreas verdes*, en las cuales se ha distinguido aún las *diarreas verdes biliares* con reacción ácida, y las *diarreas verdes no biliares* cuyo color es debido á un microbio especial, que se cree actualmente no es otro sino el bacterium coli commune. — Según su duración, se las ha dividido en *diarreas agudas* y *diarreas crónicas*. — Según la reacción del enfermo, se las ha distinguido en diarreas de forma pirética y diarreas de forma álgida (*cólera infantil*). — Finalmente, según la idea patogénica que se adopte, se designan con los nombres de : *dispepsia gastro-intestinal*, *gastro-enteritis*, *diarrea toxi-infectiva*. — Actualmente se admite que las *diarreas infantiles* son lo más á menudo la expresión sintomática de la infección de las vías digestivas.

diastasa, *s. f.* (διάστασις, separación). Fermento soluble.

diastasígeno, *adj.* (diastasa; γεννᾶν, engendrar). Que posee la propiedad de segregar diastasas. Ej. : *bacteria diastasígena*.

diastasis, *s. f.* Separación permanente de dos superficies articulares pertenecientes á dos huesos paralelos, como la tibia y el peroné, el radio y el cúbito, los dos pubis, etc.

diáster, *s. m.* (δίς, dos veces : *aster*, astro). Véase : *anfiáster*.

diástole, *s. f.* (διαστέλλω, dilato). Dilatación del corazón ó de las arterias en el momento del aflujo sanguíneo.

diátesis, *s. f.* (διατίθημι, dispongo). Nombre con que se designa el conjunto de afecciones que atacan simultánea ó sucesivamente al mismo individuo, afecciones distintas por su sitio anatómico y los signos clínicos, pero supuestas de idéntica naturaleza. Esta palabra no es ya muy usada desde que se ha reconocido la naturaleza infectiva y parasitaria de muchos de estos grandes

tico entre la gastrectasia y la gastroptosis. Consiste en separar el estómago en dos porciones por medio de una mano colocada de plano y hundida profundamente en el abdomen, mientras que otra mano por presiones metódicas trata de hacer pasar los líquidos y los gases de una porción gástrica á la otra.

digénesis, *s. f.* (δίς, dos; γένεσις, generación) (Van Beneden). Sin. : *generación alternante*. Nombre dado á la generación de ciertos invertebrados (orden de los trematodes y de los cestodes) que se reproducen alternativamente por huevos y por escisión ó por generación. — Esta palabra se emplea también adjetivada.

digestor, *s. m.* Especie de autoclave destinado á cocer rápidamente la carne y á disolver la gelatina de los huesos.

dilaceración, *s. f.* Desgarramiento hecho con violencia.

dilatación del estómago. Sin. : *gastrectasia*. Aumento de la capacidad del estómago, debida, ya á una causa mecánica (estenosis del píloro ó lesión de las túnicas musculares), ya á un simple relajamiento de la musculatura gástrica, que sobreviene progresivamente sin lesión apreciable y se traduce sobre todo por fenómenos de auto-intoxicación crónica provocados por el éxtasis de los alimentos y las fermentaciones secundarias que son su resultado (tipo de Bouchard).

dimidiado, *adj.* (*dimidium*, la mitad). Que se refiere sólo á la mitad del cuerpo. Ej. : *anestesia dimidiada*.

dinamóforos (alimentos). Véase : *alimentos de economía*.

dinamogenia, *s. f.* (δύναμις, fuerza : γεννᾶν, engendrar) (fisiología). Exaltación de la función de un órgano bajo la influencia de una excitación cualquiera; lo contrario de inhibición.

dinamómetro, *s. m.* (δύναμις, fuerza ; μέτρον, medida). Instrumento destinado á medir la fuerza muscular.

dinamoscopia, *s. f.* (δύναμις; σκοπεῖν, examinar). Procedimiento de auscultación abandonado hoy, que consistía en estudiar ciertos ruidos orgánicos perceptibles, ya introduciéndose en la oreja el auricular del paciente, ya auscultándolo por medio del dinamoscopio.

diodoncéfalo, *s. m.* (δίς, dos; ὀδούς, diente;

κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuya cabeza lleva una doble hilera de huesos dentarios.

dioptría, *s. f.* (δία, á través; ὄπτομαι, miro). Unidad empleada como medida en la refracción del ojo. — Una lente de 1 *dioptría* es una lente de distancia focal de 1 metro. Si es divergente, corrige una miopía de 1 *dioptría*; si es convergente, corrige una hipermetropía de 1 *dioptría*. — Una lente de 2 *dioptrías* tiene una distancia focal de 1/2 metro, es decir, de 0,50 centímetros, etc.

dipigo, *s. m.* (δίς, dos; πυγή, nalgas). Nombre con que se designa el grupo de monstruos dobles que tienen una cabeza y un tórax únicos, y se desdoblan por debajo del ombligo presentando dos pelvis y cuatro miembros inferiores.

diplacusia, *s. f.* (διπλόος, doble; ἀκούειν, oir). Sin.: *paracusia doble*. Percepción simultánea por un oido, ó por los dos, de dos sonidos que difieren en una tercia, en una cuarta, en una octava.

diplejía, *s. f.* (διπλόος, doble; πλήσσειν, herir). Doble hemiplejía, parálisis bilateral generalmente de origen cerebral.

diplocefalia, *s. f.* (διπλόος; κεφαλή, cabeza). Monstruo que lleva dos cabezas implantadas sobre el mismo cuerpo.

diplococo, *s. m.* (διπλόος; κοκκος, grano). Micrococos asociados de dos en dos. Ej.: *neumococo*, *gonococo*.

diplofonía, *s. f.* (διπλόος; φωνή, voz). Sin.: *diftonguia*, *diftonia*, *voz bitonal*. Trastorno de la fonación, caracterizado por la formación de dos sonidos en la laringe. Se la observa: 1º En los casos de parálisis unilateral, en que, estando las cuerdas vocales desigualmente tensas, producen dos sonidos distintos; 2º Cuando un pólipo pequeño ó un nódulo divide la hendidura vocal en dos glotis que emiten sonidos de alturas diferentes.

diplogénesis, *s. f.* (διπλόος γένεσις, generación). Nombre genérico de todas las monstruosidades que resultan de la fusión de dos fetos más ó menos desarrollados.

diplopía, *s. f.* (διπλόος; ὤψ, ojo). Visión doble. — En la *diplopía binocular*, el enfermo no superpone las dos imágenes percibidas por los dos ojos. — En la *diplopía monocular* un solo ojo suministra las dos imá-

genes: en este caso hay además casi siempre poliopia

diplosomia, *s. f.* (διπλόος; σῶμα, cuerpo). Monstruo caracterizado por la existencia de dos cuerpos completos reunidos por una ó varias partes.

diprósopo, *s. m.* (δίς, dos; πρόσωπον, cara). Nombre dado al grupo de los monstruos dobles que presentan un solo tronco sobre el que están implantadas dos cabezas fusionadas, con dos caras más ó menos distintas (iniodimo, opodimo).

dipsomanía, *s. f.* (δίψα, sed; μανία, manía). Impulsión que obliga á ciertos degenerados á beber con exceso líquidos alcohólicos. «Los borrachos son personas que se embriagan cuando encuentran la ocasión de beber; los dipsómanos son enfermos que se embriagan cada vez que son atacados por su acceso». (Trelat.)

disartria, *s. f.* (δύς, prefijo que indica dificultad; ἄρθρον, articulación). Turbación de la pronunciación de las palabras, debida á una parálisis ó á un espasmo de los órganos de la fonación: lengua, labios, velo del paladar, etc.

disbasia, *s. f.* (δύς; βάσις, marcha). Perturbación de la marcha.

discinesia, *s. f.* (δύς; κινήσις, movimiento). Incoordinación.

discinesias funcionales. Véase: *espasmos funcionales.*

discisión, *s. f.* (*discissio*, separación). Operación que consiste en practicar en la cristaloide anterior una pequeña incisión destinada á favorecer la imbibición y la reabsorción del cristalino por el humor acuoso. Esta operación debe reservarse para las cataratas blandas de los jóvenes.

discoblástula, *s. f.* (δίσκος, disco; βλαστός, germen). Nombre dado á la *blástula* del huevo de segmentación parcial (huevos de las aves). Esta *blástula* tiene la forma de un casquete de doble pared que encierra entre sus dos hojillas una hendidura, la cual representa la cavidad de segmentación. Dicho casquete se halla aplicado sobre el vitelo nutritivo.

discogástrula, *s. f.* (δίσκος; γαστήρ, estómago). La *gástrula* del huevo de segmentación parcial. Esta *gástrula* se forma por proliferación de las dos hojillas de la discoblástula (sobre todo de la hojilla externa), hasta desarrollo completo del vitelo nutritivo. La gás-

trula formada contiene en su cavidad dicho vitelo, reserva alimenticia del huevo.

discondroplasia, *s. f.* (δύς; κόνδρος, cartílago; πλάσσειν, formar) (Ollier, 1899). Afección del esqueleto caracterizada por el retardo y la irregularidad de la osificación á nivel de los cartílagos de conjunción. Ha sido revelada por la radiología, que muestra la persistencia del tejido cartilaginoso bajo forma de nódulos ó de masas irregulares. Su sitio preferente son las falanges, en las que determina inflexiones y acortamiento.

discrasia, *s. f.* (δύς; κρᾶσις, temperamento). Mala constitución.

discromatopsia, *s. f.* (δύς; χρῶμα, color; ὄψις, vista). Nombre genérico que sirve para designar las turbaciones en la percepción de los colores, particularmente la dificultad en reconocer los matices.

discromia, *s. f.* (δύς; χρῶμα). Nombre genérico de todas las perturbaciones de la pigmentación de la piel (acromia, hipercromia, vitíligo.)

disdipsia, *s. f.* (δύς; δίψα, sed). Dificultad para la deglución de los líquidos observada en los histéricos,

disección, *s. f.* (*dis*, pref. disyuntivo; *secare*, cortar). Operación que consiste en separar metódicamente los diferentes órganos, y estudiar sus relaciones y su aspecto macroscópico.

disecea, *s f.* (δύς; ἀκουειν, oir). Debilitamiento simple del oido.

disematosis ó **dishematosis,** *s. f.* Véase : *cianosis.*

disentería, *s. f.* (δύς; ἔντερον, intestino). Enfermedad infectiva endemo-epidémica y contagiosa, caracterizada por la inflamación ulcerosa del intestino grueso que da lugar á evacuaciones frecuentes de flemas sanguinolentas acompañadas de cólicos violentos. — Se distingue actualmente dos variedades de *disentería*. 1° La *disentería amibiana* debida á un parásito intestinal perteneciente al género amiba, la cual se observa en los países cálidos, con recidivas y complicada á menudo de abcesos del hígado. — 2° La *disentería bacilar*, debida á una bacteria intestinal (bacilo de Chantemesse y Widal, bacilo de Shiga), la cual se observa en todas las latitudes y no recidiva.

disenteriforme, *adj.* Se dice de las enteritis en que las evacuaciones semejan á las disentéricas.

disepatia ó **dishepatia**, *s. f.* (δύς; ἧπαρ, hígado). Véase : *parepatia*.

disestesia, *s. f.* (δύς; αἴσθησις, sensibilidad). Disminución ó exageración de la sensibilidad (histeria).

disfagia, *s. f.* (δύς; φαγεῖν, comer). Dificultad para tragar.

disfasia, *s. f.* (δύς; φάσις, palabra. Alteración de la función del lenguaje provocada por lesiones de los centros cerebrales.

disfonía, *s. f.* (δύς; φωνή, voz) Turbación de la fonación. cualquiera que sea su origen.

disgenesia, *s. f.* (δύς; γένεσις, generación). Sin. : *homogenesia disgenésica*. Nombre dado por Broca á los cruzamientos cuyos productos son entre sí estériles, mas son fecundos con individuos de una ú otra raza madre; los productos obtenidos así mestizos de segunda sangre) permanecen estériles.

disgenesia cerebral. Véase : *degeneración mental*.

disgenésico, *adj.* Que hace difícil la reproducción.

disidrosis ó **dishidrosis**, *s. f.* (δύς ; ἱδρως, sudor) (Tilbury Fox). Sin. : *queiroponfolix* (Hutchinson). Afección cutánea caracterizada por una erupción de vesículas semejantes á granos de sagú cocidos, situada, en general, sobre la cara lateral de los dedos y en los espacios interdigitales, y acompañada de sensación de quemadura; en término medio su duración es de 10 á 15 dias y recidiva con mucha frecuencia.

disistolía, *s. f.* (δύς; συστολή, sístole) (Fernet). Véase : *hiposistolía*.

disistólico (pulso) (δίς, dos, sístole). Sin. : *ritmo apareado*. Variedad de arritmia en la cual no existe sino una pulsación en la radial por dos sístoles ventriculares (la segunda pulsación, más débil, no es perceptible á la exploración digital).

dislalia, *s. f.* (δύς, prefijo que indica dificultad; λαλεῖν, hablar) Perturbación de la pronunciación de los vocablos, debida á una deformación ó á una lesión del aparato exterior de la palabra (lengua, labios, dientes, laringe).

dislexia, *s. f.* (δύς; λέξις, palabra) (Bruns, 1887). Turbación de la lectura caracterizada por el hecho de que el enfermo, después de haber leído fácilmente unas palabras, es incapaz de comprender lo que sigue, se detiene, y no puede continuar sino después de unos segun-

dos de reposo. Es una alexia transitoria.

dislocación vertical del estómago. La caída total del estómago que no se halla sostenido más que por el cardias; el píloro está descendido por debajo del ombligo y el eje del estómago tiende á aproximarse de la vertical. La *dislocación vertical* puede acompañar la enteroptosis generalizada; puede existír sola y deberse ya al corsé, ya à la estenosis del píloro.

dislogia, *s. f.* (δύς, prefijo que indica dificultad; λόγος, discurso). Turbación del lenguaje causada por defectuosidad de la inteligencia. (Irregularidad en la manera de hablar, ilogismo, incorrección, etc.)

dismenesia, *s. f.* (δύς; μνῆσις, memoria). Debilitamiento de la memoria.

dismenorrrea, *s. f.* (δύς; μήν, mes; ῥεῖν, fluir). Menstruaciones difíciles y dolorosas. Pueden estar acompañadas de la expulsión de una parte de la mucosa uterina (*dismenorrea membranosa*).

dismorfofobia, *s. f.* Temor mórbido de ponerse deforme.

disnea, *s. f.* (δύς; πνεῖν, respirar). Dificultad de la respiración.

disnervado, *adj.* (δύς; nervio) (H. Meunier). Se dice de un órgano turbado en su inervación.

disosmia, *s. f.* (δύς; ὀσμή, olfato). Nombre genérico bajo el cual se reunen las diversas turbaciones del olfato.

disostosis cleidocraneana hereditaria (Marie). Sin. : *hidrocefalia hereditaria*. Deformación hereditaria que consiste en el desarollo anormal del cráneo, con persistencia de las fontanelas, hidrocefalia, prognatismo, ausencia de soldadura de la bóveda palatina y, sobre todo, ausencia de las clavículas.

dispareunia, *s. f.* (δύς; πάρευνη, cópula). Dolor en la mujer durante el coito, sin contractura de la vulva.

dispensario, *s. m.* Establecimiento de beneficencia en que se dan consultas y se distribuyen medicamentos, sin hospitalizar los enfermos.

dispepsia, *s. f.* (δύς, prefijo que indica dificultad; πέψις, digestión). Conjunto de perturbaciones digestivas, ya gàstricas, ya gastro-intestinales, de cualquiera naturaleza (química, nervomotora, ó consistente en fenómenos anormales).

dispirema (fase de)

(δίς, dos; σπείρημα, pelotón). Sin. : *doble espirema, doble pelotón cromático.* Fase última de la cariocinesis, caracterizada por el acabamiento de los dos nuevos núcleos; el filamento acromático, que resulta de cada áster, se adelgaza y se contornea más y más hasta formar un pelotón cromático análogo al del núcleo madre.

displasia periostal (δύς; πλάσσειν, dar forma). (Durante, 1905). Distrofia ósea congénita caracterizada por la friabilidad y la fragilidad de los huesos de los miembros, á consecuencia de la rarefacción del tejido compacto de la diáfisis. En los niños que padecen esta afección los miembros son cortos y de espesor desigual (achorizados), la bóveda craneana mal osificada tiene consistencia de pergamino; pero la cara permanece normal. Esta afección se acerca á la acondroplasia y al raquitismo.

distiroidia, *s. f.* (Hertoghe). Perversión de la función tiroidea, que provoca distrofias limitadas á ciertas partes del organismo.

distiquiasis, *s. f.* (δίς, dos veces; στίχος, rango). Desviación hacia atrás de la hilera posterior de las pestañas, mientras la anterior conserva la situación normal. Esta deformidad produce los mismos accidentes que la triquiasis : conjuntivitis, queratitis, entropión, y á veces opacidad y ulceración de la córnea.

distocia, *s. f.* (δύς, prefijo que indica dificultad; τόκος, parto). Parto difícil, cualquiera que sea el origen de la dificultad.

distoma, *s. m.* (δίς, dos; στόμα, boca). Sin. *distoma hepaticum, duela.* Parásito del órden de los trematodes que se encuentra en los canales biliares del carnero. Se le ha observado á veces en el hombre.

distomatosis, *s. f.* Enfermedad causada por los distomas.

distomum hœmatobium. Véase : *bilharzia hœmatobia.*

distopia, *s. f.* (δύς, pref. que indica dific; τόπος, lugar). Anomalía en la situación de un órgano. Ej. *distopia renal* : riñones desalojados congénitamente, riñones adheridos, etc.

distrofia, *s. f.* (δύς; τροφή, nutrición). Turbación de la nutrición de un órgano, ó de una parte anatómica, con las lesiones que son su resultado.

distrofia muscular progresiva (Erb). Designación bajo la cual se agrupan generalmente las diversas variedades de atrofia muscular de origen miopático, es decir, que no dependen ni de lesión medular, ni de lesión nerviosa, y que en cierto modo son esenciales.

distrofia edematosa. Véase: *trofedema crónico hereditario.*

distrombasis, *s. f.* (P. E. Weil, 1905). Turbación de la formación del fibrin-fermento, por la cual se explica el retardo y la anomalía de la coagulación de la sangre en los hemofílicos.

disuria, *s. f* (δύς, que indica dificultad; οὖρον, orina). Dificultad de la micción.

disyunción epifisiaria. Sin.: *desprendimiento epifisiario*. Lesión traumática de los huesos observada sólo en los jóvenes, antes de la osificación del cartílago de conjunción, y caracterizada por la ruptura de este cartílago acompañada de los síntomas ordinarios de las fracturas.

Dittrich (tapones de). Pequeñas masas granulosas de color amarillento ó verduzco, formadas sobre todo de cristales de ácidos grasos, que esparcen un olor infecto característicos. Se encuentran en los productos de expectoración de la gangrena pulmonar.

diuresis, *s. f.* (δία, á través; οὖρον, orina). Excreción abundante de orina.

diurético, *adj.* y *s. m.* Medicamento que posee la propiedad de aumentar la secreción urinaria.

divulsión, *s. f.* (*dis*, pref. separativo; *vellere*, arrancar). 1° Dilatación forzada: píloro, recto, cuello uterino. — 2° Arrancamiento (Fractura por divulsión).

doble cuartana (fiebre). Fiebre intermitente en que el acceso repite dos días seguidos, al tercero hay apirexia, y luego al cuarto y quinto sobrevienen nuevos accesos, seguidos de apirexia al sexto, etc.

doble cuotidiana (fiebre). Fiebre intermitente con dos accesos diarios.

doble forma (locura de) (Baillarger). Variedad particular de locura periódica en que el acceso consta de una faz maniaca y de una faz melancólica, que se siguen sin intervalo lúcido intercalar.

doble terciana (fiebre). Fiebre intermitente

que presenta accesos diarios como la cuotidiana, mas estos accesos no sobrevienen á la mismas horas, sino se corresponden en terciana, es decir, que los accesos de los 1°, 3° y 5° dias son semejantes en hora y en intensidad; mientras que los accesos de los 2°, 4° y 6° son semejantes entre sí, pero difieren de los precedentes.

docimasia, *s. f.* (δοκιμάζειν, experimentar). Término de medicina legal.—*docimasia auricular*. Véase: *Wreden* (*signo de*)—*docim. hepática* (Lacassagne). Investigación del azúcar y de la glicosa en el hígado de los cadáveres. La presencia de estas dos sustancias (*docim. positiva*) prueba que el sujeto ha muerto en plena salud; la ausencia (*docim. negativa*) indica que la muerte sobrevino después de larga agonía; la presencia de azúcar sin glicógeno (*docim. positiva incompleta*) es indicio de muerte súbita en el curso de una enfermedad.—*docim. pulmonar*. Pruebas á que se somete el aparato respiratorio de un feto para saber si ha respirado antes de morir.

dólicocéfalo, *s. m.* (δολιχός, alargado; κεφαλή, cabeza). Nombre dado por Retzius á las razas humanas cuyo cráneo es alargado de delante atrás; la longitud mayor excede de cerca de una cuarta parte la mayor anchura.

dólicostenosmelia, *s. f.* (δολιχός, largo; στενός, estrecho; μέλος, miembro) (Marfan). Deformación congénita de los cuatro miembros, más pronunciada en los extremos, caracterizada por el alargamiento y adelgazamiento de los huesos con retracciones tendinosas, sin parálisis ni modificaciones de la excitabilidad eléctrica de los músculos.

dombo (choque en) (Bard). Sensación particular que experimenta la mano que palpa la región precordial de un sujeto atacado de insuficiencia aórtica con hipertrofia. El choque « se redondea, se extiende, se pone en contacto con mayor superficie, sin que deje de ser cincunscrito; la sensación es la de una bola ó de un globo que se endurece bajo la mano ».

dotinenteria, *s. f.* (Trousseau), **dotinenteritis**, *s. f.* (Bretonneau) (δοθιήν, botón; ἔντερον, intestino). Véase: *fiebre tifoida*.

dracunculosis, *s. f.* Enfermedad causada por la filaria de Medina. Se mani-

fiesta por un tumor subcutáneo, que no tarda en supurar y abrirse al exterior, de donde puede extraerse el parásito.

dracúnculo ó **dragoncillo**, *s. m.* Véase : *filaria de Medina*.

dragante (marcha) (Charcot)(de *dragar*). Véase: *Todd (marcha de)*.

drástico, *adj. y s. m.* (δράω, yo obro). Purgante enérgico.

dren, *s. m.* (del inglés *to drain*, desaguar ó avenar). Tubo generalmente de caucho con orificios á lo largo de su pared, destinado á asegurar el desagüe.

drenaje, *s. m.* (del inglés *to drain*, desaguar ó avenar). Tratamiento de las colecciones líquidas sépticas ó asépticas, que consiste en favorecer su derrame continuo al exterior manteniendo abierto un orificio por medio de un tubo (*dren*) ó una mecha.

dromomanía, *s. f.* (δρόμος, carrera; μανία, manía). Impulsión mórbida á andar.

Dubini (corea de). Variedad de corea eléctrica caracterizada por ataques convulsivos seguidos frecuentemente de parálisis y terminados por el coma y la muerte. Este tipo clínico, observado en Italia, parece ser muy raro en Francia.

Duchenne (enfermedad de). Nombre dado á la *tabes dorsal*, y á veces á la *parálisis labio-glosolaringea*

Duchenne-Erb (músculos del grupo). Deltoide, bíceps, braquial anterior y supinador largo.

Duckes-Filatow (enfermedad de) (1904). Sin. : *fourth disease, cuarta enfermedad*. Fiebre eruptiva cuyos caracteres semejan los de la rubeola y de la escarlatina : exantema ligero, angina, adenopatía y síntomas generales poco marcados. Todos los autores no la admiten como entidad mórbida distinta.

Ducrey (bacilo de). Microbio específico del chancro blando.

Duhring (enfermedad de). Véase : *dermatitis herpetiforme*.

duodenitis, *s. f.* Inflamación del duodeno. Se confunde ordinariamente con la gastritis ó la enteritis.

duodenostomía, *s. f.* (duodeno ; στόμα, boca). Creación de una boca en el duodeno; operación practicada en casos de estenosis pilórica, cuando no se puede ejecutar la gastro-enterostomía.

duodenotomía, *s. f.* (duodeno; τομή, sección). Incisión del duodeno.

duplex (uterus) (útero doble). Deformación caracterizada por la presencia de dos cuerpos uterinos reunidos por un cuello único, y debida á que los canales de Müller no se fundieron sino en su parte inferior.

Dupuytren (enfermedad de). Retracción de la aponeurosis palmar.

Dupuytren (fractura de). Variedad de fractura del peroné situada á 5 ó 6 centímetros del vértice del maleolo; existe á este nivel una depresión á menudo perceptible á la vista, y siempre reconocible al tacto, sobre la que se presenta una punta angulosa formada por el extremo del fragmento superior *hacha* de Dupuytren). En general, el arrancamiento del maleolo interno coincide con ella.

durina, *s. f.* Tripanosomiasis que ataca á los equideos y que se comunica por el coito. Su modo de propagación y sus síntomas la han hecho comparar con la sífilis.

Durozier (enfermedad de). Estrechez mitral pura.

Durozier (signo de). Doble soplo intermitente crural. Ruido que se oye en la insuficiencia aórtica cuando se ausculta la arteria femoral con un estetoscopio, comprimiéndola ligeramente.

E

Eberth (bacilo de). Sin.: *bacilo tífico*, *bacillus typhosus*. Bacteria que se presenta bajo la forma de bastoncillos animados de movimientos muy vivos; es el agente patógeno de la fiebre tifoidea.

ebriosa (marcha). Andar de la embriaguez. Titubeación.

eburnación, *s. f.* (*ebur*, marfil). Aumento considerable de la densidad de un hueso, del que una parte más ó menos extensa se vuelve compacta como marfil.

ecbólico, *adj.* (ἐκ, fuera de; βάλλειν, arrojar) (obstetricia). Que determina la expulsión.

eccondrosis, *s. f.* (ἐκ, fuera de; χόνδρος, cartílago). Protuberancias for-

madas en las articulaciones, las costillas, la laringe, etc., por proliferación del tejido cartilaginoso. Se observan lo más á menudo en las artritis crónicas, cuyas nudosidades contribuyen á formar.

Ecker (tapón de). Véase : *tapón endodérmico.*

eclampsia puerperal. (ἐκλάμπειν, hacer explosión). Sin: *accesos eclámpticos, convulsiones puerperales.* Afección caracterizada por una serie de accesos que constan de convulsiones tónicas, luego clónicas, con suspensión de la inteligencia y de los sentidos, y probablemente causada por la intoxicación de la madre por los productos de secreción del feto; generalmente la precede la albuminuria, que es el primer indicio de esta intoxicación. El acceso de eclampsia ofrece la mayor analogía con el ataque de epilepsía. — Fuera de la puerperalidad, *la eclampsia* no es más que una forma de la uremia.

ecmenesia, *s. f.* (ἐκ, á partir de; μνῆσις, memoria). Perturbación particular de la memoria. El paciente ha olvidado todos los hechos que se han sucedido á partir de una fecha, mientras recuerda perfectamente hechos anteriores; más aún, puede creerse transportado á ese momento de su vida (*delirio ecmenésico*).

ecocinesia, *s. f.* (ἠχώ, eco; κίνησις, movimiento). Sin. : *ecopraxia.* Impulsión mórbida de algunos degenerados á reproducir muchas veces los movimientos que se imprimen á sus miembros.

ecolalia, *s. f.* (ἠχώ, eco; λαλεῖν, hablar). Impulsión mórbida de ciertos degenerados á repetir como un eco las palabras pronunciadas delante de ellos.

ecomatismo, *s. m.* (ἠχώ; μάτος, esfuerzo). Impulsión mórbida á repetir los sonidos y los movimientos : comprende la ecocinesia y la ecolalia.

ecomimia, *s. f.* (ἠχώ; μίμος, mimo). Impulsión mórbida de ciertos degenerados á reproducir los movimientos que ven ejecutar ante sí.

economía (alimentos de) Sin. : *alimentos dinamóforos.* Sustancia alimenticia (café, kola, coca, té, etc.) que goza, según algunos autores, de la facultad de impedir que el organismo sufra, á causa de un fenómeno funcional cualquiera, las pérdidas que este fenómeno debe necesariamente provocar. Los fisiólo-

gos no admiten este poder, y, por lo contrario, consideran al *alimento de ahorro* como *alimento de gasto*.

ecópea, *s f.* (ἐκ, fuera; κοπτειν, cortar). Herida del cráneo por instrumento cortante que ha hecho en el hueso una sección recta más ó menos profunda.

ecopraxia, *s. f.* (ἠχώ, eco; πρᾶξις, acción). Véase: *ecocinesia*

ecoprótico. *adj.* (ἐκ, fuera; κόπρος, excremento). Que facilita la defecación.

ectasia, *s. f.* (ἔκτασις, dilatación). Dilatación de un órgano ó de un vaso.

ectasina, *s f.* Toxinas microbianas que determinan la vaso-dilatación.

ectima, *s. m.* (ἐκθύειν, hacer erupción). Afección cutánea que se manifiesta por pústulas con tendencia á extenderse por sus bordes, mientras el centro se cubre de una costra oscura. Es inoculable y auto-inoculable.

ectoblasto. *s m.* (ἐκτός, fuera; βλαστός, germen). Véase: *ectodermo*.

ectocardia, *s. f.* (ἐκτός; καρδία, corazón). Anomalía de situación del corazón. Este órgano puede: 1° hacer hernia á través del diafragma: *ectocardia sub-diafragmática*; — 2° Formar protuberuncia fuera del pecho á consecuencia de la bifidez ó de la ausencia del esternón: *ectocardia pretorárica*.

ectodermo, *s. m.* (ἐκτός; δέρμα, piel). Sin.: *ectoblasto, epiblasto*. Hojilla externa del blastodermo. Está destinado á formar el revestimiento epidérmico y el sistema nervioso; de donde el nombre de *hojilla nervioso-sensorial* ó *cutáneo-sensorial* que se le da á veces.

ectopago, *s. m.* (ἐκτός; παγεῖς, unidos) (I. G. St-Hilaire). Monstruo doble caracterizado por la fusión de las paredes costo-esternales de un lado con la otra pared normalmente desarrollada. Los brazos correspondientes al lado atrofiado y soldado se encuentran soldados igualmente.

ectopesófago, *s. m.* Instrumento en forma de sonda que se introduce en el esófago; su objeto es hacer que el borde izquierdo de este canal haga bulto en la operación de la esófagotomía externa.

ectopia, *s. f.* (ἐκ, fuera; τόπος, lugar) Anomalía de situación de un órgano. Ej. *ectopia del corazón, ectopia del pulmón*.

ectoplacenta. *s. f.* (ἐκτός; placenta). Revestimiento endotelial incompleto de las lagunas placentarias.

ectoplásmicas (producciones) Las diversas sustancias extracelulares elaboradas por la célula.

ectrodactilia, *s. f.* (ἐκτρώω, hago abortar; δάκτυλος, dedo). Ausencia congénita de uno ó de varios dedos.

ectromelo, *s. m.* (ἐκτρώω; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo que tiene uno ó varios miembros imperfectamente desarrollados. La detención del desarrollo puede limitarse igualmente á cada segmento de miembro.

ectropión, *s. m.* (ἐκτρέπω invierto). Inversión de los párpados hacia fuera. — Se emplea igualmente este término para designar la eversión de los labios y de la mucosa del cuello uterino.

Edebohls (operación de). Descortezamiento del riñón; operación preconizada en el mal de Bright.

edema, *s. m.* (οἴδημα, de οἰδεῖν, engrosar). Infiltración serosa de diversos tejidos y particularmente del tejido conjuntivo del revestimiento cutáneo ó mucoso. En la piel el *edema* se revela por una hinchazón indolora y sin rubor, que conserva por algún tiempo la huella del dedo. — El *edema* puede infiltrar igualmente el pulmón, el cerebro, etc. — El *edema* generalizado toma el nombre de *anasarca*.

edema agudo angioneurótico ó **toxineuropàtico**. Edema circunscrito que se presenta bruscamente, por ataques, en diversas partes del cuerpo.

edema agudo paroxístico hereditario. Véase : *Quincke* (*enfermedad de*).

edema azul ó **histérico.** Edema duro, acompañado casi siempre de coloración violácea, que se presenta en los histéricos generalmente en un miembro paralizado ó contracturado.

edema maligno. Accidente inicial raro del carbón. Se presenta de preferencia en los párpados ; á veces en la cara, en el pecho ó en los brazos. Aumenta con bastante rapidez, se pone duro, la piel se cubre de flictenas llenas de un líquido sanguinolento, las que, abiertas, dejan á descubierto escaras análogas á las de la pústula maligna. Véase : *carbón*.

edema nervioso familial (Meige) Afección familial que se manifiesta e- general de los 12 á los

años, caracterizada por un edema blanco, duro, indoloro, que ocupa ya las piernas, ya los miembros inferiores en totalidad. Véase : *trofedema crónico hereditario*.

edocéfalo, *s. m.* (αἴδοιον, partes sexuales ; κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por una sola órbita, que contiene uno ó dos ojos y sobre la cual hay una trompa en forma de pene ; por la reunión de las dos orejas bajo la cabeza y por la ausencia de boca.

edulcoración, *s. f.* Adición de una sustancia azucarada á un medicamento cuyo sabor se desea disimular.

efélide, *s. f.* (ἐπί, á causa ; ἥλιος. sol). Mancha oscura, de tamaño variable, que ocupa las partes descubiertas de la piel, en la edad adulta y en la vejez, y desaparece por completo en invierno para reaparecer en primavera y en verano. Las *efélides* están en relación directa con la acción del sol y del aire sobre la superficie cutánea.

efidrosis ó **epidrosis**, *s. f.* (ἐπί, sobre, ἱδρόω, yo sudo). Hiperidrosis localizada. Turbación de la secreción sudoral caracterizada por el aumento de dicha secreción en un punto limitado del cuerpo. Ej. *efidrosis frontal y craneana de los artríticos*.

efímera (fiebre). (ἐπί, en ; ἡμέρα, dia). Acceso de fiebre causado por un exceso de fatiga. Su duración no excede generalmente de veinte y cuatro horas.

eflorescencias de la piel. Se denominan así las lesiones elementales de la piel, es decir, las lesiones cutáneas consideradas en su forma y aspecto exterior. fuera de toda idea de causa y sin tener en cuenta su evolución.

egagrópilo, *s. m.* (αἴγαγρος cabra salvaje ; πῖλος, bola de lana). Cuerpo extraño del estómago formado por un montón de pelos ó de cabello, que se encuentra á menudo en los rumiantes y, excepcionalmente, en el hombre en la histeria. El *egagrópilo* forma un tumor cuya naturaleza no se reconoce sino después de la gastrotomía.

egílope, *s. m.* (αἴξ, cabra ; ὤψ, ojo). Pequeña ulceración que se forma en el ángulo interno del ojo y que sigue al anquílope.

egofonía, *s. f.* (αἴξ, cabra ; φονή, voz). Sin. : *voz caprina* ó *de polichinela*. Resonancia particular de la

voz, perceptible á la auscultación del pecho en los casos de pleuresía y, más rara vez, en ciertas formas de congestión pulmonar. La voz es temblorosa, nasal y parecida al valido de la cabra.

Ehrlich (células de). Véase : *eosinófilas.*

Ehrlich (reacción de). Véase : *diazo-reacción.*

Eichhorst (tipo fémoro-tibial de). Variedad de miopatía primitiva progresiva, que empieza por los miembros inferiores é invade el tronco y los miembros superiores. Está acompañada frecuentemente de *garra* de los dedos del pié.

ekiri. Enfermedad epidémica, disenteriforme, muy aguda, que ataca casi exclusivamente en el Japón á los niños de dos á seis años. La causaría un bacilo vecino del colibacilo.

elasticidad, *s. f.* (ἐλαστής, que empuja, de ἐλαύνειν, empujar). Propiedad de los tejidos de volver á su forma primitiva después de haber sido modificada. Esta propiedad puramente física es independiente del estado de vida.

electrodo, *s. m.* (electricidad ; ὁδός, vía). Los extremos de los hilos de la pila eléctrica, extremos á que se dan varias formas según el uso á que se los destine.

electro-diagnóstico, *s. m.* Aplicación de la electricidad al examen de los enfermos. El *electro-diagnóstico* informa sobre el estado del aparato neuro-muscular revelando la reacción de degeneración, la reacción miotónica y las modificaciones de la resistencia eléctrica.

electrofanitis, *s. f.* Afección que consiste en un catarro de las vías superiores con cefalea, estornudos, tos, á veces amigdalitis y bronquitis. Sería debida al polvo y á los microbios puestos en movimiento por los ventiladores eléctricos de las habitaciones, que agitan el aire confinado sin renovarlo.

electrolepsia, *s. f.* (Tordeus). Corea eléctrica de Bergeron.

electrón, *s. m.* (Larmor). Sin. : *átomo eléctrico.* Nombre dado á los elementos que provienen de la disociación del átomo por la ampolla de Crookes ó por los cuerpos radio-activos. En el primer caso los electrones forman los rayos catódicos, en el segundo los rayos β.

electro-puntura, *s. f.* Véase : *galvano-puntura.*

electroterapia, *s. f.*

Empleo de la electricidad como medio terapéutico.

electrotropismo, *s. m.* (electricidad; τρεπειν, girar). Propiedad del protoplasma de ser atraido ò rechazado por la electricidad.

electuario, *s. m.* (*eligere*, eligir). Preparación farmacéutica de consistencia blanda, formada de polvos mezclados con jarabe, miel, ó también pulpas vegetales adicionadas de azúcar.

elefanciasis, *s. f.* (ἐλέφας, elefante). Sin.: *paquidermia*. Aumento considerable del volumen de un miembro ó de una parte del cuerpo, causado por un edema duro, crónico, de los tegumentos. — Es un síntoma que se observa en cierto número de enfermedades.

elefanciasis de los Arabes. Elefanciasis de los miembros inferiores observada en la *filariosis*.

elefanciasis de los Griegos. Véase: *lepra*.

eleolato, *s. m.* (ἔλαιον, aceite) Medicamento con base de aceite.

elitrocele, *amb.* (ἔλυτρον, vagina; κήλη, hernia). Hernia vaginal.

elitroplastia, *s. f.* (ἔλυτρον; πλάσσειν, hacer). Operación que consiste en reparar por autoplastia una pérdida de substancia en la vagina.

elitroptosis, *s. f.* (ἔλυτρον; πτώσις, caida). Inversión de la mucosa vaginal.

elitrorrafia, *s. f.* (ἔλυτρον; ῥαφή, sutura). Operación que consiste en suturar una porción de la mucosa vaginal, previamente avivada, con el fin de reforzar el periné y de poner remedio al prolapso de los órganos genitales.

elitrorragia, *s. f.* (ἔλυτρον; ῥήγνυμι, yo desgarro). Hemorragia vaginal.

elitrotomía, *s. f.* (ἔλυτρον; τομή, sección). Incisión de un fondo de saco vaginal.

elixir, *s. m.* (*elicere*, extraer). Preparación farmacéutica que consiste en la mezcla de ciertos jarabes con alcoholatos.

elongación de los nervios. Operación que consiste en ejercer tracción más ó menos enérgicamente sobre un nervio puesto al descubierto, con el objeto de hacer desaparecer los dolores situados en dicho nervio.

emaciación, *s. f.* (*emaciare*, enflaquecer). Enflaquecimiento patológico.

emasculación, *s. f.* (*e* priv; *masculus*, macho.) Castración en el hombre.

embarazo gástrico. Complexo sintomático caracterizado por perturbaciones gastro-intestinales de duración variable, acompañadas ó no de fiebre, y susceptible de observarse bajo la influencia de infecciones ó de intoxicaciones diversas.

embolía, *s. f.* (ἐμβάλλειν, lanzar adentro). 1° Obliteración brusca de un vaso sanguíneo por un cuerpo extraño arrastrado por la circulación (trombus, fragmentos de neoplasma, pelotones microbianos, burbujas gaseosas).— Sin. *invaginación.* Proceso caracterizado por el hecho de que la pared de una cavidad se hunde, se excava y va á aplicarse sobre la pared opuesta, determinando la formación de una nueva cavidad que no comunica con la antigua (*gastrulación*).

émbolo, *s. m.* Cuerpo extraño que determina la embolía.

embriocardia, *s. f.* (ἔμβρυον, embrión; καρδία, corazón). Sin. : *ritmo fetal.* Aceleración del corazón y modificación de su ritmo que hacen semejar sus latidos á los del corazón fetal. Los dos silencios son iguales y los dos ruidos semejantes.

embriocardia disociada (Grasset). Véase : *pendular* (*ritmo*).

embriogenia, *s. f.* (ἔμβρυον; γεννᾶν, nacer). Desenvolvimiento del embrión.

embrioide (tumor). Variedad de quiste dermoideo situada sobre el testículo ó, más rara vez, en el ovario, que contiene elementos derivados de las tres hojillas del blastodermo, principalmente tejido mesodérmico.

embriología, *s. f.* (ἔμβρυον; λόγος, discurso). Estudio del embrión y de sus órganos.

embrioma, *s. m.* Variedad de quiste dermoideo situada en el ovario ó, más rara vez, en el testículo, que contiene elementos derivados de las tres hojillas del blastodermo, principalmente tejido ectodérmico.

embrión, *s. m.* (ἐν, dentro; βρύειν, crecer.) Nombre dado en la especie humana al producto de la concepción durante los tres primeros meses; á partir del cuarto mes el *embrión* se vuelve *feto.*

embrionado (tumor). Véase : *tridérmico* (*tumor*).

embrioplástico (tumor). Nombre dado por Robin á los tumores cuyos elementos revisten el tipo embrionario (sarcoma).

embriotomía, *s. f.* (ἔμβρυον; τομή, sección). Nombre genérico de todas las operaciones que consisten en triturar ó hacer pedazos la cabeza del feto, para facilitar la extracción, por medio de instrumentos llamados *embriotomos*.

embrocación, *s. f.* (ἐμβροχή, riego). Acción de verter lentamente un líquido sobre una parte enferma.

emenagogo, *adj.* y *s. m.* (ἐμμηνος, menstruo; ἄγειν, lanzar). Agente terapéutico que provoca ó regulariza el flujo menstrual.

emético, *adj.* y *s. m.* (ἐμέω, yo vomito). Toda sustancia que provoca vómitos.

emetocatártico, *adj.* y *s. m.* (ἐμετός, vómito; καθαίρειν, purgar). Medcamento que obra como vomitivo y como purgante.

emetropía, *s. f.* (ἐν, dentro; μέτρον, medida; ὤψ, ojo). Nombre dado á la visión normal, es decir, al estado del ojo en el que los rayos partidos del infinito vienen á formar imagen exactamente sobre la retina. — Contrario de la *ametropia*.

emigradoras (células). Nombre dado á los glóbulos blancos, los que, gracias á su amibofsmo, pueden salir de los vasos (diapédesis) y emigrar á los diferentes tejidos.

emisión, *s. f.* Se dice del derrame bajo presión de ciertos líquidos. Ej.: *emisión de orina*, *emisión sanguínea* (*sangría*).

Emmet (operación de) Traquelorrafia.

empiema, *s. m.* (ἐν, dentro; πύον, pus). Pleuresía purulenta. — Dase también este nombre á la operación destinada á evacuar este derrame. — Finalmente, también se llaman *empiema* algunas colecciones purulentas situadas en las cavidades naturales. Ej.: *empiema del seno maxilar*.

empiema de necesidad. Pleuresía purulenta que se abre en la pared torácica, en que se produce un abceso torácico que comunica con el abceso pleural.

empiema pulsátil. Pleuresía purulenta izquierda animada de movimientos sincrónicos con los latidos del corazón.

empireumático (olor) (ἐμπυρεύειν, quemar). Olor análogo al que se obtiene en la destilación de las materias animales y vegetales.

empirismo, *s. m.* (ἐν, dentro; πεῖρα, experiencia). Medicina fundada en la experiencia.

emplastro, *s. m.* (ἐμπλάττεω, yo unto). Medicamento externo que se reblandece ligeramente á un calor suave y se vuelve entonces adherente.

emprostótonos, *s. m.* (ἐμπροσθεν, delante; τονος, tensión). Sin. : *tétanos en bola*. Variedad de tétanos caracterizada por el predominio de la contractura de los flexores. El herido se halla plegado sobre sí mismo como el feto dentro de la matriz.

emulsión, *s. f.* (*emulcere*, suavizar). Líquido de aspecto lechoso que tiene en suspensión un cuerpo grasoso finamente dividido.

emunctorio, *s. m.* (*emungere*, sacar fuera). Organos destinados á eliminar los residuos de la nutrición.

enajenación mental. Véase: *alienación mental*

enantema, *s. m.* (ἐν, dentro; ἄνθημα, eflorescencia). Manchas rojas más ó menos extensas que se observan sobre las mucosas, en gran número de enfermedades, y que corresponden al exantema cutáneo.

enázimo, *s. m.* (Guillermond, 1853). Se llaman así á veces las obleas, ó sellos de pan ázimo, que contienen medicamentos.

encajamiento *s. m.* Descenso de la cabeza del feto á la excavación pelviana.

encantis, *s f.* (ἐν, dentro; κανθός, ángulo del ojo). Nombre dado por los antiguos oftalmologistas á las afecciones de la carúncula lacrimal y del repliegue semilunar.

encapsulado, *adj.* Se dice de un tumor circunscrito por una envoltura fibrosa. Ej. : *angioma encapsulado*.

encarcelación herniaria (*in*, en; *carcere*, prisión). Nombre dado antes al estrangulamiento de las hernias.

encefalalgia *s. f.* (ἐγκέφαλον, cerebro; ἄλγος, dolor) (Fournier). Dolor de cabeza intenso, gravativo, profundo, que se observa en la sífilis cerebral.

encefalitis aguda. Inflamación, generalmente circunscrita, del cerebro, que termina casi siempre por un abceso.

encefalitis crónica. Esclerosis del cerebro.

encefalitis crónica infantil. Véase : *encéfalopatía atrófica de la infancia*.

encefalitis crónica intersticial difusa. (Magnan). Véase : *parálisis general*.

encefalocele, *amb.*

(ἐγκέφαλον, cerebro; κήλη, hernia). Ectopia, hacia la cara externa del cráneo, de una parte del cerebro ó de sus envolturas. Es casi siempre congénita, mas, sin embargo, puede ser el resultado de un traumatismo y producirse como las hernias.

encefaloide *adj.* (ἐγκέφαλον; εἶδος, forma). Se dice de los tumores que presentan el aspecto y la consistencia del cerebro. Ej. *sarcoma encefaloide, cáncer encefaloide.*

encéfalomalacia, *s. f.* (ἐγκέφαλον; μαλακός, blando). Reblandecimiento cerebral.

encéfalopatía, *s. f.* (ἐγκέφαλον; πάθος, enfermedad). Nombre dado á un conjunto de síntomas cerebrales que complican á veces ciertas infecciones (reumatismo articular agudo) ó ciertas intoxicaciones (saturnismo), y no corresponden á lesiones anatómicas precisas.

encéfalopatía atrófica de la infancia. Sin.: *encefalitis crónica infantil.* Nombre genérico dado á las inflamaciones crónicas del encéfalo (esclerosis, meningo-encefalitis, porencefalia) que se presentan en el niño y determinan perturbaciones motoras, tales como la *hemiplejia espasmódica infantil*, y perturbaciones síquicas tales como la *idiotez.*

encefalorragia, *s. f.* (ἐγκέφαλον, encéfalo; ῥήγνυμι, yo desgarro). Término con que se designan todas las hemorragias intracraneanas, y no sólo la hemorragia cerebral.

enclavación, *s. f.* ó **enclavaje,** *s. m.* Empleo de clavos para mantener los fragmentos óseos en buena posición en ciertas fracturas.

enclavamiento ó **enclave,** *s. m.* (*in*, en; *clavus*, clavo). 1° *enclav. del útero.* Durante la preñez, el útero en retroversión puede alojarse en la pequeña pelvis, acomodarse exactamente á las dimensiones de ésta, comprimir los órganos vecinos (uretra y cuello de la vejiga, recto, vasos y nervios) y poner obstáculo á sus funciones. — 2° *enclav. de la cabeza.* Durante el parto, la cabeza, más ó menos encajada, puede encontrarse apretada hasta tal punto que su expulsión ó su rechazo hacia arriba son igualmente imposibles.

encondroma, *s. m.* (ἐν, dentro; χόνδρος, cartílago). Sin.: *condroma interno* (Virchow). El condroma

desarrollado á expensas de la sustancia medular de los huesos y aún á veces del tejido compacto. Termina por rechazar y romper la cáscara ósea que lo rodea. — Se emplea á veces como sinónimo de *condroma*.

endarteritis, endarteriolitis, *s. f.* Inflamación de la túnica interna de las arterias. No existe sin inflamación concomitante de las otras túnicas: la arteritis es siempre total, mas el máximum de lesiones está en la endarteria. Es sobre todo en las pequeñas arterias que se observa el espesamiento enorme de la túnica interna con tendencia á la obliteración (*endarteritis obliterante*).

endemia, *s. f.* ó **endémica (enfermedad)** (ἐν, dentro; δῆμος, pueblo). Enfermedad especial á una región, sea que reine en ella, sea que vuelva en épocas determinadas.

endérmico (método) (ἐν; δέρμα, piel). Método terapéutico que consiste en aplicar los medicamentos sobre la piel despojada de la epidermis.

endoblasto, *s. m.* (ἔνδον, adentro; βλαστός, germen). Véase: *endodermo*.

endocarditis, *s. f.* Inflamación del endocardio. Puede limitarse á las diferentes válvulas del corazón (*endocarditis valvular* ó *cardiovalvulitis*), ó, al contrario, á las paredes de las cavidades cardiacas (*endocarditis parietal*).

endocarditis infectiva, e. infectante, e. ulcerosa, e. vegetante. Enfermedad infectiva debida al paso á dentro de la sangre de microbios de diferentes clases (estreptococo, estafilococo, etc.), que se localizan especialmente en el endocardio, donde provocan lesiones ulcerosas ó vegetantes.

endocervicitis, *s. f.* (ἔνδον, adentro; *cervix*, cuello). Inflamación de la mucosa del canal cervical uterino.

endocimo, *s. m.* (ἔνδόν; κῦμα, feto) (I. G. Saint-Hilaire). Tumor, situado bastante profundamente, formado por una masa en que se encuentran vestigios del feto, considerado por I. G. Saint-Hilaire como una monstruosidad. Actualmente hay tendencia á considerarlo como quiste dermoideo, lo más frecuentemente.

endocorion, *s. m.* (ἔνδον; χόριον, corion). Sin.: *membrana intermediaria* ó *laminosa*. Tejido celular si-

tuado entre el corion y el amnios. Por este tejido es por donde surcan, á la altura de la placenta, las ramificaciones de los vasos del cordón.

endodermo, *s. m.* (ἔνδον δέρμα, dermo). Sin.: *endoblasto*, *hipoblasto*. Hojilla interna del blastodermo. Está destinada á formar el epitelio del tubo digestivo y todas las glándulas anexas, como también el pulmón: de donde el nombre de *hojilla intestino-glandular* que á veces se le da.

endodiascopia interna (ἔνδον; διά, á través; σκοπεῖν, examinar) (Bouchacourt). Método que consiste en introducir en las cavidades naturales una fuente de rayos X (tubos de Crookes) para radiografiar, y sobre todo para examinar directamente, con la pantalla fluorescente, las imágenes formadas por los tejidos que encuentran dichos rayos X.

endógena (intoxicación). Sin.: *toxicosis*. Intoxicación por sustancias producidas en el organismo, ya por contagios vivos, ya por el organismo mismo (residuos de la nutrición). En este último caso hay autointoxicación.

endógena (producción) (ἔνδον; γενής,, engendrado). La reproducción de ciertas células encapsuladas (cartílago). Dan nacimiento á células-hijas que permanecen inclusas en la cápsula de las células primitivas.

endometritis, *s. f.* (ἔνδον. μήτρα, útero). Inflamación de la mucosa uterina.

endómetro, *s. m.* Mucosa uterina.

endoparásito, *s. m.* (ἔνδον; παράσιτος, parásito). Parásito que vive en el interior del organismo (tubo digestivo ó sus anexos, aparato circulatorio, etc.).

endoplásmica (producción). Los diferentes elementos intracelulares elaborados por la célula. Pueden estar íntimamente unidos al protoplasma ó contenidos en las cavidades circunscritas por éste.

endorradioterapia, *s. f.* (ἔνδον; radioterapia). Aplicación de la radioterapia á las afecciones de las mucosas que tapizan las cavidades naturales. Los rayos X son producidos por aparatos que se introducen más ó menos profundamente y que permiten tratar las afecciones cancerosas ó tuberculosas de la laringe, de la faringe, de la cavidad vaginal, del recto, de la próstata, etc.

endoscopia, *s. f.*

(ἔνδον; σκοπεῖν, examinar). Método de exploración de los conductos (esófago) y de las cavidades de orificio estrecho (vejiga), por medio de un instrumento de óptica llamado endoscopio.

endoscopio, *s. m.* Instrumento destinado á permitir el examen de las cavidades profundas del cuerpo, alumbrándolas por medio de un foco de luz exterior cuyos rayos son reflejados por las paredes del aparato (*endoscopio de luz externa* de Désormeaux), ó por medio de una lámpara eléctrica introducida en la cavidad misma.

endósmosis, *s. f.* (ἔνδον; ὤσμός, empuje). Nombre primitivo de la corriente osmótica dirigida de fuera hacia dentro, reservado actualmente para la corriente osmótica fuerte.

endostetoscopio, *s. m.* (ἔνδον; estetoscopio) (Hoffmann, 1892). Aparato compuesto de una sonda esofágica ordinaria, á cuyo extremo libre se adapta un tubo de vidrio y un pabellón de estetocopio. Con este aparato sería posible explorar los ruidos de la punta ó de la base del corazón, hundiendo la sonda en el esófago 35 centímetros para la punta y 30 centímetros para la base.

endotelioma, *s. m.* Sin. *sammoma*. Tumor formado por la multiplicación de las células endoteliales y su aglomeración en pequeñas masas redondeadas. En el centro de cada una de estas masas se halla un nódulo calcáreo. Este tumor, cuyo sitio es generalmente la aracnoides, ha sido descrito por Cornil y Ranvier con el nombre de *sarcoma angiolítico* (Véase : *angiolítico*).

endotelioma intravascular. Tumor muy raro desarrollado á expensas del endotelio de los capilares sanguíneos, constituido por un sistema de cavidades tubuladas comunicantes entre sí, llenas de sangre y tapizadas de células voluminosas cúbicas ó cilindro-cónicas.

enfermedad, *s. f.* Nombre con que se designa el « proceso mórbido considerado en toda su evolución desde la causa inicial hasta las últimas consecuencias ». (G. H. Roger).

enfisema, *s. m.* (ἐν, dentro; φῦσα, soplo). Infiltración gaseosa difusa del tejido celular.

enfisema pulmonar Lesión consistente en la dilatación exagerada y permanente de los alveolos pulmonares (*enfisema vesicular* ó *alveolar*) capaz de

producir la ruptura de las paredes alveolares y la infiltración gaseosa del tejido celular (*enfisema interlobulillar* ó *intersticial*).

engarzamiento (ó **engarce) de la placenta.** Retención de una parte de la placenta por la contracción irregular y espasmódica de una región limitada del útero.

enilismo, *s. m.* (οἶνος, vino). Forma del alcoholismo provocada por el abuso casi exclusivo del vino, la cual se manifiesta sobre todo por trastornos digestivos, hepáticos (*cirrosis*) y nerviosos (*neuritis periférica, delirium tremens*).

enjundia, *s. f.* Grasa de puerco, ó de gallina, preparada. Tómase también por la de cualquier animal.

enoftalmía, *s. f.* (ἐν, dentro; ὀφθαλμός, ojo). Posición anormal del globo ocular, que se encuentra situado más profundamente dentro de la órbita que en el estado normal. Es síntoma que puede encontrarse en diversas afecciones (parálisis del simpático cervical, fiebres graves); es permanente ó transitorio, ó bien alterna con la exoftalmía.

enoftalmía y exoftalmía alternantes. Afección rara y poco conocida, que termina por la enoftalmía progresiva y está caracterizada por el hecho de que la exoftalmía se produce cada vez que se comprimen las yugulares.

enolado, *s. m.* (οἶνος, vino). Sin.: *vino medicinal.* Medicamento líquido cuyo excipiente es el vino. — Ciertos autores (Béral) han hecho distinción entre los *enolados* y las *enolaturas*: los primeros comprenden las preparaciones en que todas las sustancias medicamentosas son disueltas por el vino; las segundas comprenden aquellas preparaciones en que se ha hecho obrar el vino sobre materias (cortezas, raíces) que abandonan una parte de su sustancia al excipiente.

enomanía, *s. f.* (οἶνος, vino; μανία, locura) (**Rage**). Delirio alcohólico agudo, delirium tremens.

enostosis, *s. f.* (ἐν, dentro: ὀστέον, hueso). Producción ósea, generalmente compuesta de tejido compacto, que llena parte del canal medular de un hueso.

enquistamiento, *s. m.* (ἐν; κύστις, vejiga). Formación de una capa de tejido conjuntivo denso al rededor de un cuerpo extraño ó de una producción patológica, que se encuen-

tran de ese modo aislados del tejido que los rodea.

ensilladura lumbar. Término tomado de la veterinaria y que sirve para designar la curvatura de concavidad posterior que presenta el raquis á nivel de los lomos, curvatura que se exagera en ciertos estados patológicos (tumores abdominales, preñez, coxalgia, etc.)

enteralgia, *s. f.* (ἔντερον, intestino; ἄλγος, dolor). Dolor intestinal.

enterectomía *s. f.* (ἔντερον; ἐκτομή, ablación). La resección de una parte del tubo intestinal.

enteritis, *s. f.* Inflamación de la mucosa intestinal.

enteritis folicular. Variedad de enteritis particular á la primera infancia, caracterizada anatómicamente por la hipertrofia de los folículos cerrados del intestino, y clínicamente por deposiciones mucosas estriadas á menudo de sangre.

enteritis glerosa, enteritis mucomembranosa ó **seudomembranosa** Sin. : *colitis muco* ó *seudomembranosa, diarrea glutinosa* (Van Swieten), *crup intestinal* (Clemens), *etc.* Afección caracterizada por la expulsión con las heces de flemas ó de falsas membranas con acompañamiento de cólicos más ó menos violentos. Se la observa sobre todo en los neurópatas.

entero-anastomosis *s. f.* Sin. *Operación de Maisonneuve.* Operación que consiste en poner en comunicación, lateralmente, dos asas intestinales sin practicar resección previa.

enterocele, *amb.* (ἔντερον, intestino; κήλη, hernia). Hernia compuesta exclusivamente de asas intestinales.

enterocinasis, *s. f.* (Pawlow). Fermento soluble contenido en el jugo duodenal, cuya acción es necesaria para activar la de la tripsina ó fermento proteolítico del páncreas. La tripsina no peptoniza las materias albuminoideas sino en presencia de la *enterocinasis*, por débil que sea, por lo demás, la proporción en que se halle esta sustancia.

enteroclisis, *s. f.* (ἔντερον; κλύξειν, lavar). Lavado del intestino por medio de una sonda que se introduce profundamente en el recto, y de un receptáculo que se levanta más ó menos, de manera á hacer variar la presión.

enterococcia, *s. f.* Estado mórbido causado por la infección por el enterococ

enterococo, *s. m.* (ἔντερον, *coccus*). (Thiercelin). Diplococo que se encuentra en el intestino del hombre sano y desempeña, como el colibacilo, un papel importante en el desarrollo de las enfermedades del tubo digestivo y de sus anexos

enterocolitis, *s. f.* (ἔντερον; κῶλον). Inflamación de la mucosa del intestino delgado y de la del intestino grueso.

entero-epiplocele, *amb.* (ἔντερον; ἐπίπλοον, epiploon; κήλη, hernia). Hernia que contiene intestino y epiploon.

entero-hepatocele, *amb* (ἔντερον; ἧπαρ, hígado; κήλη). Hernia unbilical embrionaria que contiene el hígado junto con asas del intestino.

enterolito, *s. m.* (ἔντερον; λίθος, piedra). Concreción intestinal. Los cálculos del intestino se presentan á menudo bajo la forma de arena y se hallan compuestos principalmente de fosfatos amoniaco-magnesianos.

entero-menorrágica (fiebre). Dismenorrea con acceso febril observada en algunas mujeres atacadas de enteritis. (Dalché); es la *fiebre menorrágica* de Trousseau.

enteroplastia, *s. f.* (ἔντερον; πλάσσειν, formar). Operación cuyo objeto es el restablecimiento del diámetro normal del intestino en los casos de estenosis de este órgano.

enteroptosis, *s. f.* (ἔντερον; πτῶσις, caída) (Glénard). Descenso del colon transverso á consecuencia del relajamiento de su meso. Generalmente está acompañada de esplacnoptosis y da lugar á perturbaciones gastro-intestinales (constipación, etc.).

enteroquistoma simple. Tumor quístico desarrollado en la pared del intestino delgado cerca de la válvula de Bauhino, cuyo diámetro no excede ordinariamente de cuatro centímetros, y proveniente de la involución imperfecta del canal ónfalo-mesentérico. El *enteroquistoma* se observa sobre todo en la primera infancia y puede ocasionar la oclusión intestinal.

enterorrafia, *s. f.* (ἔντερον; ῥαφή, sutura). Sutura de una herida intestinal. Reunión de ambos extremos seccionados del intestino (*enterorrafia término-terminal*), ó anastomosis de un extremo y de una asa (*e. término-lateral*), ó de dos asas (*e latero-lateral.*)

enterorragia, *s. f.* (ἔντερον; ῥήγνυμι, yo desgarro). Hemorragia intestinal.

enterorectostomía, *s. f.* (ἔντερον; *rectum*; στόμα, boca). Sin.: *anastomosis éntero-lateral*. Operación que consiste en anastomosar el intestino con el recto. Se practica esta anastomosis, de preferencia al establecimiento de un *ano contra natura*, cuando el obstáculo al curso de las materias se halla situado demasiado abajo (asa sigmoide) para la entero-anastomosis.

enterotomía, *s. f.* (ἔντερον; τομή, sección). 1° Incisión de una asa intestinal previamente fijada al orificio cutáneo, con el fin de evacuar las materias fecales (oclusión intestinal) — 2° Sección del espolón de un ano artificial por medio del enterotomo.

enterotomo, *s. m.* 1° Cisallas de extremidades redondeadas que sirven en las autopsias, para abrir rápidamente el tubo digestivo en toda su longitud. — 2° Pinza inventada por Dupuytren para seccionar lentamente, por una presión contínua, el espolón que se opone, en el ano artificial, al restablecimiento del curso de las materias.

enterotoxia, *s. f.* (ἔντερον, intestino; τοξικόν, veneno) (Roger y Garnier, 1905). Cantidad de materia intestinal que, inyectada en la vena del conejo, es capaz de matar un kilógramo de materia viva.

enterotóxico (coeficiente). El peso de materia viva que puede matar la totalidad del contenido del intestino delgado.

entóptico, *adj.* (ἐντός, hacia adentro; ὤψ, ὄπτος, ojo). Se dice de las sensaciones luminosas nacidas en la retina.

entótico, *adj.* (ἐντός; οὖς, ὠτός, oído). Se dice del ruido que parte del oído interno, del oído medio ó del interior de los vasos de la caja.

entozoario, *s f.* (ἐντός; ζῶον, animal). Se llaman así los parásitos, de la rama de los helmintos, observados en el hombre y en otros animales. (Esta clasificación ha sido abandonada).

entropión, *s. m.* (ἐν, hacia dentro; τρέπω, yo giro). Inversión de los párpados hacia adentro.

enucleación, *s. f.* (*e*, fuera; *nucleus*). Modo especial de extirpación de un tumor encapsulado ó de un órgano (ojo) á través dos labios de una inc

« como el cuesco de un fruto que salta al comprimir éste. »

enuresis, *s. f.* (ἐν, dentro; οὐρεῖν, orinar). Incontinencia de orina.

enzimo, *s. m.* (ἐν; ζύμη, levadura). Fermento soluble.

enzootia, *s. f.* (ἐν; ζῶον, animal). Enfermedad que ataca, en una región, una ó varias especies de animales, de una manera constante ó en épocas determinadas.

eosinofilia, *s. f.* Variedad de leucocitosis en que los glóbulos blancos cuyo número ha aumentado son exclusivamente *eosinófilos*.

eosinófilo, *adj.* Que presenta gran afinidad por la eosina. — *células eosinófilas* ó *células de Ehrlich*. Variedad de leucocitos notables por sus grandes granulaciones fácilmente colorables por la eosina. Se los encuentra en la sangre, en la expectoración de los asmáticos y en diferentes secreciones patológicas (tuberculosis, neumonía, etc.).

ependimitis, *s. f.* Inflamación del canal del ependimo.

epiblasto, *s. m.* (ἐπι, sobre; βλαστός, germen). Véase : *ectodermo*.

epibolia, *s. f.* (ἐπί; βάλλειν, lanzar). Formación de una cavidad por extensión de las paredes al rededor de una excavación ideal (*gastrulación* en las aves).

epicantis ó **epicanto**, *s. m.* (ἐπι; κανθός, ángulo del ojo). Repliegue semilunar que forma á veces la piel delante del ángulo mayor del ojo.

epicomo, *s. m.* (ἐπι; κομή, cabellera) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por una cabeza accesoria inserta por el vértice sobre el vértice de la cabeza principal.

epicondilalgia, *s. f.* (epicóndilo; ἄλγος, dolor.) Neuralgia profesional del epicóndilo que se presenta á consecuencia de la fatiga del antebrazo.

epicorion, *s. m.* (ἐπί; χόριον, corion). Nombre dado por Chaussier á la caduca.

epicrisis, *s. f.* El conjunto de fenómenos que se presentan después de la crisis y que tienen la misma significación.

epidemia, *s. f.* (ἐπί, sobre; δῆμος, pueblo). Enfermedad infectiva que al mismo tiempo y en el mismo lugar ataca gran número de individuos sometidos á las mismas influencias.

epidemiología, *s. f.* (epidemia; λόγος, discurso). Estudio de las epidemias.

epidérmicos (glóbulos) (Lebert). Pequeñas masas globulares formadas por láminas córneas imbricadas en capas concéntricas, que se encuentran en los *epiteliomas pavimentosos lobulados.*

epidermolisis vejigosa hereditaria (epidermo; λύειν, disolver). Sin. : *pénfigo hereditario.* Dermatosis rara « caracterizada por una fragilidad tal de la epidermis que las presiones exteríores determinan con la mayor facilidad su desprendimiento y su levantamiento en forma de vejigas » (Thibierge).

epididimectomía, *s. f.* (epidídimo; ἐκτοπή, ablación). Extirpacíon quirúrgica del epidídimo.

epididimitis, *s. f.* ἐπί, sobre; διδυμος, testículos). Inflamación del epidídimo. Coincide á menudo con la orquitis.

epidural (método). Sin. : *método de Cathelin* ó *de Sicard.* Introducción de una sustancia medicamentosa en el espacio epidural, es decir, en el canal sacro por fuera de las meninges. Se penetra allí por el extremo inferior del canal sacro, á nivel de la articulación sacrocoxígea.

epifenómeno, *s. m.* (ἐπί, sobre; φαινόμενον, fenómeno). Síntoma accesorio.

epifito, *adj.* y *s. m.* (ἐπί; φυτόν, planta). Planta que vive sobre otras plantas. — Se dice á veces de los criptógamos parásitos de los animales.

epífora, *s. f.* (ἐπί; φέρω, llevo). Derrame de lágrimas sobre las mejillas en aquellos casos en que no pueden pasar por los puntos lacrimales (parálisis facial, dacriocistitis).

epigastralgia, *s. f.* (epigastrio; ἄλγος, dolor). Dolor en el epigastrio.

epigastrocele, *amb.* (epigastrio; κήλη, hernia). Hernia de la línea blanca.

epiglotitis, *s. f.* (ἐπί, sobre; γλῶσσα, lengua). Inflamación catarral aguda de la laringe y la faringe que presenta su máximum en la epiglotis, es causada lo más á menudo por la acción irritante de licores alcohólicos ó por la ingestión de líquidos demasiado calientes ó helados.

epignato, *s. m.* (ἐπί; γνάθος mandíbula) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble caracterizado por la implantación del parásito

sobre el maxilar superior (apófisis palatina).

epilepsia, *s. f.* (ἐπιλάμβανειν, asir). 1° *epilepsia esencial*. Sin.: *mal comicial, alto mal*. Afección de causa desconocida, que empieza en la infancia y se manifiesta por ataques convulsivos generalizados, con pérdida del conocimiento, por vértigos, por ausencias; estos fenómenos sobrevienen en medio de la más perfecta salud aparente. — 2° *epilepsia sintomatica*. Sindroma caracterizado por ataques convulsivos, limitados á una parte del cuerpo ó generalizados, que aparecen bajo la influencia de diversos estados patológicos.

epileptiforme, *adj.* Que presenta los caracteres de la epilepsia. — *Neuralgia epipleptiforme* (Trousseau). Véase: *tic doloroso de la cara*.

epiplocele, *amb.* (ἐπιπλοον; κήλη). Hernia del epiploon.

epiploitis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica de la porción de epiploon contenida en una hernia.

epiplopexia, *s. f.* (ἐπίπλοον; πήξις, fijación). Fijación del epiploon á la pared. Véase: *Talma* (*operación de*).

episcleritis, *s. f.* Inflamación del tejido celular que rodea la esclerótica; es más frecuente que la *escleritis* y presenta los mismos caracteres.

episiorrafia, *s. f.* (ἐπίσειον, pubis; ῥαφή, sutura). Operación que consiste en obliterar la vagina avivando y suturando las caras internas de los grandes labios.

episiotomía, *s. f.* (ἐπίσειον; τόμη, sección). Operación que consiste en practicar una ó varias incisiones en el contorno de la vulva, de manera de ensanchar su orificio: su objeto es evitar la ruptura traumática del periné en el curso del parto.

epispadias, *s. m.* (ἐπί, sobre; σπάω, divido). Deformación congénita de la uretra del hombre, caracterizada por la situación anormal del meato sobre la cara dorsal del pene.

epispático, *adj.* y *s. m.* (ἐπισπάω, atraigo). Se dice de las sustancias que provocan la vesicación de la piel (mostaza, cantárida, etc.).

epistaxis, *s. f.* (ἐπί, sobre: σταξειν, correr gota á gota) (Vogel y Pinel, 1808). Flujo de sangre de la nariz.

epitelioides (células). Células que se encuentran en ciertos productos pa-

tológicos (zona media de los tubérculos). Se acercan por su aspecto á las células epiteliales, pero se las considera actualmente como leucocitos modificados.

epitelioma, *s. m.* Tumor formado por tejido epitelial sin que reproduzca la estructura de órgano definido alguno (glándula). Presenta numerosas variedades, según el tipo de epitelio reproducido (*epitelioma pavimentoso, ep. cilíndrico*), y según la disposición de las células (*epitelioma lobulado, ep. tubulado, ep. perlado*).

epitelioma mucoide. Véase: *cisto-epitelioma.*

epiteliomatosis, *s. f.* Se llama así á veces la enfermedad caracterizada por el desarrollo del epitelioma.

epitema, *s. m.* (ἐπί, sobre; θέμα, acción de poner). Tópicos que no son ni ungüentos ni emplastos (cataplasmas, polvos, etc.).

epizoario, *s. m.* (ἐπί; ζῶον, animal). Nombre genérico dado á los parásitos animales que viven en la superficie del cuerpo (pulgas, piojos, ácaros, etc.)

epizootia, *s. f.* (ἐπί; ζῶον, animal). Enfermedad que ataca simultáneamente gran número de animales de la misma ó de diferentes especies.

epulia, epúlida ó **épulis,** *s. f.* (ἐπί; οὖλον, encía). Tumor desarrollado sobre el reborde alveolar de las encías, pero cuyo punto de partida es el maxilar ó su periósteo. Frecuentemente son ósteosarcomas, á veces fibromas. El cáncer epitelial puede presentarse al principio bajo forma de *épulis* (*épulis epitelial*)

equimolecularidad, *s. f.* Véase: *isotonia.*

equímosis, *s. f.* (ἐκ, fuera; χυμός, jugo). Mancha, ya negra, ya oscura ó amarillenta, que resulta de la infiltración del tejido celular por una cantidad variable de sangre. Puede aparecer en la piel, las mucosas ó las serosas.

equinismo, *s. m.* (*equus:* caballo). Nombre dado á la deformación del *pie zambo equino* (véase esta palabra).

equino, *adj.* Véase: *pie zambo.*

equinococo, *s. m.* (ἐχῖνος, erizo; κόκκος, grano). Sin.: *tenia equinococo* Tenia que habita el intestino del perro y cuyo huevo, ingerido por el hombre con los alimentos, da nacimiento á un embrión hexacanto. Este último, después de ha-

ber atravesado las paredes del intestino, se fija en un órgano, generalmente en el hígado, donde, desarrollándose, produce el quiste hidatídico.

equinococosis, *s. f.* Enfermedad debida al desarrollo, en el organismo, de la larva de *tænia echinococcus*, el cual se traduce por la formación de un quiste hidatídico. — *equinococosis secundaria* (Dévé), *equinococosis* determinada por el ingerto de los gérmenes equinocóccicos puestos en libertad por la ruptura de un quiste hidatídico primitivo.

Erb (paraplejia de). Tipo de mielitis dorsal de origen sifilítico, que se manifiesta por la rigidez espasmódica de los miembros y debilidad del esfíncter vesical.

Erb (signo de). 1° Aumento de la excitabilidad eléctrica de los músculos y de los nervios en la tetania. — 2° Desaparición del reflejo pupilar al dolor (tabes).

Erb (sindroma de) (1878). Sin. : *parálisis bulbar asténica* (Strümpell), *miastenia grave seudoparalítica* (Jolly). Parálisis de la lengua, del velo del paladar, de la faringe y de la laringe, que presenta remisiones después de períodos de reposo. Así, la palabra bien articulada al principio de la frase se transforma rápidamente en una farfulla ininteligible. Hay, además, parálisis del facial superior, del facial inferior y de los músculos de los ojos.

Erb (tipo escápulo-humeral ó forma juvenil de). Nombre bajo el cual Erb reune los diferentes casos de atrofia muscular progresiva que han empezado por el hombro y el brazo y atacan preferentemente á los niños.

Erb-Goldflam (sindroma de). Sin. : *astenia bulbo-espinal.* Este sindroma comprende perturbaciones bulbares descritas por Erb (véase : *sindroma de Erb*) y perturbaciones espinales que consisten en la parálisis de los músculos del cuello, de la nuca y de la raíz de los miembros. Esta parálisis, como la del sindroma de Erb, presenta carácter miasténico.

eréctil (tumor). Véase : *angioma cavernoso.*

eréctil pulsátil (tumor). Véase : *aneurisma cirsoide.*

erepsina, *s. f.* (Cohnheim). Fermento del jugo duodenal, que se comporta con las albumosas del mismo

modo que la enterocinasis con las albúminas.

eretismo, *s. m.* (ἐρεθίζω, yo irrito). Aumento mórbido de la actividad de un órgano. Ej.: *eretismo cardiaco.*

ereutofobia, *s. f.* (ἐρεύθω, me ruborizo; φόβος, temor). (Pitres y Regis, 1896). Temor angustioso y mórbido de ruborizarse, acompañado de rubor efectivo.

ergógrafo, *s. m.* (ἔργον, trabajo; γράφειν, escribir). Instrumento destinado á registrar y evaluar el trabajo muscular.

ergómetro, *s. m.* (ἔργον, trabajo; μέτρον, medida). Instrumento destinado á medir el trabajo ejecutado por un músculo ó un grupo muscular.

ergotismo, *s. m.* Accidentes provocados por el empleo alimenticio repetido del cornezuelo de centeno. Dichos accidentes son ó convulsivos (*ergotismo convulsivo*) ó gangrenosos (*erg. gangrenoso*).

Erichsen (signo de). Dolor determinado en la interlínea sacro-ilíaca, en la sacro-coxalgia, cuando se acercan los huesos ilíacos apoyando bruscamente sobre los dos espinas ilíacas anteriores y superiores.

erisipela, *s. f.* (ἐρύειν, atraer; πέλας, próximo; ó ἐρεύθω, enrojecer; πέλα, piel). Afección infectiva contagiosa, debida á la introducción bajo la piel de un agente patógeno especial, el estreptococo de Fehleisen, y caracterizada por una inflamación particular de los tegumentos limitada por un rodete, y síntomas generales más ó menos graves.

erisipela bronceada. Véase: *septicemia sobreaguda.*

erisipeloide, *s. f.* (Rosenbach). Afección análoga á la erisipela pero más benigna. Tiene por punto de partida una lesión cutánea y está caracterizada por una infiltración limitada, rojo oscura, que se extiende á veces al tejido subcutáneo, á las vainas sinoviales y cápsulas articulares, sin terminar jamás por supuración.

eritema, *s. m.* (ἐρύθημα, rubor en la piel). Nombre genérico de una serie de afecciones cutáneas que tienen como carácter clínico común el rubor más ó menos intenso de los tegumentos, que desaparece á la presión.

eritema nudoso. Sin.: *dermatitis contusiforme, urticaria tuberosa.*

Sindroma que comprende una erupción de nudosidades eritematosas limitadas á las piernas y á los pies, más rara vez á los antebrazos, síntomas generales más ó menos marcados, y, frecuentemente, artropatías de intensidad variable. Atribuido antes al reumatismo, se le considera hoy como una variedad del eritema polimorfo, ó como una enfermedad provocada por un parásito específico desconocido.

eritema pernio. Sabañón.

eritema polimorfo. Sindroma compuesto de una erupción polimorfa (eritema, pápula, vesícula, vejiga) principalmente en las manos y los antebrazos, de síntomas generales más ó menos acentuados y de determinaciones articulares y más rara vez viscerales (endopericarditis, pleuresía, meningitis, nefritis). Por mucho tiempo se lo atribuyó al reumatismo; parece estar bajo la dependencia de un parásito especial que no se ha logrado aislar aún.

eritrasma, *s. m.* Enfermedad de la piel causada por un parásito llamado *microsporon minutissimum*, limitada á la región inguinoescrotal, donde se presenta bajo la forma de una placa con exfoliación de la epidermis, sin dar lugar, en general, á síntomas subjetivos.

eritremia, *s. f.* (ἐρυθρός, rojo; αἷμα, sangre) (Türck). Afección caracterizada por el aumento del número de los glóbulos rojos de la sangre, acompañado de cianosis y de esplenomegalia. Es debida á la superactividad de los órganos hematopoyéticos, que se ejerce sobre los glóbulos rojos, mientras que la leucemia es determinada por la superactividad de los mismos órganos ejercida sobre los glóbulos blancos (Vaquez).

eritrismo, *s. m.* (ἐρύθρος, rojo). Coloración más ó menos roja del sistema piloso (antropología).

eritroblástico, *adj.* (ἐρύθρος; βλαστός, célula). Que atañe á la formación de los glóbulos rojos.

eritrocito, *s. m.* (ἐρύθρος; κύτος, célula). Glóbulo rojo nucleado.

eritrodermia, *s. f.* (ἐρύθρος; δέρμα, piel). Dermatosis generalizadas á toda la extensión de los tegumentos y caracterizadas por el rubor vivo y uniforme de la piel, seguido de una descamación intensa (*eritrodermia exfoliante* de Besnier). Su carácter evolutivo

varía con la causa y la naturaleza.

eritrofobia, *s. f.* (ἐρύθρος; φόβος, temor). 1° Temor angustioso al color rojo. — 2° Temor mórbido de ruborizarse.

eritrolisis, *s. f.* (ἐρύθρος, rojo; λυεῖν, disolver). Destrucción de los glóbulos rojos. Véase : *hematolisis*.

eritromelalgia, *s. f.* (ἐρύθρος; μέλος, miembro; ἄλγος, dolor) (Weir-Mitchel, 1878). Afección caracterizada por accesos dolorosos, con hinchazón y rubor de los tegumentos, en las extremidades y particularmente en los pies. Se halla clasificada como neuro-is al lado de la enfermedad de Raynaud.

eritropoyesis, *s. f.* (ἐρυθρός; ποιεῖν, hacer). Formación de los glóbulos rojos.

eritropsia, *s. f.* (ἐρύθρος; ὄψις, vista). Tinte rojo uniforme que parece colorar todos los objetos. La *eritropsia* puede aparecer bajo forma de accesos (*eritropsia paroxística*) en el curso de la epilepsia.

eritrosis, *s. f.* Excesiva facilidad para ruborizarse.

erotomanía, *s. f.* (ἔρως, amor; μανία, manía). Forma de delirio caracterizada por preocupaciones de orden genital.

errático, *adj.* 1° Irregular. Ej. : *fiebre errática* — 2° Ambulante. Ej. : *erisipela errática*.

eructación, *s. f.* (ἐρευγμός). Emisión por la boca de gases provenientes del estómago.

erupción, *s. f.* (*erumpere*, salir). 1° Vease : *exantema*. — 2° *erupción de los dientes*. Aparición de los dientes.

Esbach (tubo de). Véase : *albuminímetro*.

escafocefalia, *s. f.* (σκάφη, barca; κεφαλή, cabeza) antropología). Sin. : *esfenocefalia*. Deformación craneana debida á la osificación precoz de la sutura sagital, y caracterizada por la forma elevada, muy alargada y muy achatada lateralmente, del cráneo, que presenta el tipo dolicocéfalo exagerado.

escalpelo, *s. m.* (*scalpere*, cortar). Instrumento cortante destinado á la disección.

escama, *s. f.* (*squama*). Laminillas epidérmicas que se desprenden de la superficie de la piel. Cuando son pequeñas y muy finas se llaman *harinosas*, *furfuráceas* ó *pitiriásicas*. — La descamación de la epidermis constituye una lesión elemental de la piel ; las dermatosis en que toma gran impor-

tancia se dicen *dermatosis escamosas* Ej. : la *soriasis*.

escansión, *s. f.* (*scandere*, escandir). Perturbación de la pronunciación que consiste en separar las sílabas de cada palabra como se hace cuando se miden versos.

escápulas aladas (*scapulæ alatæ*). Omóplatos separados del tórax á causa de la atrofia de los músculos que los mantienen aplicados contra la espalda, y en particular de los músculos romboideos.

escápula flotante. Afección caracterizada por la atrofia del hombro, el alargamiento exterior de la cápsula articular y la impotencia absoluta del miembro que se mece pasivamente en todo sentido. Es debida á la parálisis de todos los músculos del hombro, generalmente de origen mielítico parálisis infantil).

escapulalgia, *s. f.* (escápula; ἄλγος, dolor). Sin. : *omalgia* Ciertos autores designan con este nombre todas las artritis crónicas del hombro. Ordinariamente se reserva el término á la artritis tuberculosa de dicha articulación.

escapulectomía, *s. f.* (escápula; ἐκτομή, ablación). Ablación primitiva y total del omóplato, con conservación del miembro superior.

escara, *s. f* (ἐσχάρα, costra). Tejido mortificado. Cuando la parte esfacelada es superficial, se presenta bajo la forma de una costra negruzca, más ó menos espesa, que tiende á eliminarse.

escarificación, *s. f.* (*scarificare*, de σκαριφεῦειν, cortar). Incisión superficial hecha con el bisturí, ó con un aparato especial llamado *escarificador* y destinado á practicar sangrías locales.

escarótico, *adj.* y *s.m.* Se dice de las sustancias que, aplicadas á la piel, producen escara.

escarlatina, *s. f.* (escarlata). Enfermedad infectiva, epidémica y contagiosa. caracterizada por un exantema generalizado de color escarlata, por un enantema bucal y faringeo de igual aspecto, y por una descamación en anchas placas, que empieza por la lengua, la cual toma un aspecto característico, y se extiende más tarde á toda la superficie cutánea.

escarlatinoide metadiftérica. Erupción con fiebre y con todos los caracteres de la escarlatina, que se observa á veces en el curso de la difteria. Atri-

buida primero á los accidentes causados por el suero, se la considera actualmente por muchos autores como una escarlatina verdadera.

esciagrafía, *s. f.* (σκιά, sombra; γραφή, dibujo). Véase: *radiografía.*

esciagrama, *s. f.* (σκιά, sombra; γράμμα, escrito). Prueba obtenida por la radiografía.

esciascopia, *s. f.* (σκιά; σκοπεῖν, examinar). Sin.: *queratoscopia. método de Cuignet, pupiloscopia, retinoscopia.* Examen de la sombra pupilar con el objeto de determinar el grado de refracción del ojo examinado.

escíbalos, *s. m. pl.* (σκύβαλα, excrementos). Excrementos duros y redondeados que, á causa de la constipación tenaz, se acumulan en el intestino.

escirro, *s. m.* (σκίῤῥος, cuerpo duro). Variedad de carcinoma en que las trabéculas fibrosas son espesas y resistentes. — *escirro atrófico.* Aquel en que la proliferación del tejido fibroso produce el ahogamiento de los alveolos y de las células y, por consiguiente, la retracción del tumor.

esclerectomía, *s. f.* (esclerótica; τομή, sección). Sección de la esclerótica.

esclerema de los recién nacidos (σκληρός, duro). Afección caracterizada por el endurecimiento de la piel, con pérdida de la motilidad de los tegumentos sobre las partes profundas, acompañada de fenómenos de atrepsia. Comienza ordinariamente de 8 á 10 dias después del nacimiento y termina en general por la muerte en pocos dias.

escleremia, *s. f.* (Alibert) Véase: *esclerodermia.*

escleritis, *s. f.* Inflamación de la esclerótica. Se localiza ordinariamente en el tejido celular epi-escleral (*episcleritis*).

esclero-coroiditis, *s. f.* Afección caracterizada por la atrofia parcial de la coroide, que puede llegar á desaparecer, y el adelgazamiento de la esclerótica, que produce la ectasia de esta membrana bajo forma de abolladuras más ó menos irregulares.—La *esclero-coroiditis* puede ser: *posterior*, coincidiendo con el estafiloma posterior y manifestándose por miopía progresiva, escotomas diversos y disminución de la acuidad visual; —*anterior*, y se manifiesta por la deformación de la parte anterior de la esclerótica (estafil-

anterior), con neuralgias ciliares más ó menos vivas según la marcha de la afección (aguda ó crónica), aparición de escotomas, estrechamiento irregular del campo visual y tendencia á la pérdida total de la visión.

esclerodactilia, *s. f.* (σκληρός; δάκτυλος, dedo). Esclerodermia limitada á los dedos.

esclerodermia, *s. f.* (σκληρός; δέρμα, piel). Dermatosis caracterizada por el espesamiento y la induración de la piel y del tejido sub-cutáneo. La *esclerodermia* puede ser *secundaria*: es entonces consecutiva á inflamaciones repetidas ó á edemas crónicos. Puede también ser *primitiva*: presenta entonces distintas variedades que entran en el grupo de las trofoneurosis. Ej. *esclerodermia simétrica difusa*, *esclerodermia en placas* ó *morfea*, *esclerodermia en bandas*.

esclerógeno (método) (σκληρός; γεννᾶν, engendrar). Método consistente en determinar la producción de tejido fibroso, con un fin terapéutico. Ha sido preconizado principalmente en el tratamiento de las artritis tuberculosas, y también en la cura radical de la hernia en los niños. El agente empleado como esclerosante es el cloruro de zinc en solución al 1/10, de la que se inyectan algunas gotas en los puntos en que se desea producir la esclerosis.

esclero-lipomatosis, *s. f.* Hiperplasia del tejido conjuntivo intersticial de un órgano, con acumulación de células grasosas y atrofia de los elementos nobles del órgano. Ej. *esclerolipomatosis de las fibras musculares*.

esclero-meningitis. *s. f.* Véase : *paquimeningitis*.

esclerosis, *s. f.* (σκληρός, duro). Induración patológica de un órgano ó tejido, á consecuencia de la hipertrofia del tejido conjuntivo que entra en su estructura.

esclerosis de los cordones posteriores. Véase : *tabes dorsal*.

esclerosis en placas (Charcot y Vulpián, 1866). Afección de los centros nerviosos caracterizada, anatómicamente, por placas de esclerosis diseminadas en mayor ó menor número en la superficie de las circunvoluciones, de la médula, y en los cortes de estos órganos; y, clínicamente, por un conjunto de síntomas ce-

rebrales, bulbares y espinales, correspondientes á las localizaciones de las lesiones. Los fenómenos espasmódicos, el temblor intencional y el nistagmus son los signos más constantes de esta afección.

esclerosis lateral amiotrófica. Sin. *enfermedad de Charcot* (1865). Afección caracterizada clínicamente por la coexistencia de fenómenos de parálisis espasmódica y de atrofia muscular progresiva, capaz de llegar al sindroma de la parálisis labio-glosolaringea; y anatómicamente por la degeneración del manojo piramidal y la atrofia de las grandes células ganglionares de los cuernos anteriores de la sustancia gris.

esclerosis combinadas. Grupo anatomopatológico que reune cierto número de lesiones de la médula espinal que tienen como carácter común la coincidencia de esclerosis de los cordones posteriores y de los cordones laterales. Desde el punto de vista clínico, los síntomas recuerdan á veces los de la tabes ó realizan otras el tipo espasmódico.

escleroso, *adj.* (σκληρός, duro). Fibroso.

escleróticonixis, *s. f* (esclerótica; νύσσειν, agujerar). El tiempo de la operación de la catarata que consiste en hacer una incisión á la esclerótica.

escleróticotomía ó **esclerotomía,** *s. f.* (esclerótica; τομή, sección) (Snellen). Incisión de la esclerótica.

escobillonaje, *s. m.* Limpia y cepillaje de la cavidad uterina por medio de un escobillón.

escódico (ruido) ó **escodismo,** *s. m.* (de Skoda, médico austriaco). Sonido timpánico suave obtenido por la percusión del vértice del pulmón sano, en el curso de una pleuresía con derrame mediano.

escólex, *s. m.* (σκώληξ, gusano). Parte anterior, provista de ventosas, y á veces de ganchos, de los helmintos cestoides (cabeza de tenia).

escoliosis, *s. f.* (σκολιός, tortuoso). Desviación lateral del raquis.

escorbuto, *s. m.* (del esclavón *scorb*, enfermedad). Enfermedad epidémica caracterizada por hemorragias múltiples, sobre todo en las encías, que se ponen fungosas, por desórdenes gastrointestinales y por una caquexia progresiva que ter-

mina á menudo en la muerte. Se atribuye generalmente la enfermedad á un defecto en la alimentación, el cual consiste en la privación de legumbres y de frutas frescas.

escorbuto infantil. Véase : *Barlow* (*enfermedad de*).

escotodinia, *s. f.* (σκοτοδινια, de σκότος, oscuridad y δίνη, giramiento) (Gorter). Véase : *vértigo apoplético.*

escotoma, *s. m.* (σκότος, oscuridad). Mancha inmóvil que oculta una parte del campo visual, situada ya en el centro, ya en la periferia; es regular ó irregular y depende ordinariamente de una lesión del nervio óptico. — *escotoma centelleante.* Mancha brillante, movible, formada ya de líneas quebradas, ya de chispas diversamente coloreadas, que perciben los que padecen ciertas neuropatías y en particular la jaqueca oftálmica.

escribomanía, *s. f.* (*scribere*: μανία). Véase : *graforrea.*

escrófula, *s. f.* (de *scrofa*, marrana, por analogía con los tumores ganglionares del puerco). Se designa con este nombre « una manera de ser de ciertos individuos, un terreno especial sobre el cual se desarrolla con la mayor facilidad el bacilo de la tuberculosis y también otros gérmenes mórbidos que producen en aquel lesiones un tanto especiales » (de Gennes).

escrofúlide, *s. f.* (Bazin y Hardy). Nombre genérico de las afecciones cutáneas que están en relación etiológica con la escrófula. Esta palabra se emplea poco actualmente.

escrófulo-tuberculosis, *s. f.* Forma atenuada de la tuberculosis ganglionar y ósea, que se observa frecuentemente en los niños.

escuarroso (favo) (*squarrosus*, sarnoso) (Cornil y Ranvier). Nombre dado al *favus* cuando se presenta bajo la forma de costras grises, espesas y sobrepuestas las unas á las otras (imbricadas).

esencial, *adj.* Se dice de las afecciones, de los síndromas, ó de los síntomas, que no pueden relacionarse con ningún estado mórbido definido, por contraposición á *sintomático*. Ej. *taquicardia esencial.*

esencismo, *s. m.* Intoxicación por las bebidas que contienen esencias, tales como el ajenjo.

esfacelo, *s. m.* (σφάκελος, mortificación). Gangrena.

esfenencéfalo o **esfenocéfalo**, *s. m.* (σφήν,

cuña, esfenoide; ἐγκέφαλος, encéfalo, ó κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo otocefaliano caracterizado por la configuración del esfenoides, cuya forma semeja la del esfenoide de las aves. Véase: *otocéfalo*.

esfenocefalia, *s. f.* (antropología). Véase: *escafocefalia*.

esfenoiditis, *s. f.* Inflamación del seno esfenoidal.

esfenotresia, *s. f.* (esfenoide; τρῆσις, perforación), ó **esfenotripsia**, *s. f.* (esfenoide; τρίψις, trituración). Variedad de embriotomía que consiste en perforar el cráneo con un instrumento especial destinado á romper el esfenoide (esfenotribo).

esfígmico, *adj.* (σφυγμός, pulso). Lo referente al pulso.

esfigmógrafo, *s. m.* (σφυγμός, pulso, γράφειν, escribir). (Marey). Instrumento registrador esencialmente compuesto de una palanca, cuyo brazo menor se aplica sobre una arteria (la arteria radial ordinariamente) y el mayor inscribe, amplificándolas, sobre una banda de papel, las pulsaciones arteriales.

esfigmograma, *s. m.* (σφυγμός; γράμμα, escritura). Trazo esfigmográfico del pulso.

esfigmomanómetro, *s. m.* Aparato compuesto principalmente de un manómetro de aire destinado á medir la tensión del pulso.

esfigmómetro, *s. m.* (σφυγμός; μέτρον, medida). Instrumento para medir el pulso (abandonado desde la invención del esfigmógrafo).

esfinteralgia, *s. f.* (esfínter; ἄλγος, dolor). Dolor en el esfínter anal.

esguince, *s. m.* Lesión traumática de una articulación, resultado de su distensión brusca, con arrancamiento de los ligamentos y sin cambio de lugar permanente de las superficies articulares.

Esmarch (banda ó aparato de). Aparato compuesto de una banda elástica que se arrolla al rededor de un miembro para echar la sangre hacia la raíz de éste, y de un lazo circular, igualmente elástico, que impide el regreso de la sangre al miembro exsangüe.

esmegma, *s. m.* (σμῆγμα, jabón). Materia blancuzca, parecida á jabón mojado, que se encuentra en el hombre en el surco balano-prepucial, y en la mujer entre los pequeños labios y el clítoris: es el producto

de la descamación de las células epiteliales de los órganos genitales.

esofagismo, *s. m.* Contractura espasmódica del esófago, que determina el estrechamiento más ó menos pronunciado del órgano, sin lesión apreciable en el punto de la contractura.

esofagitis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica del esófago.

esófagomalacia, *s. f.* (οἰσόφαγος, esófago; μαλακός, blando)(Zenker y Ziemssen). Friabilidad de la pared del esófago causada por la acción del jugo gástrico en los enfermos que tienen vómitos frecuentes Este reblandecimiento podría determinar la ruptura del esófago.

esófagorragia, *s. f.* (οἰσόφαγος; ῥήγνυμι, yo rompo). Hemorragia que se produce en la mucosa del esófago.

esófago-salivar(reflejo) (Roger, 1904). La excitación mecánica del esófago provoca una salivación considerable. Este reflejo se efectúa por intermedio del neumogástrico.

esófagocospia, *s. f.* (οἰσόφαγος; σκοπεῖν, examinar). Aplicación de la endoscopia al examen del esófago.

esófagostomia, *s. f.* (οἰσόφαφος; στόμα, boca). Operación que consiste en abrir sobre el esófago, por debajo de un punto estrechado, un orificio permanente por el que se puede alimentar el enfermo.

esófagotomía, *s. f.* (οἰσόφαγος; τομή, incisión). 1° *esofagotomía interna*. Operación que consiste en seccionar una estrechez esofágica de dentro á fuera por medio del esófagotomo. — 2° *esófagotomía externa*. Operación de abrir el canal esofágico de fuera adentro, ya para extraer un cuerpo extraño, ya para obrar directamente sobre una estrechez, ya en fin para alimentar el enfermo.

esófagotomo, *s. m.* Instrumento que sirve para practicar la esòfagotomía interna. Consta de un largo tallo graduado, destinado á ser introducido en el esófago hasta la estrechez y el cual lleva en el extremo láminas que pueden hacerse funcionar para seccionar la estrechez.

espagiria, *s. f.* (σπαν, extraer; ἀγείρειν, reunir) (Paracelso). Antiguo nombre de la química.

espanemia, *s. f.* (σπάνις, falta de; αἷμα, sangre). Véase : *anemia*.

esparadrapo, *s. m.* (*spargere*, extender; *drap*,

en francés, paño). Tejido cubierto de una materia emplástica en que se incorpora á veces un medicamento.

espasmo, *s. m.* (σπασμὸς de σπάω, contraigo). Contracción involuntaria de un grupo muscular, de un músculo solo ó aún de un manojo aislado. Algunos autores limitan el término á la contracción convulsiva de los músculos lisos.

espasmo glótico esencial de los niños de pecho. Véase : *Kopp* (*asma de*).

espasmos funcionales Duchenne de Boulogne). Sin. *Calambres funcionales* ó *profesionales*. Afección caracterizada por convulsiones tónicas entrecortadas á veces con sacudidas clónicas ó con temblores, ó por impotencia funcional. Manifiéstanse estos diversos accidentes sólo en el ejercicio de ciertos movimientos voluntarios ó instintivos y se limitan á algunos músculos de los que entonces entran sinérgicamente en acción. Ej. : *calambre de los escribanos, de los pianistas, de las bailarinas, de los telegrafistas, etc.*

espasmódico ó **espástico**, *adj.* Que va acompañado de contractura.

espasmódica (marcha). Andar de los enfermos atacados de paraplejia espasmódica. Los miembros inferiores están rígidos, los muslos y las rodillas apretados, los pies en equinismo deslizan sobre el suelo y no son colocados uno delante del otro sino por la oscilación del tronco, que alternativamente se inclina á derecha y á izquierda describiendo una ligera rotación (*andar de gallináceo* de Charcot).

espasmofilia, *s. f.* (σπασμός ; φιλία, tendencia) (Féré.) Predisposición hereditaria de ciertos individuos, de padres neurópatas, á las convulsiones.

específico, *adj.* (*species*, especie ; *facere*, hacer). Se dice de las enfermedades que forman especie separada y cuya causa es siempre semejante. Siendo la sífilis la única enfermedad en que la especificidad parecía indiscutible antes de los descubrimientos bacteriológicos, tómase algunas veces esta palabra como sinónimo de *sifilítico*.

especular (escritura). Véase : *espejo* (*escritura en*).

espéculo, *s. m.* (*speculum*, espejo). Instrumento que sirve para mantener anchamente abiertos los orifi-

cios de las cavidades naturales, con el objeto de facilitar la exploración de éstas (vagina, nariz, oídos, ano. etc.).

espejo (escritura en). Variedad de escritura en que las letras y las palabras se siguen de derecha á izquierda como en un espejo Ciertos afásicos escriben así con la mano izquierda; pero esta escritura especular no constituye una variedad especial de afasia, como se ha creido : representa la escritura instintiva normal de la mano izquierda.

espejo (palabra en). Perturbación de la palabra observada muy rara vez en los afásicos y que es á la palabra ordinaria lo que la *escritura en espejo* es á la escritura. Se ha observado ora la inversión de las sílabas en las palabras y de las palabras en la frase, ora la inversión de las letras en la palabra, conservando cada palabra su lugar en la frase.

espermatocele, *amb.* (σπέρμα. semen; κήλη, tumor). Tumefacción formada por la acumulación de esperma en el testículo ó en el epidídimo (de origen desconocido).

espermatocistectomía, *s. f.* Sin. : *vesiculecomía.* Ablación de las vesículas seminales.

espermatocistitis, *s. f.* Sin. : *vesiculitis.* Inflamación de las vesículas seminales, lo más á menudo de origen blenorrágico.

espermatorrea, *s. f.* (σπέρμα, semen ; ῥεῖν, correr). Emisión involuntaria de esperma.

espermolito. *s. m.* (σπέρμα ; λίθος, piedra). Cálculo de las vías espermáticas (vesículas seminales).

espermotoxina, *s. f.* Véase : *citotoxina.*

espica, *s. f.* (*spica,* espiga). Vendaje cruzado aplicado en la raíz de un miembro. Ej. : *espica de la ingle.*

espina bifida (*spina bifida*). Sin. : *hidrorraquis.* Deformación congénita que consiste en la fisura del raquis, debida á la no soldadura de uno ó varios arcos vertebrales, á través de la cual hacen hernia, bajo forma de un tumor más ó menos voluminoso, las meninges, y á veces la médula, con una cantidad variable de líquido céfalo-raquídeo.

espinalgia, *s. f.* *spina*; ἄλγος, dolor). Sensibilidad de las apófisis espinosas á la presión. Esta sensibilidad particular observada en las apófisis comprendidas entre la segunda y la séptima dorsal, mientras las demás permanecen insensibles, se-

ría debida, según Neisser y Petruschky, á la tuberculosis primitiva de los ganglios brónquicos y sería un signo precoz de la infección tuberculosa.

espina ventosa (*spina ventosa*). Variedad de tuberculosis ósea observada en los huesos largos del pie y de la mano (falanges), y caracterizada por el ensanchamiento del cuerpo del hueso con adelgazamiento de su tejido. Parecería que se hubiera insuflado gas en su interior.

espinitis, *s. f.* Sin.: *raquialgitis*. Nombre bajo el que se confundía antes la inflamación de la médula y la de sus membranas (la mielitis y la meningitis espinal).

espirema (fase del) (σπείρημα, pelotón). Sin.: *fase del pelotón cromático*. Primera fase de la cariocinesis, caracterizada por el acortamiento y el espesamiento del filamento nuclear, cuyo apelotonamiento se percibe con claridad.

espirilo, *s. m.* (*spirillum*). Las bacterias en forma de filamentos largos y contorneados en hélice.

espirilosis, *s. f.* Nombre genérico de las enfermedades provocadas por espirilos.

espiróforo, *s. m.* (*spirare*, respirar; φέρω, llevo). Instrumento inventado por Woillez (1876) y destinado á practicar la respiración artificial à los asfixiados.

espirómetro, *s. m.* (*spirare*; μέτρον, medida). Instrumento que sirve para medir la capacidad vital del pulmón, es decir, el volumen de aire que puede expulsar una expiración máxima después de una inspiración máxima.

espiroquete, *s. m.* (*spirochæta*, Blanchard, ó *spirochæte*. Cohn). Género de protozoarios flagelados cuyo cuerpo, excesivamente delgado, aplanado y contorneado en espiral, presenta una fina membrana ondulante y en espiral; no tiene flagela.

espiroquetosis, *s. f.* Nombre genérico de las enfermedades provocadas por las distintas variedades de espiroquetes. Ej.: *la fiebre recurrente*, la *tick-fever* (Kirk) del centro del Africa, la *angina de Vincent*.

espiroscopio, *s. m.* (*spirare*, respirar; σκοπεῖν, examinar). Instrumento que sirve para estudiar los ruidos respiratorios en las mismas condiciones que en el vivo.

esplánico, *adj.* (σπλάγ-

χνον, víscera). Lo referente á las vísceras.

esplanología, *s. f.* (σπλάγχνον; λόγος, discurso.) Parte de la anatomía que trata de la descripción de las vísceras (aparatos digestivo, respiratorio, génito-urinario, etc.).

esplanopleura, *s. f.* (σπλάγχνον; πλευρόν, lado). Sin. *lámina fibro-intestinal, lámina esplánica.* En embriología se da este nombre á una lámina del mesodermo aplicada contra el endodermo. Está destinada á formar el revestimiento del epitelio intestinal (capa muscular del intestino y de las glándulas á él anexas).

esplanoptosis, *s. f.* (σπλάγχνον, víscera; πτῶσις, caida). Sin. : *visceroptosis.* Sindroma caracterizado por el relajamiento de los diversos medios de fijación de las vísceras abdominales (estómago, intestino, hígado, riñón) que cambian de situación y presentan diversas perturbaciones de función.

esplenalgia, *s. f.* (σπλήν, bazo; ἄλγος, dolor). Dolor en el bazo.

esplenectomía, *s. f.* (σπλήν; ἐκτομή, ablación) (Péan). Extirpación total ó parcial del bazo.

esplénico, *adj.* Lo referente al bazo.

esplenización, *s. f.* (σπλήν, bazo (Léger, 1823). Lesión del pulmón caracterizada por la induración de su tejido, que presenta un aspecto más ó menos semejante al del tejido esplénico. Se observa en ciertas variedades de congestión pulmonar y en las bronco-neumonías.

esplenitis, *s. f.* Inflamación del bazo.

esplenocleisis, *s. f.* (σπλήν, bazo; κλείω. encierro) (Schiassi, 1906). Operación que consiste en envolver el bazo por algunos días con gaza ligeramente yodoformada, con el fin de provocar el desarrollo de una ancha cápsula conjuntiva que ciña el órgano y propenda á reducir su volumen. así como á la creación simultánea de nuevas vías de derivación venosa. Se ha preconizado en las anemias acompañadas de esplenomegalia.

esplenoflebitis, *s. f.* (σπλήν, bazo; flebitis). Flebitis de la vena esplénica; provoca la hipertrofia del bazo y el desarrollo de la circulación venosa de la pared abdominal. Se revela además por epistaxis y estomatorragias

esplenomegalia, *s. f.* (σπλήν, bazo; μέγας, grande). Hipertrofia del bazo. — es-

plenomegalia primitiva (Dèbove y Brühl). Afección caracterizada por la proliferación del tejido linfoide del bazo; forma de *linfadenia aleucémica*.

espleno-neumonía, *s. f.* Sin: *enfermedad de Grancher*. Afección caracterizada por signos que recuerdan los de la pleuresía aguda, de tres semanas de evolución, y termina ordinariamente por la curación; corresponde anatómicamento á una congestión del pulmón que le da aspecto de tejido esplénico (esplenización), sin derrame pleural. La causa es desconocida.

esplenopatía, *s. f.* (σπλήν; πάθος, padecimiento). Nombre genérico de todas las afecciones del bazo.

esplenopexia, *s f.* (σπλήν; πῆξις, fijación). Operación para fijar el bazo.

espleno-tifoidea, *s. f.* Forma de la fiebre tifoidea caracterizada clínicamente por la tendencia de la fiebre á tomar el tipo recurrente, y anatómicamente por el aumento considerable del volumen del bazo.

esplenotomía, *s. f.* (σπλήν, bazo; τομή, sección). Incisión quirúrgica del bazo.

espodógeno, *adj.* (σποδός, cenizas; γεννᾶν, engendrar). Se dice del bazo aumentado de volumen por el acúmulo de resíduos globulares (malaria, envenenamientos).

espondilitis, *s. f.* (σπόνδυλος, vértebra). Inflamación aguda ó crónica de las vértebras. — *espondilitis tuberculosa*. Véase : *Pott (mal de)*.

espondilizema, *s. m.* (σπόνδυλος; ἕξημα, hundimiento) (Herrgott, 1877.) Hundimiento de la columna vertebral debido á la lesión de uno ó de varios cuerpos vertebrales (*mal de Pott*). Cuando el sitio del hundimiento es en la unión de las partes lumbar y sacra, determínase una desviación angular del raquis que viene á obstruir el estrecho superior : causa de *distocia*.

espóndiloclelsis ó **espóndiloclisis**, *s f.* (σπόνδυλος; κλεῖσις, cerradura) (Lambl). Variedad de espóndilolistesis en la que el cuerpo de la vértebra bascula inclinándose sobre el estrecho superior sin franquear el límite de la pelvis.

espóndilolistesis, *s. f.* (σπόνδυλος, vértebra; ὀλίσθησις, deslizamiento) (Kilian, 1854). Deslizamiento de un segmento de la columna vertebral sobre el segmento inferior, á conse-

cuencia de un defecto de osificación de los puntos laterales del arco, ó de una fractura á ese nivel. Este deslizamiento se efectúa sobre todo en la unión de las partes lumbar y sacra de la columna vertebral y determina una viciación de la pelvis, causa de distocia.

espóndilolisis, *s. f.* (σπόνδυλος; λυσις, relajamiento)(Lambl). Sin.: *espóndilosquisis*. Primer grado de la espóndilolistesis en el que la faz articular inferior de la quinta vértebra lumbar sobresale ligeramente hacia adelante de la base del sacro.

espóndiloptosis, *s. f.* (σπόνδυλος; πτῶσις, caída) (Lambl.). Variedad muy acentuada de espóndilolistesis, en que la columna vertebral cae dentro de la excavación pelviana.

espondilosis rizomélica (σπόνδυλος; ῥίζος, raíz; μέλος, miembro) (Marie). Afección caracterizada por una anquilosis vertebral completa, con anquilosis más ó menos completa de las articulaciones de la raíz de los miembros é integridad de las pequeñas articulaciones, lo que la diferencia del reumatismo crónico deformante ordinario.

espóndilosquisis, *s. f.* (σπόνδυλος; σχίσις, separación). (Neugebauer). Véase: *espóndilolisis*.

espongioplasma, *s. m.* (σπόγγος, esponja). Red filamentosa que forma la armazón de la célula.

esponjoide (tejido). Nombre dado por Guerin y Broca al tejido esponjoso de los huesos raquíticos.

esporádico, *adj.* (σπείρειν, dispersar). Se dice de una enfermedad cuando ataca á un individuo aisladamente, por contraposición á *epidémica* y *endémica*, que se aplican á las enfermedadas que atacan á la vez todo un grupo de la población. Véase: *epidémico* y *endémico*.

esporidio vaccinal (*sporidium vaccinale*) (Funck, 1901). Protozoario encontrado en las pústulas vaccinales por Funck, quien lo considera como el agente específico de la vacuna.

esporo ó espórulo, *s. m.* (σπορά, grano). Sin.: *esporidia*. Nombre dado á los corpúsculos reproductores de los criptógamos y de las bacterias.

esporozoario, *s. m.* (σπορά; ζῶον, animal). Clase de protozoarios que viven como parásitos en los animales y están constituídos por una masa protoplásmica provista de un núcleo y rodeada por una cutícula. Comprende

cierto número de parásitos del hombre : hematozoarios del paludismo, algunas coccidias, etc.

esporozoosis, *s. f.* Nombre genérico dado á las enfermedades determinadas por los esporozoarios. Estas infecciones son ya generales (paludismo), ya locales, y pueden atacar los diferentes tejidos y órganos.

esputación, *s. f.* (*sputare*, escupir). La acción de escupir casi contínuamente. Ej. : *esputación de los enajenados, de los histéricos, de las mujeres preñadas.*

esquelalgia parestésica (σκέλος, pierna ; ἄλγος, dolor). Afección caracterizada por trastornos sensitivos y tróficos en la esfera de inervación del ciático popliteo externo, muy análogos, fuera de la localización, á los que se observan en la *meralgia parestésica.*

esquema, *s. m.* (σχῆμα, plan). « En anatomía y fisiología, figura, que, con el objeto de demostrar la disposición general de un aparato ó la sucesión de los estados de un ente ó de un órgano, es ejecutada con abstracción de ciertas particularidades de forma, de volumen, de dirección ó de relaciones de las partes; porque estos detalles impedirían apreciar á un golpe de vista, ó rápidamente, el conjunto de las nociones que se trata de hacer conocer » (Littré).

esquinancia ó **esquinencia**, *s. f.* (σύν, con; ἄγχειν, estrechar). Véase : *angina.*

esquirla, *s. f.* (σχίζειν, hender). Fragmento de hueso roto, en las fracturas conminuídas

esquistosoma, *s. m.* (σχιστός, hendido; σῶμα, cuerpo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por una eventración lateral ó mediana en toda la longitud del abdomen, y por la ausencia ó el estado muy imperfecto de los miembros pelvianos.

esquizocéfalo, *s. m.* (σχίζειν, dividir; κεφαλή, cabeza). Monstruo cuya cabeza está hendida longitudinalmente.

esquizomicete (σχίζειν; μύκης, hongo) ó **esquizofito**, *s. m.* (σχίζειν; φυτον, vegetal). Véase : *bacteria.*

esquizoprosopia, *s. f.* (σχίζειν; πρόσωπον, rostro). División de casi toda la cara por la prolongación hacia arriba de la fisura del labio leporino.

esquizotórax, *s. m.* (σχίζειν; θώραξ, pecho). Monstruosidad caracterizada

por la división de toda la pared torácica.

estadio, *s. m.* (σταδίον, lugar público de longitud determinada). Período. Ej.: *estadio de frío, de calor, de sudor*, que se suceden en el acceso de fiebre intermitente.

estado de mal. Serie de paroxismos que sobrevienen inmediatamente los unos después de los otros, en el intervalo de los cuales no vuelve el paciente á su estado normal. Ej.: *estado de mal epiléptico, histérico, eclámptico*, etc.

estafilematoma, *s. m.* (σταφυλή, campanilla; αἷμα, sangre). Lesión que consiste en un derrame sanguíneo en el espesor de la campanilla. Se presenta con la forma de pequeñas tumefacciones azuladas, dolorosas, que causan un poco de disfagia y de disfonía.

estafilitis, *s. f.* (σταφυλή, campanilla). Inflamación de la campanilla.

estafilococcia, *s. f.* Nombre genérico de los estados mórbidos que dependen de la infección por los estafilococos.

estafilococo, *s. m.* (σταφυλή, grano de uva, κόκκος, semilla). Nombre genérico dado á bacterias de forma redondeada (cocos), caracterizadas por sus agrupamientos, que semejan racimos de uvas. Como este microbio provoca á menudo la formación de pus se llama *estafilococo piógeno*. Presenta diversas variedades que se distinguen por el color de sus cultivos en agar (*estafilococo piógeno áureo, albo, cítreo*).

estafiloma, *s. m.* (σταφυλή, grano de uva). Lesión del globo ocular que consiste en una protuberancia ó abolladura, debida al debilitamiento local de la pared, y comparada por los antiguos á un grano de uva. Puede situarse en la córnea, en la esclerótica (*estafiloma anterior* y *est. posterior*), ó, finalmente, en el iris. Es consecutivo ya á un traumatismo (*est. de la córnea*), ya á una inflamación (*esclerocoroiditis, iritis*).

estáfiloplastia, *s. f.* (σταφυλή, campanilla; πλάσσειν, formar). Sin.: *palatoplastia*. Operación que consiste en una autoplastia destinada á llenar una pérdida de sustancia del velo del paladar.

estáfilorrafia, *s. f.* (σταφυλή; ῥαφεῖν, coser). Operación cuyo objeto es remediar á la división congénita del velo del paladar, suturando los dos bordes de

la abertura después de avivarlos.

estáfilotomía, *s. f.* (σταφυλή; τέμνειν, cortar). La excisión del estafiloma opaco, córneo ó irido-córneo.

éstasis ó **éxtasis**, *s. f.* (στάσις, detención). Suspensión de la circulación ó del flujo de un líquido en la economía (éstasis sanguíneo, éstasis de la leche, etc.).

estaso - basofobia, *m. f.* (στάσις, estación; βάσις, marcha; φόβος temor). (Debove). Imposibilidad de mantenerse de pie, así como de caminar, por el terror de caerse. Esta afección difiere de la astasia-abasia de Charcot por la existencia del temor angustioso (fobia), mientras que la astasia-abasia es debida al olvido (amnesia) de los movimientos de la marcha.

estasofobia, *s. f.* (στάσις, estación; φόβος, temor). (Bouveret). Aprehensión mórbida de no poder mantenerse de pie.

estático (sentido). Conjunto de las sensaciones suministradas por los canales semi-circulares y el vestíbulo del laberinto. Los primeros nos informan sobre la orientación de la cabeza en el espacio, el segundo nos hace percibir los movimientos de traslación.

estauroplejía, *s. f.* (σταυρός, cruz; πλήσσειν, herir). Forma de hemiplejía en que el miembro inferior de un lado y el superior del otro se hallan paralizados simultáneamente.

estearolado, *s. m.* (στέαρ, grasa). Pomada.

estearrea, *s. f.* (στέαρ, ῥεῖν, fluir). Exceso considerable de materias grasas expulsadas con las heces; síntoma frecuente en las lesiones del páncreas, sobre todo cuando están asociadas con lesiones del hígado. — Esta palabra se usa también como sinónimo de *seborrea*.

esteatolisis, *s. f.* (στέαρ, ατος, grasa; λύειν, disolver). Disolución y digestión de las sustancias grasas.

esteatolítico, *adj.* Se aplica á las sustancias que disuelven las materias grasas.

esteatoma, *s. m.* (στέαρ, στέατος, grasa). Nombre dado ántes á los lipomas de consistencia dura y á los quistes sebáceos.

esteatopigia, *s. f.* (στέαρ; πυγή, nalga) (Livingston). Hipertrofia grasosa de las nalgas (Hotentotes).

esteatorrea, *s. f.* Véase *estearrea*.

esteatosis, *s. f.* (στέαρ). La infiltración de los ele-

mentos anatómicos de un tejido por granulaciones grasosas.

estenocardia, *s. f.* (στενός, estrecho; καρδία, corazón). Nombre dado á veces á la *angina de pecho*, á causa de la sensación de constricción experimentada en el corazón por los enfermos.

estenocefalia, *s. f.* (στενός; κεφαλή, cabeza) (antropología). Estrechez del cráneo.

estenocorde, *s. f.* (στενός; χορδή, cuerda) (Ritgen). 1° *estenocorde anterior*. Línea oblicua que va de la espina ciática al sub-pubis. — *estenocorde posterior*. Línea oblicua que va de la espina ciática al fondo de la gran escotadura ciática. — Estas dos líneas, que pueden medirse con los dedos, permiten, según Ritgen, calcular la amplitud y el grado de asimetría de la pelvis.

estenosis, *s. f.* (στενός). Estrechamiento, estrechez. Ej.: *estenosis del píloro, de las coronarias*, etc.

estenotórax, *s. m.* (στενός; θώραξ, pecho). Estrechez del pecho.

estepaje, *s. m.* (Charcot). Andar particular de los enfermos atacados de parálisis de los extensores de los dedos del pie y de los peroneos (neuritis alcohólica, etc.). No pudiendo doblar el pie sobre la pierna, estos enfermos se ven obligados á cada paso á levantar fuertemente la pierna por una flexión del muslo sobre la pelvis, para no tropezar con el suelo la punta del pie que se halla constantemente baja (analogía con el trote de algunos caballos llamados *estepadores*).

estercoremia, *s. f.* (*stercus*, excremento, αἷμα, sangre). Véase: *copremia*.

estercoroma, *s. m.* Voluminosa masa fecal acumulada en el colon y que simula un tumor.

estéreoagnosia, *s. f.* (στερεός, sólido; ἀ priv., γιγνώσκω, reconozco). Pérdida del *sentido estereognóstico*, observada á veces en la hemiplejía.

estéreognóstico (sentido) ó **estéreognóstica (percepción)** (στερεός, sólido; γιγνώσκω, reconozco) (Hoffmann, 1885). Facultad de reconocer la forma de los objetos, así como las demás propiedades físicas, como consistencia, temperatura. No es un sentido, sino un modo de sensibilidad complexo, una asociación de diversos modos de sensibilidad elemental, provenientes de la

sensibilidad superficial y de la sensibilidad profunda.

estéreotipia, *s. f.* Exageración del automatismo en algunos vesánicos. Consiste en la repetición continua de los mismos gestos, de los mismos tics, de las mismas palabras. — Se da también el nombre de *estéreotipia* á actos ó ademanes habituales que se repiten involuntariamente sin presentar, como los tics, carácter convulsivo (tirarse del bigote, comerse las uñas, frotarse las manos, etc.).

esterilización, *s. f.* Acto por el cual se priva un objeto cualquiera de los gérmenes que contiene. Los principales medios empleados son el calor seco ó húmedo, y los antisépticos.

esterilidad, *s. f.* Imposibilidad, para el hombre ó para la mujer, de procrear, á consecuencia de una perturbación funcional ó de una lesión orgánica del aparato genital.

esternalgia, *s. f.* (στέρνον, esternón; ἄλγος, dolor) (Baumès). Nombre dado algunas veces á la *angina de pecho*, por la localización del dolor detrás del esternón.

esternópago, *s. m.* (στέρνον; παγεῖς, unidos). Monstruo doble mononfaliano formado por dos cuerpos unidos faz á faz desde el ombligo hasta el mango del esternón.

esternutación, *s. f.* (*sternutare*, estornudar). Estornudo.

esternutatorio, *adj.* y *s. m.* Se dice de las sustancias que provocan el estornudo.

estertor, *s. m.* (*stertere*, roncar). 1° Sin.: *respiración estertorosa*. Respiración ruidosa acompañada de ronquidos. — 2° Nombre dado por Laennec á todos los ruidos anormales que produce durante el acto respiratorio el paso del aire en los bronquios, ya á causa de líquidos acumulados en estos conductos ó en los alveolos pulmonares, ya por razón de la presencia de una estrechez parcial de los canales aéreos.

estesiogenia, *s. f.* (αἴσθησις, sensibilidad; γεννᾶν, engendrar). Restauración de todas las sensibilidades en los histéricos.

estesiógena (zona). Zonas cutáneas ó mucosas hiperestesiadas.

estesiógeno, *adj.* Se dice de los diversos factores capaces de modificar la sensibilidad.

estesiómetro, *s. m.* (αἴσθησις, sensibilidad; μέτρον, medida). Instrumento

para medir la sensibilidad tactil en estado normal y en estado patnlógico.

estesódico (nervio). (αἴσθησις; ὁδός, vía). Nervio sensitivo ó centrípeto.

estetofonómetro, *s. m.* (στῆθος, pecho; φωνή, voz; μέτρον, medida) (Bettelheim y Gärtner, 1892). Aparato para medir la intensidad de los ruidos cardiacos normales y patológicos.

estetógrato, *s. m.* (στῆθος, γραφειν; escribir). Véase : *neumógrafo.*

estetoscopio, *s. m.* (στῆθος; σκοπεῖν, examinar) (Laënnec). Instrumento esencialmente compuesto de un cilindro de madera ó de metal, lleno ó hueco, destinado á trasmitir al oído del médico los sonidos que se producen en la parte del cuerpo á que se aplica.

estigma ó **estigmato,** *s. m.* (στίζω, yo pincho). Orificio microscópico que las células emigradoras producen *perforando* las células endoteliales, cuando salen por diapédesis de un capilar.

estigmas de la histeria (στίζω, yo marco). Síntomas constantes del histerismo, pero en general poco aparentes, á tal punto que deben buscarse metódicamente. Son *sensitivos* (hemianestesia, perturbaciones de la vista, zonas histerógenas, etc.), *motores* y *siquicos.*

estigmasia ó **estigmatodermia,** *s. f.* Véase : *urticaria.*

estiomena de la vulva (ἐσθίειν. roer). Nombre bajo el cual se han confundido diversas afecciones de la mucosa vulvar, principalmente el lupus.

estipaje, *s. m.* (στύπη, estopa?). Procedimiento terapéutico contra las neuralgias por medio de la refrigeración por el cloruro de metilo. No se lanza la sustancia sobre la parte enferma sino se empapan con aquella tapones de algodón que se pasea sobre los tegumentos. La evaporación rápida del cloruro de metilo produce un enfriamiento que puede llegar á la congelación.

estíptico, *adj.* y *s. m.* (στυπτικός). Astringente.

Estlánder (operación de). Operación que consiste en practicar la resección subperióstica de varias costillas en una extensión más ó menos considerable. Se recurre á ella en las pleresías purulentas crónicas.

estomacacis, *s. f.* (στόμα, boca; κάκη, enfermedad). Ulceración fétida de la boca.

estoma ó **estómato**, *s. m.* (στόμα, boca). Orificio microscópico que las células emigradoras producen *separando* las células endoteliales cuando atraviesan el revestimiento de una serosa ó cuando salen por diapédesis de un capilar.

estomatitis, *s. f.* Nombre genérico dado á las inflamaciones de la boca.

estomatolalia, *s. f.* (στόμα; λαλεῖν, hablar) (Raugé). Véase: *rinolalia cerrada*.

estomatología, *s. f.* (στόμα; λόγος, discurso). Estudio de la boca y de sus enfermedades.

estomatoplastia, *s. f.* (στόμα; πλάσσειν, formar). Operación que consiste en reparar por autoplastia las deformaciones congénitas ó adquiridas de la cavidad bucal. — En ginecología se da este nombre á una operación autoplástica que consiste en rehacer el orificio del cuello uterino, en los casos de estenosis.

estomatorragia, *s. f.* (στόμα; ῥήγνυμι, rompo). Hemorragia bucal.

estomencéfalo ó **estomocéfalo**, *s. m.* (στόμα; ἐγκέφαλος, encéfalo, ó κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo ciclocefaliano caracterizado por la presencia de un ojo único sobre la línea media, ó de dos ojos en la misma órbita, y por que la boca presenta una protuberancia en forma de trompa, á causa de la interrupción del desarrollo de las mandíbulas.

estrabismo, *s. m.* (στραβός, bizco). Síntoma que consiste en mirar bizco, ó más exactamente en la desviación de los ejes visuales, debido á la falta de equilibrio entre los músculos, sin parálisis. Es ya *divergente* (desviación hacia fuera), ya *convergente* (desviación hacia dentro), más rara vez *superior* ó *inferior*.

estrabómetro, *s. m.* (στραβός; μέτρον, medida). Instrumentos que sirven para medir el grado de desviación de los ojos en el estrabismo.

estrangulamiento de un órgano. Constricción de un órgano con detención de la circulación, que produce un conjunto de síntomas (dolores, vómitos, angustia, etc.) que son casi siempre los mismos cualquiera que sea la víscera estrangulada. Ej.: *estrang. herniario, estrang. del testículo*.

estranguria, *s. f.* (στράγξ, gota; οὖρον, orina).

encuentra en el aparato urinario, y particularmente en los riñones, del perro, del lobo, y, muy rara vez, del hombre; determina hematuria, piuria, dolores vivísimos, y puede acarrear la muerte.

estrumectomía, *s. f.* (*struma*, bocio; ἐκτομή, ablación). Operación de la extirpación del bocio.

estrumipriva (caquexia.) Mixedema operatorio, consecutivo á la ablación del bocio. Véase: *mixedema*.

estrumitis, *s. f.* (*struma*, bocio). La inflamación de la glándula tiroide ya atacada de bocio.

estrumoso, *adj.* Escrofuloso. Véase: *escrófula*.

estufa, *s. f.* Aparato destinado á obtener una temperatura determinada. Unas producen una temperatura superior á 100 grados y se destinan á la desinfección ó á la esterilización; otras, provistas de un regulador, mantienen una temperatura constante. Ej.: *estufa de incubación*, 33° á 48°; *estufa de parafina*, 48° á 50°.

estupefaciente ó estupefactivo, *adj.* y *s. m.* Narcótico.

estupor, *s. m.* Adormecimiento general ó local.

eterización, *s. f.* Procedimiento de anestesia general que consiste en hacer respirar al paciente una mezcla de aire y de vapores de éter. — *eterización local*. Pulverización de éter sobre un punto limitado con el fin de obtener un enfriamiento intenso acompañado de insensibilidad.

eterismo, *s. m.* Conjunto de los fenómenos provocados por el éter absorbido bajo forma de vapor (eterización) ó en bebida.

eterolado, *s. m.* Medicamento compuesto de éter y de principios medicinales solubles en este líquido.

eterolato, *s. m.* Medicamento que resulta de la destilación de éter sobre sustancias aromáticas.

éteromanía, *s. f.* Hábito mórbido del éter; la necesidad de este medicamento se transforma poco á poco en una impulsión tanto más imperiosa cuanto más fuerte es la intoxicación.

etilismo, *s. m.* Véase: *alcoholismo*.

etiología, *s. f.* (αἰτία, causa; λόγος, discurso). Estudio de las causas de las enfermedades.

etmocéfalo, *s. m.* (ἠθμός, raíz de la nariz; κεφαλή, cabeza). (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuyas dos órbitas se hallan muy cerca

la una de la otra, sin confundirse, y cuyo aparato nasal está reducido á una pequeña trompa terminada por una ó dos ventanas nasales.

etmoiditis, *s f.* Las inflamaciones de la mucosa que cubre el hueso etmoide, y la del hueso mismo.

étnico, *adj.* (ἔθνος, pueblo) (antropología). Se dice de los caracteres propios de una raza, por contraposición á los caracteres individuales.

etnografía, *s. f.* (ἔθνος; γράφειν, describir) (antropología). Estudio de los diferentes pueblos y de sus costumbres, religión, idioma.

etnología, *s. f.* (ἔθνος; λόγος, discurso) (antropología). Estudio de los origenes, mezclas y emigraciones de los diferentes pueblos, por medio de la historia, de la lingüística y de la etnografía.

eucrasia, *s. f.* (εὖ, bien; κρᾶσις, mezcla). Buena constitución.

euforia, *s f.* (εὖ, bien; φορός de φέρειν, llevar). Estado de confianza, de satisfacción del paciente, que cree hallarse muy bien, ora corresponda esta sensación á una mejoría real de su estado (convalescencia), ora provenga de una ilusión, como se observa en el período terminal de ciertas enfermedades (tisis) ó bajo la influencia de los narcóticos (haschich, opio, etc.)

eugenesia, *s. f.* (εὖ, bien; γένεσις, generación). Sin.: *homogenesia eugenésica*, *hibridez directa* (antropología). Nombre dado por Broca á los cruzamientos cuyos productos ó mestizos son indefinidamente fecundos, tanto entre sí como con los individuos de las dos razas madres. De ese modo se produce una raza nueva.

eugenia, *s. f.* (Galton, 1905). Ciencia que se propone estudiar las condiciones más favorables al levantamiento cuantitativo y cualitativo de la raza humana, así como fijar los de una buena reproducción.

eunucoide (voz) (Krishaber). Voz muy alta, pero de poca intensidad, que, en el adulto, conserva carácter infantil. Débese ya á la detención del desarrollo de la laringe, ya á perturbaciones de coordinación de los músculos vocales. (Es la voz del eunuco).

eupepsia, *s. f.* (εὖ, bien; πέψις, digestión). Digestión normal.

eupéptico, *adj.* Que facilita la digestión.

eupnea, *s. f.* (εὖ, bien;

πνεῖν, respirar). Respiración fácil.

euricefalia, *s. f.* (εὐρύς, ancho; κεφαλή cabeza) (antropología). 1° Cráneo ancho. —2° Para Huxley *euricefalia* es sinónimo de *braquicefalia*.

eurignato, *s. m.* (εὐρύς; γνάθος, mandibula) (antropología). Término empleado por I. G. Saint-Hilaire para designar las razas de cara ensanchada á causa de la prominencia de los pómulos (tipo mongólico).

eurritmia, *s. f.* (εὖ, bien, ῥυθμος, ritmo). Regularidad del pulso.

eusonfaliano, *s. m.* (εὖς, bien conformado; ὀμφαλος, ombligo) (I. G. Saint-Hilaire). La familia de monstruos caracterizados por la reunión de dos individuos casi completos, capaces de verificar independientemente el uno del otro la casi totalidad de las funciones vitales y provistos cada uno de un ombligo distinto.

eutanasia, *s. f.* (εὖ; bien; θάνατος, muerte). Muerte tranquila y naturalmente exenta de sufrimiento, ó gracias al empleo de sustancias calmantes ó estupefacientes (morfina, cloral, cloroformo, etc.).

eutocia, *s. f.* (εὖ; τόκος, parto). Parto normal. — *cintura eutócica*. Cintura destinada á mantener en buena posición al feto al fin de la preñez.

eutrepistia, *s. f.* (εὐτρεπίζω, preparo con buena intención) (Dor, 1901). Método terapéutico que tendría por objeto preparar el enfermo á resistir á los riesgos de una infección séptica.

euzoamilia, *s. f.* (Lépine). Estado de la célula que adquiere más glicógeno del que pierde.

eventración, *s. f.* (*e*, fuera de; *venter*, vientre). Hernia ventral, es decir, formada en las regiones laterales y anteriores del abdomen. La *eventración* sobreviene á menudo á consecuencia de partos numerosos, por separación de los dos músculos rectos y relajamiento de la aponeurosis en una extensión más ó menos larga; ó por relajación de una cicatriz de laparotomía.

eversión, *s. f.* (*evertere*, echar afuera). Rodete formado en un orificio natural por la mucosa más ó menos herniada. Ej. : *eversión de los puntos lacrimales*.

evisceración, *s. f.* (*e*, fuera; *viscera*). Sin. : *exenteración*. Operación que consiste en abrir el tórax y el abdomen del feto y en sacar las vísceras para faci-

litar la extracción de éste. — Se dice también del vaciamiento del contenido del globo ocular.

exacerbación, *s. f.* Exageración transitoria de los síntomas de una enfermedad

exania, *s. f.* (*ex*, fuera, *anus*). Prolapso del recto.

exantema, *s. m.* (ἐξανθεῖν, florecer). Rubor cutáneo más ó menos vivo, no acompañado de pápulas ni vesículas, que se observa en gran número de enfermedades.

exarticulación, *s. f.* Desarticulación.

excipiente, *s. m.* (*excipere*, recibir). Base de un medicamento : sustancia á la que se incorporan los principios activos de un medicamento.

excisión, *s. f.* (*excidere*, cortar). Amputación de una parte poco voluminosa. Ej. : *excisión del pulmón, del prepucio*, etc.

exclusión de un segmento del tubo digestivo. Operación que consiste en eliminar un segmento del tubo digestivo del trayecto que deben seguir los materiales de la digestión. Ej. : *exclusión del píloro*.

excoriación, *s. f.* (*ex*, fuera; *corion*, piel). Escoriación : herida superficial de la piel, con arrancamiento de la epidermis.

excreción, *s. f.* (*excernere*, separar). Acto fisiológico en virtud del cual el producto de la secreción de una glándula es vertido al exterior de ésta por conductos especiales llamados *canales excretores*.

excreta, *s. n. pl.* Conjunto de los resíduos de la nutrición expelidos del organismo (heces, orina, sudor, bilis, etc.).

exema, *s. m.* (ἐκζεῖν, borbotar). Lesión cutánea caracterizada por rubor, formación de vesículas muy finas que manan un líquido seroso que empega la ropa, y finalmente descamación de la epidermis. — La palabra exema no corresponde, pues, á una enfermedad; designa sólo una lesión de la piel capaz de presentarse bajo la influencia de causas muy diversas, externas ó internas, y que puede por lo tanto ofrecer evolución variable.

exema seborreico (Unna). Afección de la piel, de origen probablemente parasitario, caracterizada anatómicamente por una dermitis catarral con infiltración grasosa de la piel y exfoliación seca, grasosa ó húmeda; y clínicamente por su punto

de partida en el cuero cabelludo, su localización en los pliegues, ó sobre la cara anterior del tórax, y su aspecto semejante al del exema, más rara vez al acné (tórax) ó aún á la soriasis.

exencéfalo, *s. m.* (ἐξ, fuera; ἐγκέφαλον, encéfalo). (I. G. Saint Hilaire). Monstruo caracterizado por la situación del encéfalo, que se halla colocado en la parte posterior del cráneo, por la ausencia de la pared superior de éste, así como la de la pared posterior del canal vertebral.

exenteración, *s. f.* (ἐξ, fuera; ἔντερον, intestino). Véase : *evisceración.*

exéresis, *s. f.* (ἐξ; αἱρεῖν, sacar). Nombre genérico dado á todas las operaciones quirúrgicas que consisten en la ablación de una parte cualquiera (amputación, avulsión, etc.).

exfoliación, *s. f.* (*ex*, de; *folium*, hoja). Eliminación bajo forma de laminillas de ciertas partes necrosadas (huesos, tendones).

exhibicionista, *s. m.* (Lasègue. 1877). Vesánico ó degenerado cuya turbación mental se manifiesta por la necesidad de exhibir los órganos genitales.

exocolecistopexia, *s. f.* (ἔξω, por fuera; colecistopexia). Operación que consiste en abrir la vesícula biliar y en fijarla definitivamente fuera de la cavidad abdominal.

exoftalmía, *s. f.* (ἔξω; ὀφθαλμός, ojo). Prominencia ó propulsión del globo ocular fuera de la órbita.

exoftalmía pulsátil. La que está acompañada de pulsaciones visibles y perceptibles al tacto, de thrill y de ruido de soplo.

exogamía, *s. f.* (ἔξω, fuera; γάμος, unión). Unión entre individuos no consanguíneos.

exógena (intoxicación) (ἔξω; γεννᾷν, engendrar). Intoxicación por venenos producidos fuera del organismo.

exónfalo, *s. m.* (ἔξω; ὀμφαλός, ombligo). Hernia umbilical.

exoplásmica (producción) (ἔξω; πλάσμα). Nombre dado á las producciones celulares situadas al exterior de la célula (sustancia intercelular).

exorbitis, *s. f.* ó **exorbitismo,** *s. m.* (*ex*, fuera de; *orbita*). Sinónimo de *exoftalmía.*

exósmosis, *s. f.* (ἐξ, fuera; ὠσμός, acción de empujar). Nombre primitivamente dado á la corriente osmótica dirigida de dentro

á afuera, y actualmente reservado á la corriente osmótica débil.

exosplenopexia, *s. f.* (ἔξω, por fuera; σπλήν, bazo; πῆξις, fijación). Operación que consiste en fijar el bazo fuera de la cavidad abdominal para provocar su esfacelo.

exosqueleto, *s. m.* Nombre dado en los animales superiores al conjunto de las producciones epidérmicas tales como pelos, plumas, uñas, cascos, etc.

exostosis, *s. f.* (ἐξ, fuera; ὀστέον, hueso). Tumor formado de tejido óseo desarrollado en la superficie de un hueso.

exotiropexia, *s. f.* (ἔξω, por fuera; θύρεος, glándula tiroide; πῆξις, fijación). Operación que consiste en incindir los tegumentos sobre el cuerpo tiroide y en mantener este último por fuera de la herida para provocar su esfacelo.

expectación, *s. f.*

expectante (método) (*expectare*, esperar). Método que consiste en observar la marcha de la enfermedad y en no emplear sino medios higiénicos para combatirla.

expectoración, *s. f.* (*ex*, fuera; *pectus*, pecho). Acto por el cual los productos formados en las vías respiratorias son expulsados fuera del pecho.

expulción, *s. f.* (*expuitio*). Acción de expulsar fuera de la cavidad bucal las sustancias acumuladas en ella.

expulsores (dolores). Los sentidos por la parturienta cuando la dilatación del cuello es completa y la parte encajada empieza á recorrer el canal pelviano.

éxtasis, *s. m.* (ἐξ, fuera; στάσις, estación). Estado mental caracterizado por profunda contemplación con abolición de la sensibilidad y de la motricidad.

extracto, *s. m.* (*extrahere*, extraer). Producto obtenido cuando se trata una sustancia animal ó vegetal por un líquido, y se evapora este vehículo hasta la consistencia requerida.

extrasístole, *s. f.* Sístole que se efectúa después de una sístole normal y antes del momento en que debe empezar la nueva sístole fisiológica. Es debida á una excitación exterior patológica, y seguida de una pausa más larga que la pausa normal.

extra-uterina (preñez). Fijación y desarrollo del huevo fecundado fuera de

la cavidad uterina (trompa, peritoneo).

extrofia de la vejiga (ἐξ, fuera; στροφή, inversión). Vicio de conformación de la vejiga, cuya mucosa viene á hacer prominencia en el hipogastrio por motivo de la ausencia de la pared anterior del abdomen y de la del receptáculo urinario.

exudado, *s. m.* (*ex*, fuera; *sudare*, sudor). Líquido orgánico, ya seroso, ya fibrinoso ó mucoso, que mana en una superficie inflamada.

exulceración, *s. f.* Ulceración ligera y superficial.

exutorio, *s. m.* (*exuere*, despojar). Ulcera superficial destinada á mantener una supuración permanente.

F

fabismo, *s. m.* (*faba*, haba). Enfermedad caracterizada por una coloración amarilla de la piel, astenia nerviosa, hemoglobinuria, perturbaciones digestivas y fiebre, y capaz á la larga de producir la muerte. Es debida á una sustancia nociva contenida en las flores y los frutos de la haba y se observa en individuos predispuestos, después que han ingerido esta leguminosa.

facial (signo del) (Weiss y Chvostek). Contracción de los músculos de la cara observada en la tetania, cuando se percute suavemente el nervio facial por debajo de la apófisis zigomática.

facies, *s. f.* (*fari*, hablar). Expresión de la cara en las enfermedades.

facoscopia, *s. f.* (φακός, lente; σκοπεῖν, examinar) (Darier). Procedimiento de exploración de los medios oculares: se hace mirar al enfermo, á través de lentes muy divergentes, la llama de una vela colocada en el fondo de una pieza oscura; la menor opacidad del cristalino es percibida por el enfermo como una mancha negra ó una estría.

fagedenismo, *s. m.* (φαγεῖν, comer; ἄδην, abundantemente). Accidente común á muchas enfermedades de naturaleza diferente, que les imprime cierto carácter de malignidad. Consiste en la tendencia de ciertas heri-

das, úlceras, ulceraciones, chancros, á aumentar en superficie y en profundidad y á resistir á los tratamientos que se les opone.

fagocito, *s m.* (φάγεῖν, comer; κύτος célula). Nombre dado á células capaces de engullir cuerpos sólidos, y particularmente microbios, que son destruídos en el interior de aquellas. Dichas células son movibles (leucocitos polinucleares, mononucleares, eosinófilos), ó fijas (células endoteliales de los vasos, células fijas del tejido conjuntivo).

fagocitosis, *s. f.* (Metchnikoff). Teoría según la cual los microbios destruídos en el organismo lo son por ciertas células llamadas fagocitos. Se admite hoy que los fagocitos pueden absorber y destruir tanto las sustancias solubles como los cuerpos sólidos.

fagolisis, *s. f.* (fagocito; λύειν, disolver). Disolución de los fagocitos en el líquido en que se hallan sumergidos; su contenido, puesto así en libertad, puede obrar sobre los microbios que se encuentran en ese medio.

fagoterapia, *s. f.* (φάγειν, comer; θεραπεία, tratamiento). Terapéutica por la superalimentación.

falangosis, *s. f.* Véase: *triquiasis*.

falsa vía. Accidente de cateterismo que consiste en que la sonda atraviesa la pared del canal y se hunde en los tejidos que lo rodean.

familial (enfermedad). Nombre dado á las enfermedades que atacan, sin cambiar de forma, uno ó varios niños de la misma generación, de acuerdo con la ley de la herencia homocrónica de Darwin, ley basada sobre la aparición de los caracteres hereditarios, en los ascendientes y descendientes, en las mismas épocas de la vida. Manifiéstanse además como una perturbación de desarrollo, es decir, son independientes de infecciones adquiridas, así como también de accidentes de la vida intra-uterina.

fanero, *s. m.* (φανερός, aparente). Término genérico bajo el cual se designan á veces las producciones aparentes, tales como pelos, uñas, cuernos, etc.

fanón (paño) (bajo latin *fano*, venda). El paño con que se rodean las tablillas antes de aplicarlas contra el miembro fracturado.

Farabeuf (operación de). Véase: *isquiopubiotomía*.

faradización, *s. f.* (*Faraday*, físico inglés) (Duchenne de Boulogne). Aplicación de las corrientes de inducción.

farcino, *s. m.* (*farcinimium*). Véase : *lamparones* 2ª — Muermo cutáneo.

farcinosis mutilante. Forma particular de muermo crónico, descrita por Besnier, y que consiste en vastas ulceraciones indolentes, que invaden la cara y destruyen las partes blandas en mayor ó menor extensión.

faringectomía, *s. f.* (φάρυγξ, laringe; ἐκτομή, excisión). La extirpación total ó parcial de la faringe.

faringismo, *s. m.* Contracción espasmódica de los músculos de la faringe.

faringitis, *s. f.* Inflamación de la faringe.

faringo-salpingitis, *s. f.* Inflamación de la mucosa de la trompa de Eustaquio, que tiene por punto de partida el catarro faringeo posterior (vegetaciones adenoides) y por resultado la otitis media.

faringoscopia, *s. f.* (φάρυγξ; σκοπειν, examinar). Examen de la cavidad de la faringe por medio del faringoscopio, instrumento análogo al laringoscopio.

faringotomía, *s. f.* (φάρυγξ; τομή, sección). Operación que consiste en abrir la faringe por una incisión ya horizontal y supra-hioidea, ya lateral y oblicua ó vertical.

farmacología, *s. f.* (φάρμακον, medicamento; λόγος, discurso). Sin. : *materia médica*. Estudio de los medicamentos.

farmacopea, *s. f.* (φάρμακον; ποιεῖν, hacer). Arte de preparar los medicamentos.

fasciculado, *adj.* (*fasciculus*, hacecillo). Se dice de tumores formados en gran parte de manojos de fibras. Ej. : *sarcoma fasciculado, fibroma fasciculado, neuroma fasciculado* (fibras nerviosas).

fastigio, *s. m.* (*fastigium*, cumbre.) Término empleado á veces para designar el momento en que una enfermedad ó un síntoma ofrecen el máximum de intensidad. Ej. : *fastigio* de la fiebre.

Fauchard (enfermedad de) (1720). Véase : *gingivitis expulsiva*.

favosa (tiña). Favus del cuero cabelludo.

favo ó **favus,** *s. m.* (*favus*, panal de miel). Dermatosis parasitaria contagiosa, caracterizada por la producción de costras ama-

rillentas que se hunden en forma de dedales, y causada por un hongo parásito del hombre y de los animales, *achorion Schoenleinii*.

febrícula, *s. f.* (dimin. de *febris*, fiebre). Fiebrecita.

febrífugo, *adj.* y *s. m.* (*febris*; *fugare*, echar). Los medicamentos que pasan por tener la propiedad de combatir la fiebre intermitente

fecaloides (vómitos). Vómitos compuestos de materias oscuras con olor á materias fecales. Se observan en la *oclusión intestinal*.

Fede (enfermedad de). Véase : *subglositis difteroide*.

feminismo, *s. m.* Véase : *infantilismo*.

fenómeno del pie. Véase : *clonus del pie*.

fenómeno plantar combinado (Crocq, 1904). Abolición simultánea del reflejo plantar cortical ó reflejo en flexión y del reflejo medular ó reflejo de la fascia lata. Este fenómeno no se observa sino en la histeria y especialmente en las formas acompañadas de anestesia.

fenózigo, *s. m.* (φαίνειν, aparecer; ζύγος, yugo, zigoma). Véase : *ángulo parietal*.

ferina (tos) (*fera*, fiera). Tos seca y tenaz, coqueluchoide. — Suele usarse también como sinónimo de coqueluche.

fermentación, *s. f.* « Transformación química de ciertas sustancias disueltas, bajo la influencia de seres organizados siempre privados de clorofila, que se desarrollan y viven en el interior del líquido que fermenta. » (Duclaux.)

fermento, *s. m.* (*fermentum*, de *fervere*, estar caliente). Véase : *fermentación*.

festinación, *s. f.* (*festinare*, apresurarse). Tendencia de ciertos enfermos (enfermedad de Párkinson) á acelerar la marcha para evitar la caída hacia adelante. Primer grado de la *propulsión*.

fetal (ritmo) (Stokes). Véase : *embriocardia*.

feticidio, *s. m.* (*fœtus*, feto; *cædere*, matar). Acto por el cual se provoca la muerte del feto en una época cualquiera de la gestación.

feto, *s. m.* (*fetare*, engendrar). El producto de la concepción después del tercer mes de la vida intra uterina, es decir, hacia la época en que comienza á presentar los caracteres distintivos de la especie humana.

fibrino-diagnóstico, *s. m.* (Hayem). Aplicación

al diagnóstico de las afecciones flegmásicas (neumonía, influenza, apendicitis), del examen del retículo fibrinoso en la sangre pura. Se dice que el *fibrino-diagnóstico* es *positivo* cuando existe el retículo fibrinoso (neumonía); es, al contrario, *negativo* (fiebre tifoidea), cuando no hay retículo fibrinoso.

fibrinofermento, *s. m.* Sin. : *trombasa*. Fermento soluble que determina la formación de la fibrina á expensas de la globulina contenida en la sangre. Este fermento lo elaboran, según unos, los hematoblastos, y, según otros, los leucocitos; es puesto en libertad en el momento en que estos elementos empiezan á alterarse.

fibrinógena (sustancia). Nombre dado á una sustancia albuminoide (globulina) contenida en el plasma sanguíneo y en ciertas exudaciones serosas antes de la coagulación; desaparece después de la formación del coágulo. Dicha sustancia contribuye á la formación de la fibrina.

fibrinoplástica (sustancia). Sin. : *caseína del suero*, *paraglobina*, *paraglobulina*, *serina*. Sustancia albuminoide que se encuentra en el suero y en los glóbulos. Existe igualmente en el pus. Contribuiría á la formación de la fibrina.

fibro-condroma, ó **condro-fibroma**, *s. m.* Variedad de condroma en que los lóbulos cartilaginosos del tumor son separados por abundante tejido fibroso.

fibroma, *s. m.* (Verneuil). Tumor únicamente formado por tejido fibroso, es decir, por manojos de tejido conjuntivo en medio de los cuales se observan células igualmente de tejido conjuntivo.

fibromatosis cutánea (Marie). Afección caracterizada por tumores fibrosos desarrollados en el tejido conjuntivo peri-glandular, por fuera de los ramos nerviosos. Sería análoga á la polifibromatosis neurocutánea, poniendo á un lado el origen nervioso de ésta.

fibromioma, *s. m.* Tumor uterino constituído por tejido conjuntivo y tejido muscular liso. Desde el punto de vista histológico es un *mioma*. Se le designa también con los nombres de *fibromas*, *tumores fibrosos*, *cuerpos fibrosos*.

fibro-plásticos (cuerpos). Nombre dado por Lebert á distintos elementos figurados (núcleos, células, fusiformes) que

creía capaces de transformarse en manojos fibrosos.

fibro-plásticos (tumores). Nombre con que designaba Lebert los tumores actualmente llamados *sarcomas*.

fibroso (cuerpo). Véase : *fibromioma*.

fiebre, *s. f.* (*fervere*). Elevación notable de la temperatura del cuerpo con aceleración del pulso.

fiebre intermitente. Véase : *paludismo*.

fiebre amarilla. Sin. : *tifus amarillo, tifus icterode, vómito negro*. Enfermedad infectiva, endemo-epidémica, originaria de las costas del golfo de México. Está caracterizada por una fiebre de marcha especial, por vómitos que rápidamente se vuelven biliosos y hemorrágicos, por ictericia á menudo intensa, y por fenómenos nerviosos ataxo-adinámicos.

fiebres eruptivas. Grupo de enfermedades generales, contagiosas, epidémicas, de naturaleza específica é infectiva, que presentan como caracteres clínicos comunes: erupciones cutáneas y mucosas y evolución cíclica. Este grupo comprende : sarampión, rubeola, escarlatina, vacuna, viruela y varicela.

fijación (abceso de) (Fochier). Sin. : *abceso de derivación*. Abceso provocado, con propósito terapéutico, por la inyección hipodérmica de esencia de trementina, en ciertas enfermedades infectivas.

filaria, *s. f.* Parásitos del orden de los Nematodes, comparados á un hilo por su longitud. — *filaria de Medina, filaria medinensis, dragoncillo* ó *dracúnculo*. Parásito agente de la enfermedad llamada dracunculosis. — *filaria de la sangre, filaria sanguinis hominis*. Parásito de los vasos sanguíneos y linfáticos que causa la filariosis.

filariosis, *s. f.* Enfermedad causada por la filaria de la sangre, que se manifiesta por hematuria, quiluria, elefanciasis, etc.

filiforme (pulso). Pulso muy pequeño que da al dedo la sensación de un hilo.

Filipovicz (signo de). Véase : *palmo-plantar* (*signo*).

filocitasis, *s. f.* (Metchnikoff). Véase : *sensibilizatriz*.

filodo, *s. m.* (φύλλον, hoja; εἶδος, forma). Sin. : *cistosarcoma* (Müller). Variedad ó fase de la evolución anatómica del adenosarcoma del seno.

filogenia, *s. f.* (φυλή, especie, tribu; γεννᾶν, engendrar). Desarrollo de la especie; por contraposición á *ontogenia*, desarrollo del ser.

fimatosis, *s. f.* (φύμα, tubérculo). Tuberculosis.

fimosis, *s. m.* (φιμός, lazo). Estrechez congénita ó accidental del anillo prepucial, que impide descubrir el glande.

fimosis labial. Atresia del orificio bucal.

Finsen (método de). Aplicación de los rayos luminosos químicos al tratamiento de las afecciones cutáneas, es decir, de la luz concentrada por un sistema de lentes de cristal de roca, y enfriada por su paso á través de una capa de agua.

fisicoterapia, *s. f.* (φυσικός, de φύσις, naturaleza; θεραπεία, terapéutica). Véase: *fisioterapia*.

fisiogenia, *s. f.* (φύσις, naturaleza; γένεσις, formación). Desarrollo natural del organismo y de sus diferentes partes.

fisiología, *s. f.* (φύσις; λόγος, discurso). Parte de la biología cuyo objeto es estudiar las funciones y las propiedades de los órganos y de los tejidos de los seres vivos.

fisiología celular. Estudio de los fenómenos vitales limitados á la célula.

fisiología general. « Estudio del acto íntimo de la función, independientemente de los diversos mecanismos que intervienen en ella ». (M. Duval.)

fisiología patológica. Estudio de las reacciones mórbidas que suministra el organismo bajo la influencia de las causas patógenas.

fisioterapia, *s. f.* (φύσις, naturaleza; θεραπεία, tratamiento). Utilización, con un fin terapéutico, de los agentes naturales : agua, aire, electricidad, luz, frío ó calor. La *fisioterapia* emplea también el clima, el reposo, el movimiento, como la marcha, los ejercicios de gimnástica, la trepidación.

fisiparidad, *s. f.* (*fissum*, hendidura; *parere*, parir). Sin. : *escisiparidad*. Modo de reproducción, por segmentación, de ciertos organismos monocelulares (protozoarios, bacterias).

fisocele, *amb.* (φῦσα, viento; κήλη, hernia). Hernia escrotal distendida por gases.

fisómetra, *s. m.* (φῦσα, viento; μήτρα, matriz). Desarrollo de gases dentro del útero.

fisura, *s. f.* (*fissura*, hendidura, grieta). Ulcera-

ción alargada y superficial, generalmente muy dolorosa, situada en los pliegues radiados del ano.

fístula, *s. f.* (*fistula*, flauta). Trayecto accidental que da paso á un líquido fisiológico ó patológico, y mantenido por el propio derrame del líquido.

fistular (ruido) (Chaussier). Gargullido intenso que da al oído que ausculta la sensación de un chorro de agua abierto súbitamente en la cavidad pleural. Este signo estetoscópico se observa en los casos de hidro ó de pío-neumotórax ampliamente comunicante con un bronquio.

flacidez, *s. f.* (*flaccidus*, flojo). Ausencia completa de tonicidad, observada en algunas parálisis.

flagelación, *s. f.* (masaje). Variedad de aporreo que consiste en golpear sucesivamente con los dedos la parte que se quiere amasar.

Flajani-Basedow (enfermedad de) (autores italianos). Véase : *bocio exoftálmico*.

flatulencia, *s. f.* (*flatus*, soplo, de *flare*, soplar). Producción de gases gastro-intestinales que dan lugar á la timpanización más ó menos considerable del estómago ó del intestino, acompañada á menudo de emisión de gases por la boca y también á veces por el ano.

flatuosidad, *s. f.* Los gases expulsados del tubo digestivo.

flebarteria simple. Véase : *aneurisma arterio-venosa*.

flebectasia, *s. f.* (φλέψ, vena: ἔκτασις, dilatación). Dilatación venosa. Várice.

flebitis. *s. f.* (Breschet, 1818). Inflamación de las venas.

flebógeno (angioma). Nombre dado por Virchow á los angiomas cavernosos desarrollados á expensas de los *vasa vasorum* de los venas.

flebolito, *s. m.* (φλέψ, vena; λίθος, piedra). Concreción calcárea de que á veces están incrustadas las paredes de las venas varicosas.

flebopexia, *s. f.* (φλέψ; πῆξις, fijación). Operación practicada á veces á los enfermos atacados de varicocele, para contrarrestar la ectasia y la ptosis del paquete venoso del cordón.

flebosclerosis, *s. f.* (φλὲψ; σκλερός, duro). Transformación esclerosa de las paredes de las venas.

flebotomía, *s. f.* (φλέψ: τομή, sección). Sangría venosa.

flegmasia, *s. f.* (φλέγω, quemo). Inflamación.

flegmatia alba dolens. Sin. *edema blanco doloroso*. Forma atenuada de la flebitis infectiva, que se manifiesta por un edema blanco particular, en un miembro ó segmento de miembro cuya vena principal está obturada por trombosis, acompañado de dolor y de impotencia de dicho miembro. La *flegmatia alba dolens* ataca generalmente la pierna; se la observa en el puerperio, á consecuencia de enfermedades infectivas, y en la mayoría de las caquexias.

flegmatia cerulea dolens. Forma atenuada de flebitis vecina de la *flegmatia alba dolens*, en la cual el edema es azulado. Se la observa sobre todo cuando la flebitis ha invadido las venas superficiales.

flegmón, *s. m.* (φλέγω, yo quemo). Inflamación del tejido conjuntivo que separa los órganos. — *flegmón circunscrito*. Inflamación circunscrita que termina por un abceso. — *flegmón difuso*. Inflamación que progresivamente invade el tejido conjuntivo circunvecino, que no le opone resistencia alguna.

flegmorrágico (período). El que precede al período álgido en el cólera asiático.

flictena, *s. f.* (φλύζειν, hervir). Levantamiento de la epidermis, lleno de serosidad transparente. Esta palabra designa á la vez la vesícula y la vejiga.

flicténula, *s. f.* Pequeña flictena de la córnea en la queratitis flictenu ar.

Flint (signo de). Soplo presistólico percibido á veces en la punta del corazón, en la insuficiencia aórtica no complicada de estrechez mitral.

flizaciada (pústula) (φλυζάκιον, pustulita). Dícese á veces de una pústula ancha que reposa sobre base indurada; la costra que la reemplaza es oscura ó negruzca y espesa. Ej.: *ectima*.

flogógeno, *adj.* (φλόξ, llama; γεννᾶν, engendrar). Que provoca la inflamación.

flogosis, *s. f.* (φλόξ, llama). Inflamación.

flores, *s. f. pl.* Sin.: *fluores*. Reglas. — *flores blancas*. Véase: *leucorrea*.

floridzina (prueba de la) (Achard y V. Delamare, 1899). Examen clínico de la función renal basado en la propiedad que

posee la floridzina de provocar la glicosuria cuando se inyecta bajo la piel. Cuando el funcionamiento de la glándula renal se halla turbado, retárdase, es muy débil ó nula, la glicosuria que debe producir la floridzina.

fluctuación, *s f.* (*fluctuare*, flotar). Movimiento ondulatorio que se comunica al líquido contenido en una cavidad, al deprimir ó percutir la pared de ésta con una mano, m entras la otra se halla colocada de modo que pueda percibir este movimiento.

fluctuación (ruido de). Clapoteo particular que se produce al imprimir sacudidas á una cavidad que contiene líquido y gas (hidroneumotórax, dilatación del estómago).

flujo, *s. m.* (*fluere*, fluir). Derrame de un líquido. — *flujo hemorroidal.* Derrame sanguíneo proveniente de las hemorroides. — *flujo menstrual* ó *catamenial.* Las reglas.

fluores, *s. f. pl.* (*fluere*, fluir). Véase : *flores.* — *fluores blancas* Véase : *leucorrea.*

fluorescencia, *s. f.* (del *spath fluor*, en el que primero se observó el fenómeno). Luz particular que emiten ciertas sustancias cuando se las expone á la acción de los rayos químicos del espectro ó á la de los rayos X ó N.

fluoroscopia, *s. f.* Véase : *radioscopia.*

fobia, *s. f.* (φόβος, temor). Nombre dado á la aprehensión inmotivada que causa obsesión y angustia, y se presenta en circunstancias determinadas, siempre las mismas para cada enfermo. — Empleada como afijo esta palabra designa el temor mórbido al objeto ó al acto designados por la primera parte del término compuesto.

focómelo, *s. m.* (φώκη, foca ; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo ectromeliano, en que, habiéndose atrofiado los dos segmentos medios de los miembros, las manos y los pies parecen insertarse directamente sobre el tronco como en las focas

Fochier (método de). Método terapéutico que consiste en provocar abcesos de fijación.

folicilis, *s. f.* (Barthélemy). Sin. : *foliculitis diseminadas simétricas de las partes desprovistas de pelo, con tendencias cicatriciales* (Brocq). Afección caracterizada por la aparición de pápulo-tubérculos que llevan encima una vesiculilla pro-

vista de un orificio, la cual evoluciona lentamente y deja una cicatriz deprimida semejante á la de la viruela.

foliculitis, *s. f.* Término genérico que designa todas las inflamaciones de los folículos y en particular de los folículos pilosos.

foliculitis uretral. Inflamación de los forámina de la mucosa uretral, consecutiva á la blenorragia.

folículo tuberculoso (Charcot). Sin. : *tubérculo elemental.* Lesión elemental de la tuberculosis que, antes del descubrimiento del bacilo de Koch, se consideraba como la verdadera característica de la enfermedad. — Está constituido por, en el centro, una célula gigante rodeada de una zona de células voluminosas llamadas epitelioides, al rededor de las cuales existe una tercera zona formada de células embrionarias.

fomentación, *s. f.* (*fomentum*, de *fovere*, calentar). Acción de aplicar el calor como medio terapéutico. — La *fomentación* puede ser *seca* (saco de agua caliente, de arena caliente), ó *húmeda* (cataplasma, compresa, etc.).

fonendoscopia, *s. f.* Examen de los órganos por medio del fonendoscopio.

fonendoscopio, *s. m.* (φωνή, voz; ἔνδον, dentro; σκοπεῖν, examinar) (Bianchi). Instrumento provisto de una caja de resonancia, el cual sirve para auscultar y para trazar los límites de los órganos por medio de una maniobra especial, combinación de la percusión y de la auscultación. Dicha maniobra consiste en colocar el instrumento sobre el órgano que se va á limitar y en imprimir á su alrededor ligeros estremecimientos á la piel; éstos hacen vibrar el órgano subyacente, que á su vez trasmite sus vibraciones al aparato, el cual los amplifica : allí donde el órgano falta no se trasmiten dichos estremecimientos.

fonofobia, *s. f.* (φωνή, voz ; φόβος, temor). Temor de hablar en alta voz. Se observa en los enfermos muy debilitados.

fonómetro, *s. m.* (φωνή, voz; μέτρον, medida). Véase : *acúmetro.*

fontanela, *s. f.* (*fons, fontis*, fuente). Espacio membranoso comprendido entre los huesos del cráneo en los recién nacidos.

fórceps, *s. m.* (P. Chamberlan, siglo XVI) (*forceps*, tenazas). Instrumentos obstetricales dispuestos en forma de pinza con ramas sepa-

rables (*cucharas*). Su objeto es agarrar la cabeza del feto y extraerlo rápidamente, cuando la lentitud del parto pone en peligro á la madre ó al niño.

forcipresura, *s. f.* Método de hemostasis provisoria que consiste en agarrar un vaso seccionado, con los dientes de una pinza cuyas ramas están provistas de muescas que las mantienen cerradas.

formicación, *s. f.* (*formica*, hormiga). Sin. : *hormigueo*. Sensación especial de adormecimiento comparada á la que produciría el paso de hormigas sobre los tegumentos.

fórmula celular ó **citológica.** La de un líquido orgánico, fisiológico ó patológico, está constituida por las proporciones respectivas de los elementos celulares contenidos en este líquido.

formulario, *s. m.* Nomenclatura de medicamentos simples, y colección de fórmulas que comprenden las preparaciones oficinales y gran número de las magistrales.

forúnculo, *s. m.* (*furunculus*, ladroncillo). Inflamación circunscrita de la piel, localizada en el aparato pilo-sebáceo; está caracterizada por la tumefacción acuminada (clavo) y la formación de una pequeña escara.

forunculosis, *s. f.* La erupción de una serie de forúnculos.

fosfaturia, *s. f.* Presencia en la orina de fosfatos en mayor cantidad que la normal. Generalmente está acompañada de poliuria.

fosfeno, *s. m.* (φῶς, luz; φαίνειν, brillar) (Savigny, 1838). Sensación luminosa que se produce al comprimir un punto del globo ocular.

fosforismo, *s. m.* Intoxicación por el fósforo.

fosforoscopio, *s. m.* (φῶς, luz; φορός, que lleva; σκοπεῖν, examinar) (Becquerel). Aparato que sirve para determinar si un cuerpo sólido, líquido ó gaseoso, es fosforescente, y para medir el grado de fosforescencia.

Fothergill (enfermedad de). Neuralgia facial (V° par).

fotismo, *s. m.* (φῶς, φοτός, luz). Sin. : *sensación visual secundaria*, *seudofotestesia*, *seudocromestesia*. Apariencias visuales observadas en la audición colorida. Véase : *audición colorada*.

fotofobia, *s. f.* (φῶς; φόβος, temor). Temor de la luz franca, á causa de la impresión penosa, y aún do-

dorosa, que provoca. Este síntoma se observa en afecciones oculares (conjuntivitis, queratitis, etc.) y también en algunas afecciones cerebrales (meningitis).

fotógeno ó **fotogénico**, *adj.* (φῶς; γεννᾶν, engendrar). Que engendra luz.

fotometría, *s. f.* (φῶς; μέτρον, medida). Medida por medio del instrumento llamado *fotómetro*, de la intensidad de la luz irradiada por un foco.

fotopsia, *s. f.* (φῶς; ὄψις, vista). Nombre dado á visiones subjetivas de apariencia luminosa que hieren tanto al ojo sano como al ojo enfermo, las cuales son debidas á excitaciones directas de la retina ó del nervio óptico, excitaciones generalmente muy ligeras (espasmo de los párpados, aflujo de sangre á la red vascular, choque ligero del ojo, etc.).

fototaxia, *s. f.* **fototactismo**, *s m.* **fototáctica (propiedad)**, **fototropismo**, *s. m.* (φῶς; τάξις, orden). Propiedad del protoplasma de reaccionar á la luz (estudiada en el plasmodio. — *fototaxia positiva*. Atracción ejercida por la luz débil sobre el protoplasma. — *fototaxia negativa*. Repulsión ejercida por la luz viva.

fototerapia, *s. f.* (φῶς; θεραπεία, tratamiento) Método de tratamiento por la acción de los rayos luminosos. Ej.: *tratamiento de las pústulas varióticas por los rayos rojos.*

Foville (parálisis alterna del tipo) (Grasset, 1900). Variedad de parálisis motora alterna, de origen protuberancial, caracterizada por la parálisis de los miembros de un lado, y del facial total y del hemióculo-motor rotador de los ojos del otro lado.

fractura, *s. f.* (*frangere*, romper). Lesión ósea que consiste en una solución de continuidad, con desviación ó no de los fragmentos.

frambesia, *s. f.* Véase: *pian*.

Frænkel (signo de). Signo que permite diagnosticar la *sinusitis maxilar* en los enfermos atacados de derrame nasal purulento. Si se hace inclinar fuertemente la cabeza hacia adelante, vese surgir el pus en cantidad notable por el meato medio, que previamente se ha limpiado.

franklinización, *s. f.* ó **franklinismo**, *s. m.* Aplicación de la electricidad estática.

Fréderic Müller (signo de). Fenómeno que

consiste en latidos del velo del paladar y de las amígdalas, debido á la asociación del pulso capilar y de las pulsaciones carotideas. Se observa en la insuficiencia aórtica.

frenesí, *s. m.* (φρήν, pensamiento y diafragma, porque antes se localizaba el pensamiento en la región del diafragma). Nombre dado antes al delirio violento provocado por una afección cerebral aguda (meningitis, manía, delirium tremens).

frénico, *adj.* (φρήν, diafragma. Lo que pertenece ó se refiere al diafragma.

frénico (fenómeno del) (Soloviev). Signo observado en la tetania. Consiste en sacudidas rítmicas de la mitad izquierda del diafragma, síncronas con las sístoles cardiacas, mas, sin confundirse con el choque de la punta. Estas sacudidas serían debidas á la irritación del nervio frénico izquierdo por los movimientos del corazón ó del cayado de la aorta.

frenitis, *s. f.* (φρήν, diafragma). 1° Inflamación del diafragma — 2° (φρήν, pensamiento). Nombre dado por los antiguos al delirio agudo con fiebre intensa, carfología, pulso pequeño y numeroso. —3° (φρήν, diafragma). También llamaron así los antiguos la pleuresía diafragmática.

frenoglotismo, *s. m.* ó **frenoglótico (espasmo)** (φρήν; γλῶττα. lengua). Véase : *Kopp* (*asma de*).

frenología, *s. f.* (φρήν; λόγος) (Gall). Sin. : *craneoscopia*. Teoría según la cual cada facultad ó instinto estaría localizada en un departamento del cerebro, cuya situación podría determinarse en el vivo de acuerdo con los relieves del cráneo.

Freyer (operación de). Prostatectomía transvesical.

Friedlaender (bacilo de). Bacterias encapsuladas, asociadas á menudo dos á dos (diplobacilos), que se encuentran en cierto número de infecciones de las vías respiratorias (anginas, bronconeumonías, etc.).

Friedreich (enfermedad de) (1861). Sin. : *ataxia* ó *tabes hereditaria*. Afección crónica de la médula, sin relación alguna con la ataxia locomotriz, caracterizada principalmente por perturbaciones de la coordinación motora (ataxia estática, marcha tabeto-cerebelosa), deformaciones de los pies y nistagmus, finalmente, desde el punto de vista evolutivo hállase caracterizada

por su principio en la infancia, su duración indefinida y su carácter de enfermedad familiar.

frigoterapia, *s. f.* (*frigor*, frío; θεραπεία, tratamiento]. Véase : *crimoterapia*.

frotamiento, ó **frote, globular** (Simonnet). Sensación, percibida por el dedo que comprime la radial, del paso sucesivo de una infinidad de moléculas pequeñísimas. Se tenía, erróneamente, este signo como patognomónico de la endocarditis.

fruncida (facies) (*grippée*, en francés). Aspecto particular de la cara en ciertas infecciones graves originadas en el peritoneo (peritonitis generalizada ó localizada, apendicitis, obstrucción intestinal), y algunas veces en crisis muy agudas de cólicos hepáticos ó nefríticos. Consecuencia de la retracción de las fibras musculares, la cara parece disminuida de volumen, las eminencias óseas son más prominentes, la piel de la frente está fruncida, la nariz delgada y afilada, los ojos hundidos en la órbita y cercados por líneas azuluscas; los pómulos están salientes, los labios adelgazados.

fuelle (ruido de). 1° Nombre dado por Laënnec á los ruidos que, después de Andral, se designan con el nombre de *ruido de soplo*. — 2° (Tripier y Devic). Ruido cardiaco complejo, que recuerda al del fuelle por la distensión aspirativa que precede á la propulsión del aire; y debido á la coexistencia de un soplo sistólico anorgánico de la base ó de la punta del corazón con el ruido de galope (mal de Bright).

fuetazo, *s. m.* Ruptura, al momento de un esfuerzo, de várices profundas de la pantorrilla, que produce dolor vivo y súbito, semejante al que causaría un latigazo.

fulguración, *s. f.* (*fulgur*, rayo). Accidente causado por el rayo.

fulgurante (dolor). Dolor muy vivo que ataca espontáneamente (período inicial de la tabes) y cuya breve duración ha sido comparada con la del relámpago.

fuliginosidad, *s. f* (*fuligo*, hollín). Depósito negruzco que cubre los dientes, las encías y los labios en ciertas enfermedades (fiebre tifoidea).

fumar la pipa. Término que expresa la manera de respirar del apoplético

atacado de hemiplejia. Del lado paralizado la mejilla, flácida, se infla á cada respiración.

fumigación, *s. f.* Producción de humos ó de vapores en lugares cerrados y á expensas de sustancias medicamentosas cuyas propiedades terapéuticas se trata de utilizar.

fúngico, *adj.* (*fungus*). Lo referente á los hongos. Ej. : *intoxicación fúngica*; envenenamiento por los hongos.

fungiforme, *adj.* (*fungus*. hongo; *forma*). En forma de hongo. Ej. : *papilas fungiformes.*

fungo, *s. m.* (*fungus*). Nombre dado á tumores que macroscópicamente presentan el aspecto de una esponja ó de un hongo. — *fungo del testículo.* Tumor granuloso, constituido ora por el testículo herniado cubierto de mamelones carnosos, ora por fungosidades provenientes de un tubérculo ó de una goma, que salen á la superficie de las bolsas. — *fungo hematodio.* Véase : *angioma cavernoso.*

fungosidad, *s. f.* (*fungus*, hongo). Las vegetaciones que se producen en la superficie de una herida, de una mucosa, ó en una cavidad natural, y que se presentan bajo el aspecto de una masa blanda, friable y muy vascular.

funiculitis, *s. f.* (*funiculus*, cordón). Inflamación del cordón espermático.

furfuráceo, *adj.* Semejante al salvado. Ej. : *descamación del sarampión.*

fúrfuras, *s. f. pl.* (*furfur*, salvado, caspa). Escamilla epidérmica.

fusiforme, *adj.* Alargado en forma de huso. Ej. : *célula fusiforme.*

fuso-celular (sarcoma). Sin. *sarcoma fasciculado.* Sarcoma de células fusiformes.

G

gabelo, *s. m.* *glabellus*, dimin. de *glaber*, desprovisto de pelos (antropología). Eminencia situada en el esqueleto entre las dos crestas superciliares.

Gabón, (úlcera del). Véase : *úlcera fagedénica de los países cálidos.*

galactagogo, *adj.* y *s. m.* (γάλα, γαλακτος, leche; ἀγωγὸς, que provoca). Sus-

tancia medicamentosa ó alimenticia que favorece la secreción láctea.

galactocele, *amb.* (γάλα; κηλή, tumor). Quiste, formado en el curso de la lactancia, que contiene leche más ó menos modificada.

galactoforitis, *s. f.* Inflamación de los conductos galactóforos.

galactóforo, *s. m.* (γάλα, leche; φέρειν, llevar). Instrumentos llamados *pezones*, para suplir la falta del desarrollo de éstos; Budin llama también así un aparato capaz de adaptarse á una botella cualquiera en reemplazo del tetero ó biberón. — *adj.* Que sirve para el paso de la leche: *conductos galactóforos.*

galactóforo-mastitis, *s. f.* (Budin). Inflamación de la mamila consecutiva á la galactoforitis.

galactómetro, *s. m.* (γάλα, leche; μέτρον, medida). Instrumento destinado á medir la densidad de la leche

galactopoyesis, *s f.* (γάλα; ποιεῖν, hacer). Secreción láctea.

galactorrea, *s. f.* (γάλα; ῥέω, fluyo). Derramamiento espontáneo de leche por los senos.

galacturia, *s. f.* (γάλα; οὐρειν, orinar) Presencia de gran cantidad de grasa emulsionada en la orina, que presenta un aspecto lechoso. Es variedad de la *lipuria.*

Galassi (reflejo de) (1887). Sin. : *reflejo de Westphal-Piltz.* Reflejo palpebral de la pupila. Es un fenómeno fisiológico que consiste en el estrechamiento de la pupila durante la oclusión de los párpados.

galeantropia, *s. f.* (γαλή, gato; ἄνθρωπος, hombre). Monomanía del enfermo que se cree transformado en gato. Obsérvase sobre todo en las mujeres.

galeati (*galea*, casco) (Charcot). Neurasténicos que padecen de cefalea occipital (que, como el casco de Minerva, cubre sólo la parte posterior del cráneo).

galénicos (remedios) (Galeno). Remedios vegetales.

galenismo, *s. m.* (Γαληνός, Galeno). Doctrina de Galeno que atribuía la influencia preponderante sobre la salud á los cuatro humores principales: sangre, pituita, atrabilis (proveniente de las cápsulas suprarenales) y bilis amarilla. De su mezcla ó *crasis* en proporción variable dependían el temperamento bueno ó malo, la salud ó la enfermedad.

galope (ruido de) (Bouillaud, 1847). « Triple

ruido del corazón, constituído por la adición à los dos tiempos normales de uno tercero extraño á éstos, el cual no es ni frote ni soplo, sino un ruido golpeado interpuesto, en uno ú otro silencio, entre los dos ruidos normales » (Potain). Se le observa sobre todo en la hipertrofia del corazón de origen bríghtico.

Galton (silbato de). Silbato cuya altura de sonido puede ser aumentada ó disminuída, y que sirve para medir la agudeza auditiva. En las afecciones laberínticas los sonidos agudos son los primeros que dejan de percibirse.

galvanización, *s. f.* Aplicación de las corrientes continuas.

galvano-cauterio, *s. m.* Cauterio cuya incandescencia se obtiene por el paso de una corriente eléctrica.

galvano-faradización, *s. f.* Aplicación simultánea de corrientes continuas y de corrientes de inducción.

galvano-puntura, *s. f.* Sin. : *electro-puntura.* Operación que consiste en clavar agujas en un tejido y en hacer pasar por ellas una corriente eléctrica.

galvanotropismo, *s. m.* (galvanismo; τρέπειν, girar). Propiedad del protoplasma de reaccionar bajo la influencia de la galvanización.

gallináceo (marcha de) (Charcot). Véase : *espasmódica (marcha).*

Galliot (punto de). Punto determinado por la intersección de dos líneas convencionales, una horizontal que pasa á dos traveses de dedo por encima del gran trocánter, la otra vertical que separa el tercio interno de la nalga del tercio medio. Es uno de los puntos en que se practican ordinariamente las inyecciones intramusculares.

gammacismo, *s. m.* (gamma). Vicio de pronunciación caracterizado por la dificultad ó la imposibilidad de pronunciar la letra g.

gamomanía, *s. f.* (γάμος, matrimonio; μανία, manía). Impulsión mórbida de algunos degenerados á pedir en matrimonio á todas las mujeres.

ganglionar (fiebre) (Comby, Pfeiffer). Afección de la primera infancia caracterizada por un acceso febril con tumefacción de los ganglios cervicales. La *fiebre ganglionar* no es una afección específica, como se creyó al principio : es debida á la reacción ganglionar, fre-

cuente en la infancia, consecutiva á infecciones bucales, nasales ó faríngeas de diversa naturaleza.

ganglios sinoviales. Véase : *quistes sinoviales*.

gangrena, *s. f.* (γάγγραινα, de γραίνω, yo como). Muerte local de los tejidos.

gangrena fulminante ó **gaseosa.** Septicemia sobreaguda.

gangrena simétrica de las extremidades. Véase : *Raynaud* (*enfermedad de*).

gangueo, *s. m.* Véase : *rinolalia abierta* y *rinolalia cerrada*.

gargarismo, *s. m.* (γαργαρίζειν, gargarizar). Medicamento líquido destinado á hacer gárgaras. — La acción de gargarizar.

gargullido, *s. m.* (bajo latín *gargula*, gargüero). Los estertores húmedos, de gruesas burbujas, producidos en una cavidad por la agitación del líquido contenido en ella, agitación debida al paso de la columna de aire.

garrote, *s. m.* Instrumento destinado á comprimir la arteria principal del miembro que se va á operar.

gastralgia, *s. f.* (γαστήρ, estómago ; ἄλγος, dolor). Dolor vivo, exacerbante, localizado por el paciente en el epigastrio, y acompañado de perturbación digestiva. Es síntoma común á muchas afecciones gástricas.

gastrectasia, *s. f.* (γαστήρ ; ἔκτασις, dilatación). Dilatación del estómago.

gastrectomía, *s. f.* (γαστήρ ; ἐκτομή, excisión). Resección de una parte del estómago.

gástrico, *adj.* Lo perteneciente al estómago. — *jugo gástrico*. Líquido segregado por la mucosa del estómago.

gastritis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica de la mucosa del estómago.

gastritis ulcerosa. Véase : *úlcera simple*.

gastrocele, *amb.* (γαστήρ ; κηλή, hernia). Hernia del estómago.

gastrodiafanía, *s. f.* (Max Einhorn). Procedimiento de exploración del estómago, que consiste en introducir en su cavidad una fuente luminosa, de manera de reconocer por transparencia su forma y relaciones y el estado de las paredes.

gastro-elitrotomía, *s. f.* (γαστήρ ; ἔλυτρον, vagina). Véase : *laparo-elitrotomía*.

gastro-enteritis, *s. f.* (γαστήρ ; ἔντερον, intestino.

Inflamación de las mucosas gástrica é intestinal.

gastro-enterostomía, *s. f.* (γαστήρ; ἔντερον; στόμα, boca). Operación que consiste en poner en comunicación el estómago con un asa intestinal.

gastro-histeropexia, gastro-histerorrafia, gastro-histerosinafia, *s. f.* Véase: *histeropexia abdominal.*

gastrolisis, *s. f.* (γαστήρ; λύσις, acción de liberar). Operación que consiste en liberar el estómago de bridas ó de adherencias con los órganos vecinos.

gastromelo, *s. m.* (γαστήρ; μέλος, miembro). Monstruo « caracterizado por la existencia de uno ó de dos miembros accesorios insertos entre los miembros pelvianos y los miembros torácicos» (I.G. Saint-Hilaire).

gastropatía, *s. f.* (γαστήρ; πάθος, padecimiento). Nombre genérico de todas las afecciones del estómago.

gastropexia, *s. f.* (γαστήρ; πήξις, fijación). Fijación del estómago, en los casos de gastroptosis, ya acortando el epiplón gastrohepático, ya suturando la túnica serosa del estómago con la cara inferior del lóbulo izquierdo del hígado.

gastroplastia, *s. f.* (γαστήρ: πλάσσειν, formar). Operación que tiene por objeto cerrar una úlcera perforada del estómago, rechazando hacia el interior los labios de la úlcera y suturando los bordes de la invaginación.

gastroplejia, *s. f.* (γαστήρ; πλησσειν, herir). Parálisis del estómago.

gastroplicación, *s. f.* (*gaster; plicare*, plegar). Sin.: *gastrorrafia*. Operación que consiste en practicar pliegues en el estómago. Su objeto es disminuir el volumen de este órgano en caso de dilatación atónica.

gastroptosis, *s. f.* (γαστήρ; πτῶσις, caída). Relajación de los medios de fijeza del estómago, que coincide generalmente con la dilatación de este órgano y con perturbaciones gástricas.

gastrorrafia, *s. f.* (γαστήρ; ραφή, sutura). Véase: *gastroplicación.*

gastrorragia, *s. f.* (γαστήρ; ῥήγνυμι, rompo). Hemorragia de la cara interna del estómago, que se traduce á menudo por hematemesis ó por melena.

gastrorrea, *s. f.* (γαστήρ; ῥεῖν, fluir). 1° Vómito ó regurgitación de un líquido acuoso proveniente del estómago enfermo. —

2° Hipersecreción continua del jugo gástrico.

gastroscopia, *s. f.* (γαστήρ; σκοπεῖν, examinar). Procedimiento de exploración del estómago cuyo objeto es mirar la pared propia del estómago por medio de un instrumento especial. Este procedimiento no ha entrado en la práctica.

gastrospasmo, *s. m.* Contractura total de la túnica muscular del estómago; estado bastante raro que se presenta en el curso de ciertas crisis de vómitos nerviosos.

gastrostomía, *s. f.* (γαστήρ; στόμα, boca). Operación que consiste en establecer una abertura permanente para llegar al estómago por la pared abdominal (fístula gástrica), y que permite así la introducción de los alimentos cuando la parte superior del tubo digestivo se halla obstruída.

gastrosucorrea, *s. f.* Sin.: *enfermedad* ó *síndroma de Reichmann*. Síndroma caracterizado por la presencia en el estómago ayuno de una cantidad más ó menos considerable de jugo gástrico puro, ó en el cual hay una débil cantidad de sustancias alimenticias, y generalmente muy rico en ácido clorídrico libre.

gastrotomía, *s. f.* (γαστήρ; τομή, sección). Operación que consiste en abrir el estómago después de laparatomía.

gastroxia (Lépine) ó **gastroxinsis**, *s. f.* (Rossbach). Neurosis que se presenta por paroxismos y se manifiesta por cefalea violenta y difusa é hipersecreción ácida de la mucosa gástrica. Vómitos repetidos señalan el fin de la crisis. Esta afección, que se ha comparado con la jaqueca, es casi siempre consecuencia del exceso de trabajo intelectual. Es muy rara en Francia.

gástrula, *s. f.* Sin.: *blastodermo didérmico*. Segundo estadio evolutivo del blastodermo. Está caracterizado por la presencia de dos hojillas primitivas (endodermo, ectodermo).

gastrulación, *s. f.* Transformación de la blástula en gástrula por invaginación ó por epibolia.

gatillo, *s. m.* Pinza muy sólida, provista de largos brazos de palanca y de muy cortos dientes, que sirve en cirugía ósea y en la práctica del arte dentario.

Gaucher (enfermedad de) (1882). Epitelioma primitivo del bazo.

Gayet-Wernicke

(**enfermedad de**). Afección caracterizada clínicamente, por un sueño de larga duración (varios meses) y, anatómicamente, por lesiones de polioencefalitis situadas en la sustancia gris del acueducto de Silvio y del suelo del tercer ventrículo.

gazapera. *s. f.* Foco purulento de donde el pus corre dificilmente.

gelatinización del suero. Operación que consiste en solidificar el suero por la acción de una temperatura apropiada (65°).

gelosa, *s. f.* Nombre dado por Payen á una sustancia de naturaleza celulósica contenida en el alga llamada agaro, sustancia líquida á temperatura elevada y que tiene la propiedad de coagularse al enfriarse. El agaro sirve para preparar medios de cultivo sólidos, los cuales se llaman indiferentemente *agar-agar* ó *gelosa*.

gélula, *s. f.* Cápsula gelatinosa que se emplea para contener medicamentos; sustituyen los sellos ú obleas.

geminados ó **géminos**, *adj* (*geminus*, doble). Se dice de la disposición de una serie de objetos colocados de dos en dos. Ej. : *núcleos geminados* ó *géminos*, núcleos de dos células situados cerca de la línea intercelular.

gemiparidad, *s. f.* (*gemma*, yema; *parere*, parir). Sin. *reproducción gemípara*. Modo de reproducción por yemas ó botones, cada uno de los cuales forma, desarrollándose, un individuo semejante al que le dió nacimiento (polipero).

generación espontánea (γεννᾶν, engendrar). Sin. : *heterogénesis*. Producción de seres vivos sin el concurso de individuos de la misma especie preexistentes. Teoría no admitida actualmente.

génesis, *s. f.* (γεννᾶν, engendrar). Sin. : *formación libre*. Nombre dado á la teoría, hoy abandonada, de la generación espontánea de las células.

genioplastia, *s. f.* (γένειον, barba; πλάσσειν, formar). Operación que consiste en reparar por autoplastia las pérdidas de sustancia de la barba (parte inferior del rostro).

genoplastia, *s. f.* (*gena*, mejilla; πλάσσειν). Operación con la que se repara las pérdidas de sustancia de las mejillas ó sus deformaciones.

genu-cubital (posición). Actitud en que el tronco reposa atrás sobre las

rodillas y adelante sobre los codos, apoyados en el mismo plano (suelo, cama.)

genu-pectoral (posición). Actitud en que el tronco reposa sobre las rodillas y el pecho apoyados en un mismo plano : el eje del tronco se halla así fuertemente inclinado de atrás á delante y de arriba abajo (ginecología).

genu recurvatum. Deformación de la rodilla caracterizada por la posibilidad de doblar la pierna sobre el muslo formando un ángulo abierto hacia adelante.

genu valgum. Deformación del miembro inferior caracterizada por la oblicuidad de la pierna que forma con el muslo un ángulo abierto hacia afuera.

genu varum. Sin. : *piernas arqueadas*. Deformación del miembro inferior caracterizada por que la pierna y el muslo forman un arco de concavidad interna.

geofagia, *s. f.* ó **geofagismo,** *s. m.* (γῆ, tierra; φαγεῖν, comer). Perversión del gusto que lleva á los que la padecen á comer tierra. Forma de la malacia.

geotaxia, *s. f.* (γῆ; τάξις, ordenamiento), **geotácticas (propiedades), geotactismo, geotropismo,** *s. m.* (γῆ; τρέπειν, girar). Sensibilidad del protoplasma á la pesantez (estudiada en el plasmodio). Si la masa protoplásmica tiende á elevarse á lo largo de las paredes del vaso que la contiene, la *geotaxia* es *negativa*. En el caso contrario es *positiva*.

Gerhardt (reacción de). Reacción particular que presenta la orina de los enfermos atacados de coma diabético. Consiste en la aparición en ella del color vino Burdeos ú Oporto por la adición de percloruro de hierro. Esta reacción no es típica de la presencia de la acetona, como se ha dicho, sino de la del ácido diacético; también pueden darla otros cuerpos.

Gerhardt (signo de). 1° Modificación del sonido timpánico obtenido por la percusión de ciertas cavernas pulmonares, bajo la influencia de los cambios de posición del enfermo. La sonoridad es generalmente más grave en la posición sentada que en la acostada. Aún más, puede desaparecer en ciertas posiciones á consecuencia del desalojamiento del líquido contenido en la caverna. — 2° Ruido vascular oído en el occipucio y sobre la apófisis mastoide en

os casos de aneurisma de la arteria basilar ó de la arteria vertebral.

Gerlier (enfermedad de). Véase : *vértigo paralizante.*

germen, *s. m.* Término empleado en anatomía comparada y en biología para designar el tejido genital, en contraposición al resto de la economía ó *soma.*

gerodermia génito-distrófica (γέρων, anciano; δέρμα, piel). Sin. : *enfermedad de Rummo.* Afección caracterizada por senilismo precoz : piel flácida y arrugada, cifosis cervical, abdomen caído, impotencia.

geromorfismo cutáneo (γέρων, anciano; μορφή, forma). Perturbación trófica de la piel que se pone semejante á la de los ancianos, es decir, seca, arrugada, y como demasiado ancha para las partes que cubre.

gerontofilia, *s. f.* (γερων, γέροντος, φιλία, afición). (Féré, 1905). Anomalía del instinto sexual caracterizada por la solicitud del placer sexual con individuos de edad avanzada.

gerontoxon, *s. m.* (γέρων, γέροντος, anciano; τόξον, arco). Véase : *arco senil.*

Gersung (procedimiento de). Inyección subcutánea ó intersticial de vaselina esterilizada, para remediar ciertas deformidades adquiridas ó perturbaciones funcionales puramente mecánicas.

gestación, *s. f.* (*gestare*, llevar). Estado de las mujeres preñadas.

Gibert (pitiriasis rosada de). Véase : *pitiriasis rosada.*

gigantismo, *s. m.* Crecimiento exagerado. — Para Brissaud y Meige el *gigantismo* y la *acromegalia* serían una sola y misma enfermedad, que da origen al tipo gigante cuando se desarrolla antes de la soldadura de las epífisis, y evoluciona al contrario hacia el tipo acromegálico cuando se desarrolla más tarde.

gigantoblasto, *s. m.* Megaloblasto de muy grandes dimensiones.

Gilles de la Tourette (enfermedad de). Sin. : *enfermedad de los tics.* Véase : *tics.*

ginandria, ginantropia, *s. f.* (γυνή, mujer; ἀνήρ, ó ἄνθρωπος, hombre). Seudo-hermafrodismo parcial en la mujer. La hipertrofia del clítoris y la soldadura de los grandes labios simulan groseramente el pene y el escroto.

ginandroide, *adj.* y *s. f.* (γυνή; ανήρ; εἶδος, forma). Nombre dado á veces á los individuos atacados de *ginandria*.

ginatresia, *s. f.* (γυνή; ἀ priv; τρῆσις, agujero). Atresia de una parte del canal genital en la mujer (vagina, cuello del útero).

ginecología, *s. f.* (γυνή; γυναικός, mujer; λόγος, discurso). Estudio de las enfermedades especiales á la mujer.

ginecomastia, *s. f.* (γυνή; μαστός, mama). Hipertrofia de las mamilas en el hombre.

ginefobia ó **ginecofobia**, *s. f.* (γυνή; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa que algunos neurópatas experimentan en presencia de una mujer.

gingivitis, *s. f.* (*gingiva*, encía). Inflamación de las encías.

gingivitis expulsiva. Sin. : *enfermedad de Fauchard, periodontitis expulsiva, piorrea alveolodental.* Gingivitis observada en los artríticos y sobre todo en los diabéticos, caracterizada por el aflojamiento de varios dientes con desprendimiento de su engaste y supuración de los alveolos; termina generalmente por la caída de los dientes.

glaria ó **glera**, *s. f.* (bajo latín *clara ovi*, clara de huevo). Sin. : *mucosidad.* Líquido incoloro, glutinoso como la clara de huevo, más consistente que el moco, segregado por las mucosas en ciertos estados patológicos.

glaucoma, *s. m.* (γλαυκός, verduzco). Afección ocular caracterizada por el aumento rápido ó lento de la presión intra-ocular, la atrofia de las membranas del ojo y la excavación del nervio óptico.

glaucuria intermitente (Chauffard, 1898). Intermitencia que se observa en la eliminación del azul de metileno cuando se somete á la prueba de la glaucuria un individuo atacado de insuficiencia hepática.

glaucuria (prueba de la). Véase : *azul de metileno* (*prueba del*).

glicemia ó **glicohemia**, *s. f.* (γλυκύς, azucarado; αἷμα, sangre). Nombre dado por Claudio Bernard á la presencia normal de glicosa en la sange. La glicosa se halla en cantidad exagerada en la sangre de los diabéticos (*hiperglicemia*)

glicerado ó **glicerolado**, *s m.* Preparación farmacéutica que lleva como excipiente glicerina ó glicerolado de almidón.

glicogenesia, *s. f.* (Cl. Bernard). Formación del glicógeno.

glicogenia ó **glicogénesis**, *s. f.* Formación del azúcar en el organismo; se verifica sobre todo en el hígado á expensas del glicógeno que contiene este órgano.

glicógeno, *s. m.* (γλυκύς, cosa azucarada; γεννᾶν, engendrar). Sustancia descubierta por Claudio Bernard en el hígado, donde se conserva en reserva para transformarse en azúcar según las necesidades del organismo. También se halla en otros órganos (placenta, músculos, etc.).

glicolisis, *s. f.* (γλυκύς; λύειν, disolver). Disminución ó desaparición del azúcar contenido en la sangre; este azúcar es detenido y transformado en ciertos órganos ó tejidos (hígado, músculos, etc.).

glicosismo, *s. m.* Sin.: *sacarismo.* Accidentes mórbidos, agudos ó crónicos, provocados por la ingestión de una cantidad exagerada de azúcar. Esta intoxicación, que no es muy conocida sino por experiencias de laboratorio, se parecería al alcoholismo.

glicosuria, *s. f.* (γ)υκύς, dulce; οὐρεῖν, orinar). Sin.: *melituria.* Presencia en la orina de un principio azucarado (glicosa)

glicosuria alimenticia (prueba de la). Véase: *Colrat* (*prueba de*).

glioma, *s. m.* (γλία, liga, materia viscosa). Tumor de consistencia blanda cuya estructura semeja á la de la neuroglia, formado de tejido nervioso en estado embrionario.

glioma telangiectásico. Glioma en que predomina el elemento vascular.

gliomatosis medular. Véase: *siringomielia.*

glio-sarcoma, *s. m.* Glioma en que predomina el elemento celular.

Glisson (enfermedad de). Véase: *raquitismo.*

globina, *s. f.* Sustancia albuminoide que, en unión de la hematina, componen la hemoglobina.

globo-celular (sarcoma). Sin.: *sarcoma encefaloide.* Sarcoma de células redondas.

globo histérico. Véase: *bola histérica.*

globulina, *s. f.* Sustancia albuminoide que forma el estroma (protoplasma homogéneo) del glóbulo rojo.

globulino, *s. m.* Nombre dado á veces á los linfocitos.

globulinuria, *s. f.* (globulina; οὐρεῖν, orinar). Variedad de albuminuria caracterizada por la presencia de globulina sola en la orina.

glóbulolisis, *s. f.* (glóbulo: λύειν, disolver). Véase: *hematolisis*.

globulosos (extertores). Se designa, en auscultación, bajo el nombre genérico de *estertores húmedos* ó de *estertores globulosos*, las variedades de estertores crepitantes, subcrepitantes y cavernosos, por contraposición á los *estertores secos* ó *sonoros*. — (Algunos dicen: *estertores bulosos*, *bularios*, *vejigosos*).

glomerulitis, *s. f.* Forma de nefritis en que predominan las lesiones del glomérulo.

glomérulo-nefritis, *s. f.* Nefritis subaguda en que están interesados á la vez los glomérulos y los tubos contorneados.

glosalgia, *s. f.* (γλῶσσα, lengua; ἄλγος, dolor). Sin.: *glosodinia*. Neuralgia lingual.

glositis, *s. f.* Nombre genérico dado á todas las lesiones inflamatorias de la lengua, superficiales ó profundas, agudas ó crónicas.

glositis exfoliatriz marginada. Véase: *descamación marginada aberrante de la lengua*.

glosocele, *amb.* (γλῶσσα, lengua; κήλη, hernia). Glositis flegmonosa que produce una hinchazón considerable de la lengua y la protuberancia de este órgano fuera de la boca.

glosodinia, *s. f.* (γλῶσσα; ὀδυνή, dolor) (Verneuil). Véase: *glosalgia*. — Frecuentemente se reserva el término *glosodinia* para una neuralgia especial de la lengua, notable por la fijeza del punto doloroso, y que se observa, en particular, en los artríticos neurópatas (topoalgia).

glosofitia, *s. f.* (γλῶσσα; φύτον, vegetal) (Dessois). Sin.: *lengua negra*. Afección rara, de naturaleza desconocida, caracterizada por la existencia de una coloración más ó menos oscura de la cara dorsal de la lengua y por la hipertrofia considerable de las papilas filiformes

glossy-skin (inglés *glossy*, luciente; *skin*, piel). Perturbación trófica de la piel, que consiste en su aspecto liso y luciente, con desaparición casi completa de los pliegues de flexión. Esta lesión se observa sobre todo en los dedos á conse-

cuencia de las heridas de los nervios.

Glüge (corpúsculo de). Montoncillos de detritus celulares que han sufrido la degeneración grasosa, observados en el pus.

Gmelin (reacción de). Reacción que se obtiene dejando caer suavemente ácido nítrico á lo largo de las paredes del vaso que contiene la orina de un enfermo atacado de ictericia bilifeica. El ácido cae en el fondo del vaso y entre las dos capas líquidas se forma una serie de discos colorados de los cuales el más elevado, de un bello color verde esmeralda, es debido á la transformación, por oxidación, de bilirubina en biliverdina.

Godelier (ley de). Ley según la cual la tuberculosis del peritoneo coincide siempre con la tuberculización de una ú otra pleura.

Goldspohn (operación de). Exploración y destrucción de las adherencias del útero por medio del índice introducido en el abdomen á través del canal inguinal, en el curso de la operación de Alquié-Alexánder.

goma, *amb.* Producción mórbida, que aparece bajo la forma de una tumefacción limitada, y debe su nombre ya á su consistencia, ya al líquido que á veces mana de ella y que semeja á una solución de goma Este vocablo, primero empleado para designar ciertas producciones sifilíticas, ha sido aplicado después á lesiones de naturaleza diferente, pero que presentan mayor ó menor analogía con las gomas sifilíticas. — En dermatología se designa con este nombre una producción patológica situada en las capas profundas del dermo, que forma un bulto más ó menos notable y tiende á abrirse para dar lugar á una úlcera profunda.

goma escrofulosa ó **escrófulo-tuberculosa.** Variedad de tuberculosis de la piel.

goma sifilítica. Producción mórbida de volumen variable que se presenta en el período terciario de la sífilis, capaz de desarrollarse en todos los tejidos, y caracterizada por la destrucción y el reblandecimiento de sus partes centrales, que son eliminadas en seguida.

gonalgia, *s. f.* (γόνυ, rodilla; ἄλγος, dolor). Dolor de la rodilla.

goniómetro, *s. m.* (γωνία, ángulo; μέτρον, medida). Nombre dado en antropología á los instrumentos destinados á medir los ár

gulos de la cara y del cráneo.

gonion, *s. m.* (γωνία) (antropología). Región del ángulo de la mandíbula inferior.

gonococcia, *s. f.* Enfermedad debida á la infección del organismo por el gonococo.

gonococo, *s. m.* Sin.: *micrococcus gonorrheæ.* Microbio específico de la blenorragia. Los *gonococos* son micrococos con forma de riñón, pegados generalmente dos á dos por la cara cóncava.

gonorrea, *s. f.* (γόνος, semen; ῥεῖν, correr). Véase: *blenorragia*. — Los antiguos creían que el derrame uretral era derrame de semen.

Gordon (signo de). Signo precursor de la corea, basado sobre la investigación del reflejo rotuliano mientras el enfermo está en decúbito dorsal. El pie permanece unos instantes como suspendido, luego baja lentamente. En otros casos hay interrupción en la caída y luego un segundo sacudimiento. A veces la investigación del reflejo provoca la extensión más ó menos permanente del miembro.

gota, *s. f.* (así llamada porque se suponía que la afección era causada por un humor que caía gota á gota en las articulaciones). « Enfermedad constitucional, á menudo hereditaria, caracterizada por una discrasia úrica y por ataques de fluxiones articulares específicas, susceptibles de metástasis y de compensación. » (Jaccoud).

gota militar. Blenorragia crónica.

Gothemburg (sistema de). Reglamento de higiene que da á las comunas el derecho de conceder el monopolio de la venta al detal de espirituosos á sociedades constituidas con propósitos filantrópicos, prohibiéndose todo provento ó ventaja personal. El número de los puntos de venta puede limitarse, así como la cantidad de alcohol suministrada á cada consumidor. En Suecia y en Noruega, donde está en vigor dicho sistema, la consumación de alcohol ha descendido de 46 y 16 litros por persona en 1830 á 6 litr,8 y 3 litros.

Goyrand (hernia de). Hernia inguino-intersticial; el intestino se halla situado en el espesor del canal inguinal.

graforrea, *s. f.* (γράφειν, escribir; ῥεῖν, fluir). Sin.: *escribomanía.* Nece-

sidad irresistible de escribir que se observa en ciertas formas de enajenación mental; las palabras salen de la pluma con incoherencia.

Graefe (signo de). Falta de sincronismo entre el movimiento de elevación del párpado superior y el movimiento de abajo arriba del globo ocular. Se observa en el bocio exoftálmico.

Gram (método de). Método de coloración de los microbios, que consiste en hacer obrar una solución yodo-yodurada (licor de Gram) sobre la preparación ya colorida por un color de anilina (violeta de genciana). Si se lava en seguida esta preparación con alcohol, ciertos microbios se descoloran (*no toman el Gram*), mientras que otros permanecen más ó menos fuertemente colorados (*toman el Gram*).

Grancher (enfermedad de). Véase : *espleno-neumonía.*

Grancher (esquema de). Agrupamiento de los signos suministrados por la palpación, la percusión y la auscultación del pulmón, en la pleuresía serofibrinosa, que permite diagnosticar el estado del pulmón subyacente. Cuando se encuentra: sonido + (de tonalidad mas elevada que normalmente), vibraciones + (aumentadas de intensidad). respiración — (débil ó ruda), se tiene el esquema + + —, indicio de una congestión pulmonar, de naturaleza tuberculosa casi siempre.

granulaciones grises ó tuberculosas. Sin : *tubérculos miliares.* Pequeñas nudosidades de volumen variable (de 1 vigésimo de milígramo, hasta 2 á 3 milígramos), duras, primero transparentes, luego opacas; son aisladas ó confluentes, y se transforman en nódulos caseosos.

granulia, *s. f.* (Empis, 1865). Sin. *tisis aguda granúlica, tuberculosis miliar aguda.* Forma aguda y generalizada de la tuberculosis, caracterizada desde el punto de vista anatómico por la presencia en el pulmón, y en casi todos los órganos, de granulaciones grises miliares; la invasión del organismo por el bacilo se hizo por la vía sanguínea.

granuloma, *s. m.* Nombre dado á veces á vegetaciones granulosas de origen sifilítico, tuberculoso, ó desarrolladas sobre una ulceración simple, originadas ya en la laringe, ya en las fosas nasales.

gránulopéxico, *adj.*

(*granulum*; πήξις, fijación) (Gilbert) Se dice de la función de un órgano (hígado) que fija en sus elementos las partículas sólidas que circulan en la sangre (polvos inertes, pigmentos melánico y ocre).

grasa de cadáver. Véase : *adipocira*.

gravativo (dolor) (*gravis*, pesado). Dolor acompañado de sensación de peso.

Graves (enfermedad de). Véase : *bocio exoftálmico*.

gravídico, *adj.* Que depende de la preñez. Ej. : *accidentes gravídicos*.

grávido (útero) (*gravis*, preñado) Utero que contiene un embrión ó un feto.

grippe, *s. f.* (vocablo francés, del gótico *gripan*). Sin. : *influenza*. Enfermedad infectiva, epidémica, contagiosa, caracterizada por su principio ordinariamente brusco, abatimiento general y muy variada sintomatología, que reviste ya la *forma torácica* (catarro y congestión bronco-pulmonar), ya la *forma gastro-intestinal*, ya la *forma nerviosa* (neuralgias diversas). Es causada por un microbio particular, llamado *bacilo de Pfeiffer*.

grieta, *s. f.* Pequeña fisura que interesa la epidermis y parte del dermo; se observa sobre todo en las manos, los labios y los pezones.

Gritti (operación de). Procedimiento de amputación del muslo en que, por un golpe de sierra, se quitan las superficies articulares del fémur y de la rótula. Las superficies óseas, así avivadas, son mantenidas luego en contacto hasta que se consoliden.

Grocco ((triángulo de). Macicez relativa que afecta la forma de un triángulo, observada en el lado sano de los enfermos que tienen un derrame pleural líquido. Dicho triángulo se halla situado á lo largo de la columna vertebral, en la parte inferior del tórax y corresponde á los órganos del mediastino rechazados por el fondo de saco pleural distendido.

grútum, *s. m.* Sin. : *acné miliar*, *milium*. Lesión cutánea que consiste en la formación de granulaciones redondeadas, del tamaño de una cabeza de alfiler, de color blanco ó amarillento, exparcidas sobre la frente y la cara, y debida á la obliteración de los canales excretores de las glándulas pilosebáceas.

guadañando ó de segador (marcha) (Todd). Andar del hemipléjico atacado de contractura con extensión del miembro inferior. La pierna alargada por el equinismo é incapaz de doblarse en la rodilla, no puede ser llevada hacia adelante sino describiendo un arco de círculo (movimiento de hoz ó de segador).

Gubler (reacción de). Reacción obtenida derramando suavemente ácido nítrico nitroso en un vaso que contiene la orina de un enfermo de ictericia hemafeica. Se obtiene una coloración oscura, de caoba vieja, que, para Gubler, era característica de la presencia de hemafeína en la sangre.

Gubler (tumor de). Tumor dorsal del carpo en la parálisis saturnina.

Gueneau de Mussy (punto ó botón diafragmático de). Véase: *botón diafragmático.*

Guerin (ley de J.). Ley según la cual el raquitismo procede en la deformación del esqueleto de abajo arriba; el grado de las deformaciones sucesivas está en rel ción con el orden de su manifestación.

gundú, *s. m.* (A. Macalister, 1882). Sin.: *anakhré.* Tumor de consistencia ósea implantado sobre el esqueleto de la cara y particularmente sobre las mandíbulas, que únicamente se ha observado en la raza negra. Su naturaleza es mal conocida.

gusanos (mal de). Dermatitis profesional de las devanadoras ó hiladoras de capullos de gusanos de la seda, caracterizada por rubor, hinchazón y formación de vesiculillas que se ulceran, en las manos y los antebrazos.

H

habicele, *amb.* (Calco preferible á *haricocele*). Véase: *haricocele.*

hábito exterior (*habitus*, manera de ser). Apariencia general del cuerpo considerada como expresión exterior del estado de salud y de enfermedad. — De donde un *hábito fisiológico* y numerosos *hábitos mórbidos.*

hacheadura, *s. f.* Modo de masaje que consiste en percutir una parte

del cuerpo con el borde cubital de la mano.

hafalgesia, *s. f.* (ἁφή, tacto; ἄλγος, dolor) (Pitres). Variedad de parestesia consistente en una sensación dolorosa intensa producida por la aplicación sobre la piel de ciertas sustancias (latón, oro, cobre, etc.) que en estado normal no provocan sino la sensación común de contacto (histeria y tabes).

Hahnemann (doctrina ó método de). Homeopatía.

halistérica (fusión) (Volkmann). Sin. : *reblandecimiento grasoso.* Variedad de degeneración grasosa del tejido óseo, que se observa en los huesos atacados de lesiones tuberculosas, á cierta distancia de estas lesiones.

halo, *s. m.* (ἅλως, aire). Círculo brillante que rodea la papila del ojo glaucomatoso.

hallux flexus (*hallex* ó *hallus*, dedo gordo) (Longuet, 1914). Dedo del pie en martillo.

hallux valgus. Deformidad, adquirida, del dedo gordo, que consiste en la desviación en masa hacia fuera.

Hámmond (enfermedad de). Nombre que se da á veces á la *atetosis.*

Hanot (enfermedad de). Cirrosis hipertrófica con ictericia crónica.

Hansen (bacilo de). Sin. : *bacilo de la lepra, bacillus leprœ.* Bacilo por todos los respectos muy vecino del de la tuberculosis. Agente específico de la lepra.

haptóforo, *adj.* (ἅπτειν, adherirse; φορός, que lleva) (Ehrlich). Se dice del agrupamiento atómico que permite que una molécula de cualquiera sustancia (particularmente de toxina) se fije sobre los tejidos.

haricocele, *amb.* (del francés *haricot*, habichuela). Nombre dado á veces al testículo atrofiado (sífilis hereditaria, orquitis de la infancia).

Hárley (enfermedad de). Véase : *hemoglobinuria paroxística.*

Hay (reacción de). Procedimiento clínico para descubrir la presencia de los ácidos biliares en la orina. Si se vierte en un vaso que contenga orina fresca un poco de flor de azufre, se ve que esta sustancia permanece en la superficie del líquido cuando la orina no contiene bilis, y cae al contrario al fondo del vaso cuando encuentra en la orina ácidos biliares.

Head (zonas de). Zo-

nas cutáneas cuya inervación proviene de los mismos segmentos medulares que inervan igualmente las vísceras abdominales. Los desórdenes de estas vísceras determinan hiperestesias cutáneas en las zonas correspondientes.

hebefrenia, *s. f.* (ἥβη, pubertad φρήν, inteligencia) (Kahlbaum, 1863). Variedad de demencia precoz. Turbación mental que sobreviene en la época de la pubertad; empieza por cierta tendencia á la melancolía, vagas ideas ambiciosas ó de persecución, movimientos de cólera ó de violencia, y termina por la demencia.

Héberden (nudosidades de). Engrosamiento de los huesos de los dedos en la articulación de la falangina con la falangeta, observado en el reumatismo crónico.

hebetud, *s. f.* (*hebes*, obtuso). Estado mórbido particular caracterizado por la supresión de las facultades intelectuales con conservación del uso de los sentidos. Primer grado del estupor.

hebotomía, *s. f.* (ἥβη, pubis; τομή, sección) (Gigli). Véase : *isquio-pubiotomia.*

Hebra (prurigo de). Véase : *prurigo de Hebra.*

heces, *s. f. pl.* (*fœces*, plur. de *fœx*, hez). Excrementos.

héctica (fiebre) (ἕκτικος, de ἔχειν, tener). Fiebre hética. Véase : *septicemia crónica.*

hecticidad, *s. f.* Estado particular de flacura y debilidad causado por la fiebre héctica. Hetiquez.

hedra, *s. f.* Herida del cráneo por instrumento cortante que ha dejado sólo una marca superficial en el hueso.

hedrocele, *amb.* (ἕδρα, ano; κήλη, hernia). Hernia de asas intestinales por el ano, arrastrando el recto en prolapso.

Heim y Kreysig (signo de) Depresión sistólica de los espacios intercostales en la región de la punta del corazón, observada en la sínfisis cardiaca.

Heim y Sánders (signo de). Movimiento contínuo de ondulación epigástrica que coincide con la retracción sistólica del epigastrio en la sínfisis cardiaca. Fenómeno señalado anteriormente por Senac.

Heinecke-Mikulicz (operación de) (1886-87). Véase : *piloro-plastia.*

helcópoda (marcha) (ἕλκω, yo arrastro; πούς, ποδός, pie) (Charcot). Tipo del andar en la hemiplejía

flácida (hemiplejia histérica). El miembro paralizado es arrastrado como un cuerpo que estuviera adherido al paciente, sin que éste tuviese conocimiento de ello.

helicópoda (marcha) (ἕλιξ, hélice; πούς, ποδός, pie) (Charcot). Perturbación de la marcha en la hemiplejia espasmódica. A cada paso la pierna enferma describe una curba de concavidad interna; el enfermo camina *guadañando*.

heliofobia, *s. f.* (ἥλιος, sol; φόβος, temor). Temor mórbido á la luz.

helioterapia, *s. f.* (ἥλιος, sol; θεραπεία, tratamiento). Método terapéutico que consiste en la exposición de las partes enfermas á los rayos solares; la *helioterapia* puede ser total ó parcial.

heliotropismo, *s. m.* (ἥλιος; τρέπειν, girar). Propiedad del protoplasma de ser atraído ó rechazado por la luz.

helmintiasis, *s. f.* Nombre genérico dado á las enfermedades causadas por los helmintos.

helminto, *s. m.* (ἕλμινς, gusano). Nombre genérico de las lombrices ó gusanos intestinales.

helmintología, *s. f.* (ἕλμινς; λόγος, discurso). 1° Patología verminosa. — 2° Rama de la historia natural que trata de los gusanos.

hemafeica (ictericia) (Gubler). Ictericia debida á la acumulación en la sangre de una sustancia hipotética llamada *hemafeína*, la cual se eliminaría normalmente por el hígado; la ictericia hemafeica aparecería ó cuando hubiera superproducción de dicha sustancia (destrucción exagerada de los glóbulos rojos), ó cuando, lesionado el hígado, no puede ésta ser eliminada. — No se admite ya hoy la existencia de la hemafeína y atribúyese dicho sindroma á la presencia en la sangre de pigmentos biliares modificados (pigmento rojo-oscuro). Las orinas presentan, al mismo tiempo, la reacción de Gubler.

hemagogo, *adj.* y *s. m.* (αἷμα, sangre; ἄγειν, expulsar). Aquellas sustancias á que se atribuía la propiedad de provocar el flujo menstrual ó el hemorroidal.

hemal (arco) (αἷμα). Nombre dado en embriología y en anatomía comparada á un arco formado por la parte anterior del cuerpo de la vértebra y por las costillas, arco que rodea las vísceras (por contraposición al *arco neural*).

hemartrosis, *s. f.*

(αἷμα, sangre; ἄρθρον, articulación). Derrame de sangre en una cavidad articular

hematangiosarcoma, *s. m.* (αἷμα, sangre; ἀγγεῖον, vaso: sarcoma) (Waldstein). Tumor de origen conjuntivo (sarcoma) desarrollado á expensas de la túnica más externa de los vasos sanguíneos (hematangioma).

hematemesis, *s. f.* (αἷμα; ἐμεῖν, vomitar). Vómito de sangre, cualquiera que sea su origen (estómago, esófago, sangre tragada, etc.).

hemátido, *s. m.* (αἷμα). Glóbulo rojo de la sangre.

hematidrosis, *s. f.* (αἷμα; ἱδρώς, sudor). Sin. : *sudor de sangre*. Perturbación de la secreción sudoral, caracterizada por la coloración roja del sudor; este color es debido á la presencia de la materia colorante de la sangre, sin glóbulos. La *hematidrosis* aparece en los histéricos á consecuencia de emociones ó sin causa apreciable.

hematímetro, *s. m.* (hemátido; μέτρον, medida). Aparato que sirve para contar los glóbulos de la sangre.

hematina, *s. f.* Sustancia ferruginosa que se presenta bajo la forma de polvo rojo-oscuro y que junto con la *globina* componen la *hemoglobina*.

hemato-aspiración, *s. f.* (G. Laurens, 1905). Hemostasia y secamiento de la herida operatoria, practicados de una manera continuada, en el curso de la operación, por un aparato aspirador especial.

hematoblasto, *s. m.* (αἷμα; βλαστός, germen) (Hayem). Corpúsculos figurados que se encuentran en la sangre y que Hayem considera como elementos destinados á transformarse en hemátidos.

hematocatarsis, *s. f.* (P. Delbet). Fuerte inyección de suero artificial hecha en una vena para levantar la tensión vascular (hemorragia, diarrea), ó para practicar el lavado de la sangre.

hematocele, *amb.* (αἷμα; κήλη, tumor). Esta palabra, cuyo sentido propio es *tumor sanguíneo*, no se emplea generalmente sino para designar ciertas hemorragias enquistadas de los órganos genitales del hombre (*hem. escrotal, hem. vaginal, hem. funicular, hem. intra-testicular*), ó de la pelvis en la mujer (*hem. peri-ó retro-uterina*). Sin embargo con el nombre de *hematocele del cuello* se designan ciertos quistes s

guíneos de la región cervical.

hematocele peri- ó retro-uterina. Hematoma localizado al peritoneo pelviano, y en particular al fondo-de-saco de Douglas, provocado por una paquipelviperitonitis, ó por la ruptura de una preñez tubaria.

hematocele vaginal. Véase : *paqui-vaginalitis.*

hematocolpos, *s. m.* (αἷμα; κόλπος, vagina). Retención de la sangre menstrual en la vagina por atresia del himen ó del orificio vulvar.

hematocrito, *s. m.* (αἷμα ; κριτός, separado). Aparato que sirve para evaluar el número de los glóbulos rojos contenidos en la sangre, separando éstos del plasma por centrifugación.

hematocromometría, *s. f.* (Hayem). Véase : *cromometría de la sangre.*

hematodio (carcinoma) (αἷμα; εἶδος, semejanza . Sin. : *carcinoma eréctil.* Carcinoma cuyos vasos presentan pequeñas aneurismas moniliformes, las que, reventándose, provocan hemorragias.

hematodermitis, *s. f.* (αἷμα; δερμα, piel). Nombre con que á veces se designa un grupo de dermatosis determinadas por lesiones sanguíneas (enfermedad de Dühring, pénfigo foliáceo, pénfigo vegetante).

hematofagía, *s. f.* (αἷμα; φαγεῖν, comer) Fagocitosis de los hemátidos.

hematofobia, *s. f.* (αἷμα; φόβος, temor). Sin. : *hemofobia.* Temor mórbido á la sangre.

hematoidina, *s. f.* (αἱματοειδής, semejante á la sangre). Cuerpo derivado de la hemoglobina, que se encuentra en los viejos focos hemorrágicos bajo forma de cristales microscópicos, romboidales, de bello color rojo.

hematolisis, *s. f.* (αἷμα; λύειν, disolver). Sin.: *glóbulolisis, hemolisis.* Alteración ó destrucción de los glóbulos rojos.

hematología, *s. f.* (αἷμα; λόγος, discurso). Estudio de la sangre, anatómico, fisiológico y patológico.

hematoma, *s. m.* (αἱματοῦν, llenar de sangre). Colección sanguínea enquistada.

hematoma aneurismal difuso. Véase : *aneurisma difusa.*

hematómetra, hematometria, *s. f.* (αἷμα, sangre; μήτρα, útero). Re-

tención de la sangre menstrual en el útero por atresia del cuello uterino.

hematomielia, *s. f.* (αἷμα; μυελός, médula). Hemorragia de la médula espinal, siempre situada en los centros grises.

hematonefrosis, *s. f.* (αἷμα; νεφρός, riñón). Derrame de sangre intra-renal.

hematopelvis, *s. f.* (αἷμα; *pelvis*). Colección de sangre en la pelvis.

hematopoyesis, *s. f.* (αἷμα; ποιεῖν, hacer). Formación de los glóbulos rojos.

hematoquiluria, *s. f.* Presencia en la orina de los principales elementos del quilo, de la linfa y de la sangre, que le dan una apariencia lechosa y rosada á la vez. La *hematoquiluria* es uno de los principales síntomas de la filariosis.

hematorraquis, *s. m.* (αἷμα; ῥάχις). Hemorragia intra-raquídea, proveniente de los senos del raquis ó de las meninges.

hematosalpingitis ó **hematosalpinx,** *s. f.* (αἷμα; σαλπίγξ, trompa). Hematoma de la trompa uterina, debido lo más á menudo á una preñez extra-uterina, y más rara vez á la retención de la sangre menstrual por atresia del *ostium uterinum* (orificio de la trompa en el útero).

hematoscopio, *s. m.* (αἷμα; σκοπεῖν, examinar). 1° Espectroscopio de visión directa que sirve para examinar el espectro de la sangre circulante bajo los tegumentos. — 2° Instrumento basado sobre la transparencia de la sangre, que permite evaluar rápidamente la cantidad de hemoglobina contenida en la sangre (*hematoscopio* de Henocque).

hematosis, *s. f.* Oxidación de la sangre en el pulmón (transformación de la sangre venosa en sangre arterial).

hematospectroscopia, *s. f.* Aplicación del espectroscopio al estudio de la sangre.

hematospermia, *s. f.* (αἷμα, sangre; σπέρμα, esperma). Sin.: *hemospermia*. Presencia de una cantidad más ó menos grande de sangre en el líquido emitido en la eyaculación. Esta eyaculación sanguinolenta se debe á la inflamación de la próstata ó de las vesículas seminales.

hematozoario, *s. m.* (αἷμα; ζῴαριον, animálculo). Los parásitos animales que viven en la sangre — *hematozoario de Laverán*. Parásito del paludismo.

hematuria, *s. f.* (αἷμα; οὐρεῖν, orinar). Emisión por la uretra de sangre mezclada íntimamente con la orina, en proporción más ó menos grande

hemeralopia, *s. f.* (ἡμέρα, día; ὄπτομαι, yo veo). Sin. : *ceguera nocturna*. Disminución considerable de la vista desde que cae el día.

hemeralopia epidémica. Enfermedad vecina del escorbuto y debida probablemente á la privación de ciertas materias grasas de origen animal. Se observa en los ejércitos en campaña.

hemiacéfalo, *s. m.* (ἥμισυς, medio; ἀ priv.; κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire) Monstruo en el cual la cabeza está representada por una masa redondeada que tiene en la superficie algunos repliegues cutáneos; las vísceras, en parte, faltan, y los miembros están atrofiados.

hemiacromatopsia, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; χρῶμα, color; ὄψις, vista). Hemianopsia de los colores.

hemiageusia, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; γεῦσις, gusto). Abolición del gusto en una mitad de la lengua.

hemialbumosuria, *s. f.* Véase : *albumosuria*. (La hemi-albumosa es lo mismo que la albumosa).

hemialgia, *s. f.* (ἥμισυς, medio; ἄλγος, dolor). Jaqueca.

hemianestesia, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; αἴσθησις, sensibilidad). Anestesia de una mitad del cuerpo.

hemianopía, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv ; ὄπτομαι, yo veo) ó **hemianopsia**, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; ὄψις, vista). Debilitamiento ó pérdida de la vista en una mitad del campo visual. — *hem. nasal*. La de la mitad interna. — *hem. temporal*. La de la mitad externa. — *hem. homónima*. La que interesa las dos mitades correspondientes en ambos campos visuales (derecho ó izquierdo de los dos lados). — *hem. heterónima*. Supresión en los dos campos visuales de las mitades simétricas (derecha de un lado é izquierda del otro.)

hemianosmia, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv ; ὀσμή, olfato). Anosmia unilateral.

hemiasinergia, *s. f.* Asinergia observada de un solo lado del cuerpo en las lesiones unilaterales del cerebelo ó de los manojos cerebelosos.

hemiataxia, *s. f.* Falta de coordinación de los movimientos voluntarios que se observa á veces, en los hemipléjicos, del lado paralizado.

hemiatetosis, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; τίθημι, coloco). Atetosis de un solo lado del cuerpo.

hemiatrofia, *s. f.* (ἥμισυς; ἀ priv.; τροφή, nutrición). Atrofia unilateral.

hemiclonia, *s. f.* (ἥμισυς; κλόνος, agitación). Mioclonia de una mitad del cuerpo.

hemicorea, *s. f.* (ἥμισυς; χορεία, baile). Movimientos coreiformes que no se manifiestan sino en una mitad del cuerpo.

hemicránia, *s. f.* (ἥμισυς; κρανίον, cráneo) Jaqueca.

hemicraniosis, *s. f.* Hemi-hipertrofia craneana.

hemidiaforesis, *s. f.* (ἥμισυς; διαφορέω, esparcir) **ó hemidrosis,** *s. f.* (ἥμισυς; ἱδρώς, sudor). Exageración de la secreción sudoral limitada á una mitad del cuerpo.

hemiencéfalo, *s. m.* (ἥμισυς; ἐγκέφαλος, cerebro). Monstruo privado de órgano de los sentidos, á pesar de que posee un cerebro casi normal.

hemiglositis, *s. f.* (ἥμισυς γλῶσσα, lengua). 1° Glositis flegmonosa circunscrita á una mitad de la lengua. — 2° Herpes lingual unilateral acompañado de neuralgia lingual. Probablemente de la misma naturaleza que el zona.

hemimelo, *s. m.* (ἥμισυς; μέλος, miembro). Nombre dado por I. G. Saint-Hilaire á monstruos cuyos brazos y muslos son de dimensiones normales, mientras que los antebrazos y las piernas, así como las manos y los pies, están reducidos á muñones.

hemi-mimia, *s.f.* (ἥμισυς; μῖμος, mimo). Asimetría del rostro animado por el juego de la fisonomía.

hemina, *s. f.* Cloridrato de hematina que se presenta bajo la forma de cristales romboidales muy oscuros. Su producción puede revelar la presencia de la sangre seca (medicina legal)

hemineurastenia, *s. f.* (Beard). Sin. *neurastenia dimidiada* (Charcot). Forma clínica rara de neurastenia, caracterizada por debilidad y cefalea unilaterales; puede sugerir la idea de lesión de los centros nerviosos.

hemiopía, *s. f.* (ἥμισυς; ὤψ, ὠπός, ojo). Conservación de la visión normal en una sola mitad del campo visual. Esta palabra es equivalente á *hemianopía*, mas no sinónima.

hemi-organismo, *s. m.* (Frémy, 1871). Es-

tado de ciertos cuerpos que en virtud de la « fuerza vital » de que están dotados experimentan descomposiciones sucesivas y dan origen á derivados nuevos. — Esta hipótesis estaba destinada á explicar la producción de los fermentos y se relacionaba con la teoría de la *generación espontánea*.

hemipago, *s. m.* (ἥμισυς; παγείς, unidos). Nombre dado por I. G. St-Hilaire á monstruos formados de dos cuerpos unidos por el tórax, el cuello y la parte inferior de la cara hasta la boca, que es común á ambos individuos.

hemiparacusia, *s. f.* Paracusia limitada á los sonidos provenientes de una mitad del cuerpo.

hemiparaplejia espinal. Véase: *Brown-Séquard (sindroma de)*.

hemiplejia, *s. f.* (ἥμισυς; πλήσσειν, herir). Parálisis completa ó incompleta de una mitad del cuerpo, total ó parcial.

hemiplejia alterna. Véase: *Millard-Gubler (sindroma de)*.

hemiplejia colateral. Hemiplejia del lado del hemisferio cerebral atacado.

hemiplejia espasódica infantil. Afección que empieza en la infacia y está caracterizada primero por ataques epileptiformes seguidos de hemiplejia flácida, luego de hemiplejia con contractura, y finalmente por la atrofia de los músculos paralizados.

hemisistolía, *s. f.* (ἥμισυς; συστολή, sístole). (Leyden, 1868). Sístole limitada á uno solo de los dos ventrículos, sea que los ventrículos se contraigan alternativamente, dando cada uno su sístole aisladamente; sea que uno de los dos ventrículos suspenda sus contracciones mientras el otro continúa las suyas. La *hemisistolía*, invocada para explicar ciertas arritmias regulares ó irregulares, no ha sido admitida por todos los autores.

hemiteria, *s. f.* (ἥμισυς; τέρας, monstruo). Nombre genérico dado por I. G. Saint-Hilaire á grandísimo número de anomalías simples, tales como la imperforación de un conducto (esófago, recto, vulva, iris, etc.), el labio leporino, la hernia umbilical, los órganos suplementarios, etc.

hemitermia, *s. f.* (ἥμισυς; θερμή, calor) (Vanlair). Elevación de la temperatura observada en el lado paralizado de los enfermos

atacados de apoplejía con hemiplejia.

hemocromatómetro de Hayem, hemocromómetro de Malassez (αἷμα, sangre; χρῶμα, color; μέτρον, medida). Instrumentos que sirven para practicar la cromometría de la sangre. Véase: *cromometría*.

hemocromatosis, *s. f.* (αἷμα; χρῶμα) (Recklinghausen). Coloración bronceada de la piel y de las diferentes vísceras, que se observa en ciertas formas de intoxicación crónica (alcohol). Dicha coloración es debida á un pigmento ocre formado por la célula hepática enferma á expensas de la hemoglobina.

hemocultivo, *s. m.* Siembra de una pequeña cantidad de sangre tomada á un enfermo con el propósito de reconocer los microbios contenidos en ella, y de hacer el diagnóstico de la enfermedad.

hemodiagnóstico, *s. m.* Diagnostico basado en el examen de la sangre.

hemodinamómetro, *s. m.* (αἷμα; δύναμις, fuerza; μέτρον, medida). Instrumento manométrico destinado á medir la presión sanguínea intravascular.

hemodrómico (diurético). Agente terapéutico que provoca la diuresis regularizando y acelerando la circulación sanguínea. Ej.: *la digital*.

hemodromómetro, *s. m.* (αἷμα: δρόμος, carrera; μέτρον, medida). Instrumento que sirve para medir la velocidad del curso de la sangre en las arterias ò en las venas.

hemofilia, *s. f.* (αἷμα, sangre; φιλία, amistad). Estado patológico caracterizado por la disposición casi siempre congénita y hereditaria á las hemorragias graves, ora espontáneas, ora provocadas por traumatismos muy ligeros.

hemofobia, *s. f.* (αἷμα; φόβος, temor). Véase: *hematofobia*.

hemoftalmía, *s. f.* (αἷμα; ὀφθαλμός, ojo). Derrame de sangre en el interior del globo del ojo.

hemoglobina, *s. f.* Sustancia albuminoide que contiene hierro, soluble en el agua, y á la cual se debe la coloración roja del glóbulo sanguíneo. Es muy ávida de oxígeno.

hemoglobinemia, *s. f.* Presencia de hemoglobina en la sangre á consecuencia de la disolución de los glóbulos rojos. La *hemoglobinemia* se revela por el

estado lacado del suero; puede dar origen á hemoglobinuria.

hemoglobinobilia, *s. f.* Presencia de hemoglobina en la bilis. Es síntoma siempre patológico, comparable á la hemoglobinuria.

hemoglobinometría, *s. f* Evaluación de la cantidad de hemoglobina contenida en la sangre.

hemoglobinuria, *s. f.* Presencia de hemoglobina en la orina.

hemoglobinuria esencial paroxística ó a frígore. Sin.: *enfermedad de Hárley.* Afección de naturaleza mal conocida, caracterizada por accesos de hemoglobinuria que sobrevienen bajo la influencia de diversas causas exteriores, en particular del enfriamiento.

hemo - hidartrosis, *s. f.* Derrame seroso y sanguíneo á la vez, en una cavidad articular. Ej. : *hemohidartrosis de la fractura de la rótula.*

hemoleucocitaria (fórmula). Clasificación de las diferentes variedades de leucocitos contenidos en la sangre, en el curso de una enfermedad, y la relación en que entre sí están.

hemolisis, *s. f.* Véase: *hematolisis.*

hemomediastino, *s. m.* Derrame de sangre situado en el tejido celular del mediastino.

hemoneumopericardias, *s. m.* Colección de gas y de sangre en la cavidad del pericardio.

hemoneumotórax, *s. m.* Derrame de sangre y aire en la cavidad pleural.

hemopericardias, *s. m.* Derrame de sangre en el pericardio.

hemopiésico (diurético). Agente terapéutico que provoca la diuresis aumentando la tensión arterial (baño frío, cafeína, etc.).

hemopronóstico, *s. m.* Pronóstico deducido del examen de la sangre y del estado de sus diversos elementos.

hemoptisis, *s. f.* αἷμα: πτύσις, esputo). Expectoración de una cantidad más ó menos abundante de sangre proveniente de las vías respiratorias. Dicha sangre tiene origen ya en una hemorragia de este aparato, ya en la hemorragia de un órgano vecino que se ha abierto camino por el árbol respiratorio.

hemoptoico, *adj.* (αἱμοπτοικός, error del copista por αἱμοπτυϊκός, de αἷμα y πτυειν, escupir). Lo que se refiere á la hemoptisis. Ej.:

esputo hemoptoico, foco hemoptoico.

hemorragia, *s. f.* (αἷμα; ῥηγνυμι, yo rompo). Efusión de una cantidad más ó menos considerable de sangre fuera de un vaso sanguíneo.

hemorragíparo, *adj.* (hemorragia; *parere*, producir). Que produce hemorragias.

hemorroides, *s. f. pl.* (αἷμα; ῥέω, corro). 1° Tumores varicosos formados por la dilatación de las venas del ano y del recto.—2° Sin.: *flujo hemorroidal.* Derramamiento de sangre por el ano en los individuos que padecen de tumores hemorroidales.

hemosialemesis, *s. f.* (αἷμα; σίαλον, saliva; ἐμεῖν, vomitar) (Josserand). Sin.: *pituita hemorrágica* (Mathieu y Milian). Vómito sanguíneo poco abundante, generalmente de orígen esofágico, formado por cierta cantidad de saliva coloreada que tiene el aspecto de jarabe de grosellas (histeria).

hemosiderina, *s. f.* (αἷμα; σίδηρος, hierro). Sin.: *siderina* (Quincke). Pigmento insoluble que da la reacción de las sales férricas y proviene de la hemoglobina. Se le encuentra en los antiguos focos hemorrágicos y en el hígado caquéctico.

hemosiderosis, *s. f.* Sobrecarga patológica de los órganos, particularmente del hígado, con hemosiderina.

hemospermia, *s. f.* Véase: *hematospermia.*

hemosporidiosis, *s. f.* Nombre genérico que se ha propuesto para todas las manifestaciones mórbidas provocadas por ciertos hematozoarios (hemosporidias).

hemostasis, *s. f.* (αἷμα; στάσις, detención). Fenómeno fisiológico (*hemostasis espontánea*) ú operación (*hemostasis provocada*) que detiene la hemorragia.

hemostático, *adj.* y *s. m.* Nombre dado á todos los medios puestos en uso para detener el derrame sanguíneo (medios físicos y medios químicos).

hemoterapia, *s. f.* (αἷμα; θεραπεία cura). Método terapéutico basado en el empleo sistemático de las inyecciones subcutáneas de sangre ó de suero sanguíneo.

hemotórax, *s. m.* Derrame de sangre pura en la cavidad pleural (generalmente de origen traumático).

Hennequin (aparatos de). Aparatos para reducir las fracturas de los miembros. Los destinados á las fracturas del muslo, y á las de la pierna, mantienen

los fragmentos en buena posición ejerciendo sobre el segmento inferior una tracción continua. Los destinados á las fracturas del húmero ó del radio se componen de tablillas enyesadas que sirven pora inmovilizar los fragmentos.

heno (asma ó fiebre de). Variedad de asma provocada en ciertos individuos nerviosos, por la acción del polen de ciertas gramíneas sobre la mucosa nasal, durante la siega del heno.

hepatalgia, *s. f.* (ἧπαρ, hígado; ἄλγος, dolor). Neuralgia del hígado.

hepatálgica (fiebre) (Charcot. Acceso febril que acompaña el paso de un cálculo por las vías biliares y ligado lo más á menudo á crisis de cólico hepático.

hepatargia, *s. f.* (ἧπαρ; ἀργία, inacción) (Quincke). Insuficiencia hepática.

hepatectomía, *s. f.* (ἧπαρ; ἐκτομή, extirpación). Resección de una parte del hígado.

hepático-gastrostomía, *s. f.* Operación que consiste en establecer una comunicación del canal hepático con el estómago.

hepáticostomía, *s. f.* (hepático; στόμα, boca). Abertura y sutura del canal hepático á la piel.

hepáticotomía, *s. f.* (hepático; τομή, sección). Incisión del canal hepático: operación que se practica ordinariamente para la extirpación de los cálculos biliares.

hepatismo, *s. m.* (ἧπαρ). Término empleado para designar el conjunto de los síntomas que dependen de las afecciones crónicas del hígado.

hepatitis, *s. f.* Nombre genérico de las infecciones inflamatorias del hígado.

hepatización, *s. f.* (Lœlius a Fonte). Modificación del aspecto macroscópico del pulmón en la neumonía. Su color y su densidad recuerdan groseramente el tejido hepático.

hepatocele, *amb.* (ἧπαρ; κήλη, hernia). Hernia del hígado.

hepato-colangio-enterostomía, *s. f.* (Kehr). Anastomosis en el intestino de los grandes conductos biliares intrahepáticos. Operación practicada en los casos en que los canales colédoco y hepático se hallan obstruídos.

hepatónfalo, *s. m.* (ἧπαρ; ὀμφαλός ombligo). Hernia umbilical del hígado.

hepatopatía, *s. f.* (ἧπαρ; πάθος, padecimiento).

Nombre genérico de todas las afecciones del hígado.

hepatopexia, *s. f.* (ἧπαρ; πῆξις, fijación). Fijación quirúrgica del hígado desviado ó de un lóbulo hepático flotante.

hepatoptosis, *s. f.* (ἧπαρ; πτῶσις, caída). Descenso y movilidad anormal del hígado á consecuencia del relajamiento de sus medios de fijeza.

hepatorrafia, *s. f.* (ἧπαρ; ῥαφή, sutura). Sutura de los labios de una herida hepática.

hepatotomía, *s. f.* (ἧπαρ; τομή, sección). Operación que consiste en practicar la incisión del hígado.

hepatotoxemia, *s. f.* Intoxicación de origen hepático.

heredo-ataxia cerebelosa P. Marie, 1893). Afección hereditaria que se presenta en la época de la adolescencia, caracterizada por asinergia, trastornos de la palabra y de la visión y conservación de los reflejos rotulianos.

heredo-contagio, *s. m.* Presencia en el organismo del feto, de cualesquiera bacilo ó germen mórbido (tuberculosis, sífilis) provenientes de la esperma del padre, del óvulo de la madre, ó de la sangre materna á través de la placenta

heredo-heredo-sífilis, *s. f.* Sífilis trasmitida á la segunda generación.

heredo-predisposición, *s. f.* Predisposición de los hijos de tísicos á contraer la tuberculosis.

heredo-sífilis, *s. f.* Sífilis hereditaria.

herencia, *s. f.* (*heres*, heredero). Persistencia, en los descendientes, de cierto número de los caracteres físicos é intelectuales de los ascendientes. — *her. ancestral* ó *atávica*. Véase : *atavismo*. — *her. directa*. La de padre á hijo. — *her. indirecta*. Semejanza con colaterales. — *her. de influencia*. Véase: *impregnación* 2°.

Hergott (fractura de). Variedad de fractura del peroné situada en la parte superior del hueso, que resulta de la diastasis de la articulación tibio-peronea inferior; está acompañada de heridas del nervio ciático popliteo externo (parálisis de los músculos de la región antero-externa de la pierna, actitud del pie en varo equino).

hermafrodismo, *s. m.* (Ἑρμῆς, Mercurio; Ἀφροδίτη, Venus) 1° (historia natural). Reunión de los dos sexos en un mismo individuo; el *hermafrodismo* es

normal en cierto número de invertebrados. — 2º (teratología). Deformación de los órganos genitales caracterizada por la presencia en el mismo individuo de algunos de los caracteres aparentes de los dos sexos. Mejor dicho, es un *seudohermafrodismo*.

hernia, *s. f.* Tumor formado por un órgano, ó una parte de órgano, salidos de la cavidad que lo contiene normalmente por un orificio natural ó accidental.

herpes, *s. m.* (ἕρπειν, arrastrarse). Lesión cutánea que consiste en la aparición de vesículas transparentes del volumen de una cabeza grande de alfiler, reunidas en número variable en un mismo grupo y rodeadas de una areola roja.

herpes circinado. Sin. : *tricofitia circinada, herpes parasitario.* Lesión de la piel causada por un tricófiton.

herpes del Nilo. Véase : *botón de Oriente.*

herpes gestationis. Sin. : *dermatitis polimorfa dolorosa recidivante de la preñez.* Dermatosis vejigosa que se observa en las mujeres preñadas y desaparece después del parto, caracterizada por la tendencia á la recidiva en cada nueva preñez. Aseméjase por muchos puntos á la *enfermedad de Dühring.*

herpes zóster. Véase : *zona.*

herpétide, *s. f.* Nombre dado antes á las erupciones cutáneas que se creía dependían de una diátesis llamada herpetismo.

herpétide maligna exfoliativa. Afección grave de la piel que aparece á consecuencia de afecciones cutáneas rebeldes (exema, soriasis, etc.) y caracterizada por un intenso rubor difundido á todo el tegumento y una descamación en laminillas de la epidermis. Esta afección, que es á las enfermedades de la piel lo que la asistolía á las enfermedades del corazón, produce generalmente la muerte del enfermo en medio de la caquexia.

herpetismo, *s. m.* « Enfermedad constitucional de largos períodos, esencialmente hereditaria, no contagiosa, caracterizada por desórdenes dinámicos de las tres grandes funciones nerviosas, y lesiones tróficas de los tegumentos, de los sistemas locomotores y sanguíneos. » (Lancereaux.)

Heryng (signo de). Signo que permite diagnosticar la *sinusitis maxilar.*

Alumbrando la cara del enfermo por transparencia, por medio de una lámpara eléctrica colocada dentro de la boca, se puede observar, si hay empiema maxilar : 1° una zona oscura en la parte superior de la mejilla correspondiente. 2° la oscuridad de la pupila del lado enfermo; 3° la percepción, por el paciente, de la fuente luminosa bucal por el ojo del lado enfermo, cuando se le ordena cerrar los ojos

heteradelfo, *s. m.* (ἕτερος, otro : ἀδελφός, her-(mano). Nombre dado por I. G. Saint-Hilaire á los monstruos heterotípicos en que el parásito se halla desprovisto de cabeza y parece estar implantado por la parte superior del tronco en el epigastrio del sujeto principal (autósito).

heteraliano, *s. m.* (ἕτερος; ἅλως, lugar) (I. G. St-Hilaire). Clase de monstruos dobles caracterizados por la inserción del parásito, reducido generalmente á una cabeza, sobre el vértice del autósito; el parásito no presenta nunca cordón umbilical.

heterocromia, *s. f.* (ἕτερος; χρῶμα, color). Coloración diferente de los dos iris.

heterocronia, *s. f.* (ἕτερος; χρόνος, tiempo). Aparición de un tejido en una época en que no se le encuentra habitualmente en el organismo (patogenia de los neoplasmas).

heteródimo, *s. m.* (ἕτερος; δίδυμος, gemelos). Nombre dado por I. G. Saint-Hilaire á los monstruos heterotípicos en que el parásito no se halla representado sino por la cabeza, que se implanta por un cuello y á veces un tórax rudimentario sobre la cara anterior del autósito.

heteroftalmía, *s. f.* (ἕτερος. otro : ὀφθαλμος, ojo). Nombre dado á la vez á las anomalías de coloración de un mismo ojo, y á las desemejanzas que pueden existir en la coloración de los dos ojos en un mismo individuos (*ojizarco*).

heterogéneo, *adj.* (ἕτερος; γένος, raza). Que no es de la misma naturaleza.

heterogenia, ó **heterogénesis,** *s. f.* Véase : *generación espontánea.*

heterogenesia, *s. f.* (ἕτερος; γένεσις, producción). 1° « Nombre colectivo de todas las desviaciones orgánicas en las que existe anomalía. » (Littré.) — 2° Broca designa así la imposibilidad de la fecundación entre dos

individuos de especies diferentes.

hetero-infección, *s. f.* Infección exógena.

heteró logo, *adj.* (ἕτερος; λόγος, naturaleza). Sin. . *heteromorfo* Desemejante. Ej. : *transmisión hereditaria heteróloga de las neurosis* (histérico que engendra epiléptico). — *tejido heteróloga* Sin. : *seudoplasma.* Nombre dado por los antiguos anatomo-patólogos á los tejidos morbosos que *no tenían análogos* en los tejidos del cuerpo.

heterometría, *s. f.* Desarrollo de un tejido á tal grado que se aleja de la formación típica normal (patogenia de los neoplasmas)

heteromorfo, *adj.* (ἕτερος; μορφή, forma). Véase: *heteróloga.*

heterónimo, *adj.* (ἕτερος; ὄνομα. nombre). Se dice de una lesión ó de una perturbación que ataca dos órganos ó dos partes de órgano, colocados uno á la derecha otro á la izquierda del plano mediano.

heteropago, *s. m.* (ἕτερος; παγείς. unido) Nombre dado por I. G. St-Hilaire á los monstruos heterotipios en que el parásito presenta cabeza y miembros distintos.

heteroplasia, *s. f.* (ἕτερος; πλάσσειν, formar). (Virchow). Formación de un tejido patológico á expensas de un tejido sano ; los elementos neoformados no se parecen á sus generadores por contraposición á *hiperplasia*).

heteroplasma, *s. m.* Nombre dado por los antiguos anatomo-patólogos á productos mórbidos que creían formados de elementos sin análogos entre los tejidos normales.

heteroplastia, *s. f.* 1° Sin. de *heteroplasia.* — 2° Sin. : *ingerto animal.*

heteroseroterapia. *s. f.* Aplicación al tratamiento de una enfermedad del suero de un animal inmunizado contra otra enfermedad. Ej. : inyección de suero anti-estreptocóccico á los tuberculosos (Emmerich).

heterotaxia, *s. f.* (ἕτερος, τάξις, orden). Nombre dado por I. G. St. Hilaire, en la clasificación de las anomalías de desarrollo, á la inversión visceral total ó parcial « que no pone obstáculo á que se efectue función alguna ».

heterotipio. *s. m.* (ἕτερος; τύπος, modelo) (I. G. St. Hilaire). Clase de monstruos caracterizados por la presencia de un parásito

colgado de la pared anterior del cuerpo del autósito, ambos con un cordón umbilical común.

heterotopia, *s. f.* (ἕτερος; τόπος, lugar). Teoría de Lebert, según la cual tejidos simples ó compuestos, y aún órganos, pueden formarse totalmente en lugares del cuerpo en que no se hallan normalmente.—Esta teoría, no admitida hoy, estaba destinada á explicar la patogenia de los tumores y aún de los quistes dermoideos.

hexacanto (embrión) (ἕξ, seis; ἄχανθα, espina). Embrión de la tenia equinococo, así llamado porque está armado de tres pares de ganchos que le permiten salir del tubo digestivo, perforando la mucosa, y ganar un capilar sanguíneo ó linfático; la circulación lo transporta á un punto cualquiera de la economía (principalmente al hígado), en donde forma un quiste hidatídico.

hexadactilia, *s. f.* (ἕξ, seis; δάκτυλος, dedo). Véase : *sexdigitismo.*

hialino, *adj.* (ὕαλος, vidrio). Se dice de todos los tejidos ó de todos los elementos que son transparentes como vidrio.

hialitis, *s. f.* Inflamación del cuerpo vítreo.

hialoplasma, *s. m.* Porción amorfa y homogénea del protoplasma.

hibridismo, *s. f.* ὕβρις, violo). Se designa á veces con este termino la doble naturaleza de ciertas lesiones, por analogía con el hibridismo de los animales y vegetales. Ej.: *hibridismo cáncero-sifilítico* de ciertos tumores.

hidartrosis, *s. f.* (ὕδωρ, agua; ἄρθρον, articulación). Afección articular crónica caracterizada por el derrame de un líquido seroso en la cavidad sinovial, la que distiende más ó menos.

hidátide, *s. f.* (ὕδωρ, agua). El estado larvario ó vesicular de la tenia equinococo, tal como se le encuentra en el hombre. Las *hidátides* tienen la forma de esferas más ó menos voluminosas, llenas de líquido incoloro.

hidatídico (quiste). Quiste más ó menos voluminoso capaz de desarrollarse en todos los órganos de la economía, pero que se forma sobre todo en el hígado, y se halla constituído por una hidátide que á la vez puede contener una ó muchas *vesículas hijas.*

hidatiforme (mola). Degeneración quística ó hipertrofia de las vellosida-

des coriales, debida á la hiperplasia del tejido mucoso.

hidradenoma eruptivo (ὕδωρ, agua; ἀδήν, glándula). (Jacquet y Darier). Pequeños tumores cuyos elementos celulares revisten la disposición glandular (adenoma) y presentan pequeñas dilataciones quísticas.

hidragogo, *adj.* y *s. m.* (ὕδωρ; ἄγειν, expulsar). Todos los agentes capaces de provocar una evacuación de líquido, tales como : sudoríficos, purgantes y diuréticos.

hidramnios, *s. m.* (ὕδωρ; ἄμνιος). Sin. : *hidropesía del amnios*. Abundancia anormal del líquido amniótico. Se admite generalmente que hay hidramnios cuando el peso del líquido excede de un kilógramo.

hidrargiria, *s. f.* (ὑδράργυρος, mercurio). Erupción cutánea producida por la administración al interior, ó la aplicación exterior, del mercurio ó de compuestos mercuriales.

hidrargirismo, *s. m.* Intoxicación por las preparaciones mercuriales.

hidremia, *s. f.* (ὕδωρ, agua; αἷμα, sangre). Aumento anormal de la cantidad de agua contenida en la sangre.

hidrencefalia, *s. f.* (ὕδωρ; ἐγκέφαλος, cerebro). Véase : *hidrocefalia*.

hidrencefálico (grito). (Coindet). Grito breve, agudo, monótono, que lanzan, sin razón apreciable, los niños atacados de meningitis tuberculosa.

hidrencefalocele, *amb.* (ὕδωρ. ἐγκέφαλος; κήλη, hernia). Ectopia hacia la cara externa del cráneo de una parte del cerebro, que contiene una prolongación ventricular distendida por líquido (variedad de encefalocele).

hidriatria, *s. f.* (ὕδωρ; ἰατρική, medicina). Véase : *hidroterapia*.

hidroa, *s. m.* (ὕδωρ). Nombre dado antiguamente á toda erupción vesiculosa. Esta palabra sirve hoy para designar : 1° el *hidroa vesiculoso*. Sin. : *herpes iris* (Bateman). Variedad de eritema polimorfo caracterizado por la forma especial de la erupción. La pápulo-vesícula primitiva se rodea de un círculo de vesículas (á veces de un doble círculo) mientras la vesícula central se seca y se cubre de una costrilla. — 2° el *hidroa vejigoso*. Véase : *dermatitis herpetiforme*.

hidro-aéreo (ruido). Ruido particular, de timbre generalmente metálico, que

se obtiene percutiendo una cavidad que contiene líquidos y gases (gran caverna pulmonar, neumotórax, estómago, etc.).

hidrocefalia, *s. f.* (ὕδωρ; κεφαλή, cabeza). Sin.: *hidrencefalia*. Derrame de líquido seroso en la cavidad de los ventrículos cerebrales (*hidrocefalia interna*) ó fuera del cerebro entre las meninges (*hidrocefalia externa*).

hidrocefalia hereditaria (Marie). Véase: *disostosis cleido-craneana hereditaria*.

hidrocele, *amb.* (ὕδωρ. κήλη, tumor). Derrame de serosidad en la túnica vaginal. — Por analogía se designa con el nombre de *hidrocele de la mujer* los quistes de los grandes labios. — Se ha dado también el nombre de *hidrocele del cuello* á ciertos quistes serosos uniloculares de la región cervical.

hidrocistoma, *s. m.* (ἱδρῶς sudor; κύστις, vejiga) (Róbinson, Thibierge). Quistes sudorales que forman pequeñas eminencias aisladas, ó aglomeradas, con el aspecto de perlas semitransparentes, de consistencia dura, y de la dimensión de una cabeza de alfiler.

hidrofobia, *s. f.* (ὕδωρ, agua; φόβος, temor), 1° Horror mórbido al agua. — 2° Sinonimo de *rabia* (la *hidrofobia* es uno de sus principales síntomas).

hidroftalmía, *s. f.* (ὕδωρ; ὀφθαλμός, ojo). Distensión de las membranas del globo ocular á consecuencia del aumento de volumen de los diferentes medios del ojo. Afección propia de la infancia (á veces congénita).

hidrogastria, *s. f.* ὕδωρ, agua γαστήρ, estómago). Nombre dado á la dilatación de estómago, vasta, con estrechez del píloro y éstasis de los alimentos.

hidrolado, *s. m.* Todos los medicamentos que tienen el agua como vehículo, con disolución de una ó varias sustancias activas.

hidrolato, *s. m.* Medicamento obtenido destilando con agua una sustancia que contiene principios activos.

hidrología médica. Estudio de las diferentes especies de aguas naturales ó artificiales consideradas sólo desde el punto de vista de sus propiedades terapéuticas.

hidrómetra, *s. m.* ó **hidrometria**, *s. f.* (ὕδωρ, agua; μήτρα, útero). Colección de líquido seroso en el útero.

hidromielia, *s. f.* (ὕδωρ; μυελός, médula). Nom-

bre dado primero á todas las afecciones congénitas ó no, incluyendo la siringomielia, que estaban acompañadas de una excavación patológica intra-medular. No se le aplica hoy sino á la dilatación simple del canal del ependimo, por comparación con la *hidrocefalia*.

hidronefrosis, *s. f.* (ὕδωρ: νεφρός, riñón). Distensión de la pelvis renal, y á menudo también del riñón, por la orina aséptica.

hidroneumopericardias, *s. m.* (ὕδωρ; πνεῦμα, aire; pericardio) Derrame de aire y de líquido en la cavidad del pericardio. Se manifiesta por un clapoteo particular llamado *ruido de molino*.

hidroneumotórax, *s. m.* (ὕδωρ; πνεῦμα, θώραξ, pecho). Derrame gaseoso en la cavidad pleural (neumotórax), acompañado de un derrame seroso ó sero-purulento de abundancia variable.

hidrónfalo, *s. m.* (ὕδωρ; ὀμφαλός, ombligo). Tumor líquido que se forma en algunos ascíticos por distensión de la cicatriz umbilical.

hidroparesia, *s. f.* Véase: *mixeedema*.

hidropericardias, *s. m.* Hidropesía del pericardio.

hidropesía, *s. f* (ὕδωρ; ὄψις, aspecto). Derrame de serosidad dentro de una cavidad natural del cuerpo ó entre los elementos del tejido conjuntivo.

hidrorraquis, *s. m.* (ὕδωρ; ῥάχις, raquis). Véase: *espina bífida*.

hidrorrea, *s. f.* (ὕδωρ; ῥεῖν, fluir). Pérdida serosa muy abundante proveniente de una mucosa inflamada (útero). — *hidrorrea nasal*. Derrame acuoso por las narices. Comprende las *rino-hidrorreas entotópicas* ó derrames provenientes de la pituitaria, y las *rino-hidrorreas ectópicas* ó derrame acuoso proveniente, ya del cerebro (*cráneo-hidrorrea*, líquido céfalo-raquídeo), ya de los senos frontales (*sinuso-hidrorrea*).

hidrosadenitis, *s. f.* (ἱδρῶς, sudor; ἀδήν, glándula) (Verneuil). Sin.: *adenitis sudorípara*, *abceso tuberoso* (Velpeau). Pequeño abceso redondeado, situado en la piel ó en el tejido celular subcutáneo, que tiene por punto de partida muy probablemente una glándula sudorípara.

hidrosalpinx, *s. m.* (ὕδωρ, agua; σάλπινξ, trompa). Colección serosa enquistada en la cavidad de una trompa uterina.

hidroterapia, *s. f.* (ὕδωρ; θεραπεία, tratamiento). Sin. : *hidriatría*. Método terapéutico por el agua bajo todas las formas y á temperaturas variables : baños, duchas de agua ó de vapor, sudación en estufas secas ó húmedas, sábanas frías, y además, según algunos autores, empleo del agua al interior.

hidrotimetría, *s. f.* (ὕδωρ; τιμή, valor; μέτρον, medida). Procedimiento para calcular el valor higiénico ó industrial de una agua, midiendo la proporción de sales terrosas que contiene.

hidrotomía, *s. f.* (ὕδωρ; τομή, disección). Procedimiento destinado á facilitar las disecciones finas; consiste en inyectar agua, bajo presión y de una manera continua. en la principal arteria del órgano que se va á estudiar.

hidrotórax, *s. m.* (ὕδωρ; θώραξ, pecho). Derrame seroso de la cavidad pleural, ya unilateral, ya bilateral, sin reacción inflamatoria, acompañado generalmente de otras hidropesías, en el curso de una afección hidropígena.

hidruria, *s. f.* (ὕδωρ; οὐρεῖν, orinar). Emisión de orina clara, de débil densidad, cuya composición se acerca mucho á la del agua.

hígido (estado) (ὑγιεία, salud). Estado de salud.

higiene, *s. f.* (ὑγιεία). Ciencia que enseña á conservar y mejorar la salud.

higroma, *s. m.* (ὑγρός, húmedo). Nombre colectivo de todas las variedades de inflamación de las bolsas serosas.

hilera. Instrumento que sirve para determinar el diámetro de las sondas y bujías que se usan para el cateterismo.

hipantropía, *s. f.* (ἵππος. caballo ; ἄνθρωπος, hombre). Monomanía del enfermo que se cree transformado en caballo.

hipemia, *s. f.* (ὑπό, debajo ; αἷμα, sangre). Disminución de la cantidad de sangre, en la totalidad ó en cualquiera de los elementos (generalmente se emplea la palabra *anemia* en el sentido de *hipemia*).

hiperacusia ó **hipercusia,** *s. f.* (ὑπερ, que indica exceso ; ἀκούειν, oir). 1° Audición dolorosa, esto es, acompañada de una sensación dolorosa en el interior del oído, aunque el sonido sea de intensidad media. — 2° Exageración subjetiva de la intensidad

del sonido, sin que la agudeza auditiva se halle exagerada, es decir, sin que el paciente pueda diferenciar mejor sonidos de diversas intensidades.

hiperalgesia, *s. f.* (ὑπερ; ἄλγος, dolor). Exasperación de la sensibilidad al dolor.

hiperazoúria, ó **hiperazoturia**, *s. f.* Aumento de la cantidad de úrea eliminada por la orina (congestión aguda del hígado).

hipercinesis, *s. f.* (ὑπέρ; κίνησις, movimiento) (Romberg). Sin. : *hiperquinesia*. Convulsión.

hipercloridria, *s. f.* Exceso de ácido clorídrico en el jugo gástrico Se traduce por dolores al fin de las digestiones, regurgitaciones, á veces vómitos, y lentitud del trabajo digestivo.

hipercloruración, *s. f.* Aumento de la cantidad de los cloruros alimenticios.

hipercloruria, *s. f.* Aumento de la cantidad de los cloruros eliminados por la orina.

hipercolia, *s. f.* (ὑπέρ; χολή, bilis) Aumento de la secreción biliar.

hipercondroplasia, *s. f.* (ὑπέρ: χόνδρος, cartílago; πλάσσειν, formar) (Méry). Alargamiento excesivo de los huesos debido al mayor espesor de los cartílagos de conjunción.

hipercrinia, *s. f.* (ὑπέρ; κρίνειν, separar). Aumento de secreción provocado por distintas causas y que coincide ó no, con modificaciones de calidad de la secreción.

hipercromia, *s. f.* (ὑπέρ; χρῶμα, color). Nombre genérico de todas las exageraciones de la pigmentación normal de la piel. La *hipercromia* comprende : el léntigo, las efélides, el cloasma y las melanodermias de causas internas y externas.

hiperefidrosis, *s. f.* (ὑπέρ; ἐπι; ἱδρώς, sudor). Sudores excesivos.

hiperemia, *s f.* (ὑπέρ; αἷμα, sangre). Sin. : *congestión*. Presencia de sangre en exceso en un órgano ó en parte de un órgano.

hiperencéfalo, *s m.* (ὑπέρ, por encima : ἐγκέφαλος, cerebro). Monstruo exencéfalo, en que falta la bóveda craneana y cuyo encéfalo está situado, en totalidad ó en parte, fuera del cráneo; mas, no presenta fisura espinal.

hiperepidermotrofia generalizada (E. Vidal). Tipo muy raro de dermatosis, que empieza al nacer, caracterizado por : rubor generalizado del der-

mo, hiperqueratosis acentuada, abundante secreción seborreica del cuero cabelludo, superactividad notable del crecimiento del pelo y de las uñas, y producción más ó menos abundante de levantamientos veingosos de la epidermis.

hiperepidosis, *s. f.* (ὑπέρ; ἐπιδοσις, crecimiento). Hipertrofia del tejido de un órgano.

hiperepinefria, *s. f.* Exageración de la actividad de las cápsulas supra-renales: se traduce por hipertensión arterial y los desórdenes que ésta produce (cefalea, vértigos, etc.).

hiperestesia, *s. f.* (ὑπέρ; αἴσθησις, sensibilidad). Exageración de las distintas clases de sensibilidad.

hipergénesis, *s. f.* Multiplicación exagerada de los elementos celulares de un órgano, de un tejido ó de un neoplasma. Véase: *hiperplasia*.

hiperglobulia, *s. f.* Aumento del número de los glóbulos rojos contenidos en la sangre. —Según Vaquez dicho término designa el aumento del diámetro de los glóbulos rojos.

hiperglicemia, *s. f.* Exageración de la cantidad de glicosis contenida en la sangre de los diabéticos.

hipergueusia ó **hipergeusia,** *s. f.* (ὑπέρ, que indica exceso; γεῦσις, gusto). Exageración de la sensibilidad gustativa.

hiperhepatia ó **hiperepatia,** *s. f.* (ὑπέρ; ἧπαρ, hígado) (Gilbert). Exageración del funcionamiento de la célula hepática, que se traduce ó por su multiplicación anormal, ó por una actividad secretora exagerada.

hiperidrosis, *s. f.* (ὑπέρ; ἵδρως, sudor). Exageración de la secreción sudoral.

hiperinosis, *s. f.* (ὑπέρ; ἴς, ἰνός, fibra). Exceso de fibrina en la sangre.

hiperleucocitosis, *s. f.* Aumento considerable del número de glóbulos blancos en la sangre.

hipermenesia, *s. f.* (ὑπέρ; μνῆσις, memoria). Exaltación de la memoria.

hipermetamórfosis, *s. f.* (Neumann. Estado que se observa en algunos vesánicos agitados. La atención de éstos es sobre-exaltada por la menor excitación exterior: invenciblemente se ven arrastrados á imitar cuanto se hace á su rededor.

hipermetropía, *s. f.* (ὑπέρ; μέτρον, medida; ὤψ, ojo). Anomalía de la refrac-

ción estática, que consiste en que los rayos luminosos paralelos van á converger más allá de la retina si no interviene la acomodación.

hipernefroma, *s. m.* (ὑπέρ; νεφρός, riñón). Nombre genérico de los tumores de las cápsulas suprarenales.

hiperosmia, *s. f.* ὑπέρ; ὀσμή, olfato). Exaltación de la olfación.

hiperostosis, *s. f.* (ὑπέρ; ὀστέον, hueso). Deformación constituida por el espesamiento de parte de un hueso, de todo él, y aun de varios huesos.

hiperpepsia, *s. f.* (ὑπέρ; πέψις, cocción) (Hayem). Sin. : *hiperestenia gástrica*. Exageración del funcionamiento de la mucosa gástrica con exaltación del proceso fermentativo. Se traduce por el aumento de apetito y cierta sensación penosa durante la digestión gástrica.

hiperpéptica (gastritis) (Hayem). Variedad de gastritis caracterizada por la hipersecreción del jugo gástrico, crisis dolorosas después de las comidas, y conservación del apetito.

hiperplasia, *s. f.* (ὑπέρ ; πλάσσειν, formar) (Virchow). Formación de tejido patológico á expensas del tejido sano ; los elementos neoformados no difieren en nada, ni en la forma ni en las funciones, de sus generadores (por contraposición á *heteroplasia*).

hiperplástica (inflamación). Inflamación caracterizada desde el principio por la proliferación de tejido embrionario, que se transforma poco á poco en tejido conjuntivo.

hiperprosexia, *s. f.* (Ziehen). Véase : *hipermetamórfosis*.

hiperqueratosis, *s. f.* (ὑπέρ; κέρας, cuerno). El grupo de las dermatosis caracterizadas por la hipertrofia de la capa córnea del epidermis (ictiosis, queratodermia, poroqueratosis, verruga).

hiperquinesia, *s. f.* Véase : *hipercinesis*.

hipersecreción, *s. f.* Exageración de la secreción de un órgano glandular.

hipersplenia, *s. f.* (ὑπέρ; σπλήν, bazo). Aumento del volumen del bazo. Véase : *esplenomegalia*.

hipersplenomegalia, *s. f.* (Gilbert y Fournier). Hipertrofia considerable del bazo, cuyo volumen puede alcanzar el del hígado y excederlo ; se observa en ciertos casos de enfermedad de Hanot.

hiperstenia, *s. f.* (ὑπέρ ; σθένος, fuerza). « Exal-

tación de las fuerzas, que acompaña las enfermedades inflamatorias. » (Littré.)

hiperstenia gástrica (A. Robin). Véase : *hiperpepsia*.

hipertensión, *s. f.* Véase : *hipertonía*.

hipertermia, *s. f.* (ὑπέρ; θέρμη, calor). Elevación de la temperatura del cuerpo ó de una parte del cuerpo por encima de la normal.

hipertiroidación, *s. f.* Presencia en el organismo de una cantidad demasiado grande de jugo tiroideo, proveniente : ya de la hipersecreción de la glándula (*enfermedad de Basedow*). ya del tratamiento tiroideo intensivo. Se manifiesta por taquicardia, elevación de la temperatura, insomnio, etc.

hipertiroidia, *s. f.* Exageración de la función tiroidea.

hipertonía, *s. f.* (ὑπέρ; τόνος, tensión). Aumento de tensión Ej. : *hip. arterial*.

hipertricosis, *s. f.* (ὑπέρ; τρίξ, τριχός, pelo). Sin. : *tricauxis*. Deformidad cutánea que consiste en el desarrollo anormal del sistema piloso. Puede ser congénita ó adquirida, generalizada ó localizada.

hipertrofia, *s. f.* (ὑπέρ; τροφή, nutrición). Aumento de la nutrición de un órgano. — Esta palabra se emplea á menudo con el sentido de aumento del volumen de un órgano por alteraciones anatómicas variables.

hipinosis, *s. f.* (ὑπό, debajo, ἴς, ἰνός, fibra). Disminución de la cantidad de fibrina de la sangre.

hipnagógicas (alucinaciones). Véase : *alucinaciones hipnagógicas*.

hipnalgia, *s. f.* (ὕπνος, sueño; ἄλγος, dolor) (Oppenhein). Dolor que no se produce sino durante el sueño y desaparece en cuanto el enfermo se despierta (neuropatías).

hipno-anestesia, *s. f.* (ὕπνος; anestesia). Anestesia general obtenida por el sueño (cloroformo, èter, etc.).

hipnosis, *s. f.* Sueño provocado.

hipnosia, *s. f.* (ὕπνος, sueño). Véase : *sueño (enfermedad del)*.

hipnótico. *adj.* y *s. m.* Sustancia cuya absorción produce el sueño.

hipnotismo, *s. m.* (ὕπνος) (Braid, 1841). « Estado síquico particular, susceptible de ser provocado, que pone en actividad ó exalta á grados diversos la sugestibilidad, esto es, la aptitud á ser influido por una idea aceptada por el

cerebro, y á realizarla ». (Bernheim.)

hipo, *s. m.* Contracción espasmódica del diafragma que determina la brusca sacudida del abdomen y del tórax, y va acompañada de un ruido ronco especial, causado por la constricción de la glotis y la vibración de las cuerdas vocales.

hipoacusia, *s. f.* (ὑπό, debajo; ἀκούειν, oir). Disminución de la agudeza auditiva.

hipoalgesia, *s. f.* (ὑπό; ἄλγος, dolor). Disminución de la sensibilidad al dolor.

hipoazoúria, ó **hipoazoturia,** *s. f.* Disminución del ázoe eliminado por la orina (úrea, uratos). Se observa en la insuficiencia hepática.

hipoblasto, *s. m.* (ὑπό; βλαστός, germen). Véase : *endodermo.*

hipocinético, *adj.* y *s. m.* (ὑπό; κίνησις, movimiento). Medicamento que produce depresión del organismo.

hipocinética (respiración) (Holovtschiner). Respiración superficial acelerada, con penetración incompleta del aire en los pulmones. Tipo respiratorio observado en las hemorragias graves.

hipocloridria, *s. f.* Disminución de la cantidad de ácido clorídrico (libre ó combinado) contenido en el jugo gástrico (síntoma frecuente en el cáncer del estómago).

hipocloruración, *s. f.* Disminución de la cantidad de los cloruros alimenticios.

hipocloruria, *s. f.* Disminución de los cloruros eliminados por la orina.

hipocolia, *s. f.* (ὑπό; χολή, bilis.) Disminución de la secreción biliar.

hipocoluria, *s. f.* Débil eliminación por la orina de los elementos de la bilis, que presenta á veces intermitencias. Se la observa en la colemia simple familial y coincide con la recrudescencia de la ictericia.

hipocondría, *s. f.* Neurastenia cuya causa se atribuye á desórdenes de los órganos situados en el hipocondrio (hígado, estómago).

hipocrática (facies). « Rostro profundamente alterado, anunciador de muerte próxima; es así llamada porque Hipócrates, en su *pronóstico*, la describió. » (Littré.)

hipocrática (sucusión). Véase : *sucusión hipocrática.*

hipocráticos (dedos). Deformación de los dedos, observada en la tisis

crónica, que consiste en el ensanchamiento del pulpejo de la última falange, y la incurvación de las uñas hacia la cara palmar, dando á los dedos la forma de una baqueta de tambor. Es el primer grado de la *ósteo-artropatía hipertrofiante neúmica.*

hipocratismo, *s. m.* Doctrina que preconiza la observación y la experimentación razonada; según Hipócrates, el médico debe estudiar la naturaleza en su lucha contra la enfermedad, lucha que llega á la crisis, y los esfuerzos de aquel deben obrar en este mismo sentido.

hipocromia, *s. f.* (ὑπό; χρῶμα, color). Nombre genérico dado á todas las disminuciones de la pigmentación cutánea : vitíligo, etc.

hipodérmico (método) (ὑπό, debajo; δέρμα, piel). Introducción en el tejido celular subcutáneo de una sustancia medicamentosa en solución, ó en suspensión en un líquido, por medio de una aguja ahuecada en canal.

hipodermoclisis, *s. f.* (ὑπό; δέρμα; κλύζειν, lavar) (Cantani). Inyección subcutánea de gran cantidad de suero artificial, con el fin de practicar el lavado de la sangre.

hpoepinefria, *s. f.* Insuficiencia funcional de las glándulas supra-renales; se manifiesta por astenia é hipotensión arterial, con tendencia al síncope.

hipo-estesia, *s. f.* (ὑπό; αἴσθησις, sensibilidad). Disminución de los diversos modos de la sensibilidad.

hipofosfaturia, *s. f.* Disminución en la proporción de los fosfatos eliminados por la orina.

hipogastrópago, *s. m.* (Marcel Baudoin, 1902). Monstruo doble mononfaliano cuyos dos cuerpos se hallan unidos desde el ombligo hasta la región prepubiana.

hipogeustia, *s. f.* (ὑπό; γεῦσις, gusto). Disminución de las sensaciones gustativas.

hipoglobulia, *s. f.* Disminución de la cantidad de glóbulos rojos contenidos en la sangre.

hipognato, *s. m.* (ὑπό; γνάθος, mandíbula) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble caracterizado por la implantación del parásito sobre el maxilar inferior del autósito.

hipohema, *s. m.* (ὑπό; αἷμα, sangre). Derrame sanguíneo en la cámara anterior del ojo.

hipohemoglobinia muscular, *s. f.* Disminu-

ción de la hemoglobina propia del músculo.

hipohepatía, *s. f.* (ὑπό; ἧπαρ, hígado) (Gilbert y Carnot). Sin.: *insuficiencia hepática*. Disminución ó insuficiencia en el funcionamiento de la célula hepática.

hipoosmia, *s. f.* (ὑπό; ὀσμή, olfato). Disminución de la olfación.

hipopepsia, *s f.* (ὑπό; πέψις cocción) (Hayem). Disminución del proceso fermentativo del estómago, que se traduce por la menor secreción clorídrica, fermentaciones anormales más frecuentes y más intensas, y dilatación atónica del estómago.

hipopión, *s. m.* (ὑπό; πῦον, pus). Colección purulenta en la cámara anterior del ojo.

hipoplasia, *s. f.* (ὑπό; πλάσσειν, formar). Disminución de la actividad formadora de los tejidos. Véase: *aplasia*.

hiposistolía, *s. f.* (ὑπό; συστολή, sístole). Sin.: *disistolía*. Disminución de la fuerza de la contracción cardíaca, observada en las cardiopatías crónicas antes de la fase asistólica.

hiposmia, *s. f.* Véase: *hipo-osmia*.

hipospadias, *s. m.* (ὑπό; σπάω, yo divido). Deformación congénita de la uretra del hombre, caracterizada por la división del canal en una extensión más o menos grande de la pared inferior, con un orificio anormal situado á distancia variable del extremo del glande.

hipostasis, *s. f.* **hipostática (congestión)** (ὑπό; στάσις, posición). Acumulacion de la sangre en las partes declives del pulmón en aquellos individuos en que la circulación se hace mal, y que se ven obligados á permanecer en decúbito dorsal.

hiposteatolisis, *s. f.* (Hallion, 1905). Ausencia de desdoblamiento de las grasas ingeridas; síntoma de insuficiencia pancreática, cuyo valor clínico es mayor que el de la esteatorrea.

hipostenia, *s f.* (ὑπό; σθένος, fuerza). Disminución de las fuerzas.

hipostenia gástrica (Robin). Véase: *hipopepsia*.

hipotensión, *s. f.* Véase: *hipotonía*.

hipotermia, *s. f.* (ὑπό; θέρμη, calor). Descenso de la temperatura del cuerpo, ó de una parte del cuerpo, por debajo de la normal.

hipotiroidación, *s. f.* Disminución de la cantidad de jugo tiroide vertido en el organismo.

hipotiroidia, *s. f.* Insuficiencia de la secreción tiroidea, que se manifiesta por las formas frustradas del mixedema, de las cuales la más atenuada constituye el síndroma de la *hipotiroidia benigna crónica.*

hipotonía, *s. f.* (ὑπό; τόνος, tensión). Disminución de la tensión. Ej.: *hipotonía arterial hipotonía ocular.* — *hipotonía muscular.* Disminución del tonus muscular; síntoma observado en el período inicial de la tabes (Fränkel), en la hemiplejia orgánica (Babinski), etc.

hipotrofia, *s. f.* (ὑπό; τροφή, nutrición). Deficiencia de nutrición de un órgano, que provoca generalmente su desaparición.

hipsocefalia, *s. f.* (ὕψος, altura; κεφαλή, cabeza). Véase: *acrocefalia.*

hippus, *s. m.* Sin.: *atetosis pupilar.* Nombre dado á una serie de contracciones (miosis) y dilataciones (midriasis) de la pupila, que se presentan alternativa y rítmicamente.

hipurgia, *s. f.* (ὑπουργία, asistencia). Técnica de los cuidados que deben darse á los enfermos.

hipuria, *s. f.* Presencia accidental de ácido hipúrico y de hipuratos en la orina humana.

Hirschsprung (enfermedad de). Sin.: *dilatación hipertrófica congénita del colon, megacolon congénito, enfermedad de Mya.* Dilatación de una parte más ó menos extensa del intestino grueso, acompañada del espesamiento de la túnica musculosa, que se presenta en los recién nacidos y se manifiesta clínicamente por una constipación tenaz y la distensión enorme del abdomen. Para unos, sería congénita; para otros, consecutiva á la estenosis del píloro.

histeralgia, *s. f.* (ὑστέρα, útero; ἄλγος, dolor). Dolor sordo situado en la matriz.

histerectomía, *s. f.* (ὑστέρα; ἐκτομή, ablación). Extirpación del útero, en totalidad ó en parte, por la vía abdominal (*hister. abdominal*) ó por la vía vaginal (*hister. vaginal*).

histerismo, *s. m.* (ὑστέρα, útero). Neurosis caracterizada por la existencia de dos órdenes de signos: los unos permanentes y que deben ser buscados (estigmas), y los otros transitorios, que se manifiestan generalmente de manera ruidosa (accidentes, ataques). La mayor parte de los fenómenos histéricos

pueden ser reproducidos por la sugestión ó la auto-sugestión.

histerocele, *amb.* (ὑστέρα; κήλη hernia). Hernia del útero.

histerocleisis ó **histerostomatocleisis,** *s. f.* (ὑστέρα; στόμα, boca; κλεῖσις, oclusión). Operación que consiste en suturar, uno á otro, los dos labios del cuello uterino. Se practica en los casos de fístulas vésico-uterinas. El útero queda de ese modo obliterado; los menstruos pasan por la vejiga. La esterilidad es consecutiva á esta operación.

histerocleisis vesical (ὑστέρα; κλεῖσις, oclusión). Operación que, en los casos de fístula vésico-vaginal yuxta-cervical, esto es, que ha interesado el labio anterior del cuello, consiste en suturar el labio posterior del hocico de tenca con el borde anterior de la fístula; de este modo, el útero comunica con la vejiga, y la fístula queda obturada por el labio posterior del cuello uterino.

histero-epilepsía, *s. f.* Gran histeria cuyos ataques semejan á las crisis de epilepsía.

histeróforo, *s. m.* (ὑστέρα; φόρος, que lleva). Pesario provisto de un tallo y sostenido por un cinturón.

histeroma, *s. m.* (ὑστέρα. Nombre propuesto por Broca para designar los cuerpos fibrosos del útero.

histerometría, *s. f.* (ὑστέρα; μέτρον, medida). Cateterismo del útero por medio de un tallo de metal, de ballena ó de goma (histerómetro), con el que se puede apreciar la forma, las dimensiones y la sensibilidad de la cavidad del órgano.

histero - neurastenia, *f. s.* Histeria cuyos accidentes recuerdan los desórdenes de la neurastenia.

histeropexia, *s. f.* (ὑστέρα; πήξις, fijación). 1° *histerop. abdominal.* Sin.: *gastro-histeropexia, gastro-histerorrafia, gastro-histerosinafia, ventro-fijación.* Fijación del útero á la pared abdominal anterior para corregir la retroflexión.—2° *histeropexia vaginal.* Sin.: *colpo-histeropexia vagino-fijación.* Operación que consiste en fijar el cuello uterino á la pared posterior de la vagina para poner remedio á las retroversiones y retroflexiones.

histerotomía abdominal (ὑστέρα; τομή, sección). Véase: *cesárea* (*operación*).

histerotomotocia, *s. f.* Véase : *cesárea* (*operación*).

histero-traumatismo, *s. m.* Nombre dado á la histeria cuando se revela con ocasión de un traumatismo.

histioide (tumor). Nombre genérico de los tumores compuestos de tejidos perfectamente diferenciados, esto es, desarrollados á costa de los tejidos del adulto: por contraposición á los tumores *complejos* ó *teratoides*, ú *organoides*.

histogénesis, *s. f.* (ἱστός, tejido; γένεσις, producción). Parte de la embriología que trata del desarrollo de los tejidos. — Empléase también el término para designar el estudio de la formación de los tejidos mórbidos (neoplasma, tubérculo, etc.)

histolisis, *s. f.* (ἱστός; λύειν, disolver). Destrucción de la materia viva, como consecuencia de los cambios vítales.

histología, *s. f.* (ἱστός; λόγος, discurso). Sin. *anatomía microscópica*. Parte de la anatomía que estudia los tejidos de que están formados los seres vivos.

histopoyesis, *s. f.* (ἱστός; ποιεῖν, hacer) (Chauveau). Sin. : *nutrición formativa* (Virchow), *síntesis morfológica* (Claudio Bernard). El conjunto de los fenómenos de química biológica que modifican la estructura de cada célula en el curso de su desarrollo, y le permiten diferenciarse en vista de una aptitud especial.

histo-química, *s. f.* Estudio de las reacciones químicas de los tejidos y de sus elementos, por medio del microscopio.

histotripsia, *s. f.* (ἱστός; τρίψις, trituración). Véase : *aplastamiento lineal*.

histricismo, *s. m.* (ὑστριξ, puerco espín, de ὗς, puerco; θρὶξ, τριχός, pelo). Sin. : *ictiosis histrix*. Variedad de ictiosis en que las papilas del dermo están hipertrofiadas y las escamas son formadas por excrecencias salientes.

hocico de tenca. Nombre dado, por su forma, á la porción intravaginal del cuello del útero.

Hodgkin (enfermedad de). Véase : *linfadenia aleucémica*.

Hodgson (enfermedad de). Nombre dado á veces á la insuficiencia aórtica de origen arterial.

Hoffmann (signo de). Fenómeno que se provoca en la tetania y que

depende de la hiperexcitabilidad de los nervios. Basta percutir los nervios correspondientes á territorios cutáneos atacados de parestesia para despertar los espasmos.

Holländer (método de). Aplicaciòn de corrientes de aire caliente al tratamiento de las dermatosis.

holoblástico (huevo) (ὅλος, solo, entero; βλαστός, germen). Huevo cuya segmentación es total, esto es, que se divide por entero. Esta puede ser total é igual (*huevo alecítico*), ó total y desigual (*huevo telolecítico*).

Holth (método de). Véase: *quinescopia*.

homeomorfo, *adj.* (ὅμοιος, semejante; μορφή, forma). Véase: *homólogo*.

homeopatía, *s. f.* (ὅμοιος; πάθος, padecimiento) (Hahnemann). « Método terapéutico que consiste en tratar las enfermedades por medio de agentes que se suponen dotados de la propiedad de producir en el hombre sano síntomas semejantes á los que se quiere combatir » (Littré).

homeoplasia, *s. f.* (ὅμοιος; πλάσις formación) (Cohnstein). Nombre dado por los antiguos anatomo-patólogos á la formación de tejidos patológicos idénticos á los tejidos naturales.

homeoterapia, *s. f.* (ὅμοιος; θεραπεία, tratamiento). Método de tratamiento por los semejantes. Véase: *homeopatía*.

homeotérmico, *adj.* (ὅμοιος; θερμή, calor). Se dice de los animales de sangre fría, porque su temperatura es semejante á la del medio ambiente.

homocrónica (herencia), (ὁμός, el mismo; χρόνος, tiempo). Herencia caracterizada por la aparición en los hijos, de caracteres transmitidos, precisamente á la edad en que se manifestaron en los padres. (Ley formulada por Darwin.)

homogenesia, *s. f.* (ὁμός, semejante; γένεσις, producción) (antropología). Término con que designa Broca los diversos grados de afinidad sexual entre individuos de especies diferentes.

homólogo, *adj.* (ὁμός; λόγος, relación). Sin.: *homeomorfo*. Semejante.

homónimo, *adj.* (ὁμός, el mismo; ὄνομα, nombre). Dícese de una lesión ó de un desorden funcional que hiere dos órganos ó dos partes de órgano colocados del mismo lado, esto es, todos á la derecha ó á la izquierda del plano mediano.

homosexual, *s. m.*

(ὁμός: *sexus*). Véase : *uranista*.

hordeiformes (gránulos) (*hordeum*, cebada; *forma*). Cuerpos extraños articulares no organizados que se encuentran en ciertas sinovitis tuberculosas.

hormigueo, *s. m.* Véase : *formicación*.

horripilación, *s. f.* (*horrere*, erizarse; *pilus*, pelo). Nombre dado á la erección de los pelos (piel anserina) que se observa en el calofrío. — Tómase frecuentemente como sinónimo de escalofrío.

horse-pox, (inglés, *horse*, caballo; *pox*, viruela). Vacuna del caballo. Véase : *vacuna*.

humórico (timbre). Ruido hidro-aérico.

humorismo, *s. m.* Doctrina médica en la que se atribuyen los desórdenes morbosos á las alteraciones de los humores del organismo.

Húnter (ley de). Ley según la cual « no pueden existir á la vez en el mismo organismo dos fiebres diferentes ». Esta ley no se admite hoy : conócense numerosos ejemplos de asociación de fiebres (eruptivas ó no).

Húnter (método de). Véase : *Anel-Húnter (método de)*.

hunteriano (chancro) (de Húnter, quien primero hizo una buena descripción de él). Véase : *chancro indurado*.

Húntington (corea de). Véa e . *corea crónica*.

huso de segmentación. Véase : *acromático (huso)*.

Hútchinson (diente de). Deformación de los incisivos medianos superiores de la segunda dentición; es característica de la sífilis hereditaria tardía, y consiste en la escotadura semilunar del borde libre de dichos dientes, el angostamiento de su parte superior, y la desviación de sus ejes, que convergen inferiormente.

Hútchinson (facies de). Aspecto de la cara en los enfermos atacados de oftalmoplejia. Se halla caracterizado por la inmovilidad de los globos oculares, y la caída de los párpados, que el enfermo trata de elevar contrayendo el frontal.

Hútchinson (síndroma de) Véase : *ocular simpático (síndroma)*.

Hútchinson (triada de). Síndroma característico de la sífilis hereditaria, que consta de la coincidencia de deformaciones dentarias, de lesiones oculares y de lesiones auriculares.

I

icor, *s. m.* (ἰχώρ). Pus de mala naturaleza, sanguinolento y fétido. Ej. : *derrame icoroso.*

ictericia, *s. f.* (ἴκτερος). Síntoma que consiste en la coloración amarilla más ó menos intensa de la piel y de las mucosas, debida á la impregnación de los tejidos por los pigmentos biliares normales ó modificados.

ictericia azul. Véase : *cianosis.*

ictericia grave. Sin. : *ictericia maligna, ictericia tifoidea, fiebre amarilla nostras, atrofia amarilla aguda del hígado.* Afección de origen infectivo ó tóxico, caracterizada por ictericia y un estado general grave, con predominio de síntomas nerviosos y gran tendencia á las hemorragias. Su causa es la abolición de las funciones de la célula hepática.

ictericia infectiva. Nombre dado á una serie de afecciones caracterizadas principalmente por ictericia y síntomas generales.

ictericia infectiva crónica esplenomegálica (Hayem, 1898). « Enfermedad particular esencialmente caracterizada por : ictericia crónica de duración indefinida con accesos paroxísticos pasageros; hipertrofia lisa y moderada del hígado, tumefacción más notable del bazo con esclerosis progresiva, desórdenes digestivos y anemia bastante intensa, que puede en ciertos momentos alcanzar un grado muy marcado. »

ictericia violeta (Paracelso). Véase : *cianosis.*

icterode (tifus). Véase : *fiebre amarilla.*

icteroide (bacilo). Bacteria en forma de bastoncillo que, según Sanarelli, sería el agente específico de la fiebre amarilla.

ictus, *s. m.* (*ictus*, golpe, choque). Nombre dado en neuropatología á toda manifestación mórbida que se produce súbitamente. Ej. : *ictus apoplético.*

ictus laringeo. Véase : *vértigo laringeo.*

ictiosis, *s. f.* (ἰχθύς, pescado). Estado particular de la piel, que consiste en gran sequedad de los tegumentos con descamación continua : de donde, la formación de escamas frecuen-

temente imbricadas, que dan á la piel cierta semejanza con la de los peces y reptiles (*sauriasis*). Es una deformidad congénita de la piel; mas, ordinariamente no aparece sino varios meses después del nacimiento.

...ide. Afijo que generalmente significa el conjunto de las manifestaciones cutáneas de una enfermedad general. Ej. : *artritide, sifilide.*

idiopatía, *s. f.* **idiopática (enfermedad)** (ἴδιος, propio; πάθος, enfermedad). Afección que existe por sí misma, que es independiente de todo estado morboso distinto (por contraposición á *afección sintomática*).

idiosincracia, *s. f.* (ἴδιος, propia σύγκρασις, constitución). Disposición particular en virtud de la cual cada individuo siente de una manera que le es propia las influencias de los diversos agentes que impresionan sus órganos.

idiotez, *s. m.* (ἴδιος, solo, aislado). Disminución considerable ó ausencia completa de la inteligencia y de las facultades afectivas, sensitivas y motoras, acompañada ó no de perversión de los instintos. La *idiotez* coincide casi siempre con la detención de desarrollo del encéfalo, que puede efectuarse ya en la vida intrauterina, ya después del nacimiento, y tener como causa la herencia ó una enfermedad cualquiera.

idiotez mixedematosa (Bournevil e). Véase *mixedema congénito.*

idiotismo. Véase *idiotez.*

.....ido ó **....oide** (εἶδος, forma). Afijo que significa *en forma de* ó indica semejanza. Va pospuesto á radicales latinos, como también á los griegos. Ej. : *cancroide, osteoide.*

ignipuntura, *s f.* (*ignis*, fuego; *punctura*, picadura) (Richet). « Método de cauterización que consiste en introducir varias veces, y en puntos diferentes, en los tejidos mórbidos que se desea modificar, un pequeño cauterio terminado por una aguja larga y fina llevada al blanco. »

ileadelfo, *s. m.* (*ilion*, por corrupción *ileon*; ἀδε)φός, hermano) (I. G. Saint Hilaire). Monstruo doble que no presenta sino una cabeza y un tronco bifurcado en la región pelviana, de la que penden cuatro miembros inferiores.

ileítis, *s. f.* Inflamación de la última parte del intestino delgado.

íleo-colostomía, *s. f.* Entero-anastomosis entre los intestinos delgado y grueso.

íleo-ileostomía, *s. f.* Entero-anastomosis entre dos asas del intestino delgado.

íleo-rectostomía, *s. f.* Entero-anastomosis entre el intestino delgado y el recto. Operación preconizada contra el cáncer inextirpable del intestino grueso.

íleo-sigmoidostomía, *s. f* Entero-anastomosis entre el intestino delgado y el asa sigmoide del intestino grueso. Operación preconizada en las colitis graves y en el cáncer inoperable del intestino grueso.

íleus, *s. m.* (εἰλεῖν, dar vuelta, porque en esta afección las asas intestinales están arrolladas unas al rededor de otras). Véase : *vólvulus*.

ilusión, *s. f.* (*in*, en; *ludere*, jugar). Falsa interpretación de una sensación realmente percibida.

imbecilidad, *s. f.* Primer grado de la idiotez. El imbécil asocia algunas ideas y á menudo puede tener alucinaciones.

impaludismo, *s. m.* Véase : *paludismo*.

imperforación, *s. f.* (*in* neg; *perforare*). Deformación congénita que consiste en la oclusión completa de un canal ó de un orificio naturales. Ej. : *imperforación del ano, del esófago*, etc. — Por extensión, á veces se da este nombre á las obliteraciones accidentales ú operatorias.

impétigo, *s. m.* (*impetere*, atacar). Dermatosis caracterizada por la formación de vesico-pústulas, que dejan escapar cierto líquido que se concreta en costras amarillentas, melitosas, características. Es auto-inoculable y debida á la inoculación de microbios piógenos, especialmente del estafilococo, en terreno linfático.

impétigo herpetiforme. Afección rara de la piel, que se presenta en las mujeres preñadas, caracterizada por una erupción de pústulas miliares dispuestas en grupos y cubiertas de costras negruzcas, por fiebre continua, remitente, y por un estado general grave que termina ordinariamente por la muerte.

impétigo sicosiforme del labio superior. Sin. : *sicosis artrítico* (Bazin), *exema recidivante del labio superior*. Variedad de foliculitis que ataca los folículos pilosos del labio superior, general-

mente bajo la dependencia de un coriza crónico; la fluxión nasal, irritante, provoca y mantiene la lesión.

impotencia, *s. f.* (*in*, neg.; *posse*, poder). Imposibilidad para el hombre, por falta de erección, de practicar el coito.

impregnación, *s. f.* (*in*, en; *prægnens*, que está fecundado). 1° Fecundación del óvulo por el espermatozoide. — 2° Sin. : *herencia de influencia, telegonía*. Influencia ejercida por una fecundación anterior sobre los productos de las fecundaciones ulteriores derivados de otros genitores.

impulsión, *s. f.* (*in*. sobre; *pellere*, arrojar). Turbación de la voluntad observada en los degenerados. Dichos enfermos, bien que conscientes de sus actos, son arrastrados por modo irresistible á efectuar actos que se imponen sobre su voluntad. La impulsión va acompañada de una sensación particular de angustia que desaparece desde que aquella es satisfecha.

impulsivo, *adj.* y *s. m.* Degenerado en quién la voluntad se halla profundamente atacada y que es incapaz de resistir á sus impulsos.

inapetencia, *s. f.* Véase : *anorexia*.

incarceración herniaria. Véase : *encarcelación herniaria*.

incitación, *s. f.* (*in*, en; *citare*, empujar). Término empleado en fisiología como sinónimo de *excitación*.

inclusión, *s. f.* (*includere*, de *in*; *claudere*, cerrar). Operación que consiste en introducir una pieza anatómica en un medio homogéneo, con el cual forma cuerpo, y que le da el grado de dureza necesaria para que puedan practicarse cortes histológicos finísimos.

inclusión fetal. Encajamiento de un óvulo fetal dentro de otro óvulo fecundado al mismo tiempo; mientras que el segundo se desarrolla normalmente, el primero forma un tumor más ó menos voluminoso en el cual se encuentran los vestigios de un feto.

incontinencia, *s. f.* (*in* neg.; *continere*, retener). Emisión involuntaria de materias fecales ó de orina.

incoordinación, *s. f.* Véase : *ataxia*.

incubación, *s. f.* (*in*, en; *cubare*, acostar). Tiempo que transcurre de la época del contagio á la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

incubadora, *s. f.* Aparato que sirve para mantener

bajo temperatura constante á los niños nacidos antes de tiempo ó en estado de debilidad congénita.

indicanuria, *s. f.* Presencia de indicán en la orina. El indicán urinario proviene del indol, cuerpo formado en el intestino á expensas de los albuminoideos, y no aparece en la orina sino en los casos de insuficiencia hepática ó de fermentaciones intestinales intensas. Se descubre su presencia por la adición á la orina de igual cantidad de ácido clorídrico y agitándola con éter ó cloroformo, que disuelven el indicán y toman su coloración azul ó lila.

índice endémico del paludismo. Relación que existe entre el guarismo de los habitantes de una región y el número de estos mismos que presenten ya hematozoarios y esplenomegalia, ya uno ú otro.

infantilismo, *s. m.* (Lorain). Sin. : *feminismo.* Forma particular de la detención del desarrollo, observada sobre todo en la población de las grandes ciudades, que se manifiesta en la época de la pubertad. Está caracterizada por el aspecto ruín, la ausencia de barba, anchura de la pelvis, desarrollo relativo de las mamas, pequeñez del pene y de los testículos. Sin ser del todo impotentes, los infantiles tienen poca aptitud para el coito, y á veces toman los instintos sexuales de la mujer, de quien los aproxima su conformación física.

infarto, *s. m.* (participio pasado de *infarcire*, rellenar, porque en el infarto los tejidos parecen infiltrados é hinchados). El territorio vascular en que ha cesado la circulación, cuando la región así atacada de muerte no es campo de fenómenos sépticos.

infección, *s. f.* ó **infectiva (enfermedad),** « Enfermedad que se desarrolla bajo la influencia de las toxinas producidas por ciertos agentes parasitarios. » (G. H. Roger.)

infestación, *s. f.* Palabra empleada en parasitología para designar la penetración de un parásito no microbiano en el organismo.

infibulación, *s. f.* Operación practicada en ciertas tribus salvajes con el propósito de hacer imposible el coito. Consiste en pasar un anillo, al hombre, al través del prepucio, y, á la mujer, al través de los pequeños labios.

infiltración, *s. f.* Invasión de los tejidos, y en

particular del tejido celular, por un líquido orgánico (serosidad de edema, sangre, orina, pus, etc.)

inflamación, *s. f.* (*inflamare*, quemar). Sin. : *flegmasia*, *flogosis*. « Conjunto de los fenómenos de reacción que se producen en el punto irritado por un agente patógeno » (G. H. Roger). Se traduce ordinariamente por cuatro síntomas cardinales : calor, dolor, rubor y tumefacción.

influenza, *s. f.* (vocable italiano equivalente al *grippe* francés. Creemos que en español debemos preferir *influenza*, que es más conforme con el idioma). Véase : *grippe*.

inframastitis, *s. f.* (*infra*, debajo; μαστὸς, mamila). Nombre dado por algunos autores al flegmón retromamario (sub-adenoideo), esto es, desarrollado en el tejido celular que separa la mama de la pared torácica.

ingerto, *s m.* Operación que consiste en trasportar sobre un individuo una parte de tejido tomada ya de él mismo, ya de otro, y destinada á reparar una pérdida de sustancia. Ej. : *ingerto cutáneo*, *ing. óseo*, *ing. nervioso*, etc

ingesta, *s. n. pl.* (cosas ingeridas). Nombre colectivo de todos los alimentos sólidos ó líquidos.

inhalación, *s. f.* Absorción, por las vías respiratorias, de gases, vapores ó líquidos vaporizados.

inhibición, *s. f.* Detención de las funciones de un órgano á consecuencia de la irritación de un punto del organismo más ó menos lejano; la irritación es trasmitida al órgano que cesa de funcionar, por el sistema nervioso.

inencéfalo, *s. m.* (ἴνιον, occipucio; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo exencefaliano caracterizado por la abertura del cráneo en la región occipital, abertura complicada de una fisura espinal. También presenta á menudo anomalías viscerales.

iniodimo, *s. m.* (ἴνιον, occipucio; δίδυμος, gemelos) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble compuesto de un cuerpo provisto de dos cabezas soldadas por la parte posterior.

inion, *s. m.* (ἴνιον) (antropología). Protuberancia occipital externa.

iniope, *s. m.* (ἴνιον; ὤψ, ojo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble que consta de dos cuerpos distintos por

debajo del ombligo y soldados por encima. La cabeza presenta una cara completa y otra incompleta.

inmunidad, *s. f.* (*in* neg.; *munus*, servicio). La resistencia del organismo á la acción de las sustancias tóxicas ó medicamentosas, al contagio de las enfermedades infectivas y al desarrollo de ciertos agentes patógenos. — La *inmunidad* puede ser innata; más frecuentemente es adquirida y trátase de conferirla por diversos procedimientos de vaccinación. Véase: *vacuna*.

inmunógeno (poder). Propiedad de las toxalbúminas las toxinas y las ponzoñas, de producir antitoxinas.

innato, *adj.* Sin.: *ingénito*. Se dice de lo que no es heredado

inoculación, *s. f.* Introducción en el organismo, por una brecha de los tegumentos, de una sustancia que contiene gérmenes patógenos (microbios ó virus).

inodular (tejido). (ἰνώδης, fibroso) Nombre dado por Delpech al tejido fibroso cicatricial.

inopexia, *s. f.* (ἴς, ἰνός, fibra; πήξις, coagulación). Exageración de la coagulabilidad de la sangre.

inoscopia, *s. f.* (ἴς, ἰνός: σκοπεῖν, examinar, (Jousset, 1903). Método bacterioscópico que sirve para descubrir los microbios contenidos en los líquidos orgánicos normales ó patológicos (serosidad de ascitis, de pleuresía, sangre, líquido céfalo-raquídeo, orina, etc.). Consiste en provocar la formación de un coágulo que precipita arrastando los microbios; la disolución de dicho coágulo por jugo gástrico artificial fluorado pone en libertad los microbios, que luego es fácil colorar.

inosculación, *s. f.* (*in*, en; *osculari*, besar). Comunicación directa de dos vasos del mismo calibre, sin interposición de vasos menos voluminosos. Ej.: *anastomosis por inosculación*.

insolación, *s. f.* Nombre dado al conjunto de accidentes, á menudo mortales, causados por la irradiación solar (clima cálido y húmedo). Manifiéstase por cefalalgia intensa, tendencia al sueño, supresión de las secreciones, vómitos, alucinaciones, delirio y pérdida del conocimiento. Su evolución varía de algunos minutos á uno ó dos días.

instilación, *s. f.* (*in*, en; *stilla*, gota). Acción de verter un líquido gota á gota.

insuficiencia, *s. f.*

(*in*, neg.; *sufficiens*.) Estado de inferioridad fisiológica en que cae un órgano ó una glándula, incapaces de llenar sus funciones íntegramente.

insuficiencia valvular. Defecto en la aplicación de las válvulas de un orificio cardiaco, que da por resultado el reflujo de una parte de la sangre á la cavidad que acaba de abandonar (*insuficiencias mitral, aórtica, tricúspide* y *pulmonar*).

intensión (reunión por primera. La reunión de las heridas puede obtenerse directamente por adhesión de las partes divididas (*reunión inmediata* ó *por primera intensión*). Este género de cicatrización es imposible si hay supuración; en este caso cierta cantidad de tejido neoformado viene á interponerse entre los labios de la herida: la *reunión* es *mediata* ó *por segunda intensión*.

intercurrente, *adj.* (*inter*, entre; *currere*, correr). Se dice de la complicación ó enfermedad que se presenta en el curso de otra enfermedad.

intermisión, *s. f.* Véase: *intermitencia*.

intermitencia, *s. f.* (*inter*, entre; *mittere*, poner Sin.: *intermisión*. 1° Intervalo que separa los accesos de una fiebre ó de cualquiera enfermedad. Ej.: paludismo, locura periódica. — 2° *intermitencia del pulso y del corazón*. Pausa que se presenta de tiempo en tiempo, á veces periódicamente, y rompe la serie regular de las pulsaciones cardiacas. Fuera de dichas pausas el corazón late normalmente, mientras que en la arritmia las pulsaciones, son irregulares y desiguales. — En la *falsa intermitencia* la sístole cardiaca no falta, sino es insuficiente y no se percibe en la radial.

intermitente biliar ó **bilio-séptica** (**fiebre**). Variedad de *fiebre intermitente*, de accesos separados por intervalos irregulares y debida á la infección de las vías biliares.

intermitente (fiebre). Fiebre que vuelve por accesos separados por intervalos más ó menos regulares Este síntoma se observa sobre todo en el paludismo, y el término *fiebre intermitente* se toma á menudo como sinónimo de paludismo.

intermitente (locura). Véase: *periódica (locura)*.

intersticial *adj* Dícese de as esiones inflamatorias que interesan princi-

palmente el tejido conjuntivo y los vasos de un órgano, respetando los elementos noples. Ej. *nefritis intersticial*, *encefalitis intersticial* (parálisis general).

intersístole, *s. f.* Intervalo que transcurre entre la sístole de las aurículas y la sístole de los ventrículos. Según ciertos autores, llena la una parte notable de la pause presistólica.

intertrigo, *s. m.* (*inter*, entre; *terere*, frotar). Sin.: *eritema intertrigo*. Inflamación de la piel que se desarrolla en los pliegues, en las personas gordas que transpiran mucho y no tienen suficiente aseo de la piel.

intestino-glandular (vejilla). Véase: *endoderma*.

intoxicación, *s. f.* (*in*, en; *toxicum*, veneno), s. : *enfermedad tóxica*. Enfermedad provocada por la acción de los venenos sobre el organismo.

intususcepción, *s. f.* (*intus*, dentro; *suscipere*, tomar). Véase: *invaginación*.

invaginación, *s f.* (*in*, en; *vagina*, vaina). — 1° Pause: *embolia*. — 2° Modo de desalojamiento del canal intestinal que consiste en la introducción de una parte del intestino en la parte que le sigue, de tal manera que la primera se halla envainada dentro de la segunda, á la manera de un dedo de guante. » (Cruveilhier).

invasión *s. f.* Período que se extiende desde la aparición de los primeros síntomas de una enfermedad hasta el período de estado.

inversión. *s. f.* (*in*, en; *versus*, vuelto). 1° Anomalía que consiste en que uno ó varios órganos se encuentran situados del lado opuesto al que ocupan normalmente en el cuerpo. Ej.: *inversión del corazón* (corazón á la derecha), *inversión del hígado* (hígado á la izquierda), etc. — 2° *inversión del útero*. Invaginación del útero: el fondo del útero desciendo más ó menos hacia la cavidad uterina ó vaginal. — 3° *inversión de los puntos lacrimales*. Desviación hacia atrás, de los puntos lacrimales.

inversión térmica. Modificación de la temperatura en la que el máximum térmico, en vez de efectuarse en la tarde ó en la noche, se efectúa en la mañana. Puede observarse en el curso de ciertas fiebres, particularmente en la fiebre tuberculosa y también (Gilbert y Lereboullet en las infecciones biliares é intestinales.

involución senil (*in*,

en; *volvere*, rodar). Conjunto de las modificaciones sufridas por el organismo bajo la influencia de la vejez.

ión, *s. m.* Véase : *yón*.

iofobia, *s. f.* (ἰός, veneno, ponzoña; φόβος, miedo). Temor angustioso á los venenos.

iridectomía, *s. f.* (ἶρις, iris; ἐκτομή, ablación) (de Grœfe). Resección parcial del iris, practicada para abrir paso á los rayos luminosos (*iridectomia óptica*) ó para combatir la inflamac ón (*iridectomia antiflogística*).

iridocele, *amb.* (ἶρις; κήλη, hernia). Hernia del iris á través de una herida de la córnea.

irido-ciclitis, *s. f.* Véase : *ciclitis*.

iridocoroiditis, *s. f.* Inflamación del iris y de la coroide.

iridodiálisis, *s. f.* (ἶρις; διάλυσις, separación). Nombre dado á la disección de un colgajo del iris y al arrancamiento de su inserción ciliar, con el objeto de practicar una pupila artificial.

iridodonesis, *s. f.* Sin. : *iris trémulo*. Temblor particular del iris que se produce al menor movimiento del ojo y que se ha comparado « á la ondulación de la vela que hace flotar el viento en tiempo de calma » (Fano). La causa es generalmente la ausencia del cristalino, que sirve de punto de apoyo al iris.

iridoplejia, *s. f* (ἶρις; πλήσσειν, herir). Parálisis del iris.

iridopsia, *s. f.* (ἶρις, arco-iris; ὄψις, vista). Turbación ocular que consiste en la visión de arco-iris.

iridorrexis, *s. f.* (ἶρις; ῥήξις, arrancamiento). Arrancamiento de un colgajo del iris sacado afuera por desgarramiento.

iridotomía ó **iritomía**, *s. f.* (ἶρις; τομή, sección). Simple incisión del iris con el objeto de crear una pupila artificial.

iris (herpes). Véase : *herpes iris*.

iritis, *s. f.* Inflamación del iris.

iscuria, *s. f.* (ἴσχειν, detener; οὖρον, orina). Retención de orina.

isocoria, *s. f.* (ἴσος, igual; κόρη, pupila) Igualdad del diámetro de las pupilas (estado normal).

isopatía, *s. f* (ἴσος, semejante; πάθος, enfermedad). Doctrina que enseña que el organismo, bajo la influencia de la enfermedad, elabora sustancias destinadas á combatir ésta. Dicha doctrina, procedente de Hipócrates, quien escribió « lo que engendra la enfermedad

también la cura », ha sido desenterrada por la escuela pastoriana con el nombre de inmunización activa, y ha fundado el empleo terapéutico de los sueros de animales vacunados seroterapia).

isoterapia, *s. f.* (ἴσος, igual; θεραπεία, terapéutica). « Método terapéutico que, contando con las *igualdades* de potencia, de acción, de fuerza, pone en juego los medios de inducir á las divinidades, los elementos, los hombres, los animales, los vegetales, esto es, las causas todas que han producido la enfermedad, á que así mismo efectúen la curación.» (Landouzy.)

isotermia cutánea. La igualdad de temperatura entre todos los puntos del revestimiento cutáneo; síntoma que se observa frecuentemente en el bocio exoftálmico.

isotonía, *s. f.* (ἴσος, igual; τόνος tensión). Sin.: *equimolecularidad*, *isotonismo*. Equilibrio molecular entre dos líquidos separados por una membrana orgánica. Dicho equilibrio se establece por medio de corrientes osmóticas á través de la membrana.

isquemia, *s. f.* (ἴσχειν, detener; αἷμα, sangre). Anemia local.

isquiadelfo, *s. m* (ἰσχίον, isquion; ἀδελφός, hermano), **isquiópago,** *s. m.* (ἰσχίον; παγεῖς, unido). (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble con un ombligo común; los dos sugetos están soldados por la región pelviana y tienen la cara vuelta hacia el mismo lado.

isquio-pubiotomía, *s. f.* Sin.: *hebotomía*, *pelvitomía*, *pubiotomía*, *operación de Farabeuf*. Operación destinada á producir el agrandamiento momentáneo de la pelvis para permitir el paso de la cabeza, en los casos de pelvis oblicua ovalar.

...itis. Afijo que designa las afecciones inflamatorias. Ej.: *bronquitis*.

J

Jaboulay (método de). Empleo de las sales de quinina, en inyección hipodérmica o por la boca, en el tratamiento del cáncer. Dicho método reposa sobre la hipótesis de que el cáncer es una afección parasitaria, y sobre el hecho de que la quinina mata los protozoa-

rios, agentes supuestos del cáncer.

Jaccoud (signo de). Movimiento de reptación sistólica, ó de balanceo, señalado por Jaccoud en la sínfisis cardiaca.

Jackson (síndroma de). Asociación de las parálisis unilaterales del velo del paladar, de la lengua, de la laringe y de los músculos trapecio y esternomastoideo.

jacksoniana (epilepsía). Sin. : *epilepsia bravais-jacksoniana*. Epilepsía localizada en una mitad del cuerpo, ó en un miembro, ó en un grupo muscular, y provocada por la irritación de la zona rolándica.

Jacquemet (reacción de) (1898). Reacción de la albumosuria. El éter, agitado en una probeta con orina albumosúrica privada de albúmina, de mucina y de fosfatos, pierde su movilidad y aspecto tan característicos, y se presenta con la apariencia de un coágulo gelatinoso que, en reposo, vase á la parte superior del tubo.

Jacquemier (maniobra de) (obstetricia). Maniobra que sirve para desprender los hombros retenidos en la pelvis después del paso de la cabeza. Consiste en buscar el brazo posterior y bajarlo por debajo del promontorio. Se transforma de ese modo el diámetro bis-acromial en un diámetro axilo-acromial menos extenso que el precedente y más apto para salvar el canal óseo.

janicéfalo ó **janiforme**, *s. m.* Véase : *sicefaliano.*

Janíceps, *s. m.* (*Janus*; *caput*, cabeza). Monstruo doble cuyos dos cuerpos están soldados en la parte superior y cuya cabeza única presenta dos caras opuestas.

jantelasma, *s. m.* (ξανθός, amarillo; ἔλασμα. placa de metal). Afección cutánea caracterizada por la formación de pequeñas manchas ó de pequeñas nudosidades de color amarillo. Puede ser generalizada ó al contrario localizada; se la encuentra lo más á menudo sobre los párpados.

jantocromia, *s. f.* (ξανθός; χρῶμα, color) (Besnier). Coloración amarillo-verduzca ó amarillo ocre de la piel, debida, no á la ictericia, sino á la generalización del jantelasma. y corresponde á la exageración del pigmento normal de la capa profunda de las células malpiguianas.

Jantodermia, *s. f.* (ξανθός, amarillo; δέρμα, piel). 1° Véase : *jantocromia*. —2° Subictericia limitada á ciertos puntos del tegumento (palma de las manos, planta de los pies, surcos nasolabiales), que se ha señalado en la *colemia simple familial*.

Jantoma, *s. m.* (ξανθός, amarillo). Sin. *jantelasma tuberoso* (Hardy). Elevaciones amarillas de la piel semejantes á las que se encuentra en el jantelasma.

Jantomatosis, *s. f.* (Chambard). Proceso morboso que termina por la producción en el espesor del dermo de manchas ó de nudosidades de color amarillo más ó menos oscuro.

Jantopsia, *s. f.* (ξανθός, amarillo; ὄψις, vista). Tinte amarillo uniforme que parece colorar todos los objetos; síntoma poco frecuente de la ictericia.

Jaqueca, *s. f.* Sin. *hemicrania*. Sindroma caracterizado por accesos de cefalalgia intensa, lo más á menudo unilateral, en las regiones temporal y orbitaria, acompañada de malestar general, de náuseas y de vómitos.

Jaqueca oftálmica. Sindroma caracterizado por accesos de jaqueca acompañados de fenómenos visuales muy particulares (escotoma centelleante), que duran un espacio de tiempo variable, de unos segundos á una hora, y que preceden en general la cefalalgia.

Jaqueca oftalmopléjica (Charcot). Sin. : *parálisis óculo-motora recidivante ó periódica, enfermedad de Mœbius*. Sindroma caracterizado por accesos de jaqueca intensos, de varios días de duración, y que terminan bruscamente con la aparición de una parálisis total del motor ocular común. Estas crisis se repiten á intervalos más ó menos lejanos, y pueden terminar en la parálisis completa y persistente del nervio.

Jargonafasia, *s. f.* (mal calco de *jargonaphasie*. Véase : *jergafasia*.

Jendrassik (maniobra de). Maniobra que consiste en hacer que el paciente tire con fuerza, de sus manos, enganchadas entre sí por los extremos de los dedos. Su objeto es imponer al individuo cuyos reflejos rotulianos se examinan, un esfuerzo durante el cual los grupos musculares estudiados permanecen en estado de relajación completa.

Jeneriana (vacuna). Sin. *vacuna hu-*

mana. Vacunación de brazo á brazo.

jenerización, *s. f.* (von Behring, 1902). Nombre dado por Behring á la inmunización preservativa de la tuberculosis bovina por el virus debilitado.

jenofonía, *s. f.* (ξένος, extrangero; φωνή voz). Trastorno de la fonación que da á la voz cierto acento extrangero.

jergafasia, *s. f.* (*jerga*, jerigonza, y *afasia*; por analogía con el término francés *jargonaphasie*) Sin. *parafasia literal*. Variedad de afasia motora en que el enfermo crea sílabas y palabras que no tienen sentido alguno, y habla un lenguaje incomprensible.

jerodermia, *s. f.* (ξηρός duro, árido; δέρμα, piel). Véase : *ictiosis*.

jeroftalmía, *s. f.* **xerosa** ó **xeroma**, *s. m.* (ξηρός, duro; ὀφθαλμός, ojo) (Schmidt, 1803). Estado de sequedad con atrofia de la conjuntiva, que trae á menudo como resultado la opacidad de la córnea y la pérdida más ó menos completa de la visión.

jerosis, *s. f.* (ξηρός, duro) (Boy-Teissier). Modificación de la estructura de los órganos bajo la influencia de la vejez, caracterizada por la proliferación, general y regular, del tejido conjuntivo; difiere de la esclerosis, que es una proliferación conjuntiva irregular y localizada bajo forma de islotes, telas ó trabéculas.

jerostomía, *s. f.* (ξηρός, árido; στόμα, boca). Véase : *aptialismo*.

jetaje, *s. m.* (calco del francés *jetage*; podría derivarse del español ant. *jetar*, echar, arrojar). Flujo nasal en los animales (caballo) atacados de muermo. Por analogía, empléase también este vocablo para designar todo flujo nasal abundante en el hombre.

jiba, *s. f.* (*gibba*, corcoba). Sin. : *corcoba*. Curvatura anormal del raquis que se manifiesta por una protuberancia de la caja torácica.

jifodimo, *s. m.* (ξίφος, apendice xifoide; δίδυμος, gemelo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble sisomiano cuyos dos cuerpos se hallan fundidos en uno por su parte inferior hasta la base del tórax; las dos columnas vertebrales están separadas casi siempre en toda su longitud.

jifópago, *s. m.* (ξίφος, apendice xifoide; παγεῖς, unidos) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble mononfaliano cuyos dos cuerpos se

hallan unidos del ombligo al apéndice jifoide. Ej.: *los hermanos siameses.*

Joffroy (signo de). 1° Paresia del músculo frontal, el cual no se contrae cuando se hace dirigir la mirada hacia arriba (bocio exoftálmico). — 2° Supresión del espasmo de la cara, por compresión del nervio facial, en la corea eléctrica.

julepe, *s. m.* (árabe *jelab*). Poción emoliente y calmante en que no entran sino agua destilada y jarabes.

jumentosa (orina) (*jumentum*, bestia de carga). Orina turbia como la del caballo.

juvenilismo, *s. m.* Véase: *infantilismo.*

K

Kahler (enfermedad de). Sarcoma mielógeno difuso con albumosuria.

kakke, *s. m.* Véase: *beriberi.*

kala-azar (fiebre negra). Nombre dado en la India á la *piroplasmosis humana.*

Kaposi (enfermedad de). Véase: *xeroderma pigmentosum.*

kariokinesis, *s. f.* Véase: *cariocinesis.*

kariolisis, *s. f.* Véase: *cariolisis.*

kariomicrosoma, *s. m.* Véase: *cariomicrosoma.*

kariomitoma, *s. m.* Véase: *cariomitoma.*

kariosquisis, *s. f.* Véase: *cariosquisis.*

kefir, *s. m.* Licor gaseoso y acídulo obtenido sometiendo la leche á la fermentación del *dispora caucásica.* Según haya durado la fermentación 1, 2, ó 3 días, obtiénese una bebida ligeramente laxante (*kefir n° 1*), sin acción sobre las funciones intestinales (*kefir n° 2*), ó ligeramente constipante (*kefir n° 3*).

kefiroterapia, *s. f.* Empleo terapéutico del kefir.

Kernig (signo de) (1882). Síntoma que consiste en que, sentado el enfermo dentro de la cama, las rodillas permanecen siempre más ó menos dobladas sin que se logre ponerlas en extensión completa. Tal posicion es debida á la con-

tractura de los flexores; es síntoma constante en las meningitis espinales simples ó tuberculosas : permite hacer el diagnóstico de los casos de meningitis frustrada.

kinasa, *s. f.* Véase : *cinasa*.

Klebs (bacilo de). Sin. *bacilo de Lœffler, bacilo de la difteria, bacillus diphteriæ.* Agente específico de la difteria.

Klíppel (atrofia numérica de). (1893). Atrofia caracterizada por la disminución del número de los elementos anatómicos en los diferentes tejidos cuyo desarrollo se ha interrumpido. Del lado enfermo los músculos, troncos nerviosos, huesos, etc., son más pequeños; empero los elementos anatómicos que los componen tienen el mismo volumen y la misma estructura que los del lado sano : sólo ha disminuído el número de ellos.

Klíppel (enfermedad de). Sin. *seudo-parálisis general artrítica.* Complexo mórbido que se observa en individuos de edad avanzada; se distingue de la parálisis general por la aparición rápida de la demencia y desórdenes paralíticos consecutivos á pequeños ataques (ictus). Anatómicamente sólo se comprueba la existencia del ateroma de las arterias cerebrales.

Koch (bacilo de). Sin. : *bacilo de la tuberculosis, bacillus tuberculosis.* Agente específico do la tuberculosis.

Kócher (procedimiento de). Conjunto de maniobras empleadas para la reducción de la lujación del hombro.

Koplik (signo de). (1896). Síntoma descrito por Koplik en el período prodrómico del sarampión, que consiste en la aparición sobre la mucosa bucal, principalmente sobre la cara interna de las mejillas, de pequeñas eflorescencias blanco-azulinas, de 2 á 6 milímetros de diámetro, rodeadas de una areola inflamatoria. Este signo, que aparece desde el primero ó el segundo día de la enfermedad, permite hacer el diagnóstico antes de la erupción.

Kopp (asma de). Sin. *asma timica, frenoglotismo, laringospasmo, espasmo glótico esencial de los niños de pecho.* Neurosis que se presenta en los niños de pecho, caracterizada por crisis de sofocación dependientes de la contractura de las cuerdas

vocales y acompañadas á menudo de espasmo del diafragma. Parece causada por una auto-intoxicación de origen gastro-intestinal; algunos autores, la atribuyen á la epilepsía infantil.

Korsakoff (sicosis de). Desórdenes mentales asociados con las polineuritis.

koumis, Véase : *cumis.*

Kraske (operación de). Operación que consiste en resecar una parte del recto llegando á él por la vía sacra y respetando los esfínteres.

kraurosis. Véase : *craurosis de la vulva.*

Kreysig (signo de). Véase : *Heim y Kreysig (signo de).*

Krœnlein (método ú operación de). Procedimiento operatorio que consiste en penetrar en la órbita por la fosa temporal movilizando el hueso malar.

kubisagari, *s. m.* (japonés). Véase : *vértigoparalizante.*

Küppfer (células de). Grandes células estrelladas que se encuentran en el hígado y que pertenecen al revestimiento epitelial de los vasos sanguíneos.

Kussmaul y Kien (respiración de). Tipo respiratorio observado en el *coma diabético*; consiste en una inspiración profunda seguida de una breve pausa en inspiración forzada, y luego una expiración corta y gemebunda, á la que sigue una nueva pausa. Estos fenómenos continúan reproduciéndose en el mismo orden.

L

lab ó **lab-fermento,** *s. m.* (Hammarsten). Fermento existente en el jugo gástrico que tiene la propiedad de coagular la albúmina; es abundante sobre todo en el estómago de los animales jóvenes, particularmente en el cuajo; coagula casi instantáneamente la caseina de la leche.

labímetro, *s. m* (λαβίς, pinza, fórceps; μέτρον, medida). Instrumento que sirve para medir la separación de las ramas del fórceps, y por consiguiente la de las cucharas.

labioleporino. Nombre dado á todas las deformaciones congénitas de la cara que provienen de un defecto de soldadura de los mamelones faciales (línea de soldadura aparente ó persistencia de una hendidura). Lo más á menudo la deformidad se presenta bajo la forma de una fisura del labio superior; fisura uni ó bilateral, simple ó compleja (que interesa la bóveda palatina).

lacada (sangre) (*lacca*, gomc-resina encarnada). Estado de la sangre cuya hemoglobina ha abandonado los glóbulos rojos y se ha disuelto en el suero : es transparente como jarabe, y color de laca.

laceria, *s. f.* 1° Antes sinónimo de *lepra*.— 2° Sin.: *cisticercosis*. Alección causada por el desarrollo en diversos tejidos de la economía, del *cisticercus cellulosæ*, larva del *tænia solium*. Esta enfermedad, muy rara en el hombre, es común en el puerco. — Es por absorción de carne infestada por dicho cisticerco, insuficientemente cocida, que se adquiere la lombriz solitaria.

lactación, *s. f.* (*lac*, leche). 1° Lactancia. — 2° Secreción y excreción de la leche.

lacto-butirómetro, *s. m.* Instrumento que sirve para medir la cantidad de manteca contenida en la leche.

lacto-densímetro, *s. m.* Instrumento que permite apreciar el valor de la leche por la densidad.

lactoscopio, *s. m.* (*lac*, leche; σκοπεῖν, examinar). Instrumento que sirve para estimar el valor de la leche por la opacidad.

lactosuria, *s. f.* (lactosa; οὖρον, orina). Presencia de lactosa en la orina.

Laënnec (cirrosis de). Véase : *cirrosis atrófica*.

Laënnec (catarro sofocante de). Véase : *bronquitis capilar*.

lagoftalmía, *s. f.* (λαγώς, liebre; ὀφθαλμός, ojo). Brevedad anormal de los párpados, y particularmente del párpado superior, que los impide cubrir por completo el globo ocular.

lagunas, *s. f. pl.* Sin. : *lagunas ó focos lacunarios de desintegración cerebral* (P. Marie, 1901). Lesión de los centros nerviosos (cerebro, cerebelo) caracterizada por la producción de pequeñas cavidades irregulares cavadas en pleno tejido, que se encuentran frecuentemente en los ancianos. Estas *lagunas*

se traducen durante la vida por ataques de hemiplejia incompleta, cierto desorden en el andar llamado marcha á breves pasos, disartria, risa y llanto espasmódicos, y á veces demencia y decrepitud.

laitmatofobia, *s. f.* (λαῖτμα, abismo; φόβος, temor) (Bertelsen). Temor, acompañado de angustia y vértigo, de caer al mar, que experimentan á veces bajo forma de accesos los esquimales que van solos á pescar en un ligero esquife, llamado *kayak*, de donde el nombre de *kayaksvimmel*, ó vértigo del kayak, que igualmente le dan.

lalopatía, *s. f.* (λαλεῖν, hablar; πάθος, enfermedad). Nombre genérico de todos los defectos en el empleo de las palabras, habladas ó escritas, ya sea que resulten de alteración de pronunciación de las palabras, ó de algún desorden en su utilización como símbolo.

lambda, *s. m.* Punto de encuentro de las suturas sagital y lambdoide.

lambdacismo, *s. m.* Vicio de pronunciación que consiste ora en desdoblar inoportunamente el sonido de la letra *ll*, ora en pronunciar la *r* como *l*.

laminaria, *s. f.* Tallo de un alga (*laminaria digitata*) que, desecada y preparada, es notable por la propiedad de hincharse en la humedad, y de adquirir un volumen mucho más considerable que su volumen anterior. Se utiliza esta propiedad para dilatar los conductos estrechos (trayectos fistulosos, cavidad uterina). Generalmente consérva se en éter yodoformado para mantenerla aséptica.

laminectomía, *s. f.* (*lamina*; ἐκτομή, extirpación) (Kraske). Resección de una ó de varias láminas vertebrales, operación que se practica para disminuir la compresión de la médula y enderezar el raquis en el mal de Pott.

lamparones, *s. m. pl.* : 1° Adenopatía cervical tuberculosa crónica. Escrófulas. — 2° Enfermedad rara, especial de los bovideos, causada por un parásito del orden de las estreptotricosas, que se manifiesta bajo la forma de un tumor cutáneo, seguido de hinchazón ganglionar y de caquexia. Es completamente distinta al muermo.

Landouzy-Déjerine (tipo facio-escápulo-humeral de atrofia muscular de). Sin. : *atrofia muscular progresiva*

de la infancia (Duchenne de Boulogne). Variedad de atrofia muscular que empieza por los músculos de la cara, de los hombros y de los brazos. Es una de las ormas de la miopatía primitiva progresiva.

Landry (enfermedad de) (1859). Sin. : *parálisis ascendente aguda*. Afección caracterizada por una parálisis flácida que empieza por los miembros inferiores, invade rápidamente el tronco y los miembros superiores, y produce la muerte en algunos días. La localización anatómica ha sido fijada por unos en los nervios periféricos, por otros en la médula. La causa es una infección por microbios variables.

lanugo, *s. m* (en latín : vello, pelusilla). La fina vellosidad que cubre las regiones pilosas del cuerpo del feto.

laparocele, *amb.* (λαπάρα, los lomos; κήλη, hernia). Sin. : *hernia ventral*, *laterocele*. Hernia que se produce en cualquier punto de la pared abdominal que no sean los anillos inguinal ó crural.

laparo-elitrotomía, *s. f.* (λαπάρα; ελύτρον, vagina; τομή, sección). Sin. : *gastro-elitrotomía*. Variante de la operación cesárea, en que, después de abierto el abdomen, se despega el peritoneo sin abrirlo y se llega al cuello uterino por una incisión hecha á la pared vaginal.

laparo-esplenotomía, *s. f.* (λαπάρα; σπλήν, bazo; τομή, sección)(Czerny). Extirpación del bazo enfermo. No se emplea esta denominación cuando se trata de ablación del bazo herniado á través de una herida penetrante del abdomen; en este caso se dice esplenotomía simple.

laparo-histerotomía, *s. f.* (λαπάρα; ὑστέρα, útero; τομή, sección). Véase: *cesárea* (*operación*).

laparotomía, *s. f.* (λαπάρα, lomos; τομή, sección). Operación que consiste en abrir la pared abdominal y el peritoneo para evacuar un derrame ascítico, explorar uno de los órganos abdominales (*laparotomía exploradora*) ó practicar una operación sobre alguno de estos órganos.

lardáceo, *adj.* 1° Sin. : *seudo-membranoso*. — 2° Se dice de los tejidos cuyo aspecto macroscópico y cuya consistencia semejan á los del lardo; se encuentran generalmente al rededor de las lesiones tuberculosas.

larvada (fiebre)

(*larva*, máscara). Forma de paludismo en que el acceso febril es reemplazado por una manifestación de otro orden (urticaria, neuralgia) que cede como aquel por la acción de la quinina.

larvado (estado). Forma irregular de una enfermedad que se manifiesta con la apariencia de otra enfermedad.

laringectomía, *s. f.* (λάρυγξ, laringe; ἐκτομή, extirpación). Ablación total ó parcial (unilateral) de la laringe.

laringismo, *s. m.* La contracción espasmódica de los músculos de la laringe y del cuello, y la asfixia que ella produce.

laringitis, *s. f.* Nombre colectivo de las inflamaciones agudas ó crónicas de la laringe.

laringitis estridulosa. Sin. *asma de Millar, falso crup, laringitis subglótica aguda.* Variedad de laringitis especial á los niños, caracterizada por accesos de sofocación con quintas de tos ronca, estridente, que se presenta en la noche, y conservación de un estado general bueno.

laringocele, *amb.* (λάρυγξ, laringe : κήλη, hernia). Tumor gaseoso del cuello, formado por una colección de aire circunscrita, que comunica con la laringe.

laringo-espasmo, *s. m.* Véase: *Kopp (asma de).*

laringo-estenosis, *s. f.* (λάρυγξ; στενός, estrecho). Estrechez de la laringe.

laringofisura, *s. f.* (λάρυγξ; *fissura*). Sin. *laringotomía total.* Operación que consiste en hender en la línea media el cartílago tiroide solo, ó el cartílago junto con las dos membranas supra y sub-yacentes y el cartílago cricoide.

laringología, *s. f.* (λάρυγξ; λόγος, discurso). Estudio de la laringe y de las enfermedades que le son especiales.

laringopuntura, *s. f.* (λάρυγξ ; *punctura*) (Rossbach). Punción de la laringe con un cuchillo cuyos movimientos se dirige en el interior del conducto aéreo por medio del laringoscopio; operación que se emplea para atacar los tumores de la laringe.

laringoscopia, *s. f.* (λάρυγξ ; σκοπεῖν, examinar). Examen directo de la cavidad de la laringe por medio del laringoscopio.

laringoscopio, *s. m.* (García, 1865). Instrumento que consta de un espejito montado sobre un tallo largo,

que permite alumbrar y examinar la cavidad de la laringe.

laringo-tifoidea, *s. f.* ó **laringo-tifus,** *s. m.* Fiebre tifoidea complicada con ulceración de la laringe y necrosis de los cartílagos susceptible de producir el edema laringeo ó la perforación de la mucosa.

laringotomía, *s. f.* (λάρυγξ; τομή, sección). Incisión de la laringe sobre la línea media y en una extensión más ó menos larga. — *laringotomía total.* Véase: *laringofisura.* — *laringotomía parcial.* La practicada por encima del cartílago tiroide (*laringotomía supra-tiroidea*), ó por debajo del mismo cartílago (*laringotomía intercricotiroidea*).

Lasegue (enfermedad de). Véase: *persecución* (*delirio de*).

Lasegue (gangrena de). Sin. *gangrena curable del pulmón.* Variedad de gangrena bronquial que termina por la curación.

Lasegue (signo de). Síntoma frecuente de la neuralgia ciática: si se practica la flexión del muslo sobre la pelvis, estando la pierna en extensión sobre el muslo, el movimiento es, inmediatamente, impedido por el dolor vivísimo que siente el enfermo en la nalga, dolor causado por el estiramiento del nervio; si, por el contrario, se practica el mismo movimiento, con la pierna en flexión bajo el muslo, el dolor es débil ó nulo.

Lasegue (síndroma de). Síndroma observado en la histeria: sin el socorro de la vista, el paciente es incapaz de hacer el menor movimiento; mientras que sí ejecuta, sin ayuda de la vista, los movimientos sugeridos.

laterocele, *amb.* (*latus*, lado; κήλη, hernia). Véase: *laparocele.*

laterocidencia, *s. f.* (obstetricia). Descenso de una asa del cordón, que viene á colocarse entre la parte fetal que se presenta y la pared uterina ó vaginopelviana, sin bajar más adelante que la parte encajada.

laterofleXión del útero. Desviación del útero en la que el fondo del órgano se encuentra inclinado á la derecha ó á la izquierda; mientras el cuello conserva la situación normal.

lateroposición del útero. Cambio de lugar total del útero hacia la derecha ó hacia la izquierda.

lateropulsión, *s. f.* Dificultad que experimentan ciertos enfermos (*enfermedad*

de Párkinson) para recobrar el equilibrio cuando se los ha empujado á un lado.

lateroversión del útero. Desviación del útero en la que el fondo del órgano se halla inclinado á la derecha ó á la izquierda, mientras que el cuello, por un movimiento de báscula, se levanta del lado opuesto.

latirismo, *s. m.* (*lathyrus*, arveja). Intoxicación causada por la ingestión de alimentos que contienen harina de arvejas. Dicha intoxicación se revela por una paraplejia espasmódica muy acentuada.

Laugier (hernia de). Hernia á través del ligamento de Gimbernat

Laugier (signo de). Signo que indica la fractura de la extremidad inferior del radio. Consiste en la ascensión de la apófisis estiloide de dicho hueso : ésta se encuentra entonces al mismo nivel ó aún por encima de la apófisis estiloide del cúbito.

Laverán (hematozoario de). Véase : *hematozoario.*

Lawson Tait (operación de). Nombre dado á veces à la laparotomía por lesión inflamatoria de los anejos del útero, del nombre del cirujano inglés que primero intentó esa operación.

laxante, *adj.* y *s. m.* Purgante suave.

lazareto, *s. m.* (bajo latín *lazarus*, leproso). 1° Establecimiento instalado, ya en los puertos, ya en las estaciones fronterizas, donde se someie al examen sanitario á los viajeros y mercancías provenientes de países en que reinan enfermedades contagiosas epidémicas, y en donde aquellos pasan la cuarentena, si se les impusiere. — 2° Los sitios (casas, hospitales, aldeas) en donde se aíslan los leprosos.

lécito, *s. m.* (λέκιθος, yema de huevo). Vitelo nutritivo.

lecitina, *s. f.* (λέκιθος, yema de huevo). Grasa fosforada, neutra, que se encuentra en la bilis, en la sangre y sobre todo en la yema de huevo.

legra, *s. f.* Instrumento de cirugía formado por una placa de acero cuyos bordes están tallados en bisel y que sirve para raspar los huesos y desprender el periósteo.

lengua negra. (M. Raynaud). Véase : *glosofitia.*

lengua plicaturada simétrica congénita. (Fournier). Sin. :

lengua escrotal, ó *cerebral*, ó *fisural*. Distrofia casi siempre asociada con otras deformaciones de la cara y de la boca. Consiste en surcos longitudinales bastante profundos que dan á la lengua cierto aspecto especial.

leníceps, *s. m.* (*leniter capiens*, que toma suavemente) (Mattei). Variedad de fórceps, inventada por Mattei; no ha entrado en la práctica.

lenitivo, *adj.* (*lenire*, suavizar). Calmante.

lentigo, *s. m.* (*lens*, *lentis*, lente). Pequeñas manchas pigmentarias de la piel, que aparecen en las manos, en el cuello y sobre todo en la cara, persistentes, pero más visibles en verano que en invierno. Son más frecuentes en las personas rubias, y se presentan desde la segunda infancia.

leontiasis, *s. f.* (λέων, león). Hipertrofia de la cara que da aspecto leonino á la fisonomía. Dicha hipertrofia generalmente sólo ataca los tegumentos, y es debida á una localización de la lepra, à veces de la sifilis. Más rara vez la hipertrofia ataca los huesos de la cara y especialmente los maxilares (*leontiasis ósea*).

lepótrix, *s. f.* (λεπίς, escama; θρίξ, pelo) (Wilson). Sin. : *tricomicosis nudosa*. Afección del pelo, de naturaleza probablemente parasitaria, que se observa sobre todo en las axilas y partes genitales. Está caracterizada por la presencia á lo largo del pelo de pequeñas concreciones prominentes, principalmente en el tercio medio; coincide á menudo con sudores colorados, ordinariamente rojos.

lepra, *s. f.* (λέπρα, de λεπίς, escama). Sin. : *elefantiasis de los Griegos*. Enfermedad debida al desarrollo en el organismo de un bacilo especial, llamado bacilo de Hánsen. Está caracterizada, ora por la formación de nódulos más ó menos voluminosos que aparecen sobre la piel ò las mucosas (*lepra tuberculosa*); ora por una erupción maculosa (*lepra maculosa* ó *lisa*); ora por diversas perturbaciones nerviosas : anestesia, atrofia muscular, gangrena de los miembros, acompañadas ó no de erupciones cutáneas (*lepra anestésica*, *lepra sistematizada nerviosa*, *lepra mutilante*); ora por desórdenes nerviosos y ciertas vejigas, que, rompiéndose, dejan cicatrices deprimidas é irregulares (*lepra lazarina*).

lepralgia, *s. f.* (λέπρα;

ἄλγος, dolor). Dolores musculares observados en la lepra.

lepra cabila (Arnould). Nombre bajo el cual fué descrita por primera vez en Argel, donde es muy frecuente, la leucomelanodermia de Fournier. Entonces se creía que era una enfermedad especial, independiente de la sífilis. Véase: *leucomelanodermia*.

lépride, *s. f.* Manifestación cutánea de la lepra.

leproma, *s. m.* Los tumores numerosos que se desarrollan en el dermo, ó en el corion mucoso, en los individuos atacados de lepra tuberculosa.

leprosis, *s. f.* (dom Sauton). Nombre dado à la lepra considerada cõmo enfermedad específica.

leprosería, *s. f.* Véase: *lazareto* 2°.

leptomeningitis, *s. f.* (λεπτός, delgada; μήνιγξ. membrana). Inflamación de la pía madre. Meningitis en que la inflamación ataca sobre todo la pía madre.

leptorrinio, *s. m.* (λεπτός, fino; ρίν, nariz). (Broca). Nombre dado en antropología y etnografía á los individuos y razas cuyo índice nasal es corto (de 42 á 47). Este índice corresponde à la nariz relativamente larga y estrecha (raza caucásica).

leptótrix, *s. m.* (λεπτός, delgado; θρίξ, cabello). Bacteria cuyos elementos forman filamentos dispuestos en mechones más ó menos largos. Ej.: *leptothrix buccalis*.

lesión, *s. f.* (*lædere*, herir). Cambio, apreciable á nuestros medios de investigación, que se presenta en los caracteres anatómicos é histológicos de un órgano, bajo la influencia de una causa mórbida. La *lesión* es pues el efecto de la enfermedad; ella provoca cierto número de síntomas. El estudio de las lesiones constituye la anatomía patológica.

letalidad, *s. f.* (*lethalis*, mortal, de *lethum*, muerte). « Condición que hace que una lesión sea necesariamente mortal ». (Littré.)

letargia, *s. f.* (λήθη, olvido; ἀργία, pereza). « Sueño profundo y continuo, durante el cual el enfermo habla cuando se le despierta, más, no sabe lo que dice, olvida cuanto ha dicho y vuelve pronto á su primer estado. » (Littré.) Actualmente se considera la *letargia* como una forma de histeria monosintomática.

letargia de Africa.

Véase : *sueño (enfermedad del)*.

Letievant (motilidad suplida de). Véase : *motilidad suplida de Letievant*.

leucanemia, *s f.* (λευκός, blanco; anemia). (Leube, 1900). Estado patológico caracterizado por los signos hematológicos de la anemia aguda de marcha perniciosa y los de la leucemia.

leucemia, *s. f.* (λευκός, blanco; αἷμα, sangre) (Virchow, Leudet). Sin. *leucocitemia*. Afección cuya característica anatómica es el aumento considerable de los glóbulos blancos en la sangre, aumento que se halla ligado con la neoformación de tejido linfoide. La *leucemia* no existe pues como afección distinta, sino que va siempre unida á una variedad de *linfadenia*, de donde el nombre que se le ha dado á veces de *linfadenia leucémica*.

leucemia aguda (Ebstein). Sin. : *linfadenia leucémica aguda*. Forma de linfadenia de marcha rápida, acompañada de fiebre, hemorragia, anemia intensa, y que en algunas semanas termina por la muerte. Está anatómicamente caracteriza la por la proliferación rápida del tejido linfoide en todo el aparato hematopoyético, la diseminación de numerosos linfomas metastáticos y la presencia en la sangre de gran número de mononucleares más ó menos deformados. En ciertos casos la fórmula sanguínea se asemeja á la de la *leucemia mielógena* por la presencia de *mielocitos*.

leucemia linfática. Variedad de *leucemia* en que la casi totalidad de los glóbulos blancos está constituída por linfocitos. Esta forma, que tiene su característica hematológica, no se confunde con la *linfadenia leucémica* antes llamada también *leucemia linfática*.

leucemia mielógena. Variedad de *leucemia* en que se encuentran leucocitos pertenecientes á gran número de tipos distintos, de los cuales unos existen normalmente en la sangre y otros no se hallan ordinariamente sino en la médula ósea : polinucleares neutrófilos, eosinófilos y basófilos (*mastzellen*), mononucleares medianos y gruesos, mononucleares de granulaciones neutrófilas, eosinófilas y basófilas (*mielocitos*), y, finalmente, hemátidos nucleados (normoblastos y megaloblastos).

leucémide, *s. f.* Nombre con el cual designa Audry los exantemas pruriginosos que pueden presentarse en el curso de las diferentes variedades de leucemia.

leucoblástico, *adj.* (λευκός, blanco; βλαστός, célula). Lo que se refiere á la formación de los glóbulos blancos.

leucocitemia, *s. f.* (λευκός; κύτος; αἷμα). Véase: *leucemia*.

leucocitolisis, *s. f.* (λευκός;κύτος;λύειν,disolver). Desaparición ó destrucción de los glóbulos blancos en la sangre, en estado normal ó patológico.

leucocitometría, *s. f.* (leucocito: μέτρον, medida). Numeración de los glóbulos blancos.

leucocitosis, *s. f.* Aumento del número de glóbulos blancos en la sangre ó en una serosidad.

leucodermia, *s. f.* (λευκός, blanco; δέρμα, piel). Variedad de *acromia* caracterizada únicamente por la decoloración de la piel, y que se encuentra en diversas afecciones (esclerodermia, lepra, sífilis, etc.).

leucolisis, *s. f.* Véase: *leucocitolisis*.

leucomaína, *s. f.* (λεύκωμα, clara de huevo) (A. Gautier). Nombre dado á los alcaloides formados en el curso de los fenómenos físico-químicos que se efectúan en los órganos durante la vida.

leucoma, *s. m.* (λευκός, blanco). Mancha blanca consecutiva á la herida ó ulceración de la córnea.

leucomatosis, *s. f.* (Lancereaux). Véase: *amiloide* (*degeneración*).

leucomelanodermia, *s. f.* (λευκός, blanco; μέλας, negro; δέρμα, piel) (Fournier, 1893). Perturbación de la pigmentación cutánea, que consiste á la vez y simultáneamente en hipercromia é hipocromia. Estas lesiones de origen sifilítico no se producen sólo sobre las sifílides, sino se extienden á superficies cutáneas más considerables (regiones cervical, escapular, dorsal).

leucomielitis, *s. f.* (λευκός; μυελός, médula). Inflamación de los cordones blancos de la médula espinal.

leucomielitis posterior. Véase: *tabes dorsal*.

leucopatía, *s. f.* (λευκός; πάθος, enfermedad). Nombre dado á veces á las distintas variedades de acromia y en especial al *albinismo*.

leucopenia, *s. f.* (λευκός; πενία, pobreza). Disminución del número de los

glóbulos blancos (leucocitos) contenidos en la sangre.

leucopénica (linfadenia) (Gilbert). Forma de linfadenia en que el número de glóbulos blancos se halla disminuído.

leucoplasia bucal (λευκός; πλάσις, formación). « Afección inflamatoria crónica cuyo carácter clínico y anatómico más notable es la transformación córnea del epitelio bucal, y cuya causa no es específica. » (Merklen.)

leucorragia, *s. f.* (λευκός; ῥαγεῖν, hacer irrupción). Nombre dado á la hemorragia en los enfermos atacados de linfadenia leucémica, en quienes la sangre presenta aspecto puriforme.

leucorrea, *s. f.* (λευκός; ῥεῖν, fluir). Sin. : *flores* ó *fluores blancas*. Flujo mucoso ó muco-purulento, por la vulva, debido á la exageración patológica de las secreciones normales del aparato genital de la mujer.

leucoterapia, *s. f.* (λευκός; θεραπεία, tratamiento). Método de tratamiento que consiste en provocar la leucocitosis por medio de una sustancia química.

levadura, *s. f.* (*levare*, levantar). Organismo monocelular de la familia de los blastomicetos, que se reproduce por gemación.

levogiro, *adj.* (*leva*, á la izquierda; *gyro*, doy vueltas). *Sin.* : *senestrogiro*. Que hace girar hacia la izquierda. Ej. : 1° Fibras del óculo-motor común que determinan la rotación de los ojos hacia la izquierda. 2° Levulosa, azúcar que desvía el plano de polarización hacia la izquierda.

levulosuria, *s. f.* Presencia de levulosa en la orina.

levulosúrico (síndroma). Véase : *Marie y Robinson* (*síndroma de*).

Leyden-Mœbius (tipo). Variedad de atrofia muscular que empieza en tierna edad por los miembros inferiores é invade más tarde los superiores. Es una de las formas de la miopatía primitiva progresiva, vecina de la parálisis seudo-hipertrófica de Duchenne.

leyomioma, *s. m.* Véase : *liomioma*.

licantropía, *s. f.* (λύκος, lobo; ἄνθρωπος, hombre). Monomanía caracterizada por que los enfermos se creen transformados en lobos.

licorexia, *s. f.* (λύκος, lobo; ὄρεξις, deseo). Bulimia.

Lichteim (signo de). Posibilidad para un afásico

de indicar por medio de los dedos el número de sílabas de las palabras que no puede pronunciar. — Se ha considerado este signo como síntoma patognomónico de la afasia subcortical.

lienasa ó **lienasis**, *s. f.* (Hedin y Rowland, 1901). Fermento soluble que determina la destrucción en los espacios lacunares del bazo. de los glóbulos rojos viejos y alterados.

lienteria, *s. f.* (λεῖος, pulido, resbaloso; ἔντερον, intestino). Diarrea en que las deposiciones están compuestas de alimentos incompletamente digeridos.

lima (ruido de). Ruido de soplo rudo, grave ó agudo, que se produce en estado patológico en las cavidades del corazón, y que hasta cierto punto imita el ruido de una *lima* ó de una *sierra*. Se observa generalmente en las lesiones de los orificios.

linfadenia, *s. f.* (νύμφη, agua; ἀδήν. glándula). Sin.: *diátesis linfógena* (Jaccoud), *leucemia* (Virchow), *leucocitemia*. Enfermedad caracterizada por la proliferación del tejido linfoide. El tejido neoformado es ya típico ó análogo al tejido normal (llámase á veces entonces esta producción *linfoma* ó *linfadenoma*), ya metatípico ó modificado (empléase entonces la designación de *linfosarcoma*). — La *linfadenia* comprende dos formas principales: la *linf. simple* ó *aleucémica*, sin aumento notable del número de los glóbulos blancos; y la *linf. leucémica* caracterizada por el aumento considerable del número de los glóbulos blancos. Recientemente se ha descrito otra forma de *linfadenia* en que el número de leucocitos está disminuído, de donde el nombre de *linf. leucopénica* propuesto por Gilbert.

linfadenoma, *s. m.* (νύμφη, agua αδήν, glándula). Tumor constituído por tejido adenoide típico, que se desarrolla ora en los órganos que contienen dicho tejido (bazo, ganglios, etc.), ora en los que están desprovistos de él.

linfagogo, *adj.* y *s. m.* (νύμφη; ἄγειν, empujar). Sustancia que aumenta la producción de linfa.

linfangiectasia, *s. f.* (νύμφη; ἀγγεῖον, vasos; ἔκτασις, dilatación). Dilatación varicosa de los ganglios (*adeno-linfocele*) y de los vasos linfáticos.

linfangiectodo, *s. m.* Sin: *linfangioma circunscriptum* (Malcolm Morris). Afección rara y poco conocida, caracterizada por la

aparición, en un punto cualquiera de la piel, de vesículas dispuestas en grupos que manan un líquido claro análogo á la linfa.

linfangioma tuberoso múltiple (*lymphangioma tuberosum multiplex*) (Kaposi). Afección rara y poco conocida caracterizada por nudosidades múltiples del tamaño de una lenteja, situadas en el dermo, las que serían formadas por tejido conjuntivo atravesado por numerosas dilataciones linfáticas.

linfangioma, *s. m.* (νύμφη, ἄγγειον). Producción patológica constituida por una aglomeración de vasos linfáticos de nueva formación, que forman una tumefacción circunscrita. No es pues un tumor, sino una anomalía del tejido linfático, congénita lo más frecuentemente.

linfangitis, *s. f.* (νύμφη; ἄγγειον). Sin. : *angioleucitis*, *linfatitis*, *linfitis*. Inflamación de los vasos linfáticos. — *linf. troncular*. Inflamación de los troncos linfáticos. — *linf. reticular*. Inflamación de las redes linfáticas del dermo. — *linf. radicular* (Le Dentu). Inflamación de las raíces mismas de los linfáticos en la piel, el tejido conjuntivo, ó las vísceras; no tiene existencia separada y se confunde con la inflamación de esos diferentes tejidos.

linfatismo, *s. m.* Sin. *temperamento linfático*. Estado mal definido del organismo, caracterizado por la predisposición á contraer la tuberculosis, que se localiza más especialmente en los huesos, las articulaciones y los ganglios.

linfatitis, *s. f.* Véase : *linfangitis*.

linfemia, *s. f.* (autores alemanes). Sinónimo de *leucemia*.

linfitis, *s. f.* Véase : *linfangitis*.

linfocitemia, *s. f.* Aumento del número de los linfocitos, cuya proporción con respecto á la de los otros glóbulos blancos es considerablemente crecida. Hanse descrito dos formas : la *linfoc. leucémica*, y la *linfoc. aleucémica*, según que el número total de los glóbulos blancos se encuentra aumentado ó no.

linfocito, *s. m.* (νύμφη; κύτος, célula). Sin. : *globulino*, *pequeño leucocito mononuclear*. Nombre dado á pequeños leucocitos (6 μ) de núcleos muy voluminosos, que son particularmente abundantes en los ganglios linfáticos.

linfocitosis, *s. f.* Presencia de considerable número de linfocitos en un líquido del organismo (líquido céfalo-raquídeo en la meningitis tuberculosa).

linfogenia ó **linfopoyesis.** Formación de los glóbulos blancos.

linfoma, *s. m.* Véase : *linfadenoma.*

linfomatosis, *s. f.* Nombre genérico dado por los autores alemanes á todas las afecciones caracterizadas por la hiperplasia del sistema linfático (linfadenia, etc.).

linfo-peritonitis puerperal. Expresión empleada por Siredey para designar la pelvi-peritonitis primitiva, enfermedad que es siempre de origen puerperal y cuyos gérmenes infectivos se propagan por vía linfática.

linforragia, *s. f.* (νύμφη, agua; ῥαγεῖν, hacer irrupción). Derramamiento persistente de linfa; es causado por la herida de un vaso ó de un ganglio linfáticos.

linfosarcoma, *s. m.* (νύμφη; σάρξ, carne). Sin. : *sarcoma linfadenoide* (Rindfleisch). Tumor compuesto de tejido adenoide metatípico, capaz de desarrollarse en los ganglios, así como en órganos que no contienen normalmente tejido adenoide.

linfosis, *s. f.* (νύμφη) (Chaussier). Acto de elaboración especial del que, para ciertos fisiólogos, resultaría la linfa.

linguátula, *s. f.* (*linguatus*, en forma de lengua). Sin. : *pentastoma.* Parásito de la clase de los arácnidos, de cuerpo vermiforme, anillado, que por mucho tiempo se tuvo por una lombriz. Se aloja de preferencia en el hígado en donde se le encuentra enquistado. Las *linguátulas*, en general, no dan lugar á desorden alguno apreciable; son hallazgos de autopsia.

lingua vitull (lengua de ternera). Véase : *macroglosia.*

linimento, *s. m.* (*linire*, suavizar). Tópico untuoso que se emplea para ungir y friccionar la piel.

linitis plástica (*lineum*, lino, á causa de la blancura y resistencia del tejido patológico) (Brinton). Lesión del estómago cuya naturaleza no se ha puesto aún en claro. Los síntomas que presenta hacen pensar generalmente en el escirro del estómago. Desde el punto de vista anatomo-patológico está caracterizada por el desarrollo de las vellosidades de la mucosa y el espesamiento considerable

de la capa fibrosa subyacente. Se la considera generalmente como una forma especial de carcinoma provisto de abundante estroma escleroso.

liomioma, *s. m.* (λεῖος liso; μυών, músculo)(Zenker). Tumor formado de tejido muscular liso. Se desarrolla principalmente en el útero.

liotrico, *adj.* (λεῖος, liso; θρίξ, cabello). Nombre dado por algunos antropólogos á las razas humanas de cabellos lisos.

lipasa ó **lipasis**, *s. f.* (Bourquelot). Fermento soluble que posee la propiedad de saponificar las grasas. Se encuentra en el jugo pancreático (Cl. Bernard), en la sangre (Hanriot) y en el extracto de las vísceras principales.

lipemanía, *s. f.* (λίπη tristeza; μανία, manía). Melancolía.

lipemia, *s. f.* (λίπος, grasa; αἷμα, sangre). Presencia en la sangre de una cantidad más ó menos notable de grasa. Las materias grasas pueden hallarse en la sangre durante la digestión normal, la preñez, la lactancia, y en diversos estados patológicos.

lipocele, *amb.* (λίπος, grasa; κήλη), tumor). Hernia formada por grasa.

lipógeno (angioma). (λίπος; γεννᾶν, engendrar). Nombre dado por Virchow á los angiomas cavernosos nacidos en el tejido adiposo.

lipolisis, *s. f.* (λίπος; λύειν, disolver). Desdoblamiento de las grasas alimenticias en ácidos grasos y jabones, en el curso de la digestión intestinal, bajo la influencia de la bílis y del jugo pancreático.

lipoma, *s. m.* (λίπος, grasa). Sin. : *adipoma* (Cruveilhier). Tumor formado de tejido adiposo.

lipomatosis, *s. f.* (λίπος, grasa). Adiposis.

lipomatosis simétrica principalmente cervical (Reclus). Véase: *adenolipomatosis simétrica*. No todos los autores admiten que esta afección tenga origen linfático.

lipotimia, *s. f.* (λείπειν, faltar; θυμός, alma). Pérdida de conocimiento con conservación de la respiración y de la circulación; es el primer grado del síncope. No se ha efectuado síncope sino cuando ha habido detención, ó por lo menos debilitamiento considerable, de la circulación sanguínea.

lipuria, *s. f.* (λίπος, grasa; οὖρειν, orinar). Presencia en la orina de una

cantidad más ó menos considerable de grasa; ésta puede hallarse emulsionada y dar á la orina aspecto turbio semejante al del quilo, ó aún al de la leche (*galacturia*); ó, por lo contrario, puede la grasa no estar mezclada con la orina, sino formar una capa en la superficie. La *lipuria* se observa, ya á consecuencia de la degeneración grasosa de los riñones, ya, por intermedio de la lipemia, á consecuencia de ciertas intoxicaciones (fósforo) ó de lesiones del hígado y sobre todo del páncreas.

liquen, (*s. m.* (λειχήν). Nombre genérico de todo un grupo de dermatosis, caracterizadas por la presencia de pápulas aglomeradas ó discretas, más ó menos pruriginosas. Estas se complican, en cierta época de su desarrollo, de espesamiento de la piel con exageración de los pliegues naturales.

liquenificación, ó **liquenización,** *s. f.* (Brocq). Proceso mórbido consecutivo al rascarse, caracterizado por el engrosamiento de la piel y la exageración de los pliegues naturales. La *liquenificación* puede ser primitiva, si el prurito aparece en una superficie de piel sana en apariencia, ó secundaria á una lesión anterior de los tegumentos.

líquor, *s. m.* Parte líquida de la sangre en estado fisiológico (suero y fibrina).

lisa, *s. f.* (λύσσα, rabia). Lesión especial de la boca, que aparece durante el período de incubación de la rabia y que permite el diagnóstico precoz. Consiste, según Marochetti (1820), en la presencia de tumorcitos situados en la extremidad de los canales excretores de las glándulas submaxilares y sublinguales, á cada lado del frenillo. No ha sido observada por los autores más recientes.

lisina, *s. f.* (λύειν, disolver). Nombre genérico de las sustancias orgánicas, mal determinadas hasta ahora, que gozan de la propiedad de disolver los glóbulos rojos, las células de los tejidos, las bacterias, y las cuales no revelan su existencia sino por dicha propiedad.

lisis, *s. f.* (λύσις, solución). Nombre aplicado á las desfervescencias lentas y progresivas, que se realizan en varios días. Ej. : La desfervescencia de la fiebre tifoidea se efectúa por *lisis*.

lisofobia, *s. f.* (λύσσα, rabia; φόβος, temor). Horror mórbido á la rabia.

litiasis, *s. f.* (λίθος, piedra). Formación de cálculos en un aparato glandular ó en un receptáculo. Ej. : *litiasis renal, l. salivar, l. lechosa, l. biliar, l. intestinal*, etc.

litolabio, *s. m.* (λίθος, piedra; λαμβάνειν, asir). Las pinzas destinadas á agarrar los cálculos en la vejiga.

litolopaxia, *s. f.* (λίθος; λάπαξις, evacuación). Nombre dado á veces á la litotricia tal como se la practica actualmente, bajo el cloroformo, con trituración y evacuación de los cálculos todos en una sola sesión.

litología, *s. f.* (λίθος; λόγος, discurso). Parte de la patología que trata de la formación de los cálculos en la economía.

litontríptico, *adj.* y *s. m.* (λίθον, piedra; τρίψις, trituración). Las sustancias á que se atribuye la propiedad de disolver los cálculos, cualquiera que sea el modo de administración.

litopedion, *s. m.* (λίθος, piedra; παῖς, παιδός, niño). Feto muerto, infiltrado de sales calcáreas á consecuencia de larga permanencia en la matriz.

litotricia ó **litotripsia**, *s. f.* (λίθος; *terere*, moler, ó τρψίς, trituración). Operación que consiste en triturar un cálculo en la vejiga y hacer salir los fragmentos por la uretra.

Litten (signo de). Disminución de la movilidad del diafragma en el lado correspondiente al pulmón enfermo, signo del principio de la tuberculosis pulmonar.

Little (enfermedad de) (1861-62). Sin. : *rigidez espasmódica congénita de los miembros* (Little). Afección caracterizada por una paraplejia espasmódica que aparece desde los primeros meses de la vida, en niños venidos al mundo antes de término ó en estado de asfixia ó por un parto difícil. Comprende dos formas: una espinal (*tabes dorsal espasmódica de la infancia*), otra cerebro-espinal (variedad de *diplejia cerebral infantil*) acompañada de turbación intelectual. Ciertos autores (Brissaud) han querido reservar este nombre á los casos en que la parálisis es debida al desarrollo incompleto del manojo piramidal, casos susceptibles de mejoría progresiva y que no presentan desórdenes intelectuales.

Littre (operación de). Véase : *colotomía*.

livedo, *s. m.* ó **lividez**, *s. f.* Coloración amoratada de la piel, enfriada y aumentada de volumen á con-

secuencia de la compresión de los grandes vasos, que da lugar á la hiperemia pasiva.

lobópodo, *s. m.* (λοβός, lóbulo; πούς ποδός, pie). Véase : *seudópodo.*

Lobstein (enfermedad de). Véase : *osteopsatirosis.*

Lobstein (placenta de). Véase : *velamentosa del cordón* (*inserción*).

loc, *s. m.* (*looch*, origen árabe. Littré). Medicamento de consistencia espesa como de jarabe, formado por una emulsión y un mucílago (*loc blanco* ó *amigdalino*), ó, más rara vez, de un mucílago solo sin emulsión (*loc gomoso*).

loción, *s. f.* Lavado de una parte ó de toda la superficie del cuerpo con agua caliente ó fría, simple ó cargada de sustancias medicinales.

locomotora (ruido de) (Guttmann). Ruido de frote pericárdico que no se efectúa sino en un solo momento de la revolución cardiaca, ordinariamente mesosistólico, observado á veces en la pericarditis.

locura, *s. f.* Véase : *licosis.*

locura alterna, l. circular, l. intermitente, l. periódica, l. de doble fórma. Variedades de vesania caracterizadas por el retorno de accesos de manía y de melancolía, ya aislados, ya conjuntos, á intervalos irregulares. Se ha descrito gran número de formas según la alternabilidad y periodicidad de los accesos. Véase : *alterna* (*locura*), *circular* (*locura*), *etc*

locura cardiaca. 1° Nombre dado por Bouillaud á los casos extremos de arritmia cardiaca. — 2° Desórdenes síquicos susceptibles de revestir diferentes formas (alucinaciones, delirio agudo, impulsiones, delirio de persecución) que se observan á veces en los cardiacos durante las crisis de asistolía y aún fuera de esas crisis.

locura de la duda. Obsesión experimentada por algunos degenerados cuyo espíritu vive atormentado por problemas incesantes, á los que no encuentran nunca solución satisfactoria.

Lœffler (bacilo de) Véase : *Klebs* (*bacilo de*).

lofotrico, *s. m.* (λόφος, clineja; θρίξ, cabello) (Ellis). Variedad de bacilos provistos de un mechón de pestañas vibrátiles en uno solo de sus extremos.

logoplejia, *s. f.* (Magnan). Afemia.

logorrea, *s. f.* (λόγος, ῥεῖν, fluir). Flujo de palabras, necesidad irresistible de hablar que á veces experimentan ciertos enajenados.

loquios, *s. m. pl.* (λοχεῖα, de λοχός, parturienta). Flujo sanguinolento que sigue al parto y dura de quince días á un mes.

loquiómetra, *s. m.* (λοχεῖα, loquios; μήτρα, útero). Retención de los loquios en el útero; es causada ordinariamente por la anteflexión del órgano.

lordosis, *s. f.* (λορδός, plegado). Desviación, de convexidad anterior, de la columna vertebral.

Loreta (operación de). Sin.: *divulsión digital del piloro.* Dilatación forzada del píloro en los casos de insuficiencia pilórica.

loro (lengua de). Lengua seca, áspera y arrugada, que se observa en los estados tíficos.

Louis (leyes de). Leyes formuladas por Louis en sus *Investigaciones anatomo-patológicas sobre la tisis* (1825): 1° Los tubérculos se hallan primitivamente situados en el vértice del pulmón, y allí son siempre más antiguos que en la base. — 2° Pasados los 15 años, no hay tubérculos en un órgano, sin que los haya en los pulmones.

Lúdwig (angina de) (1836). Variedad de flegmón del suelo de la boca, caracterizada por la tumefacción de la región supra-hioidea, de dureza leñosa, que aumenta rápidamente y pone obstáculo á la respiración á veces desde el 2° día (de donde el nombre de *angina*). Está al mismo tiempo acompañada de estado general grave, indicio de su carácter infectivo.

lúes venérea. Véase: *sífilis.*

lujación, *s. f.* (*luxare*, dislocar). Dislocación permanente de dos superficies articulares que han perdido más ó menos por completo las relaciones que entre sí normalmente tienen.

lumbago, *s. m.* (*lumbi*, los lomos). 1° Expresión tomada á veces en el sentido vago de dolor en los lomos. — 2° Afección dolorosa de la región lumbar que sobreviene bruscamente á consecuencia de un esfuerzo. Limitado primero á las masas musculares sacro-lumbares, se considera actualmente el *lumbago* como un esguince de las articulaciones de las vértebras entre sí.

lumbricosis, *s. f.* Conjunto de los accidentes que

pueden provenir de los *ascárides lombricoides* ó *lombrices* (parásitos del intestino).

lupia, *s. f.* Véase : *quiste sebáceo.*

lupus, *s. m.* (*lupus*, lobo; alusión á la acción roedora de la afección). Afección de la piel que presenta la tendencia á invadir y destruir. Dase á veces este nombre á dos enfermedades, dependientes ambas de la tuberculosis : el *lupus vulgar* ó *tuberculoso*, el *lupus eritematoso.*

lupus eritematoso. Sin. : *lupus de Cazenave.* Dermatosis clínicamente muy distinta del lupus vulgar, caracterizada por rubefacción de la piel, descamación más ó menos marcada y tendencia cicatricial de los tegumentos. Bajo esta denominación han sido confundidas, según Brocq, dos dermatosis diferentes : el *lupus eritematoso simétrico, aberrante*, ó *eritema centrífugo simétrico* ó *vespertilio*, afección superficial que se extiende rápidamente y cuya naturaleza es desconocida; el *lupus eritematoso fijo*, que es un proceso lento, que interesa la piel más profundamente y que probablemente es una variedad de tuberculosis local.

lupus tuberculoso. Sin. : *lupus de Willan.* Variedad particular de tuberculosis cutánea, caracterizada por la presencia de granos amarillentos, semitransparentes, engarzados en el dermo, susceptibles de ulcerarse ó no. En esta expresión la palabra *tuberculoso* no indica la causa de la enfermedad (tuberculosis), sino sólo su forma sintomática, y significa que la lesión elemental es lo que se llama en dermatología un tubérculo.

Lustgarten (bacilo de) (1884-85). Bacilo descrito por Lustgarten como agente específico de la sífilis. Dicho bacilo no es más que un saprófito que vive normalmente en el esmegma prepucial.

M

Mac Búrney (punto de). Punto situado en el medio de la línea que une el ombligo á la espina iliaca antero-superior del lado derecho, y que, más ó menos, corresponde al punto de inserción del apéndice sobre el ciego. El dolor á la presión en este punto limitado es signo de apendicitis.

Mac Ewen (procedimiento de). Tratamiento de los aneurismas de la aorta. que consiste en raspar la cara interna del saco con una aguja, allí introducida, y que se deja fija en la pared. La irritación determinada de ese modo favorece el depósito de fibrina que viene á reforzar la pared del aneurisma.

Mac Ewen (signo de). Signo basado en el examen comparativo de la sonoridad de las diferentes partes del cráneo en los niños de más de dos años. Cuando el paciente está sentado con la cabeza recta, se encuentra normalmente una zona sonora en la base del frontal y en la porción escamosa del parietal. Dicha sonoridad aumenta cada vez que el ventrículo lateral se halla distendido por líquidos (pr ncipio de la meningitis tuberculosa con hidrocefalia); desaparece, al contrario, si el líquido se halla interpuesto entre el cerebro y la pared craneana (meningitis cerebro-espinal).

macicez, *s. f.* Véase: *mate (sonido).*

macilencia, *s. f.* (*macer*, flaco). Enflaquecimiento parcial ó total.

macrocefalia, *s. f.* (μακρός, grande; κεφαλή, cabeza) (antropología). Alargamiento del cráneo, que en la parte posterior presenta un volumen exagerado (deformación generalmente artificial).

macrocito, *s. m.* (μακρός; κύτος, célula). Glóbulo rojo gigante que se encuentra en las anemias graves.

macrodactilia, *s. f.* (μακρός; δάκτυλος, dedo). Vicio de conformación que consiste en el desarrollo monstruoso de uno ó varios dedos.

macrófagos (fagocitos) (μακρός; φαγεῖν, comer). Fagocitos de grandes

dimensiones. Comprenden las células del tejido conjuntivo, células endoteliales de los vasos, células del bazo, de la médula de los huesos, etc.

macroglosia, *s. f.* (μακρός; γλῶσσα, lengua). Aumento monstruoso del volumen de la lengua que á veces trae la procidencia del órgano. Es debida á menudo á una variedad de linfangioma.

macromelia, *s. f.* (μακρός; μέλος, miembro). Monstruosidad que consiste en el tamaño excesivo de algunos miembros. — 2° (μακρός; μήλα, mejillas). Hipertrofia monstruosa de las mejillas.

macropia ó **macropsia,** *s. f.* (μακρός; ὄψις, vista). Sin. : *megalopsia*. Fenómeno subjetivo que consiste en creer los enfermos que los objetos que se les ofrecen á la vista son más grandes que lo que realmente son (histeria).

macropodia, *s. f.* (μακρός; πους, pie). Monstruosidad caracterizada por el desarrollo exagerado del pie.

macroprosopia, *s. f.* (μακρός; πρόσωπον, cara). Monstruosidad caracterizada por el desarrollo exagerado del rostro.

macroqueilia, *s. f.* (μακρός; χειλός, labio). Hipertrofia congénita de los labios, constituída por una variedad de linfangioma.

macroquiria, *s. f.* (μακρός; χείρ, mano). Monstruosidad caracterizada por el desarrollo excesivo de las manos.

macrosquelia, *s. f.* (μακρός; σκέλος, pierna). Monstruosidad caracterizada por el exagerado desarrollo de las piernas.

macrostomía, *s. f.* (μακρός; στόμα, boca). Fisura comisural, uni ó bilateral, que aumenta considerablemente la abertura de la boca, debida á un vicio de desarrollo de la cara.

mácula, *s. f.* (*macula*, mancha). Lesión elemental de la piel, que consiste en una mancha roja de dimensiones variables, sin prominencia notable en la superficie de los tegumentos, y que desaparece momentáneamente por la presión del dedo.

madarosis, *s. f.* (μαδαρός, sin pelos). Calvicie del borde palpebral, debida á la caída de las pestañas.

Madelung (deformidad de) (1879). Nombre con que se conoce en Alemania la sublujación es-

pontánea del puño hacia adelante, probablemente determinada por la curvatura raquítica de la extremidad inferior del radio.

madera (ruido de) (Pitres). Ruido obtenido por la percusión plesimétrica del tórax cuando el pulmón se halla sano, ó por lo menos normalmente aereado. Se percibe un ruido sordo comparable con el que se obtiene por la percusión de un pedazo de madera con el extremo de los dedos.

Madura (pie de). Sin. : *fungo del pie, micetoma, enfermedad endofítica del pie.* Enfermedad de los países cálidos debida á un parásito especial, vecino del de la actinomcosis, la cual se manifiesta clínicamente por la considerable hipertrofia del pie, infiltrado por tumores especiales que producen la desorganización de los tejidos, y la muerte del enfermo si no se interviene con la amputación.

Magendie (ley de) (fisiología). Ley según la cual todos los filetes nerviosos motores pasan por las raíces anteriores de la médula.

magma, *s. m.* (μάσσειν, pilar). Residuo obtenido después de exprimir las partes líquidas de cualquiera sustancia.

magnetoterapia, *s. f.* (magnetismo; θεραπεία, tratamiento). Empleo de los imanes en el tratamiento de ciertas sicosis.

Mahu (signo de). Signo que permite hacer el diagnóstico entre la sinusitis maxilar y el empiema del seno debido al derrame en esta cavidad de pus proveniente de otro origen. Está basado en la disminución de la capacidad del seno en el caso de sinusitis.

Maisonneuve (operación de). Véase : *entero-anastomosis.*

mal (estado de). Véase : *estado de mal.*

mal (alto). Gran ataque epiléptico.

mal (pequeño). Manifestación larvada de la epilepsía (ausencia, vértigo, acceso incompleto).

mal perforante. Expresión con que se designan ciertas ulceraciones que tienden á cavar hacia la profundidad, generalmente determinadas por lesiones nerviosas.

mal perforante bucal (Fournier). Afección rara, caracterizada por la caída espontánea de los dientes, reabsorción del reborde alveolar, y, finalmente, perforaciones palatinas; es debida á una neuritis

trigémino, que á su vez depende de la tabes.

mal perforante plantar. Afección caracterizada por una ulceración situada en la planta del pie, sobre la articulación metatarso-falangiana de los dedos, con tendencia á invadir la articulación subyacente; depende de una neuritis, que á su vez es efecto de la tabes, la diábetes sacarina, ó algún otro proceso general.

malacia, *s. f.* (μαλακία, blandura). Trastorno del apetito que consiste en el deseo mórbido de platos excitantes ó ácidos.

malar (punto) (antropología). Punto situado sobre el tubérculo de la cara externa del hueso malar.

malaria, *s. f.* (italiano *mala; aria,* aire). Véase: *paludismo.*

maleatoria (corea). Véase: *corea histérica.*

maligno, *adj.* Se aplica á la enfermedad que presenta carácter grave é insidioso, y al tumor susceptible de generalizarse y de producir la muerte del paciente.

Malta (fiebre de). Enfermedad infectiva causada por el *micrococcus melitensis* (Bruce, 1817). caracterizada por fiebre alta, dolores en los miembros y sudores abundantes. Dura de una á cinco semanas y está sujeta á recaídas con intervalos irregulares. Reina principalmente en el litoral del Mediterráneo.

maltusianismo, *s. m.* (de Malthus, economista inglés que publicó en 1798 un *Ensayo sobre los principios de la población* en donde señalaba el peligro del creciente aumento de ésta). Práctica de los diferentes medios apropiados para disminuir la natalidad (aborto provocado, castración, inyecciones cáusticas ó antisépticas, etc.).

mamiloplastia, *s. f.* (*mamilla*, mamila; πλάσσειν, formar). Operación que consiste en quitar al rededor del pezón uno ó dos colgajos de piel, y cuyo objeto es evitar la umbilicación ó invaginación del pezón.

mamitis, *s f.* (*mamma,* glándula mamaria). Véase: *mastitis.*

manía, *s. f.* (μαίνομαι, deliro). Síndroma caracterizado por « la sobrexcitación general y permanente de las facultades intelectuales y morales » (Baillarger), y que puede manifestarse, ya en el curso de una afección mental, ya aisladamente constituyendo entonces una sicosis autónoma.

manicomio, *s. m.* (μανία, locura; κομεῖν, cuidar). Hospital de locos.

manógrafo, *s. m.* (μανία: γραφεῖν, escribir). Médico alienista.

maniluvio, *s. m.* (*manus*, mano: *luere*, lavar). Baño de manos.

Mannkopf (signo de) (1885). Aumento de la frecuencia del pulso por la compresión de los puntos dolorosos en las neuralgias.

mano zamba. Deformación congénita ó adquirida de la mano, en la que ésta se halla replegada sobre el antebrazo, el cual termina, pues, por una extremidad redondeada, análoga á la que termina la pierna en la deformación llamada pie zambo.

mano de predicador. Véase : *predicador* (*mano de*).

marasmo, *s. m.* (μαραινεῖν, desecar). Flaqueza extremada de todo el cuerpo, provocada por larga enfermedad.

marasmo senil. Proceso regular de atrofia que ataca la mayor parte de los tejidos en la vejez.

marástico, *adj.* Que tiene relación con el estado de marasmo. Ej. : *trombosis marástica*.

marcha, *s. f.* (calco del francés *démarche*). Empléase en el tecnicismo médico este vocablo por manera de andar. paso (*marcha tabeto-cerebelosa*. *marcha de Todd*, *marcha helicópoda* etc.), y como sinónimo de evolución desenvolvimiento (*marcha de una enfermedad*).

marcha (aparatos para la). Aparatos destinados á las fracturas del miembro inferior, los cuales permiten que el enfermo camine apoyándose en la pierna quebrada.

Marechal (reacción de). Reacción que se utiliza para descubrir la presencia de la materia colorante biliar en la orina. Se vierten unas gotas de tintura de yodo en la orina que se examina, y, por agitación, preséntase en ella una coloración verde esmeralda.

maregmáticas (fiebres). Paludismo.

Marey (ley de). La frecuencia de los latidos cardiacos aumenta siempre que la tensión arterial disminuye, y vice versa, disminuye cuando la presión arterial aumenta.

margaroide (tumor). Nombre dado á veces á ciertos tumores que presentan el aspecto de la margarina.

Marie (enfermedad de). Véase : *acromegalia.*

Marie y Robinson (sindroma levulosúrico de). Sindroma caracterizado esencialmnote por la presencia en la orina de una sustancia reductriz y levogira, y cierto estado melancólico con ideas de ruina y de suicidio.

marisco, *s. f.* (*marisca*, especie de higo salvaje). Tumorcito inserto en la margen del ano, provisto de envoltura cutánea ó cutáneo-mucosa, arrugado, blando é indolente, proveniente de una hemorroide que ha sufrido la transformación fibrosa.

Markwald (operación de). Sin. : *operacion de Simón.* Operación que consiste en amputar el cuello uterino por el método de dos colgajos : se practica sobre cada labio separadamente una excisión cónica de la parte hipertrofiada y se suturan los dos colgajos así obtenidos.

Marsh (enfermedad de). (Tapret). Véase : *bocio exoftálmico.*

marsupialización, *s. f.* Operación que consiste en suturar á la piel la pared de un quiste no enucleada. Fórmase así una bolsa comparada con la de los marsupiales.

martillaje, *s. m.* Procedimiento de castración que consiste en golpear con un martillo sobre el cordón testicular apoyado en un pedazo de madera.

masaje, *s. m.* (etimología discutida : 1ª árabe *mass*, palpar, manejar; 2ª μάσσειν. amasar). Acción de comprimir, amasar, sobar con las manos una de las partes del cuerpo (masaje de los músculos, del estómago, etc.). — Dícese también, y es más castizo, *amasamiento.*

masaje inspiratorio (Mœbius). Masaje indirecto del hígado por el intermedio del diafragma, preconizado en los accesos de hepatalgia.

mascujamiento, *s. m.* Movimiento automático y continuo de las mandíbulas, síntoma observado en cierto número de afecciones del encéfalo.

masoquismo, *s. m.* Variedad de perversión del sentido genésico, caracterizada por el hecho de que el acto sexual, en vez de ser provocado por las causas habituales, necesita de sevícias ó violencias, tales como flagelación de las nalgas y del lomo, etc.

masoterapia, *s. f.* (masaje : θεραπεία, trata-

miento). Empleo terapéutico del masaje.

mastitis, *s. f.* (μαστός, mama). Sin. : *mamitis*. Nombre genérico de todas las afecciones inflamatorias de la mama.

mastodinia, *s. f.* (μαστός; ὀδύνη, dolor). Dolores neurálgicos de la mama susceptibles de irradiarse á las regiones vecinas. Es síntoma de varias afecciones de la glándula.

mastoiditis, *s. f.* Inflamación de la apófisis mastoide, consecutiva casi siempre á una otitis media.

mastzellen (alemán *Mast*, gordura; *Zellen*, células) (Ehrlich). Células existentes normalmente en el tejido conjuntivo y que excepcionalmente pueden hallarse en la sangre. Son grandes células de 30 á 40 μ cuyo núcleo redondeado ú ovalar se oculta á menudo trás de granulaciones más ó menos voluminosas no colorables sino por colores básicos.

materia médica. Conjunto de los cuerpos que suministran los medicamentos.

mate (sonido). Sin. : *macicez* ó *matitez*. Sonido obtenido por la percusión de una parte del cuerpo, caracterizado por tonalidad elevada, baja intensidad y ausencia de timbre apreciable. Cuando es perfecto, se le compara al sonido obtenido percutiendo el muslo (*tanquam percussi femoris*).

Mathieu (enfermedad de). Véase : *Weil* (*enfermdedad de*).

matitez, *s. f.* Véase : *mate (sonido)*. (Creemos preferible decir *macicez*).

Mauriceau (maniobra de) (obstetricia). Maniobra destinada á desprender la cabeza del feto retenida en la excavación ó en la pelvis blanda, en el parto de pelvis, después de la salida del tronco y de los miembros. Consiste en poner el feto á caballo sobre el antebrazo y en doblarle fuertemente la cabeza metiéndole dos dedos en la boca.

Maydl (procedimiento de). Procedimiento de urétero-enterostomía aplicado á la cura radical de la extrofia de la vejiga.

Mayor (martillo de). Procedimiento de revulsión debido á Mayor, cirujano de Lausanne (1829), el cual consiste en el empleo de un martillo que se ha metido en agua hirviente; sirve para practicar cauterizaciones enérgicas.

mbori, *s. f.* Tripanoso-

miasis reinante en el Sudán francés especialmente sobre los dromedarios. Según Laverán, el tripanosoma de esta enfermedad no difiere del del surra más que por su menor virulencia.

meatotomía, *s. f.* (meato; τομή, sección). Incisión del meato urinario, con el fin de aumentar el diámetro de este orificio.

mecanoterapia, *s. f.* (μηχάνη, máquina; θεραπεία, tratamiento) (Bonnet de Lyon, 1848). Sin.: *método de Zánder* (1857). Método terapéutico que consiste en hacer ejecutar á las articulaciones movimientos activos y pasivos por medio de aparatos especiales.

meconio, *s. m.* (μηκώνιον, jugo de adormidera). Las materias viscosas, oscuras y verduzcas, que expulsa el feto después que nace, las cuales presentan completa analogía de color y de consistencia con el jugo de adormidera.

mediastinitis, *s. f.* Nombre colectivo de todas as inflamaciones del tejido celular del mediastino.

mediastino-pericarditis callosa (Küssmaul). Inflamación crónica del tejido celular del mediastino, que complica á veces la sínfisis cardiaca y forma adherencias entre el pericardio y el esternón, las costillas y el raquis.

mediastinotomía, *s. f.* (mediastino, τομή, sección). La operación que tiene por objeto llegar hasta los órganos situados en el mediastino (bronquios, tráquea, esófago, etc.). La *mediastinotomía* puede ser *anterior*, y entonces requiere la resección más ó menos extensa del esternón y de los cartílagos costales, ó *posterior*, con resección de las costillas.

mediata (auscultación). Auscultación con el estetoscopio.

medicina legal. Rama de los conocimientos médicos que trata de las relaciones de la medicina con el derecho.

medular (carcinoma). Carcinoma encefaloide. Véase: *encefaloide*.

medulización, *s. f.* (*medulla*). Invasión del tejido compacto de los huesos por tejido medular óseo, ya bajo la influencia de la desnutrición senil (*medulización* del cuello del fémur en los ancianos), ya bajo la influencia de la sífilis hereditaria en los jóvenes.

medulitis, *s. f.* Véase: *osteomielitis*.

medulitis tubercu-

losa. Lesión provocada en la médula ósea por la tuberculosis.

meduloterapia antirrábica. (Pasteur, 1885). Tratamiento preventivo de la rabia por medio de inoculaciones de médula, más ó menos desecada, de conejos rabiosos.

mefitismo, *s. m.* (*mephitis*, hedor). Viciación del aire por gases irrespirables, ó por otros principios capaces de ejercer sobre el organismo animal una acción nociva inmediata.

megacariocito, *s. m.* (μέγας, grande; κάρυον, núcleo; κύτος, célula). Sin.: *célula gigante de la médula de los huesos*. Célula grande que se encuentra en la médula ósea y contiene un grueso núcleo vesiculoso y mamilado.

megacefalia, *s. f.* (μέγας grande; κεφαλή, cabeza) (antropología) Desarrollo considerable del cráneo (normal ó patológico).

megacolon congénito. Véase: *Hirschsprung* (*enfermedad de*).

megaleritema epidémico. (Plachte, 1904). Sin.: *eritema infectivo agudo* (Sticker. 1899), *quinta enfermedad eruptiva*. Enfermedad contagiosa y epidémica, perteneciente al grupo de las fiebres eruptivas, que lo más á menudo coincide con epidemias de sarampión ó de rubeola. Se revela por una erupción de máculo-pápulas confluentes en la cara, raras en los miembros y nulas en el tronco. No presenta enantema ni síntomas generales.

megaloblasto, *s. m.* (μέγας, μέγάλη, grande; βλαστός, célula). Glóbulo rojo nucleado cuyo volumen es tres á cuatro veces mayor que el de los glóbulos rojos ordinarios.

megalocefalia, *s. f.* Véase: *megacefalia*.

megalocito, *s. m.* (μέγας; κύτος, célula). Variedad de glóbulo rojo, debida á la transformación de un megaloblasto cuyo núcleo se ha reabsorbido.

megaloftalmía, *s. f.* (μέγας; ὀφθαλμός, ojo). Anomalía congénita del ojo, que consiste en el aumento de sus diámetros (principalmente de los de la córnea).

megalomanía, *s. f.* (μέγας; μανία). Delirio de las grandezas.

megalopodia, *s. f.* (μέγας; πους, ποδός, pie). Hipertrofia parcial ó total de las extremidades inferiores.

megalopsia, *s. f.* (μέγας; ὄψις, vista). Véase: *macropsia*.

megastria, *s. f.* (μέγας;

γαστήρ, estómago). Nombre dado por Ewald á aquellos estómagos normalmente muy voluminosos (cuya capacidad excede de 1700 c. c.), sin que haya, propiamente, dilatación.

melagra, *s. f.* (μέλος, miembro; ἄγρα, dolor). Nombre dado antes à los dolores de los miembros.

melalgia, *s. f.* (μέλος, miembro; ἄλγος, dolor). (Beau). Dolores observados en los tísicos, situados principalmente por encima de la rodilla, pero susceptibles de extenderse á todo el miembro inferior.

melancolía, *s. f.* (μέλας, negro; χολή. bilis). Sin. : *lipemania* (Esquirol). Sicosis que se presenta por accesos, caracterizada por « la existencia mórbida de una emoción penosa, depresiva, que domina al paciente » (Griesinger), y trae secundariamente la disminución de las facultades intelectuales. Puede curarse ó pasar al estado crónico.

melanemia, *s. f.* (μέλας, negro; αἷμα, sangre). Alteración especial de la sangre, caracterizada por la presencia en ella de pigmento y por el acúmulo de este pigmento en ciertos órganos. Se la observa sobre todo en el paludismo.

melánico (carcinoma). Variedad muy rara de carcinoma, caracterizada por la presencia de pigmento que infiltra mayor ó menor número de células.

melánico (sarcoma). Sin. *melano-sarcoma.* Tumores cuyo punto de origen es casi siempre la piel ó el globo ocular; presentan todos los caracteres del sarcoma, sin más diferencia, á la simple vista y al microscopio, que la abundancia de pigmento, repartido ya uniforme, ya irregularmente.

melanina, *s. f.* (μέλας, negro). Sustancia de color negro intenso que, reducida á finísimas granulaciones, da su coloración característica á las células pigmentarias (coroide, piel).

melanismo, *s. m.* ó **melanodermia,** *s. f.* (μέλας; δέρμα, piel). Aquel estado de la piel en que presenta ésta cierta pigmentación de intensidad variable; mas, siempre difusa y á veces generalizada. Se observa en distintas enfermedades (enfermedad de Addison, diábetes bronceada, sífilis, etc.).

melanoglosia, *s. f.* (μέλας; γλῶσσα, lengua). Coloración negra de la parte dorsal de la lengua, debida á un hongo. Véase : *glosofitia.*

melanoma, *s. m.* Nombre genérico de los tumores melánicos ó de pigmento.

melanosis, *s. f.* (μέλας, negro; νόσος, enfermedad). Nombre con que designaba Laënnec los tumores melánicos. Actualmente designa esta voz el acúmulo de materia negra en los diferentes tejidos de la economía, ora venga dicha materia del exterior (antracosis). ora se forme en los órganos. En este último sentido es como se la emplea de preferencia; se aplica entonces á la aglomeración de pigmento en los distintos tejidos, y la melanodermia es una de sus variedades.

melanotriquia lingual (μέλας; θρίξ, τριχός. cabello) (H. Surmont), Véase : *glosofitia*.

melanuria, *s. f.* (μέλας; οὖρον, orina). Presencia de pigmento melánico en la orina.

melasma, *s. f.* Manchas negras que se observan en los ancianos, particularmente en las piernas, debidas á la coloración anormal de la epidermis y seguidas de descamación furfurácea.

Meleda (enfermedad de) (Ehlers). Afección común en la isla de Meleda (Dalmacia), caracterizada por la telangiectasia simétrica de las extremidades con hiperqueratosis é hiperidrosis Es afección familial cuya naturaleza se ignora.

melena, *s. m.* (μέλαινα, sobrentendido χολή, bilis negra). Síntoma que consiste en la evacuación por el ano de sangre negra mezclada ó no á las heces, y con el aspecto de alquitrán.

melicérida, *s. f.* (μελίκηρον, panal de miel). Lupia de contenido melicérico; especie de lupia formada por el acúmulo en el folículo piloso de una materia amarillenta de consistencia de miel, constituída por una gran cantidad de grasa libre y de células epidérmicas disociadas.

melitagroso, *adj.* (μέλι, miel; ἄγρα, mal). Dícese de las costras del impétigo á causa de su semejanza con la miel.

melito, *s. m.* Jarabe en que el azúcar es reemplazado por miel.

melituria, *s. f.* (μέλι, miel; οὐρεῖν, orinar). Véase: *glicosuria*.

melomelo, *s. m.* (repetición del vocablo μέλος miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por la inserción de uno ó varios miembros acceso-

rios sobre uno ó varios miembros normales.

meloplastia, *s. f.* (μήλον, pómulo; πλάσσειν, formar). Restauración de la cara por autoplastia.

melotomía, *s. f.* (μέλος, miembro; τομή, sección). Variedad de embriotomía que consiste en la sección de un miembro que ocupa la vía genital é impide con su volumen toda intervención ulterior.

menagogo, *adj.* (μήν, menstruo; ἄγειν, empujar). Véase : *enmenagogo.*

menidrosis, *s. f.* (μήν, menstruo; ἱδρώς, sudor). Perturbación de la secreción sudoral caracterizada por su exageración en las épocas menstruales. La *menidrosis* la consideran algunos autores como verdaderas reglas suplementarias.

Menière (enfermedad ó vértigo de). Sin. : *oticodinia, sordera apopletiforme.* Forma de vértigo auricular que termina por la sordera y es debida á la hemorragia del laberinto. Véase : *vértigo auricular.*

meningismo, *s. m.* (Dupré, 1894). Complexo sintomático que comprende todos ó casi todos los signos que se encuentran habitualmente en la meningitis aguda. Bajo diversas influencias pueden, efectivamente, ciertos niños neurópatas presentar los signos de la meningitis, sin que haya, no obstante, inflamación de las meninges. Para poner de bulto esta independencia de los síntomas y de la lesión es que Dupré ha propuesto el término *meningismo.*

meningitis, *s. f.* (Herpin). Sin : *aracnitis, cefalitis.* Nombre genérico de todas las inflamaciones difusas y simultáneas de las meninges (aracnoide, tejido celular sub-aracnoideo, pía madre, dura madre).

meningitis cerebro-espinal epidémica. Enfermedad epidémica cuya causa es un microbio, el meningococo, muy semejante al neumococo. Está caracterizada anatómicamente por la inflamación de las meninges cerebrales y medulares, y clínicamente por principio brusco, contracturas musculares, coma y evolución en general rápidamente mortal.

meningocele, *amb.* (μήνιγξ, membrana; κήλη, tumor). Ectopia, en la cara externa del cráneo, de las meninges, las que sólo contienen líquido en mayor ó menor abundancia, provista de un angosto pedículo casi siempre impermeable. Es una variedad de *encefalocele.*

meningococo, *s. m.* (*diplococcus intracellularis meningitidis* (Weichselbaum, 1887). Diplococo observado en la meningitis cerebro-espinal epidémica y que parece ser el agente patógeno de la enfermedad.

meningo-encefalitis, *s. f.* Inflamación del cerebro y de sus membranas.

meningo-encefalocele, *amb.* Véase : *encefalocele.*

meningo-mielitis, *s. f.* Inflamación de la médula y de sus membranas, en especial de la piamadre.

meningopatía tuberculosa. Nombre propuesto por Poncet para designar la tuberculosis de las meninges. Dicho término comprende numerosos estados patológicos, desde las cefaleas más ó menos tenaces y las meningitis atenuadas que terminan por la curación, hasta las formas rápidamente mortales.

meningorragia, *s. f.* (μήνιγξ, membrana; ῥαγεῖν, hacer irrupción). Hemorragia meningea.

menopausa, *s. f.* (μήν, mes; παῦσις, cesación). Fin de la función menstrual. — *menopausa artificial.* Abolición de las reglas consecutiva á una operación (ablación del útero ó castración bilateral).

menorragia, *s. f.* (μήν, mes; ῥήγνυμι, salgo violentamente). Exageración, en cantidad ó duración, del flujo menstrual.

menorrágica (fiebre) (Trousseau). Afección caracterizada por fiebre y fenómenos intestinales que recuerdan el comienzo de la fiebre tifoidea; sobreviene en jóvenes que menstrúan mal, y termina bruscamente al aparecer las reglas.

menorrea, *s. f.* (μήν, mes; ῥεῖν, fluir). Flujo de las reglas.

menstruación, *s. f.* Fenómeno fisiológico ligado con la función de reproducción, que existe en la mujer desde la pubertad hasta la menopausa, y consiste en un flujo sanguíneo por las vías genitales que se reproduce cada mes, excepto durante la preñez y la lactancia.

menstruos, *s. m. pl.* (*menstrua* de *mensis*, mes). Sin. : *reglas.* El flujo sanguíneo cuya regular repetición constituye la menstruación.

mentagra, *s. f.* (*mentum*, barba; ἄγρα, presa). Variedad de foliculitis pilosa limitada al mentón.

mentoniano (punto)

(antropología). Punto situado en el medio del borde inferior del maxilar inferior.

meralgia parestésica (μηρός, muslo; ἄλγος, dolor) (Bernhardt, 1895). Sin.: *enfermedad de Bernhardt.* Afección caracterizada por dolores y desórdenes diversos de la sensibilidad subjetiva y objetiva, que se presenta en el dominio del nervio fémoro-cutáneo. Su naturaleza es aún mal conocida; parece ser un síndroma indicativo del estado de sufrimiento del nervio, y que sobreviene á consecuencia de una enfermedad general (diábetes, fiebre tifoidea), de una afección nerviosa (tabes, parálisis general) ó finalemente de un simple desorden local (músculo paralizado, estación de pie prolongada).

mercurialización, *s. f.* Introducción en el organismo de mercurio ó de compuestos mercuriales, por la vía digestiva, por la cutánea ó por la hipodérmica.

mercurialismo, *s. m.* Véase: *hidrargirismo.*

mericismo, *s. m.* (μηρυκισμός, rumiadura). Fenómeno bastante raro que consiste en que los alimentos ingeridos pueden volver á la boca, ya voluntaria, ya involuntariamente, para ser de nuevo masticados, como en los rumiantes.

meroblástico, *adj.* (μέρος, parte; βλαστός; germen). Se dice del huevo cuya segmentación es parcial; esto es, que cierta parte del huevo, el deutoplasma ó vitelo de nutrición, acumulada en un punto, no participa en la segmentación; ésta puede ser entonces discoidal (huevo telolecítico), ó superficial (huevo centrolecítico).

merocele, *amb.* (μηρός, muslo; κήλη, tumor). Hernia crural.

merogonía, *s. f.* ó **merogónica (fecundación)** (Delage). Modo de fecundación en el que el núcleo macho ó espermático se une á un citoplasma hembra que no contiene núcleo. La larva producida así conserva exiguas dimensiones.

merotomía, *s. f.* (μέρος, parte; τέμνειν, cortar). Operación que consiste en separar de un organismo vivo un fragmento más ó menos considerable, con el objeto de observa los fenómenos de supervivencia que dicho fragmento puede presentar.

merozoíto, *s. m.* (μέρος, parte; ζῶον, animal). 1° Fragmento separado de un organismo vivo en la operación de la merotomía. — 2° Células en que se divide durante

la esquizogonía (generación asexual) la esquizonta adulta de los esporozoarios (coccidias, hematozoario palúdico).

mesarteritis, *s. f.* Inflamación de la túnica media de las arterias. No existe sin lesión concomitante de las otras túnicas : la arteritis es siempre total. — La túnica media, la más resistente, se halla á veces infiltrada por elementos embrionarios (arteritis aguda), ó participa en la degeneración de las otras membranas de la arteria.

mesaticéfalo, *s. m.* (μέσατος, mediano; κεφαλή, cabeza) (Broca). Variedad de cráneo intermedia entre el cráneo braquicéfalo y el dolicocéfalo.

mesenquimatosos (elementos), ó **mesenquima**, *s. m.* Tejido conjuntivo embrionario. Es de origen mesodérmico y desempeña ya en el embrion el papel de relleno y de sostén que compete al tejido conjuntivo adulto.

mesenteritis, *s. f.* Peritonitis localizada en el mesenterio.

mesoblasto ó **mesodermo**, *s. m.* (μέσος, en el medio; δέρμα, piel). Sin.: *hojilla media*. Capa media que aparece en la gástrula entre el ectodermo y el endodermo; se divide en dos partes : *meso. parietal* y *meso. visceral*, que limitan la cavidad llamada *celoma*.

meso-histología, *s. f.* **mesología histológica** (Bertillon). Influencia del medio sobre los elementos anatómicos y sobre los tejidos que constituyen.

mesología, *s. f.* (μέσος, medio; λόγος, doctrina). « Ciencia de los medios, ó ciencia que tiene por objeto el conocimiento de las relaciones existentes entre los seres vivos y el medio en que se hallan sumergidos : vale decir, que esta ciencia se esfuerza en descubrir las influencias recíprocas que los dos términos puestos en presencia, el medio y el ser sumergido, ejercen uno sobre otro, así como las modificaciones que de ello deriva cada uno ». (Bertillon.)

mesoneuritis, *s. f.* (Vanlair). Variedad de neuritis intersticial situada en una parte del tejido conjuntivo de los nervios; presenta ya la forma nodular, ya la forma laminar.

mesoroptro, *s. m.* (μέσορος, que sirve de límite; ὄπτομαι, veo) Distancia á que debe colocarse un objeto para ser visto distintamente.

mesorrinio, *s. m.*

(μέσος, mediano; ῥίν, nariz). (Broca). Nombre dado en antropología y en etnografía á los individuos y razas de índice nasal mediano (de 48 á 52) (raza mongólica).

mesosistólico, *adj.* (μέσος, medio; sístole) (Potain). Se dice de los ruidos mórbidos que coinciden con el medio de la sístole. Son siempre de origen extracardiaco.

mestizo, *s. m.* (*mixtus*, mezclado). El producto de individuos de razas diferentes; se reserva la voz *híbrido* para designar el producto de especies diferentes.

metablástula, *s. f.* (μετά, después; blástula). La *blástula* de los mamíferos. Seméjase á la vez á la anfiblástula de los anfibios y á la discoblástula de las aves.

metabolismo, *s. m.* (μεταβολή, de μεταβάλλειν, transformar). El conjunto de las transformaciones químicas y biológicas que se efectúan en el organismo y que constituyen el acto de la nutrición — *metabolismo mucinoso.* Función atribuída por Hórsley á la glándula tiroide, la cual consiste en transformar la mucina en sustancia útil al organismo.

metacinesis, *s. f.* (μετά, indica cambio; κίνησις, movimiento). La emigración de los dos grupos de cromosoma hacia sus respectivos polos (cariocinesis).

metacromasia, *s. f.* Propiedad de ciertos elementos histológicos de tomar, bajo la influencia de ciertos colorantes, un tinte diferente al resto del tejido de que forman parte.

metacromatismo, *s. m.* (μετά, indica cambio; χρῶμα, color). Modificación del color de la piel ó del cabello bajo la influencia de la edad ó de las enfermedades.

metagástrula, *s. f.* (μετά, después; gástrula). La *gástrula* de los mamíferos que, aunque proviene de un huevo de segmentación total, recuerda por el modo de su formación (epibolia del ectodermo) á la discogástrula de las aves.

metagenesia, *s. f.* (μετά, alternativamente; γένεσις, nacimiento). Modo de reproducción de ciertos seres organizados, caracterizado por el hecho de que, antes de haber llegado á la forma adulta y de poseer órganos genitales, dé un ser nacimiento á gérmenes nuevos, los que, al desarrollarse, serán adultos, tendrán sexo y podrán reproducirse por fecundación.

metágmico, *adj.* (μετά,

después ; ἀγμός, fractura) (Roger y Garnier). Que es consecutivo á una fractura. — *osteopatía metágmica*. Variedad particular de deformación ósea consecutiva á una fractura, situada en el segmento de miembro subyacente al hueso fracturado y sin directa relación con el traumatismo.

metálico (ruido). Nombre dado á toda aquella serie de ruidos perceptibles á la auscultación, que tienen por carácter común la clara resonancia propia de los que se producen en cavidades con paredes metálicas. Ej. : *resonancia metálica, retintín metálico, ruido de bronce.*

metalofobia, *s. f.* (μέταλλον, metal ; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa (fobia) de tocar ciertos objetos metálicos (botones de las puertas, etc.).

metaloterapia, *s. f.* (μέταλλον ; θεραπεία). Modo de tratamiento que consiste en la aplicación de ciertos metales bajo forma de placas, brazaletes, anillos, etc. (renovado de la medicina hermética).

metamería, *s. f.* División primitiva de la cuerda dorsal y de los tejidos que la rodean, en segmentos ó metameros. Cada segmento posee en sí las propiedades y atribuciones del ser definitivamente acabado. Esta división no persiste en los vertebrados superiores : pronto se produce una nueva fragmentación de la cuerda dorsal que da lugar á la formación de las vértebras definitivas.

metamería cutánea. División de la superficie cutánea en territorios de los cuales cada uno corresponde á un segmento medular primitivo ó neurotoma. Esta división ha sido invocada para explicar el reparto de ciertas perturbaciones cutáneas : anestesias, erupciones (zona), que se hallan en relación con una lesión norviosa, mas, sin corresponder á la distribución de nervio periférico alguno.

metamero, *s. m.* (μετά ; μέρος, parte). Sin. : *protovértebras, prevértebras, somitas*. Segmentos que resultan de la división primitiva del embrión, ó metamería.

metaplasia, *s. f.* (Virchow) ó **metaplásico (proceso).** Proceso en virtud del cual ciertos elementos pertenecientes á un tejido producen otros elementos que se diferencian de los primeros y constituyen células y tejidos provistos de caracteres físicos

y químicos distintos. La *metaplasia* explicaría la formación de tejidos normales ó patológicos á costas de tejidos diferentes á éstos.

metástasis, *s. f.* (μετάστασις, de μεθίστημι, yo cambio de sitio). Desaparición de un fenómeno patológico seguida de la aparición, en otro punto de la economía, de otro fenómeno patológico, siendo ambas manifestaciones mórbidas dependientes de la misma enfermedad. La *metástasis* se observa particularmente en la gota. — Para los autores antiguos había transporte de la materia morbífica, del órgano en donde primero se había fijado á partes más ó menos lejanas

metastático (abceso). Abceso causado por una embolía séptica desprendida de un foco infectivo más ó menos lejano.

metatarsalgia, *s. f.* Sin. : *enfermedad ó pie de Morton.* Afección caracterizada por un dolor situado en la articulación metatarsofalangiana del cuarto dedo, que aparece ya bruscamente á consecuencia de un traumatismo, ya lentamente á consecuencia del cansancio, y se manifiesta bajo forma de accesos paroxísticos en los neurasténicos.

metatopia, *s. f.* (μετά, indica cambio; τόπος, lugar). Proceso según el cual ciertos elementos poco desarrollados normalmente en un tejido (células cartilaginosas en medio de los ligamentos) proliferan y llegan á ser predominantes en él bajo la influencia de una causa mórbida. Ej. : producción de eccondrosis en los bordes de la artritis deformante.

metatrófica (terapéutica) (Richet y Toulouse). Método terapéutico que consiste en modificar la alimentación y la nutrición al mismo tiempo que se administra una sustancia medicamentosa. Ej. : para que sea en los epilépticos más eficaz la acción del bromuro de sodio, se suprime el cloruro de sodio de la alimentación; la necesidad de sales alcalinas es entonces intensa y pequeñas dosis de bromuro obran sobre los elementos nerviosos con la misma actividad que dosis dobles ó triples administradas á individuos que no han sido privados de sal.

meteorismo, *s. m.* (μετέωρος, elevado). Sin. : *timpanismo.* Hinchazón del abdomen por gases contenidos en el intestino.

metoarion, *s. m.* (μετά,

después; ὠάριον, óvulo) (Raciborski). Véase : *cuerpo lúteo.*

metodismo, *s. m.* Doctrina de la escuela de Alejandría, según la cual las enfermedades todas provienen del encogimiento ó del relajamiento de las diferentes partes del cuerpo.

metópago, *s. m.* (μέτωπον, frente; παγεῖς, unidos) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo formado por dos individuos provistos de ombligos distintos, reunidos por las extremidades cefálicas, frente con frente, sin ninguna otra deformación.

metópico (punto) (μέτωπον, frente) (antropología). Punto situado sobre la línea mediana entre las dos eminencias frontales.

metritis, *s. f.* (μήτρα, útero). Nombre genérico de todas las afecciones inflamatorias del útero.

metrocito, *s. m.* (μήτρα, κύτος, célula). Células hemoglobiníferas, muy voluminosas, que poseen un núcleo de pocas dimensiones, consideradas por Engel como las células madres de los normoblastos (anemia perniciosa, reacción mieloide de la sangre).

metro-elitrorrafia, *s. f.* (μήτρά; ἔλυτρον, vagina; ῥαφή, sutura). Operación que consiste en suturar la pared vaginal anterior, ó el labio anterior del cuello, con la pared posterior de la vagina.

metro-peritonitis, *s. f.* Inflamación del útero y del peritoneo.

metrorragia, *s. f.* (μήτρα; ῥήγνυμι, salgo con violencia). Hemorragia uterina que sobreviene fuera de las reglas.

metrorrea, *s. f.* (μήτρα; ῥεῖν, fluir). Flujo de líquido acuoso (líquido amniótico) ó mucoso por el útero.

metro-salpingo-ovario-peritonitis, *s. f.* Término genérico propuesto por Trélat para designar las varias lesiones que puede producir la inflamación del aparato genital de la mujer.

metroscopio, *s. m.* (μήτρα, útero : σκοπεῖν, examinar) (Naugh). Instrumento que por un extremo se introduce en el cuello uterino para escuchar los latidos del corazón del feto (poco usado).

metrotomía, *s. f.* (μήτρα; τομή, sección). Histerectomía.

Meynet (nudosidades de). Pequeños tumores subcutáneos, esféricos ú ovoides, movibles bajo la piel, de tamaño variable entre una lenteja y una ave-

llana, que se encuentran sobre todo en el vecindario de las articulaciones enfermas, en el reumatismo articular agudo. Están formadas por tejido conjuntivo en activa proliferación. Indicarían grave pronóstico.

meyopragia, *s. f.* Véase : *miopragia*.

mialgia, *s. f.* (μῦς, músculo; ἄλγος, dolor). Dolor muscular.

miasma, *s. m.* (μίασμα, de μιαίνειν, ensuciar). Nombre con que se designaba antes el principio, de naturaleza desconocida, causa de las enfermedades epidémicas y contagiosas (cólera, peste, tifus). Desde que los descubrimientos pastorianos han mostrado que la causa de dichas enfermedades es siempre un agente figurado, un microbio, ese término vago no tiene ya razón de ser.

miastenia, *s. f.* (μῦς, músculo; ἀ priv. σθένος, fuerza). Sensación de fatiga excesiva que sobreviene con ocasión de un esfuerzo muscular, sin que haya amiotrofia.

miastenia grave. Véase : *Erb* (*sindroma de*).

miatonía, *s. f.* (μῦς; ἀ priv.; τόνος, resorte). Ausencia ó destrucción de la tonicidad muscular. — Oppenheim ha descrito (1901) cierta *miatonía* que ataca sólo los músculos del tronco y de los miembros, y respeta los de la cara. No hay atrofia, mas los músculos no responden ni á excitaciones mecánicas, ni á corrientes eléctricas. Dicha afección estaría bajo la dependencia de los cuernos anteriores de la médula.

miatonía periódica. Véase : *parálisis periódica familiar*.

micción, *s. f.* (*mictio*, de *mingere*, orinar). Acción de orinar.

micela, *s. f.* (Nœgeli) (1877). Aglomeración de moléculas que debe considerarse como el mínimum de sustancia capaz de poseer todas las propiedades físicas de un cuerpo. Las moléculas de un cuerpo pueden agruparse en *micelas* que presentan propiedades físicas muy diferentes, de donde los fenómenos de alotropia y de polimorfia.

micelio, *s. m.* (μύκης, hongo). Filamentos más ó menos ramificados que provienen de esporos y sirven de raíces á los hongos.

micetoma, *s. m.* Véase: *Madura* (*pie de*).

micodermoterapia, *s. f.* Empleo terapéutico de las levaduras y particularmente de la levadura de cerveza.

micosis, *s. f.* (μύκης, hongo). 1° Nombre genérico de todas las afecciones parasitarias provocadas por hongos. — 2° Vocablo creado por Alibert para denominar afecciones caracterizadas por excrecencias ó tumores fungosos de la piel. — Actualmente no se usa más que en la expresión *micosis fungoide*, que designa una dermatosis especial, de naturaleza aún indeterminada (vecina del sarcoma), caracterizada primero por erupciones diversas, eritematosas ó exematiformes (período exematiforme), más tarde por la aparición de placas liquenoides, y finalmente, para terminar, por tumores de color rojo vivo, susceptibles de ulcerarse.

microbía ó **microbiología**, *s. f.* (microbio; βίος, vida; λόγος, discurso). Ciencia que estudia los microbios y en especial las bacterias.

microbio, *s m.* (μικρός, pequeño) (Sédillot, 1878). Nombre genérico dado á aquellos seres tan pequeños que no pueden ser claramente vistos sino por el microscopio. Designa, pues, además de las bacterias, otras especies, como las levaduras, infusorios, etc.

microbismo latente. Presencia en el organismo de microbios patógenos que no determinan desorden alguno durante una época más ó menos prolongada. Bajo la influencia de circunstancias favorables, pueden producir el desarrollo de enfermedades diversas.

microblasto, *s. m.* (μικρός; βλαστός, germen). Glóbulo rojo nucleado, de tamaño muy pequeño, que á veces se encuentra en las anemias traumáticas.

microcaulia, *s. f.* (μικρός; καυλός, tallo). Pequeñez congénita del pene.

microcefalia, *s. f.* (μικρός; κεφαλή, cabeza). Desarrollo del cráneo, y del cerebro, inferior al desarrollo normal. Está generalmente acompañada de idiotez.

microcito, *s. m.* (μικρός; κυτός, célula). Glóbulo rojo que ha sufrido la transformación vesiculosa.

micrococo, *s. m.* Véase : *coco*.

microdontismo, *s. m.* (μικρός; ὀδούς, ὀδόντος, diente). Detención del desarrollo de los dientes, que en el adulto conservan las dimensiones que presentan en el niño (sífilis hereditaria).

micrófago (**fagocito**) (μικρός; φαγεῖν, comer). Nombre dado á los fagocitos de pequeñas di-

mensiones. Tales son los leucocitos polinucleares neutrófilos y los eosinófilos.

micrófito, *s. m.* (μικρός; φυτόν, vegetal). Vegetal microscópico : microbio.

microftalmía, *s. f.* (μικρός; ὀφθαλμός, ojo) Anomalía congénita que consiste en la disminución de los diámetros todos del ojo.

microgastria primitiva (μικρός: γαστήρ, estómago) (Bendersky). Pequeñez del estómago probablemente debida á la interrupción del desarrollo; obsérvase principalmente en las mujeres y va acompañada de la hiperexcitabilidad de la mucosa gástrica (hipo, eructos, vomituriciones, etc.)

microglosia, *s. f.* (μικρός; γλῶσσα, lengua). Pequeñez de la lengua.

micrognatismo, *s. m.* Desarrollo incompleto del maxilar inferior, ya congénito (interrupción de desarrollo), ya adquirido. En este caso el *micrognatismo* es debido á la constricción de las mandíbulas por maniobras obstétricas, ó á una inflamación de la articulación temporo-maxilar en la infancia, ó, en fin, á una retracción cicatricial.

micrografía, *s. f.* (μικρός; γράφειν, describir). Descripción de los cuerpos que no se ven sino al microscopio.

microgiria, *s. f.* (μικρός; γῦρος, circonvolución). Pequeñez de las circunvoluciones cerebrales por atrofia ó interrupción del desarrollo.

micromelia, *s. f.* (μικρός; μέλος, miembro). Brevedad de los miembros que forma contraste con el desarrollo normal del tronco, observada en ciertas formas de enanismo (acondroplasia).

micrómetro, *s. m.* (μικρός; μετρεῖν, medir). Instrumento empleado en micrografía para la medida de los objetos de pequeña dimensión.

micron, *s. m.* (μικρός, pequeño). Unidad de medida adoptada en micrografía equivalente al milésimo del milímetro : se la representa por la letra griega μ.

micro-organismo, micro-parásito, *s. m.* Véase : *microbio.*

micropía ó **micropsia,** *s. f.* (μικρός; ὄψις, vista). Fenómeno subjetivo que consiste en creer más pequeños de lo que realmente son, los objetos que se presentan á la vista.

micropoliadenitis periférica ó **micropoliadenopatía** (Le-

groux). Inflamación crónica de los ganglios de la ingle, de la axila y del cuello, caracterizada por el gran número de ganglios atacados, la pequeñez de su volumen y su indolencia. Se la observa en diferentes septicemias crónicas de la primera infancia y principalmente en la tuberculosis.

microrquidia, *s. f.* (μικρός; ὄρχις, testículo). Pequeñez de los testículos acompañada de esterilidad.

microsfigmia, *s. f.* (μικρός; σφυγμός. pulso). Pequeñez del pulso.

microsoma, *s. m.* Véase : *citomicrosoma.*

microsomatia ó **microsomia,** *s. f.* Monstruosidad caracterizada por la pequeñez del cuerpo.

microspectroscopio, *s. m.* Ocular provisto de prismas que, sustituído en el microscopio al ocular ordinario, da la imagen del espectro.

micrósporon fúrfur. Hongo parásito, causa del *pitiriasis versicólor.*

micrósporon minutíssimum. Hongo parásito, causa del *eritrasma.*

microstesia, *s. f.* (μικρός; αἴσθησις, sensibilidad). Perturbación del tacto caracterizada por cierta alteración especial de las sensaciones de peso y de volumen : los objetos tenidos en la mano parecen menos pesados y menos voluminosos que lo que realmente son.

microtomo, *s. m.* (μικρός; τομή, sección). Instrumento empleado en micrografía para obtener cortes muy finos destinados á ser vistos al microscopio.

midriasis, *s. f.* (μυδρίασις. de ἀμυδρός. oscuro). Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris (parálisis del esfínter).

midriático, *adj.* y *s. m.* Se dice de las sustancias que producen la midriasis.

mielastenia, *s. f.* (μυελός, médula; ἀ, priv.; σθένος, fuerza). Sin. : *neurastenia espinal.* Forma clínica de la neurastenia en que predominan ora raquialgia, hiperestesia de la columna vertebral y dolores torácicos ó abdominales, ora dolores lancinantes, debilitamiento de los miembros inferiores, quebranto lumbar é impotencia genital, síndroma que lleva á pensar en el principio de la tabes.

mielencéfalo, *s. m.* (μυελός; ἐγκέφαλος, encéfalo). Centros nerviosos (médula y encéfalo).

mielitis, *s. f.* (μυελός, médula). Nombre dado á la

mayor parte de las afecciones intrínsecas de la médula espinal.

mielocito, *s. m.* (μυελός; κύτος, célula). Nombre dado á los leucocitos mononucleares granulosos cuyas granulaciones neutrófilas se tiñen con la mezcla triácida; son éstas las células normalmente más abundantes en la médula ósea. — *mielocito de Robin.* Véase: *neuroblasto.*

mielógena (leucemia). Véase: *leucemia mielógena.*

mielógeno (osteosarcoma). Véase: *osteosarcoma.*

mieloide (sarcoma). Sin.: *sarcoma con mieloplaxas.* Sarcoma rico en células angio-plásticas.

mieloides (tumores) (μυελός, médula; εἶδος, forma) (Paget). Tumores formados por los elementos del tejido medular óseo.

mieloma, *s. m.* Variedad de linfadenoma caracterizada por el predominio de los mielocitos.

mielomalacia, *s. f.* (μυελός; μαλακία, blandura). Reblandecimiento de la médula espinal, cuya causa generalmente es una arteritis infectiva (sífilis, fiebre tifoidea).

mielomatosis, *s. f.* Variedad de linfadenia caracterizada por la formación de mielomas.

mielómero, *s. m.* (μυελός, médula; μέρος, parte). Territorio cutáneo que tiene la forma netamente limitada de una banda, cuyos nervios están en relación con un neurotoma. Véase: *metameria cutánea.*

mielopatía, *s. f.* (μυελός; πάθος, enfermedad). Nombre genérico de todas las afecciones medulares.

mieloplaxa, *s. m.* (μυελός; πλάξ, placa). Sin.: *célula de núcleos múltiples* ó *célula gigante de la médula.* Enormes células (30 á 100 μ) formadas por una placa poligonal de protoplasma granuloso, que contiene muchos núcleos (5 á 20); se encuentran en la médula ósea.

mieloplaxoma, *s. m.* Tumor mieloide en que predominan los mieloplaxas.

miesosclerosis, *s. f.* (μυελός, médula; σκλήρωσις, endurecimiento). Esclerosis en placas.

mióitis, *s. f.* (μῦς, músculo). Véase: *miositis.*

mijo, *s. m.* Pequeños tumores blanco-amarillentos, de la dimensión de un grano de mijo, situados sobre el párpado y debidos al acúmulo de los productos de se-

creción de las glándulas sebáceas de esa región.

Mikulicz (drenaje y apósito ó cura de). Cura de las laparotomías destinada á asegurar el drenaje de la cavidad abdominal. Consiste en un saco de gasa que se introduce en el vientre más ó menos profundamente, y que se llena de vendas de gasa que desempeñan el papel de dren.

Mikulicz (enfermedad de) (1892). Hipertrofia de las glándulas lacrimales y de las glándulas salivares, con disminución ó suspensión de la secreción, que sobreviene súbitamente sin causa aparente y sin dolores locales. Estos desórdenes, que á veces terminan en la leucemia, dependerían de una infección.

milacéfalo, *s. m.* (μύλη, masa; ἀ priv.; κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo acéfalo cuyo cuerpo no es sino una masa informe, indescriptible.

miliar (aneurisma). Pequeñísimas aneurismas, de diámetro variable entre 2 décimos de milímetro y 1 milímetro, situadas sobre las arteriolas del cerebro, cuya ruptura provoca la hemorragia cerebral.

miliar (erupción) (*milium*, grano de mijo). La erupción que sobreviene á consecuencia de abundantes transpiraciones y que constituye con la sudámina el grupo de las erupciones sudorales. Está formada de menudas vesículas semejantes al grano de mijo y rodeadas de una pequeña areola rosada; el contenido de la vesícula es al principio límpido, mas, puede enturbiarse (*miliar blanca*) y aún volverse purulento (*miliar amarilla*). Estas vesículas las consideran la mayor parte de los autores como quistes sudoríparos, debidos á la retención del sudor, á causa de haber tapado la epidermis el orificio del canal glandular.

miliar (fiebre). Véase: *sudor miliar.*

mílium, *s. m.* Véase: *grútum.*

Millard (asma de). Laringitis estridulosa.

Millard-Gubler (síndroma de) (1855). Sin.: *hemiplejia alterna.* Asociación de la parálisis facial de un lado y de una hemiplejia de los miembros del lado opuesto (hemiplejia alterna). Este sindroma es debido á una lesión bulbo-protuberancial.

mimetismo, *s. m.* (μιμέομαι, imito). Procedimiento defensivo que usan ciertas especies animales,

las cuales toman el aspecto de otras especies mejor protegidas, aprovechándose de la confusión con ellas para evitar los ataques enemigos. El *mimetismo* es, pues, distinto de la *homocromia*, que consiste en que el animal únicamente toma el color del medio ambiente.

minerva, *s. f.* Nombre dado en cirugía ortopédica á los aparatos destinados á mantener la cabeza en buena posición, en los casos de tortícolis muscular permanente y de artritis de las articulaciones vertebrales.

minorativo, *adj.* y *s. m.* Purgante suave que no provoca cólicos ni trastorno general.

mioblasto, *s. m.* (μῦς, músculo; βλαστός, célula). Célula de origen mesodérmico situada primitivamente en la capa cortical de las prevértebras (láminas musculares), destinada á transformarse en fibras musculares estriadas.

miocarditis, *s. f.* (Sobernheim). Nombre genérico de todas las inflamaciones del miocardio : *miocarditis aguda* (de origen infectivo ó tóxico); y *miocarditis crónica* (*m. esclerosa*, cirrosis cardíaca).

miocimia, *s. f.* (μῦς, músculo; κῦμα, ondulación) (F. Schultze). Sindroma caracterizado por la existencia de contracciones musculares semejantes á la mioclonia; mas, de ésta se distingue por el carácter ondulatorio y por la coexistencia de perturbaciones de la sensibilidad.

mioclonia, *s. f.* (μῦς, músculo; κλόνος, agitación). Sin. : *corea eléctrica*. Contracciones musculares clónicas, bruscas, semejantes á las sacudidas producidas por el choque eléctrico, involuntarias, no sistematizadas, mas ó menos diseminadas, que se repiten á intervalos variables. Es el síntoma principal de diversas afecciones nerviosas (*paramyoclonus múltiplex*, *corea de Bergerón*, *etc*).

miocronoscopio, *s. m.* (μῦς, músculo; χρόνος, tiempo, σκοπεῖν, examinar) (Czermak). Instrumento que sirve para medir la velocidad de propagación de la excitación nerviosa hasta los músculos.

miodesopsia, *s. f.* Véase : *moscas volantes*.

miodinia, *s. f.* (μῦς, músculo; ὀδύνη, dolor). Dolor muscular.

mioedema ó **mioidema**, *s. m.* (μῦς, músculo; οἴδημα, hinchazón). Contractilidad idio-muscular : nudosidad producida

sobre un músculo superficial, del que se contraen aisladamente algunas fibras. Se provoca el fenómeno excitando con un choque ó una fricción bruscos los músculos del brazo ó del tórax, en gran número de enfermos (tísicos, tíficos, etc.).

miognato, *s. m.* (μῦς; γνάθος, mandíbula) (I. G. St.-Hilaire). Monstruo doble en quien la cabeza supernumeraria se halla adherida al maxilar inferior del autósito por músculos y piel.

miógrafo, *s. m.* (μῦς; γράφειν, trazar). Aparato registrador destinado á inscribir las contracciones musculares, amplificándolas para facilitar su estudio.

mioide, *adj.* (μῦς; εἶδος, forma) Se dice á veces de los tumores constituídos por tejido muscular liso.

miolisis, *s. f.* (μῦς; λύειν, disolver) (Marinesco). Resolución de la fibra muscular en sus elementos constitutivos (comienzo del proceso miopático).

mioma, *s. m.* (μῦς, músculo). Tumor formado por tejido muscular. — Los *miomas* se dividen en *miomas* constituídos por tejido muscular estriado ó *rabdomiomas*, muy raros, y *miomas* constituídos por tejido muscular liso ó *liomiomas*, frecuentes, situados en regiones en que existen fibras musculares lisas, y particularmente en el útero (*fibromioma*).

miomectomía, *s. f.* (mioma; ἐκτομή, excisión). La extirpación de un fibromioma por la vía peritoneal dejando el útero en su lugar.

miómero, *s. m.* (μῦς; μέρος, parte). Sin.: *miotoma* ó *segmento muscular*. Serie de segmentos de origen mesodérmico, que se disponen en el embrión á lo largo del tubo medular y de cada lado de éste. Cada segmento corresponde á un metámero y da origen al conjunto de músculos estriados que estarán situados entre dos vértebras definitivas.

miomotomía, *s. f.* (mioma; τομή, sección). La extirpación de los fibromiomas uterinos, á pedazos, por la vía vaginal (*histerotomía vaginal*).

miopatía, *s. f.* (μῦς, músculo; πάθος, enfermedad). Nombre colectivo de las afecciones del sistema muscular.

miopatía primitiva progresiva (Charcot). Sin.: *miopatía atrófica progresiva* (Landouzy y Déjerine), *distrofia muscular progresiva* (Erb). Afección ordinariamente hereditaria ó

familial, caracterizada clínicamente por debilitamiento progresivo, luego atrofia, aparente ó no, de ciertos grupos musculares repartidos simétricamente; anatómicamente por lesiones limitadas al músculo mismo (atrofia de la fibra estriada con ó sin proliferación conjuntiva ó adiposa intersticial), sin lesión apreciable del sistema nervioso central ó periférico; y etiológicamente por la ausencia, fuera de la herencia, de toda causa conocida.

miopática (facies). Aspecto particular de la cara de ciertos enfermos, atacados de miopatía primitiva progresiva (tipo facio-escápulo-humeral de Landouzy-Dejerine), debido á la atrofia de los músculos de la cara: la fisonomía está inmóvil, indiferente, semejante á la del idiota; la piel lisa, los ojos muy abiertos; los párpados no pueden cerrarse por completo, la boca se ensancha, etc.

miopía, *s. f.* (μύειν, parpadear; ὤφ, ojo). Anomalía de la refracción estática que consiste en que los rayos luminosos paralelos convergen en un punto situado por delante de la retina, si la acomodación no interviene.

mioplasma, *s. m.* Sin.: *plasma muscular*. Líquido obtenido triturando y sometiendo á la prensa músculos enfriados por debajo de 0°. El *mioplasma* se coagula y se divide en un coágulo retráctil (miosina) y una parte líquida (suero muscular).

mioplastia, *s. f.* (μῦς, músculo; πλάσσειν, formar) (Schwartz, 1892). Procedimento operatorio que consiste en cerrar el orificio del anillo, en la cura radical de la hernia crural, por medio de un colgajo muscular tomado de los músculos vecinos.

mioplejia familial (Oddo y Audibert, 1904). Véase: *parálisis familial periódica*.

miopragia, *s. f.* (μείων, menor; πράσσειν, ejecutar) (Potain). Estado del órgano que, á consecuencia de una lesión anterior, se halla en inferioridad funcional.

miopsiquia, *s. f.* (μῦς, μυός, músculo; ψυχή, alma). Nombre genérico con el que Joffroy (1902) reúne todas las afecciones nerviosas en que coexisten de ordinario trastornos motores y síquicos: corea de Sydenham, corea de Húntington, enfermedad de Párkinson, de Thomsen, de Friedreich, siringomielia, amiotrofias, tics.

miorrafia, *s. f.* (μῦς, músculo; ῥαφή, sutura). Sutura muscular.

miosalgia, *s. f.* (μῦς; ἄλγος, dolor). Sin.: *mialgia*. Dolor muscular.

miosina, *s. f.* Sin.: *fibrina muscular*. Producto de la coagulación muscular. En el músculo muerto la *miosina* es la que determina la rigidez cadavérica. Véase: *mioplasma*.

miosis, *s. f.* (μύειν, parpadear). Estrechez permanente de la pupila, con inmovilidad más ó menos completa, proveniente de la turbación de la inervación del iris.

miositis, *s. f.* (μῦς, μυός, músculo). Sin.: *mitis*. Inflamación del tejido muscular.

miositis osificante progresiva. Afección muy rara, caracterizada por la osificación progresiva de los diferentes músculos.

miospasia, *s. f.* ó **miospasmo**, *s. m.* (μῦς; σπάω, contraigo) (Marina, 1888). Nombre genérico propuesto para designar las diversas afecciones nerviosas que se manifiestan con espasmos.

miosteoma traumático (μῦς; ὀστέον, hueso) (Cahier). Osteoma muscular adherente ó no al esqueleto, consecutivo á un traumatismo directo ó indirecto, y que sería debido á una miositis osificante.

miosuero, *s. m.* (μῦς; suero) (Richet). Sin.: *suero muscular*. Jugo de carne obtenido por compresión, provisto, según Richet, de propiedades curativas de la tuberculosis experimental del perro. Véase: *zomoterapia*.

miotexia, *s. f.* (μῦς; τῆξις, fusión) (Marinesco). Fusión de las fibras y fibrillas musculares, con desaparición del mioplasma (segundo tiempo del proceso miopático, del que el primero es la miolisis).

miótico, *adj.* (μύειν, parpadear) Se aplica á las sustancias que producen miosis.

miotomía, *s. f.* (μῦς, músculo; τομή, sección). Sección de los músculos. Tenotomía.

miotomía vaginal à pedazos. Sin.: *operación de Peán*. La extirpación del útero en fragmentos por la vía vaginal. Se practica en los casos de fibromiomas de volumen mediano.

miotomo, *s. m.* (μῦς, músculo; τέμνειν, cortar). 1° Tenotomo. — 2° Véase: *miómero*.

miotonía adquirida (Talma). Afección de corta duración, curable, caracterizada por la reacción miotónica y por calambres que sobrevienen después de esfuerzos prolongados.

miotonía congénita (Erb). Véase: *Thomsen (enfermedad de)*.

miotónica (reacción) (Erb). Turbación particular de la excitabilidad eléctrica de los músculos, que consiste sobre todo en modificaciones cualitativas de la forma de las contracciones (éstas son más lentas en producirse y persisten por más tiempo que normalmente), y también en modificaciones cuantitativas: la excitabilidad se halla aumentada, la galvánica también lo está un poco; pero, hay inversión de la fórmula como en la reacción de degeneración.

miringitis, *s. f.* (*miringa*, tímpano, corrupción de μηνιγξ, membrana). Inflamación del tímpano.

miringotomía, *s. f.* (*miringa*, tímpano; τομή, sección). Incisión del tímpano.

misantropía, *s. f.* (μίσος, odio; ἄνθρωπος, hombre). Aversión por los hombres y por la sociedad, síntoma de hipocondría.

misoginia, *s. f.* (μίσος, odio; γυνή, mujer). Repulsión mórbida del hombre hacia las relaciones sexuales, ó simplemente por la sociedad de las mujeres.

mitacismo, *s. m.* (μῦ, *m*). Vicio de pronunciación que consiste en sustituir las letras *m*, *p*, *b*. á otras letras.

mitoma, *s. m.* (μίτος, filamento). Véase: *citomitoma*.

mitomanía, *s. f.* (Dupré). Propensión patológica, más ó menos voluntaria y consciente, á decir mentira y á crear fábulas (histéricos, niños, etc.).

mitósica (división). Véase: *cariocinesis*.

mitosis, *s. f.* (μίτος, pelotón). Véase: *cariocinesis*.

mitral (facies). Aspecto particular de los enfermos de estrechez mitral: cara colorada, surcada de pequeñas venosidades, labios fácilmente violáceos, y frecuencia del acné ó la caparrosa.

mitridatismo, *s. m.* (alusión á la leyenda de Mitrídates, quien se había habituado á los venenos). Inmunidad para con venenos minerales ó vegetales, adquirida por la administración de esos venenos, primero á dosis mínimas fácilmente

toleradas, luego á dosis progresivamente crecientes.

miuro (pulso). Véase: *pulso miuro.*

mixedema, *s. m.* (μύξα, mucosidad; αἴδημα, hinchazón). Afección caracterizada clínicamente por la infiltración mucosa de los tegumentos y por desórdenes intelectuales, y anatómicamente por la atrofia completa de la glándula tiroide. Es debida á la supresión de la función tiroidea. — Distínguense tres variedades: 1° *mixedema espontáneo de los adultos* ó *caquexia paquidérmica;* 2° *mixedema congénito* ó *idiotez mixedematosa;* 3° *mixedemá operatorio* ó *caquexia estrumipriva.*

mixocondroma, *s. m.* (μύξα, mucosidad; χόνδρος, cartílago). Tumor mixto formado de tejido conjuntivo y de tejido mucoso, que frecuentemente evoluciona como tumor maligno.

mixoma, *s. m.* Tumores formados de tejido mucoso; sucesivamente se los ha llamado *tumores coloides* ó *gelatiniformes,* por su aspecto. Actualmente se los tiene más bien como sarcomas.

mixosarcoma, *s. m.* Tumor constituído por tejidos múltiples, entre los cuales tejidos mucoso y sarcomatoso, y que para ciertos autores se confunde con el *cilindroma.*

mixtura, *s. f.* (*miscere,* mezclar). Preparación farmacéutica compuesta de la mezcla de varios medicamentos. Se reseva generalmente este nombre á las mezclas que contienen sustancias muy activas, y por lo tanto destinadas á ser tomadas por pequeñas dosis, particularmente por gotas.

miyasis, *s. f.* (μυία, mosca). Afección causada por las larvas de ciertos dípteros (*lucilia hominivórax,* etc). Estos insectos depositan sus huevos sobre las heridas ó en las cavidades naturales; las larvas, desarrollándose en seguidas, traen la aparición de tumores forunculosos y de supuraciones múltiples.

miyodopsia, *s. f.* (μυιώδης, semejante á las moscas; ὄψις, vista). Véase: *moscas volantes.*

moco, *s. m.* (*mucus,* de *mungere,* sonarse). Sustancia segregada por las glándulas mucosas y las células caliciformes ó células glandulares. Es insoluble en alcohol y éter, soluble en agua, y no se tiñe con los reactivos colorantes.

moco-pus, *s. m.* Moco

con la apariencia de pus, á causa de la abundancia de leucocitos contenidos en él.

Mœbius (enfermedad de). Véase : *jaqueca oftalmopléjica* y *akinesia álgera.*

Mœbius (signo de). Dificulta de la convergencia de los ojos, observada en la *enfermedad de Basedow.*

Mœbius (sindroma de). Véase : *akinesia álgera.*

Mœller-Barlow (enfermedad de) Véase : *Barlow* (*enfermedad de*).

mogifonía, *s. f.* (μόγις, con dificultad; φωνή, palabra). Trastorno de la fonación especial á los profesionales de la voz. Consiste en la impotencia vocal rápidamente creciente, acompañada de sensación penosa de constricción gutural, que se presenta sólo durante el ejercicio profesional de la voz. La *mogifonía* coincide con el relajamiento de las cuerdas vocales.

mogigrafía, *s. f.* (μόγις, con dificultad; γραφειν. escribir) (Hirsch). Calambre de los escribanos. Véase : *espasmo funcional.*

mola, *s. f.* **mola hidatiforme** ó **vesicular** (*moles*, masa). Los antiguos daban el nombre de *mola* á cierto número de cuerpos muy diversos que podían ser expelidos por el útero; fibromioma, pólipo, restos placentarios, coágulos modificados, etc. — Actualmente se reserva este nombre para una degeneración quística muy rara de las vellosidades coriales del huevo. Preséntase bajo la forma de un racimo de pequeñas vesículas reunidas por filamentos muy tenues y contenidas en una membrana Esta degeneración, por lo demás, puede no atacar sino parte de la placenta. Su aspecto ha hecho que se le dé el nombre de *mola hidatiforme* ó *vesicular.*

mólimen, *s. m.* (*moliri*, hacer esfuerzo). Conjunto de trastornos mórbidos que preceden y preparan un fenómeno crítico (la naturaleza parece que hiciera un esfuerzo para realizar dicha crisis). Ej. : *mólimen hemorrágico* : palpitaciones, vértigos, irregularidades del pulso, que preceden la hemorragia.

molino (ruido de) (Bricheteau). Clapoteo sonoro y rimado análogo al ruido de los batanes de un molino de agua, que se percibe en la región cardiaca en los casos de hidroneumopericardias.

mollúscum, *s. m.* Sin.

fibroma mollúscum, mollúscum verdadero. Tumor fibroso de la piel, cuyo tamaño varía del de un grano de mijo al de un huevo y, aún más, al de una cabeza de feto. En general, existe gran número de esos tumores diseminados en toda la superficie cutánea (*mol. generalizado*); por lo contrario á veces no se ve sino pequeño número de ellos (*mol. circunscrito*).

mollúscum contagiósum (Bateman). Sin.: *acné varioliforme* (Bazin). Afección cutánea, que en ciertas condiciones es contagiosa é inoculable, caracterizada por pequeñas prominencias de color blanco mate ó rosado, del tamaño de una perla, cuyo vértice está deprimido en ombligo. Dicho tumor contiene una masa blancuzca semi-sólida que se puede hacer salir por compresión, á través de la depresión umbilicada.

mollúscum péndulum. Véase: *acrocordon.*

momificación, *s. f.* Transformación de un cadáver en momia, ó, más generalmente, desecación de los tejidos animales que les permite resistir á la putrefacción. La gangrena seca puede provocar la *momificación* de una parte del cuerpo (falange, dedo, más rara vez del pie entero).

monáster (estadio de) (μόνος, solo; ἀστήρ, astro). Estadio de la cariocinesis caracterizado por la formación de una estrella cromática sobre el ecuador del huso acromático.

mongolismo, *s. m.* (Langdon Down)(1866). Sin.: *idiotez mongólica.* Variedad de idiotez congénita en que el niño presenta una facies chinesca: cara redonda, cabeza braquicéfala, ojos oblicuos ó embridados, con epicanto. Dicha afección sería muy distinta del mixedema, á pesar de las muchas analogías que existen entre los dos estados mórbidos.

moniléthrix, *s. f.* (*monile*, collar; θρίξ, pelo). Afección del sistema piloso, rara y poco conocida, caracterizada por el hecho de que los pelos toman el aspecto moniliforme á la vez que se ponen secos y quebradizos. Según ciertos autores (Besnier), es una anomalía del desarrollo del pelo que puede observarse en gran número de enfermedades y particularmente en la pelada.

moniliforme, *adj.* (*monile*, collar; *forma*). Se dice del canal ó cordón que presenta una serie de es-

trangulamientos que le hacen semejar á un rosario.

monocefaliano, *s. m.* (μόνος. solo; κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Familia de monstruos que comprende « todos aquellos monstruos dobles autositarios en que una cabeza doble, sin traza exterior alguna de duplicidad, se halla situada sobre dos cuerpos más ó menos íntimamente confundidos y en una extensión más ó menos grande ».

monocular, *adj.* (μόνος, único; *oculus*, ojo). Que resulta del empleo de un solo ojo. Ej. : *visión monocular*, *diplopia monocular*.

monodérmico (blastodermo) (μόνος, solo; δέρμα; piel). Véase : *blástula*.

monofobia, *s. f.* (μόνος; φόβος, temor). Aprehensión angustiosa que ciertos neurópatas experimentan en la soledad.

monogénesis, *s. f.* (μόνος; γένεστις, generación) (Van Beneden). Nombre dado á la *generación directa*, en que los individuos se reproducen sólo por huevo ú óvulo, por contraposición á la *digénesis* ó *generación alternante*. — Adjetivadamente se dice : los vertebrados son *monogenésicos*.

monogenismo, *s. m.* (μόνος; γένος, raza). Doctrina antropológica según la cual todas las razas humanas serían derivadas de un solo tipo primitivo.

monoideísmo, *s. m.* Predominio de una sola idea durante la atención.

monomanía, *s. f.* (μόνος, solo; μανία, locura) (Esquirol). Sin. : *delirio parcial*. « Lesión parcial de la inteligencia, de las afecciones ó de la voluntad. » (Esquirol). Se observa en la degeneración mental y se manifiesta ordinariamente bajo forma de obsesiones, de impulsiones, de temores irresistibles (locura de la duda, fobias diversas, etc.)

mononfaliano, *s. m.* (μόνος; ὀμφαλός, ombligo) (I. G. Saint-Hilaire). Familia de monstruos dobles con un ombligo común.

mononuclear, *adj.* Se aplica á la célula que no posee sino un núcleo. Ej. : *leucocito mononuclear* (por contraposición al *leucocito polinuclear*, que parece tener muchos núcleos). — *s. m.* leucocito mononuclear.

mononucleosis, *s. f.* Variedad de leucocitosis en que los leucocitos cuyo número ha aumentado son principalmente los mononucleares.

monoplejia, *s. f.* (μόνος, solo; πλησσεῖν, herir). Parálisis localizada en un solo miembro ó en un solo grupo muscular.

monopsia, *s. f.* (μόνος; ὤψ, ojo). Véase : *ciclopia.*

monorquidia, *s. f.* (μόνος; ὄρχις, testículo). Anomalía que consiste en la presencia de un solo testículo en el escroto, por haberse detenido la otra glándula en su desarrollo ó en su emigración.

monosomiano, *s. m.* (μόνος; σῶμα, cuerpo) (I. G. Saint-Hilaire). Familia de monstruos dobles cuyos dos cuerpos se hallan íntimamente fundidos el uno en el otro; empero, presentan dos cabezas más ó menos separadas.

monotermia, *s. f.* (μόνος; θερμή, calor) (Gilbert y Lereboullet, 1905). Identidad de la temperatura vesperal con la matinal. El enfermo no presenta sino una sola temperatura; anomalía observada en afecciones biliares y gastro-intestinales.

monotrico, *s. m.* (μόνος; θπίξ, cabello) (Ellis). Variedad de bacilos que presentan una sola pestaña vibrátil en uno de los extremos.

monstruo, *s. m.* **monstruosidad,** *s. f.* (*monstrare*, mostrar). « Las monstruosidades son desviaciones del tipo específico, complexas, muy graves, viciosas, aparentes al exterior y congénitas. » (I. G. Saint-Hilaire).

Morax (diplo-bacilo de). Microbio específico de la conjuntivitis sub-aguda ó blefaro-conjuntivitis.

morbicidad, *s. f.* (*morbidus*, de *morbus*, enfermedad). Estado de enfermedad. Suma de las enfermedades que ha padecido un individuo ó un grupo de individuos en un tiempo dado.

mórbido, morbífico, morboso, *adj.* Lo que pertenece á la enfermedad ó la ocasiona.

morbilloso, *adj.* (*morbilli*, sarampión). Que se refiere al sarampión.

morbo, *s. m.* (*morbus*). Enfermedad. — *morbo comicial.* Epilepsía. — *morbo gálico*, Sífilis. — *morbo real* ant. Lepra. — *morbo regio.* Ictericia.

morbus coxæ senilis. Variedad de artritis seca que ataca la articulación coxo-femoral.

mordicante (calor) (*mordicare*, picotear). Sensación particular de picazón que experimenta la mano al tocar la piel de ciertos febri-

citantes (calor acompañado de sequedad).

morfea, *s. f.* Sin. : *esclerodermia en placas.* Afección caracterizada por la aparición de una placa única ó múltiple, blanconacarada, fina, redondeada y rodeada de un anillo color lila característico.

morfinismo, *s. m.* (Laborde). Intoxicación crónica por la morfina ó por sus sales.

morfinomanía, *s. f.* Hábito mórbido de la morfina : la necesidad del medicamento hase transformado poco á poco en una impulsión tanto más imperiosa cuanto más fuerte es la intoxicación.

morfogenia, *s. f.* (μορφή, forma; γεννᾶν, producir) (Serres). Leyes de la producción de la forma de los órganos y de los seres, durante la evolución.

morfología, *s. f.* (μορφή, forma; λόγος, descripción). Descripción de la forma exterior de los animales y de los vegetales, de sus órganos ó partes de órganos.

Mórison-Talma (operación de). Véase : *Talma (operación de).*

morriña, *s. f.* Enfermedad contagiosa é inoculable especial de los ovideos, caracterizada por una erupción pustulosa sobre la piel y diversas mucosas. Accidentalmente, puede transmitirse al buey, al caballo, al puerco y aún al hombre. Se asemeja á la vacuna en algunos caracteres, mas no puede identificarse con ella.

mortalidad, *s. f.* Nombre dado en demografía á la relación que existe entre el número de las muertes y el guarismo de población en que se han producido, en cierto tiempo determinado (generalmente el año medio, unidad de tiempo).

mortificación, *s. f.* Gangrena.

mortinatalidad, *s. f.* Nombre dado en demografía á la relación que existe entre el número de los muertos al nacer y el guarismo total de los nacimientos.

Morton (pie de ó enfermedad de). Véase : *metatarsalgia.*

Morton (tos de). Sin. : *tos emetizante.* Acceso de tos seguido de vómitos alimenticios que se observa en la tuberculosis pulmonar.

mórula, *s. f.* Nombre dado al huevo en plena segmentación, siempre que la cavidad de segmentación no se haya formado aún ó lo esté apenas.

Morván (corea de). Véase : *corea fibrilar.*

Morván (enfermedad de) (1883). Sin. : *panadizo analgésico*. Afección caracterizada por trastornos nerviosos de los miembros y sobre todo de los dedos (paresia, anestesia, neuralgia), luego por desórdenes tróficos, como el panadizo analgésico, y finalmente por terminar en la necrosis. Algunos antores la consideran como forma atenuada de la lepra.

mosca (ruido de). Ruido vascular de timbre elevado que se produce en la yugular externa y se oye cuando se apoya ligeramente el estetescopio sobre dicha vena en los cloróticos.

moscas, *s. f pl.* Los dolores del principio del parto, que corresponden al período de desaparición del cuello. Son cortos y recuerdan más ó menos la desagradable sensación producida por las picaduras de moscas.

moscas volantes. Sin. : *miyodopsia, miodesopsia*. Fenómeno subjetivo que consiste en la aparición de puntos brillantes en el campo visual. Estas manchas son debidas á elementos del cuerpo vítreo que proyectan su sombra sobre la retina.

mosqueteadura, *s. f.* (calco de *moucheture*). Escarificación ligera hecha con la punta de una lanceta, sin pasar del espesor del dermo y cuyo objeto es abrir salida á la serosidad del edema.

motilidad, *s. f.* (*motus*, movimiento). Facultad de moverse

motilidad suplida de Letievant. Movimientos producidos por grupos musculares vecinos de los músculos paralizados, y destinados á poner remedio á la inacción de éstos. Dichos movimientos pueden hacer creer en que la parálisis es incompleta.

motor (neurona). El conjunto de una célula nerviosa motora, ya medular, ya cerebral, sus prolongamientos protoplasmáticos y su cilindro-eje hasta las ramificaciones terminales.

motricidad, *s. f.* (*motus*, movimiento). Propiedad que poseen los centros nerviosos de provocar la contracción muscular.

moxa, *s. f.* Procedimiento de cauterización, abandonado hoy por completo, que consiste en la aplicación sobre la parte del cuerpo que se desea cauterizar, de una sustancia que allí se hace quemar lentamente.

mucílago, *s. m.* Medicamentos en que entra una solución de goma en agua,

destinada á darles consistencia espesa y viscosa.

mucina, *s. f.* Sustancia transparente, hialina, semilíquida, no coagulable por el calor, pero sí por el ácido acético; es elaborada por las células del tejido mucoso y acumulada en el espacio interpuesto entre estas células.

mucinasa ó **mucinasis**, *s. f.* (Roger). Fermento existente en la mucosa intestinal y que determina la coagulación del moco.

mucocele, *amb.* (μύξα, mucosidad; κήλη, tumor). 1° Tumor compuesto de moco (Littré). — 2° Tumor formado por el saco lacrimal cuando los conductos lacrimales no están permeables, y cuando el canal nasal se halla igualmente obstruído.

múcoro-micosis, *s. f.* Nombre dado por Klissitch á infecciones experimentales que provoca inyectando esporos de diversas mucoráceas á conejos ó á cochinillos de India.

mucosa (fiebre). Nombre dado antes á ciertas formas ligeras de la fiebre tifoidea.

mucosa (placa). Lesión sifilítica secundaria, que aparece sobre las mucosas y sobre la piel que cubre las partes vecinas de un orificio (boca, ano, vulva). Es una erosión superficial del corion mucoso, que á veces sobresale más ó menos. Su color es rojo opalino; á veces está cubierta por un exudado difteroide.

mucosidad, *s. f.* Sin.: *glera*, *flema*. La sustancia espesa y viscosa que en masas pequeñas tapiza ciertas mucosas. Está en gran parte compuesta de moco concreto, y de algunas células descamadas, microbios y polvo.

mucoso (estertor). Variedad de estertor subcrepitante. Véase: *subcrepitante* (*estertor*). — Este término lo emplean principalmente los autores que reservan el de subcrepitante para los estertores de retorno de la neumonía.

mucronal, *adj.* Véase: *apexiano*.

mudez, *s. f.* Véase: *sordera*.

muermo, *s. m.* (*morbus*, enfermedad, pues el muermo es la enfermedad por excelencia del caballo. Littré). Enfermedad contagiosa é inoculable, causada por un microbio especial (bacilo del muermo), particular á los equídeos, pero susceptible de trasmitirse al hombre y á diferentes especies animales; se manifiesta clínicamente por fenómenos generales graves, colecciones

purulentas cutáneas ó subcutáneas, y una inflamación de las fosas nasales con cierto flujo nasal (*jetaje*) que constituye el fenómeno característico. Cuando las fosas nasales no son atacadas, la enfermedad toma el nombre de *farcino* (lamparones).

muguete, *s. m.* (francés *muguet*, llamado así á causa de su color blanco como el de la flor del lirio de ese nombre ó lirio de los valles). Sin.: *estomatitis cremosa*. Enfermedad parasitaria debida al desarrollo sobre ciertas mucosas (particularmente en la boca y á veces en la faringe) de un microorganismo, *saccharomyces ú oídium álbicans*. El muguete se presenta bajo la forma de placas más ó menos extensas, blanco-cremosas, y acompañadas de reacción ácida de la saliva. Muéstrase sobre todo en los niños atrépsicos y en los viejos urinarios (prostatitis, cistitis, etc.).

Mules (operación de). Ablación de la córnea y evacuación completa de todo el contenido del ojo, con conservación de la esclerótica y del aparato muscular, é inserción en la esclerótica de un globo de vidrio ó de plata.

muletas (parálisis de las). Parálisis del nervio radial y á veces de otras ramas del plexo, determinada por la compresión ejercida sobre el tronco nervioso, á su paso por el hueco axilar, por una muleta.

Müller (líquido de). Líquido que sirve para la fijación y endurecimiento de las piezas anatómicas destinadas á los cortes microscópicos. Su composición es la siguiente: bicromato de potasa 2 á 2 ½, sulfato de soda 1, agua 100.

Müller (ley de). Ley según la cual todo tumor está constituído por un tejido que tiene su análogo en el organismo normal, ya en estado embrionario, ya en estado de completo desarrollo.

multíparo, *adj.* (*multus*, mucho; *parere*, parir). Se aplica á la mujer que ha tenido varios hijos.

muñón, *s. m.* Porción del miembro amputado comprendida entre la cicatriz y la articulación que queda inmediatamente por encima.

murmullo asistólico (Parrot). Murmullo suave que se percibe en el primer tiempo en el borde izquierdo del esternón, y se propaga hacia arriba y á la izquierda; existe bastante á menudo en la asistolía.

murmullo respira-

torio ó **vesicular.** Ruido que se percibe cuando se aplica el oído contra el pecho de un hombre sano y que respira naturalmente. Es « un ligero murmullo análogo al que produce una persona dormida apaciblemente que lanza un suspiro profundo ». (Barth y Roger.)

murmullo rotatorio. Sin. : *ruido muscular.* Ruido sordo causado por la contracción muscular.

musitación, *s. f.* (*mussitare*, murmurar). Movimiento de los labios que se observa en ciertas enfermedades graves con fenómenos cerebrales.

Musset (signo de) (Delpeuch). Sacudidas rítmicas de la cabeza en los enfermos atacados de insuficiencia aórtica (se dice que Alfredo de Musset, fue el primero que notó este signo en él mismo). Se le ha observado igualmente en el aneurisma del cayado de la aorta y en el bocio exoftálmico.

mutismo, *s. m.* (*mutus*, mudo). Estado del individuo que no articula palabra alguna. Término general que comprende el *mutismo* voluntario de los enajenados y de los simuladores, el *mutismo* temporal de los sordos que aprenden á hablar, el *mutismo* por suspensión de desarrollo cerebral de los idiotas, cretinos, etc.

Mya (enfermedad de). Véase : *Hirschsprung* (*enfermedad de*).

N

Nægele (pelvis de) (1841) (obstetricia). Pelvis oblicua ovalar : deformación caracterizada por la interrupción del desarrollo de una mitad de la pelvis, la sinostosis de la articulación sacro-ilíaca y la deformación por el enderezamiento de la curvatura anteroposterior de ese lado.

nævus, *s. m.* (en latin, marca, mancha). Deformidad congénita de la piel, que consiste en una alteración de color y de textura, ordinariamente permanente y limitada á mayor ó menor extensión del tegumento externo. — Hay dos especies de *nævus* : los *nævi pigmentarios* y los *nævi vas-*

culares. Mas, es necesario saber que muchos autores han empleado esta voz como sinónimo de *tumor eréctil* (angioma prominente ó cavernoso), ya sea éste congénito, ya aparezca en una época más ó menos distante del nacimiento.

nagana, *s. f.* Tripanosomiasis que ataca á los bovideos y equídeos del Africa y que les es inoculada por la mosca tse-tsé.

nanismo, *s. m.* (νάνος, enano). Anomalía del ser humano caracterizada por la exigüidad de todas sus dimensiones y, más particularmente, de la estatura.

nanocefalia, *s. f.* (νάνος, enano; κεφαλή, cabeza). Anomalía caracterizada por la exigüidad de la cabeza, en su totalidad ó sólo en algunas de sus partes.

nanomelia, *s. f.* (νάνος, enano; μέλος, miembro). Anomalía caracterizada por la brevedad (nanismo) de uno ó varios miembros, en su totalidad ó solo en uno de los segmentos.

narcolepsia, *s. f.* (νάρκη, adormecimiento; λεπτικός, que toma) (Gélineau, 1880). Síntoma que consiste en la exageración patológica de la necesidad de dormir y se manifiesta por la tendencia irresistible al sueño, que sobreviene por accesos. Obsérvase en los obesos, los diabéticos y sobre todo en los histéricos y los epilépticos.

narcosis, *s. f.* (νάρκωσις, adormecimiento) Sueño. Con esta voz se designa sobre todo el sueño artificial, Ej. : *narcosis clorofórmica*.

narcótico, *adj.* y *s. m.* (νάρκη, adormecimiento). Sin. : *estupefaciente, somnífero, sedativo*. Las sustancias que producen adormecimiento, resolución muscular y cierto entorpecimiento de la sensibilidad susceptible de llegar hasta la anestesia.

narcotismo, *s. m.* Conjunto de los efectos producidos por las sustancias narcóticas.

narcotismo de los negros. Véase : *sueño* (*enfermedad del*).

nasal (índice) (antropología). Relación que existe, en el esqueleto, entre la anchura máxima del orificio anterior de la nariz y su altura tomada de la espina nasal al punto nasal.

nasal (punto) (antropología). Punto situado en la raíz de la nariz en el medio de la sutura nasofrontal.

Nassilof (operación de) (1888). Operación que tiene por objeto llegar á

la porción torácica del esófago por el mediastino posterior, resecando cierto número de costillas.

natalidad, *s. f.* (*natus*, nacido). Nombre que se da en demografía á la relación que existe entre el número de nacimientos y la cifra de la población, en un lapso de tiempo determinado.

natiforme (cráneo) (*nates*, nalgas) (Parrot). Aspecto particular del cráneo observado en la sífilis hereditaria y que está caracterizado por la presencia de dos eminencias óseas, desarrolladas á la derecha y á la izquierda de la línea mediana y separadas entre sí por una corredera profunda formada por la sutura sagital.

naturismo, *s. m.* Doctrina que enseña que debe esperarse todo de *natura medicatrix*. Véase : *hipocratismo*.

naupatía, *s. f.* (ναῦς, nave; πάθος, afección). Mareo.

náusea, *s. f.* (ναῦς, nave). Ganas de vomitar.

neartrosis, *s. f.* (νέος, nuevo; ἄρθρον, articulación). Articulación de nueva formación (véase: *seudartrosis*). — Ciertos autores (Denucé) quieren reservar este nombre para los casos en que la nueva articulación es consecutiva á una resección articular.

necrobiosis, *s. f.* (νεκρός, muerte; βίος, vida). Modificación en la estructura de un órgano ó de una parte de órgano cuya circulación ha sido abolida; mas, al abrigo de la infección. El tejido, que sufre una especie de transformación regresiva, es tolerado por las partes vivas vecinas, que le suministran á veces los elementos necesarios á cierta oscura vitalidad. Ej. : *necrosis del cerebro, del riñón, del bazo*, consecutivas á infartos.

necrobiótico, *adj.* Que se refiere á la necrobiosis.

necrofilia, *s. f.* (νεκρός; φιλεῖν, amar). Sin. : *vampirismo*. Variedad de perversión del sentido genital caracterizada por el hecho de ejercer actos carnales con cadáveres.

necrofobia, *s. f.* (νεκρός. cadáver; φόβος, temor). Temor, con obsesión y enfermizo (fobia), á los cadáveres.

necropsia, *s. f.* (νεκρός, cadáver; ὄψις, vista) ó **necroscopia**, *s. f.* (νεκρός; σκοπεῖν, examinar). Autopsia.

necrosis, *s. f.* (νεκρός, muerte). Mortificación de los huesos y de los cartílagos. — Se extiende á veces

este significado á la destrucción de los otros tejidos.

necrosis de coagulación. Lesión histológica caracterizada por una tumefacción de las células, que se ponen transparentes, refringentes, pierden el núcleo y semejan fibrina coagulada. Parece idéntica á la *degeneración vítrea* ó *vitrosa*.

necrosis diseminada del tejido adiposo. Afección anatómicamente caracterizada por la transformación del tejido adiposo vecino del páncreas en nódulos blanco-amarillentos, opacos; y clínicamente por dolores epigástricos, vómitos, abatimiento, hipotermia y á veces glicosuria y azotorrea. Se atribuye á la difusión del jugo pancreático fuera de sus vías naturales, consecutiva á una pancreatitis. Ha sido principalmente estudiada en Alemania.

necro-tuberculosis, *s. f.* (Grancher y Ledoux-Lebard). Tuberculosis experimental obtenida con inyecciones en la vena del conejo de bacilos muertos por una temperatura de 115°. Esta experiencia demuestra que los bacilos tuberculosos contienen en sí mismos toxinas que resisten al calor.

nefelion, *s. m.* (νεφέλη, nube). Mancha transparente de la córnea que no intercepta por completo la luz.

nefralgia, *s. f.* (νεφρός, riñón; ἄλγος, dolor) (Rayer). Dolor situado en el riñón, y observado fuera de toda alteración anatómica del órgano.

nefrectomía, *s. f.* (νεφρός; ἐκτομή, ablación). Extirpación total ó parcial del riñón.

nefrítico (cólico) (νεφρός, riñón). Sindroma caracterizado por accesos de dolor en la región lumbar, irradiados hacia el hipogastrio y acompañados de los signos habituales del estrangulamiento de un conducto; lo provoca el paso de un cuerpo extraño (generalmente cálculos) por el uréter.

nefritis, *s. f.* Nombre genérico de todas las inflamaciones agudas ó crónicas del riñón.

nefrocele, *amb.* (νεφρός, riñón; κήλη, hernia). Hernia del riñón.

nefrolisis, *s. f.* (νεφρός; λύειν, soltar). (Rovsing, 1903). Operación que consiste en la liberación y la resección de la atmósfera celulosa del riñón.

nefrolito, *s. m.* (νεφρός; λίθος, piedra). Cálculo del riñón.

nefrolitotomía, *s. f.* (νεφρός; λίθος; τομή, sección).

Operación que consiste en hacer una incisión al riñón para extraer el ó los cálculos contenidos en la pelvis renal.

nefroneurosis, *s. f.* Trastornos urinarios (alternativa de anuria y de poliuria) de origen histérico.

nefropexia, *s f.* (νεφρός; πῆξις, fijación). Véase: *nefrorrafia*.

nefroptosis, *s. f.* (νεφρός.riñón; πτώσις,caída). Dislocación y movilidad anormal del riñón á consecuencia del relajamiento de sus medios de fijeza. La nefroptosis acompaña frecuentemente las otras tosis viscerales. Comprende dos grados: el primero, en que el riñón es simplemente *movible* y en el cual el cambio de lugar del órgano es limitado; el segundo, en que el riñón se dice *flotante* y en el cual el órgano puede ocupar cualquier punto de la cavidad abdominal.

nefrorrafia, *s. f.* (νεφρός; ῥαφη, sutura). Sin.: *nefropexia*. Operación que consiste en fijar el riñón movible ó flotante.

nefrorragia, *s. f.* (νεφρός; ῥαγειν, salir con violencia). Hemorragia de origen renal.

nefrostomía, *s. f.* (νεφρός; στόμα, boca). Establecimiento de una fístula renal quirúrgica.

nefrotomía, *s. f.* (νεφρός; τομή, sección). Incisión practicada en el riñón con el objeto de extraer un cálculo ó de evacuar una colección líquida.

nefrotomía superficial (Le Dentu, 1880). Desbridamiento de la cápsula propia del riñón.

nefrotoxina, *s. f.* Suero que posee propiedades citotóxicas contra las células del epitelio renal de un animal determinado. Dicha acción tóxica se manifiesta por albuminuria. Véase: *citotoxina*.

negativismo, *s. m.* Turbación de la actividad voluntaria observada en las vesanias, caracterizada primero por la lentitud, el embarazo y la hesitación de los movimientos que se manda ejecutar; luego por la inercia y la inacción completas.

Negri (cuerpos de). Corpúsculos hallados por Negri en las células del sistema nervioso central de animales rábicos y considerados por este autor como los elementos específicos de la rabia. No se les encuentra en los animales inoculados experimentalmente con la rabia.

Neisser (gonococo de). Véase: *gonococo*.

Nelatón (línea de). Línea oblicua hacia abajo y adentro, formada por la espina ilíaca antero-superior, el vértice del gran trocánter y el isquion, cuando el miembro inferior está en semiflexión. Esta línea sirve de relación cuando se busca la dislocación de la cabeza del fémur lujada.

nematode, nematoide, *s. m.* (νῆμα, hilo; εἶδος, forma). Orden de gusanos caracterizados por el cuerpo filiforme. Comprende numerosos parásitos, tales como los ascárides, las filarias, etc.

neocitemia, *s. f.* (νέος, nuevo; κύτος, célula; αἷμα, sangre). Presencia de células neoplásicas en la sangre. Comprobada en casos de linfadenomas y de sarcomatosis, parece coincidir con la generalización del neoplasma.

neoformación, *s. f.* Véase : *neoplasia.*

neomembrana, *s. f.* (νέος, nuevo; membrana). Membrana de nueva formación provista de una red vascular, y de análoga estructura á la de las otras membranas del organismo.

neómetro, *s. m.* (πνεῖν, respirar; μέτρον, medida). Espirómetro.

neoplasia, *s. f.* **neoplásico(proceso)** (νέος, nuevo; πλάσις, formación). Formación de un tejido nuevo cuyos elementos se sustituirían á los de un tejido anterior sin quitarles elemento alguno. Ej. : *osificación encondral.* — Este vocablo se emplea más frecuemente para designar las producciones morbosas y en particular los tumores.

neoplasma, *s. m.* (νέος; πλασσεῖν, formar). Tejido morboso que resulta del proceso neoplásico. Tumor.

nervino, *adj.* y *s. m.* (*nervus*, nervio). Sustancia considerada como provista de la propiedad de tonificar los nervios.

nervosismo, *s. m.* (*nervosus*, nervioso). Sin. : *neurosismo.* Nombre con que se ha designado por mucho tiempo cierto estado de sensibilidad nerviosa mal definido, acompañado de accidentes diversos (espasmos, dolores, trastornos vaso-motores). La neurastenia y la histeria son las causas más frecuentes de dicho estado mórbido.

nervo-tabes, *s. m.* (Déjerine, 1881). Sin. : *tabes periférica.* Afección caracterizada por un conjunto clínico semejante al de la tabes dorsal (ataxia, signo de Wéstphal, signo de Rómberg,

etc.), y debida á lesiones periféricas, sin que se halle comprometida la médula espinal.

neumatocele, *amb.* (πνεῦμα, aire; κήλη, tumor). Enfisema. — *neumatocele del cráneo.* Insuflación de aire entre los huesos del cráneo y su periósteo, causada por la perforación espontánea ó traumática de los senos frontales ó de las células mastoideas. — *neumatocele vaginal.* Distensión de la túnica vaginal por gases; complicación de la hematocele.

neumatoréctica (respiración) (Holovtschiner). Respiración profunda, y por lo común exagerada, que proviene de la necesidad de oxígeno. Tipo respiratorio observado en las hemorragias.

neumatosis, *s. f.* (πνεῦμα, aire). Nombre dado por los médicos del siglo XVIII á los estados morbosos causados por la presencia de gases en los tejidos, en los órganos ó en las cavidades, tales como el estómago y el intestino, que normalmente no deben contener sino débiles cantidades : de allí una gran variedad de *neumatosis.*

neumatosis intestinal. Sin. : *quistes gaseosos del intestino.* Grupo de pequeños quistes gaseosos encerrados en el espesor de la pared intestinal y capaces de determinar, por el número, una induración más ó menos limitada análoga á la que produciría un neoplasma.

neumatoterapia, *s. f.* (πνεῦμα, aire; θεραπεία, tratamiento). Cura de aire.

neumectomía, *s. f.* (πνεύμων, pulmón; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en extirpar una parte más ó menos extensa del pulmón.

neumobacilemia, *s. f.* (neumobacilo; αἷμα, sangre). Infección general por el neumobacilo de Friedländer.

neumobacilo, *s. m.* Sin. : *bacilo encapsulado de Friedländer.* Bacilo que se halla en los esputos. Es encapsulado, agrupado ordinariamente de dos en dos, se cultiva fácilmente en los medios habituales, y no se colora por el método de Gram.

neumocele, *amb.* (πνεύμων pulmón; κήλη, hernia). Hernia del pulmón. — *neumocele escrotal* (Verneuil). Véase : *neumatocele vaginal.*

neumococcemia, *s. f.* (neumococo; αἷμα, sangre). Septicemia provocada por la presencia del neumococo en la sangre.

neumococcia, *s. f.* Conjunto de los accidentes mórbidos producidos por el neumococo.

neumococo, *s. m.* (Talamon; Fränkel). Sin. : *micrococcus Pasteuri*. Coco alargado, lanceolado, en forma de llama de bujía, ordinariamente pegados dos á dos (diplococo) y rodeado de una cápsula refringente. Permanece colorado por el método de Gram. Es el agente de la neumonía.

neumoconiosis, *s. f.* (πνεύμων, pulmón; κονίς, polvo) (Zenker). El conjunto de las alteraciones causadas por la inhalación y la fijación en el pulmón de las partículas sólidas esparcidas en la atmósfera (carbón, sílice, hierro).

neumógrafo, *s. m.* (Marey). Sin. : *estetógrafo* (Riegel). Instrumento que sirve para inscribir la expánsión circunferencial del tórax durante los movimientos respiratorios.

neumohemia pútrida (πνεῦμα, aire; αἷμα, sangre). Nombre dado algunas veces á ciertas formas de la septicemia sobreaguda.

neumolito, *s. m.* (πνεύμων, pulmón; λίθος, piedra). Las concreciones sólidas que se encuentran en el parenquima pulmonar.

neumómetro, *s. m.* (πνεύμων; μέτρον, medida) (Waldenburg). Instrumento que permite determinar la presión bajo la cual el aire es inspirado y expirado.

neumonía caseosa. Sin. : *tísis aguda neumónica*. Forma aguda de la tisis, caracterizada desde el punto de vista anatómico por la infiltración tuberculosa del pulmón (Laënnec), cuyo aspecto recuerda la hepatización de la neumonía lobar; y, desde el punto de vista clínico, por un estado general grave debido á la intoxicación tuberculosa, y por signos locales análogos á los de la neumonía.

neumonía lobar ó **neumonía franca** ó **neumonía fibrinosa.** Enfermedad infectiva debida al neumococo lanceolado encapsulado de Talamón-Fränkel. La caracterizan, anatómicamente, la inflamación aguda del pulmón y la presencia en los alveolos pulmonares de un exudado fibrinoso que los llena; clínicamente, la evolución cíclica, desde el principio brusco y solemne hasta la desfervescencia rápida, en una sola crisis, que se presenta del 5° al 9° día.

neumonía lobular ó, más propiamente, **lobuli-**

lar. Véase: *bronconeumonía.*

neumonía marginal. Véase: *atelectasia.*

neumonía maciza (Grancher). Variedad de la neumonía lobar, en la que, á causa de la obliteración de los bronquios gruesos por concreciones fibrinosas, faltan la mayor parte de los signos físicos.

neumonoconiosis, *s. f.* Véase: *neumoconiosis.*

neumonopatía, *s. f.* (πνεύμων, pulmón; πάθος, enfermedad). Nombre genérico de todas las afecciones del pulmón.

neumopaludismo del vértice (de Brun, 1895). Complicación pulmonar del paludismo, que consiste en la induración del vértice del pulmón, y simula la tisis incipiente. Se distingue de ella por la ausencia de estertores, por la tos seca y la mejoría rápida bajo la influencia de las sales de quinina.

neumopericardias, *s. m.* (πνεύμα, aire; περικάρδιον, pericardio). Sin. *neumatosis pericárdica.* Presencia de aire ó de gases en el pericardio; es consecutiva, lo más á menudo, á una herida torácica que ha lisiado á la vez el pulmón y el corazón, ó á una ancha herida que permite que penetre el aire exterior directamente al pericardio.

neumopexia, *s. f.* (πνεύμων, pulmón; πήξις, fijación). Fijación del pulmón á la pared torácica para poner remedio al neumotórax.

neumorragia, *s. f.* (πνεύμων; ῥήγνυμι, yo desgarro) (Lænnec). Infiltración de sangre en el tejido pulmonar; apoplejía pulmonar.

neumoterapia, *s. f.* (πνεύμα; θεραπεία, tratamiento) (Hanke). Método terapéutico empleado contra el enfisema, que consiste en hacer que el enfermo inspire en aire comprimido y expire en aire rarefacto.

neumotifoidea (fiebre) ó **neumotifus**, *s. m.* Fiebre tifoidea cuyo comienzo se disimula tras los signos de una neumonía concomitante, y que continúa su evolución después que la neumonía ha terminado la suya. En este caso, la neumonía ha sido atribuída por cierto número de autores á la infección del pulmón por el bacilo de Eberth, agente de la fiebre tifoidea. Se admite generalmente hoy que es debida al neumococo.

neumotomía, *s. f.* (πνεύμων, pulmón; τομή,

sección). Incisión hecha al pulmón con propósito terapéutico.

neumotórax, *s. m.* (πνεῦμα, aire; θώραξ, pecho). Presencia de aire ó gases en la cavidad pleural. Esta lesión da lugar á cierto número de signos particulares, y el *neumotórax* constituye un tipo clínico especial.

neuragmia, *s. f.* (νεῦρον; ἀγμὸς, fractura). Sección ó arrancamiento de un nervio, hechos con un fin experimental (empleada por Wáller para estudiar la degeneración).

neural (arco) (νεῦρον, nervio). Nombre dado en embriología y en anatomía comparada al arco formado por la parte posterior del cuerpo de la vértebra y por las láminas vertebrales, arco que rodea al sistema nervioso central (por contraposición al *arco hemal*).

neuralgia, *s. f.* (νεῦρον; ἄλγός, dolor). Sindroma caracterizado por dolores espontáneos ó provocados, continuos ó paroxísticos, en el trayecto de un nervio.

neuralgia epileptiforme. Véase : *tic doloroso de la cara.*

neurastenia, *s. f.* (νεῦρον, nervio; ἀ priv.; σθένος, fuerza) (Beard, 1880). Sin. : *agotamiento nervioso, enfermedad de Béard.* Neurosis que se manifiesta sobre todo en los neuro-artríticos y en los rendidos por la fatiga; presenta como caracteres fundamentales la hipotonía muscular y arterial, la disminución más ó menos acentuada de las secreciones glandulares, acompañada de cefalea, raquialgia, dispepsia gastro-intestinal y tosis de las vísceras. Estos trastornos provocan el insomnio, gran sensación de fatiga y determinan un estado mental particular en que dominan la tristeza, el temor y la indecisión.

neurectomía, *s. f.* (νεῦρον; ἐκτομή, excisión). Resección de un nervio en una parte más ó menos larga de su trayecto.

neuritis, *s. f.* (νεῦρον, nervio). Nombre con que se designan actualmente la mayor parte de las lesiones de los nervios, inflamatorias ó degenerativas, con excepción de los neoplasmas.

neuro - artritismo, *s. m.* Asociación del artritismo y de la neuropatía.

neuroblasto, *s. m.* (νεῦρον, nervio; βλαστός, germen). Sin. : *mielocito de Robin.* Célula nerviosa embrionaria formada por un pequeño núcleo redondo,

circuído de una delgada capa de protoplasma apenas visible. Los *neuroblastos* se transforman en células por aumento del protoplasma, que no tarda en emitir primero un prolongamiento cilindráxil y luego prolongamientos protoplasmáticos.

neurodermia, *s. f.* (Brocq). Grupo de dermatoneurosis, en que, á pesar de un prurito intenso, la reacción cutánea es nula ó insignificante (prurito sin lesiones). Ej. : *prurito senil.*

neurodermitis, *s. f.* (Brocq). Grupo de dermatoneurosis en que la reacción cutánea, siempre intensa, se traduce ya por erupciones especiales (liquen, liquenificación, urticaria), ya por lesiones vulgares (pápulas de prurigo, exematización). Ej. : *prurigo de Hebra.*

neuro-eje, *s. m.* Conjunto del encéfalo y la médula.

neurofibromatosis, *s. f.* (Recklinghausen) Véase : *polifibromatosis neuro-cutánea pigmentaria.*

neurofibrosarcomatosis, *s. f.* (Cestan, 1903). Variedad particular de sarcomatosis primitiva del sistema nervioso, caracterizada por el desarrollo rápido de numerosos tumores malignos, del tipo sarcoma, en la base del cráneo y á lo largo de la médula; estos tumores invaden igualmente los nervios periféricos.

neuróglico (sarcoma). Sin. : *glioma.* Sarcoma que presenta como caracteres particulares : la tendencia de sus elementos á organizarse en el sentido de la neuroglia, una consistencia blanda comparada á la de la cola y su asiento en los centros nerviosos (cerebro y médula).

neuroglioma, *s. m.* Véase : *cerebroma.*

neuro-lépride, *s. f.* Erupción cutánea de origen leproso, no debida á la localización del bacilo de Hansen en la piel, sino que representa cierto desorden trófico provocado por una neuritis, causada ésta por el desarrollo del bacilo en un nervio.

neurología, *s. f.* (νεῦρον; λόγος, discurso). Parte de la anatomía que trata del sistema nervioso, y estudio de las enfermedades del mismo.

neuroma, *s. m.* Tumor formado de sistema nervioso (ganglionar ó fasciculado). Por abuso de lenguaje, dase también á menudo el nombre de neuroma á los tumores desarrollados sobre el trayecto de un nervio, cualquiera que sea su

estructura (fibroma, sarcoma, etc.).

neurona, *s. m.* (νεῦρον, nervio). Conjunto formado por una célula nerviosa, sus prolongaciones protoplasmáticas y su prolongación cilindro-áxil.

neuronas (teoría de los). Teoría que explica el acto de los reflejos por las relaciones que existen, en los centros nerviosos, entre las ramificaciones terminales de las raíces sensitivas y las células motoras, ya directamente, ya por uno ó varios neuronas de asociación.

neuronofagia, *s. f.* (neurona; φαγεῖν, comer) (Marinesco). Fenómeno observado por Marinesco en la mayor parte de las lesiones agudas del sistema nervioso; consiste en la penetración de la célula nerviosa por las células neuróglicas jóvenes. Hay tendencia á considerar este proceso como una manifestación de la fagocitosis.

neuropapilitis, *s. f.* (de Wecker). Inflamación localizada á la papila del nervio óptico, que se presenta, al oftalmoscopio, hinchada, edematosa, con venas distendidas. Generalmente evoluciona hacia la atrofia de la papila.

neuropatía, *s. f.* (νεῦρον; πάθος, afección). 1º Nombre genérico dado á todas las afecciones nerviosas. — 2º Igualmente designa un estado especial de debilidad general del sistema nervioso central, considerado con particularidad desde el punto de vista de las funciones siquicas: la neurastenia es uno de dichos estados neuropáticos.

neuropatología, *s. f.* Parte de la patología que trata de las enfermedades del sistema nervioso.

neurosis, *s. f.* Nombre genérico dado á un grupo de afecciones cuyos síntomas indican el trastorno de las funciones del sistema nervioso, sin que el examen anatómico revele lesiones apreciables de los elementos de este sistema.

neurosismo, *s. m.* Véase: *nervosismo.*

neurosténico, *adj.* y *s. m.* (νεῦρον, nervio; σθένος, fuerza). Sustancia capaz de aumentar la fuerza nerviosa.

neuro-tabes, *s. m.* Véase: *nervo-tabes.*

neurotoma, *s. m.* (νεῦρον; τομή, sección). Segmento del sistema nervioso central del embrión, correspondiente á un metámero.

neurotomía, *s. f.*

Sección de un nervio, ejecutada á veces con el propósito de poner término á una neuralgia rebelde.

neurotripsia, *s. f.* (νεῦρον; τρίβω, trituro). Trituración de los nervios, particularmente del ciático. Operación preconizada por Verneuil para modificar la nutrición de los miembros que padecen trastornos tróficos (úlceras viejas, mal perforante, etc.).

neurotrófico, *adj.* Véase : *trofoneurótico.*

neutrófilos (leucocitos) (*neuter*, neutro; φιλεῖν, amar). Nombre que se da á veces à los leucocitos polinucleares, porque sus granulaciones no se tiñen sino con una mezcla de colores ácidos y de colores básicos de anilina. Estas granulaciones neutrófilas se encuentran rara vez fuera de la especie humana.

Nicolaier (bacilo de). Sin. : *bacilo del tétanos.* Agente específico del tétanos; bacilo anaerobio caracterizado por la forma abultada hacia un extremo, como la de un clavo ó de una baqueta de tambor.

nicotinismo, *s. m.* Conjunto de los accidentes mórbidos, agudos ó crónicos, producidos por el tabaco.

nictación ó **nictitación**, *s. f.* (*nictare*, pestañear). Pestañeo.

nictalopia, *s. f.* (νύξ, νυκτός, noche; ὤψ, ojo). Facultad de ver de noche (y no ceguera nocturna, como han pretendido algunos autores que hacen derivar esta voz de νύξ, noche; ἀλαός, ciego; ὤψ, ojo) (Littré).

nictémero, s. *m.* (νύξ, noche; ημέρα, día). Espacio de tiempo que comprende un día y una noche, es decir 24 horas.

nicturia, *s. f.* (νύξ, noche; οὖρειν, orinar). Excreción urinaria predominante en la noche.

nidoroso, *adj.* (*nidor*, olor á quemado). Se aplica á todo lo que huele á hidrógeno sulfurado ó á huevos podridos. Ej. : *eructos nidorosos.*

nidosis, *s. f.* (κνίδη, ortiga). Nombre dado por algunos autores á la *urticaria.*

nigua, *s. f.* Variedad de pulga (*pulex penetrans*) común en la América del Sur y en las Antillas. La hembra penetra en la piel del pie (bajo la uña de los dedos) y determina allí abcesos y heridas profundas.

ninfomanía, *s. f.* (νύμφη, ninfa; μανία, manía). Afrodisia ó exageración, en la mujer, de los deseos sexuales.

ninfotomía, *s. f.* (νύμφη;

τομή, sección). Excisión de parte de las ninfas ó pequeños labios.

nistagmus, *s. m.* (νυστάζω, me inclino). Movimientos oscilatorios y á veces rotatorios del globo ocular. Estos movimientos son involuntarios, por sacudidas, horizontales, verticales y alguna vez, de circunducción. Son congénitos ó sintomáticos de una lesión de los centros nerviosos.

Nocard (bacilo de). Bacilo de la sitacosis.

nódulo, *s. m.* (*nodulus*, nudito). Nombre dado en anatomía normal ó patológica á pequeñas nudosidades.

noli me tángere (en latin : no me toques). Nombre que dieron los antiguos autores á ciertas úlceras cutáneas, las cuales se irritan por la aplicación de cualesquiera tópicos. En general se trataba en esos casos de epiteliomas ó de cancroides.

noma, *s. m.* (νόμη de νέμειν, roer). Estomatitis gangrenosa, que se observa en los niños, secundaria á enfermedades generales infectivas (sarampión, escarlatina, fiebre tifoidea).

nona, *s. f.* (etimología incierta : 1° *nona*, en italiano la hora novena; *nonna*, en italiano, abuela; 3° corrupción popular de *coma*). Afección caracterizada por sueño profundo, que dura varios días ó varias semanas y sobreviene á consecuencia de la influenza. Observada en Italia durante la epidemia de 1889-90, no ha sido señalada después.

nonana (fiebre) (*nonanus*, que vuelve cada nueve días.) Fiebre intermitente cuyos accesos vuelven cada nueve días.

no-restraint (en inglés, ninguna sujeción). Supresión de los medios todos de sujeción empleados antes en los asilos de locos.

normoblasto, *s. m.* Glóbulo rojo nucleado de tamaño igual al de los hemátidos normales. Los normoblastos se presentan en las anemias graves secundarias.

normocito, *s. m.* Variedad de glóbulo rojo derivada del normoblasto por expulsión del núcleo.

nosencéfalo, *s. m.* (νόσος, enfermedad; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo seudoencefaliano que en lugar de cerebro presenta un tumor vascular : el cráneo está anchamente abierto en las regiones frontal y parietal; el agujero occipital se halla intacto.

nosocomial, *adj.* (νόσος, enfermedad; κομεῖν, cuidar).

Que depende de los hospitales.

nosofobia, *s. f.* (νόσος; φόβος, temor). Temor excesivo de algunas personas á contraer enfermedades.

nosóforo, *s. m.* (νόσος; φόρος, que lleva). Lecho mecánico para enfermos.

nosogenia, *s. f.* (νόσος; γεννάω, engendro). Estudio de las causas y del desarrollo de las enfermedades.

nosografía, *s. f.* (νόσος; γράφειν, escribir). Clasificación metódica de las enfermedades.

nosología, *s. f.* (νόσος; λόγος, discurso). Estudio de los caracteres distintivos que permiten definir las enfermedades.

nosomanía, *s. f.* (νόσος; μανία, manía). Exageración de la hipocondría, que llega á concepciones delirantes; el paciente revela la preocupación más excesiva por su salud y se cree atacado de una ó de varias enfermedades.

nosotoxicosis, *s. f.* (von Jaksch). Véase: *autointoxicación.*

nostalgia, *s. f.* (νόστος, regreso; ἄλγος, dolor). Tristeza y agotamiento provocados por el extrañamiento del país nativo y del medio en que por mucho tiempo se ha vivido.

nostras, *adj.* (*nostras*, de nuestro país). Se dice de los enfermedades especiales á nuestra región: *cólera nostras.*

notalgia, *s. f.* (νῶτος, dorso; ἄλγος, dolor). Dolor de la región dorsal.

notencéfalo, *s. m.* (νῶτος, dorso; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuyo cráneo presenta una abertura en la porción occipital, por la que forma hernia el encéfalo. Dicha hernia se presenta en la nuca como un tumor pediculado.

notocordio, *s. m.* (νῶτος, dorso; χορδή, cuerda). Véase: *cuerda dorsal.*

notómelo, *s. m.* (νῶτος, dorso, μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo que presenta insertos en el dorso uno ó dos miembros accesorios.

nubilidad, *s. f.* (*nubere*, desposarse). Estado del individuo que es apto para reproducirse.

núcleo, *s. m.* (*nux*, *nucis*, nuez). Nombre dado en anatomía patológica á un agrupamiento de elementos nuevos (*núcleo canceroso*, *tuberculoso*, etc.).

nudosidad, *s. f.* Nombre dado en anatomía patológica á todas las producciones accidentales que dan

al tacto la sensación de un cuerpo duro, más ó menos redondo y netamente circunscrito. — También se llaman así las tumefacciones epifisiarias de los niños raquíticos.

nudoso (eritema). Véase : *eritema nudoso.*

nulíparo, *adj.* (*nullus,* ninguno; *parere,* parir). Se aplica á la mujer que no ha tenido hijos.

numular (esputo) (*nummulus,* diminutivo de *nummus;* moneda). Esputo extendido y redondo como una moneda. Se observa muy frecuentemente en la tísis pulmonar, mas no puede considerarse como característico de esa enfermedad.

nutación, *s. f.* (*nutare,* mover la cabeza). Oscilación de la cabeza.

nutrimento, *s. m.* (*nutrire,* nutrir). Sustancia alimenticia susceptible de asimilarse por completo, sin que sea necesario que sufra las modificaciones de la digestión estomacal (y que puede por consiguiente ser inyectada directamente dentro de las venas).

nutrición, *s. f.* « Conjunto de los cambios que se hacen entre el organismo vivo y el medio que lo rodea » (M. Duval).

nutrición formativa (Virchow). Véase : *histopoyesis.*

O

ooriulo, *s. m.* (ὤαριον, óvulo; οὐλή, cicatriz). Véase : *cuerpo lúteo.*

Obermeier (espirilo ó espiroquete de) (1873). Bacteria en forma de filamento flexuoso, dotada de movimientos en espiral, que se encuentra en la sangre de los enfermos que padecen de fiebre recurrente, durante los accesos. Véase : *recurrente (fiebre).*

obesidad, *s. f.* (*obesitas,* de *obesus,* gordo). Sin. : *polisarcia.* Hipertrofia general del tejido adiposo.

obitorio, *s. m.* (*obire,* morir). 1° Depósito mortuorio en que se conservan los cuerpos en que se sospecha la muerte aparente. — 2° Depósito y exposición de cadáveres con un fin médico-legal.

objetivos (síntomas). Síntomas que descubre el médico, por contra-

posición á los que percibe el enfermo.

obnubilación, *s. f.* (*ob*, delante; *nubilum*, nubecilla). Estado vertiginoso durante el cual los objetos se ven como á través de una nube.

obsesión, *s. f.* (*obsequi*, seguir). Turbación de la voluntad, observada en los degenerados. Consiste en una idea fija, temor ó impulsión irresistible, que se impone al espíritu del enfermo, aún cuando éste permanece consciente del dominio que sufre, y provoca en él una sensación de angustia de que no puede libertarse sino cediendo á la impulsión.

obstetricia, *s. f.* (*ob*, delante; *stare*, mantenerse). Arte de los partos.

obstipum (abdomen) (*obstipus*, inclinado) (Habs). Acortamiento congénito del músculo recto del abdomen, lesión muy rara comparable al tortícolis congénito.

obstrucción, *s. f.* (*obstruere*, obstruir). Dificultad ú obstáculo para la circulación de materias sólidas ó líquidas por un conducto del organismo. Ej.: *obstrucción intestinal*, oclusión del intestino.

obturación, *s. f.* 1° *obturación de los dientes*. Relleno de la cavidad de un diente cariado con una sustancia destinada á cerrar herméticamente la cavidad, y á suplir por su dureza la parte de diente que ha desaparecido. — 2° *obturación del intestino*. Oclusión del intestino por un cuerpo extraño tragado, ó introducido por el recto.

occipital máximo (punto) (antropología). Punto del cráneo en que termina el diámetro anteroposterior máximo, que parte del gabelo.

occípito-bregmático (diámetro). Diámetro de la cabeza fetal que va de la protuberancia occipital externa al bregma.

ocitóxico, *adj.* (ὠκύς, pronto; τόκος, parto). Que favorece el parto.

oclusión, *s. f.* (*occludere*, cerrar). 1° Acercamiento de los bordes de una abertura natural (párpados). — 2° Obliteración de un conducto ó de un orificio (vagina, cuello uterino, etc.), — *oclusión intestinal*. Detención del curso de las materias contenidas en el intestino.

ocrodermia, *s. f.* (ὠχρός, pálido; δέρμα, piel) (M. Labbé). Palidez de la piel, debida á la anemia ó á cualquiera otra causa.

ocronosis, *s. f.* (Virchow). Coloración negra, casi general, de los cartílagos.

octana (fiebre) (*octo*, ocho). Forma de fiebre intermitente en que los accesos vuelven cada ocho días.

ocular simpático (síndroma). Sin.: *síndroma de Claudio Bernard-Horner ó de Hutchinson.* Síndroma caracterizado por la asociación de la enoftalmía, de miosis y de ligera caída del párpado. Se observa en las parálisis radiculares inferiores del plexo braquial, y en ciertas lesiones de los hemiferios cerebrales y del bulbo.

ocularista, *s. m.* (*ocularius*, oculista). El fabricante de piezas destinadas á la protesis ocular.

oculista, *s. m.* (*oculus*, ojo). El que se ocupa especialmente en el tratamiento de las enfermedades de los ojos.

oculística, *s. f.* Véase: *oftalmología.*

oculogiro, *adj.* y *s. m.* (*oculus; gyro*). Que hace girar los ojos. Nombre con que designa Grasset los centros, nervios y músculos rotatores del ojo.

...odinia, (ὀδύνη, dolor). Afijo que sirve para designar los fenómenos dolorosos. Ej.: *acrodinia, pleurodinia.*

odinofagia, *s. f.* (ὀδύνη; φαγεῖν, comer). Deglución dolorosa. Se emplea frecuentemente con el mismo significado el término *disfagia.*

odontalgia, *s. f.* (ὀδούς, ὀδόντος, diente, ἄλγος, dolor). Sensación dolorosa en un diente.

odonteblasto, *s. m.* (ὀδούς; βλαστός, germen). Las grandes células que se encuentran en la periferia de la pulpa dental, y cuya función es segregar el marfil (análogas á los osteoblastos).

odontocia, *s. f.* (ὀδούς; ὠκύς, liviano) (Ferrier, 1900). Disminución de la consistencia de los dientes, favorable al desarrollo de la carie y debida á la decalcificación; coincide con la *osteocia.*

odontogenia, *s. f.* (ὀδούς; γένεσις, generación). Formación de los folículos dentales y de los dientes.

odontología, *s. f.* (ὀδούς; λόγος, discurso). Tratado sobre los dientes y sus enfermedades.

odontoma, *s. m.* (ὀδούς, ὀδόντος, diente). Tumor formado, según Broca, por la hipergenesia de los tejidos dentales. Virchow designa así no sólo los odontomas de Broca, sino también todos

los tumores de los dientes, tales como las exostosis debidas á la inflamación del periósteo alveolo-dental.

odontoplástico (odontoma). Variedad de odontoma debida á la hipergenesia del bulbo dental. Estos odontomas pueden ser no dentificados y tener la dureza del fibroma, ó dentificados y presentarse con la forma de masas de consistencia ósea, superficie mamilada, y la misma estructura del diente.

odontotecnia, *s. f.* (ὀδούς; τεχνή, arte). Arte dental.

OErtel (método de). Sin. : *cura por el terreno.* Aplicación al tratamiento de las afecciones crónicas del corazón, de las ascensiones de pendiente suave, que determinan cierto grado de hipertrofia cardiaca, si son prudentemente reguladas.

oflásica (pelada). Véase : *pelada oflásica.*

oflasis, *s. f.* « Pelada, así llamada á causa de que á los enfermos se les cae el pelo en ondas, figurando una serpiente que en griego llaman ὄφις » (A. Paré).

oflidismo, *s. m.* (ὄφις, serpiente). Conjunto de los accidentes ocasionados por la mordedura de serpientes venenosas.

ofrion, *s. m.* (ὀφρύς, ceja). Sin. : *punto supraorbitario* (antropología). Mitad de la línea que corresponde sobre la frente á la base del cráneo y á la bóveda de las órbitas; marca la separación de las partes supra y sub-cerebrales de la cara.

oftalmía, *s. f.* (ὀφθαλμός, ojo). Nombre genérico de todas las afecciones inflamatorias del ojo. Estas inflamaciones empiezan á menudo por la conjuntiva y pueden permanecer limitadas á ella. — A veces se toma la palabra *oftalmía* como sinónimo de *conjuntivitis.*

oftalmitis, *s. f.* Véase : *panoftalmía.*

oftalmología, *s. f.* (ὀφθαλμός, ojo; λόγος, discurso). Estudio de los ojos y de sus enfermedades.

oftalmía nudosa (Sämisch). Queratitis superficial caracterizada por una muchedumbre de puntitos grisáceos irregularmente distribuídos sobre la córnea, donde á veces forman verdaderas nudosidades. Cada uno de estos puntos sería causado por la presencia de un pelo proveniente de cierta oruga procesionaria (*cnethocampa pityocampa*) que segrega una sustancia irritante. El pronóstico sería benigno.

oftalmía simpática. Conjunto de síntomas inflamatorios que sobrevienen en un ojo cuando el otro presenta lesiones infectivas de origen traumático, por lo regular.

oftalmomalacia, *s. f.* (ὀφθαλμός; μαλακός, blando). Sin. : *tisis ocular*. Atrofia del ojo, caracterizada por reblandecimiento y disminución del volumen del globo ocular. Es siempre consecutiva á otra afección (generalmente inflamatoria).

oftalmometría, *s. f.* (ὀφθαλμός; μέτρον, medida). Determinación del índice de refracción de los diversos medios del ojo, y mensuración de estos medios refringentes.

oftalmoplejia, *s. f.* (ὀφθαλμός; πληγή, golpe). Parálisis de los músculos del ojo. Si todos los músculos (extrínsecos é intrínsecos) se hallan paralizados, se le da el nombre de *oft. doble* (muy rara). — La *oft. interna* es la parálisis de los músculos intrínsecos, esto es, del esfínter de la pupila y del músculo ciliar. — La *oft. externa* es la parálisis de los músculos extrínsecos y del elevador del párpado.

oftalmoplejia nuclear. Sin. : *polio-encefalitis superior*. Parálisis de los músculos del ojo debida á lesiones de los núcleos y de las fibras de orígen de los nervios de los 3°, 4° y 6° pares.

oftalmoscopia, *s. f.* Examen del ojo con el oftalmoscopio.

oftalmoscopio, *s. m.* (ὀφθαλμός, ojo; σκόπεῖν, examinar). Instrumento que sirve á la vez para alumbrar y examinar el fondo del ojo.

oftalmostato, *s. m.* (ὀφθαλμός; στατός, detenido). Instrumento que sirve para separar los párpados y fijar el globo del ojo, con el objeto de que se pueda practicar operaciones en dicho órgano.

oftalmotomía, *s. f.* (ὀφθαλμός; τομή, sección). Extirpación del ojo.

...olde. Véase : ... *ide*.

oídiomicosis, *s. f.* Enfermedad producida por el hongo de la estomatitis cremosa (*oidium albicans*).

oídium álbicans (Robin). Nombre dado por Ch. Robin al parásito de la estomatis cremosa ó muguete. Actualmente, à consecuencia de los estudios de Audry, considéra se dicho parásito como una levadura, *saccharomyces albicans*.

olfación, *s. f.* (*olfacere*, olfatear). Ejercicio del sentido del olfato.

olfatometría, *s. f.* Determinación del grado de la olfación.

oligocitemia, *s. f.* (ὀλίγος, poco; κύτος, glóbulo; αἷμα, sangre). Disminución del número de los glóbulos sanguíneos. — *olig. hematoblástica*. Disminución del número de los hematoblastos (fiebres prolongadas, anemia extremada).

oligocromemia, *s. f.* (ὀλίγος; χρῶμα, color; αἷμα, sangre). Disminución de la coloración de la sangre y por lo tanto de la hemoglobina (anemias).

oligoposia, *s. f.* (ὀλιγοποσια, ación de beber poco) (M. Labbé). Ingestión habitual de cantidades insuficientes de bebidas.

oligotriquia, *s. f.* (ὀλίγος; θρίξ, cabello). Desarrollo incompleto del sistema piloso, que no existe sino como simple pelusilla fina y débil.

oliguemia, *s. f.* (ὀλίγος; αἷμα, sangre). Véase: *anemia*.

oliguidramnios ú **oligo-amnios**, *s. m.* (ὀλίγος, poco) Insuficiencia en la cantidad del líquido amniótico, que puede bajar hasta 100 ó 150 gramos en una preñez á término.

oliguria, *s. f.* (ὀλίγος; οὐρεῖν, orinar). Disminución de la cantidad de la orina.

olímpica (**frente**). Frente prominente, anormalmente desarrollada en altura y en anchura (sífilis hereditaria).

Oliver (**signo de**). Véase: *tráquea* (*signo de la*).

...oma. Afijo que representa la terminación griega ...ωμα, que designa los tumores neoplásicos. Ej. *sarcoma*, *carcinoma*.

omacéfalo, *s. m.* (ὦμος, hombro; ἀκέφαλος, acéfalo). (I. G. St-Hilaire). Monstruo acéfalo privado de miembros torácicos y terminado en la región del hombro (forma muy rara).

omalgia, *s. f.* (ὦμος; ἄλγος, dolor). Véase: *escapulalgia*.

omental, *adj.* (*omentum*, epiplón). Que se refiere al epiplón ú omento.

omentofijación ú **omentopexia**, *s. f.* (*omentum*; πήξις, fijación). Véase: *Talma* (*operación de*).

omofagia, *s. f.* (ὠμός, crudo; φαγεῖν, comer). (Percy, año X). Bulimia por la carne cruda.

omotocia, *s. f.* (ὠμός, crudo, no maduro; τόκος, parto). Parto prematuro.

onanismo, *s. m.* (Onán, de quien se habla en la Biblia). « Conjunto de los medios empleados por uno

ú otro sexo para provocar el orgasmo venéreo fuera de las condiciones del coito normal » (Chrétien).

ondulación epigástrica. Fenómeno que se observa en la estenosis del píloro. Es una ondulación de la pared abdominal que se propaga de izquierda á derecha, debida á una especie de espasmo clónico de las túnicas musculares del estómago en lucha contra el obstáculo pilórico.

onfalectomía, *s. f.* (ὀμφαλός, ombligo ; ἐκτομή, extirpación). Resección del ombligo en la cura radical de la hernia umbilical. Ciertos cirujanos la practican sistemáticamente en la laparotomía mediana.

onfalocele, *amb.* (ὀμφαλός; κήδη, hernia). Hernia umbilical.

onfalorragia, *s. f.* (ὀμφαλός ; ῥαγεῖν, hacer irrupción). Hemorragia umbilical.

onfalósito, *s. f.* (ὀμφαλός; σῖτος, alimento). Nombre dado por I. G. St-Hilaire á todo aquel orden de monstruos que carecen de gran número de órganos, y cuya vida no se mantiene sino porque comunican con la madre por medio del cordón umbilical. Mueren al cortárseles el cordón.

onfalotomía, *s. f.* (ὀμφαλός; τομή, incisión). Sección del cordón umbilical.

ónfalotripsia, *s. f.* (ὀμφαλός; τρίβω, trituro). Aplastamiento del cordón umbilical por medio de una pinza de fuerte presión (onfalotribo) ; este procedimiento hace inútil la ligadura del cordón.

onicauxis, *s. f.* (ὄνυξ, uña ; αὔξη, crecimiento). Hipertrofia congénita ó adquirida de las uñas, desarrolladas regularmente en todo sentido.

ónico-atrofia, *s. f.* (ὄνυξ, uña ; atrofia). Atrofia congénita ó adquirida de las uñas.

ónicofagia, *s. f.* (ὄνυξ; φαγεῖν, comer). Hábito de comerse las uñas.

onicógena (evolución) (ὄνυξ; γεννᾶν, engendrar). Evolución que sufren las células de la capa de Malpigio en la placa unguinal. De esta evolución resulta la formación de los elementos de la uña.

ónicografia, *s. f.* (ὄνυξ; γράφειν, escribir) (Herz). Medida é inscripción de la presión de los vasos unguinales (pulso unguinal) por medio de un instrumento llamado onicógrafo, análogo al esfigmógrafo.

ónicogrifosis ú **ónicogriposis**, *s. f.* (ὄνυξ; γρυπός, encorvado). Hipertrofia irregular de la uña (uña claviforme, uña transversalmente acanalada, uña en forma de cuña encorvada hacia atrás, ó de garra encorvada hacia adelante).

ónicomicosis, *s. f.* (ὄνυξ; μύκηρ, hongo). Lesión producida en las uñas por hongos parásitos, ya por el *achorion Schœnleinii* (*onicomicosis fávica*), ya por una variedad de tricófito (*onicomicosis tricofítica*).

onicopatía, *s. f.* (ὄνυξ; πάθος, afección). Nombre genérico de las afecciones unguinales.

oniomanía, *s. f.* (ὠνή, compra; μανία, manía). Impulsión morbosa á hacer compras (uno de los numerosos estigmas síquicos de los degenerados).

onírico, *adj.* (ὄνειρος, sueño). Que tiene relación con los sueños.

onirodinia, *s. f.* (ὄνειρος, sueño; ὀδύνη, dolor): Pesadilla.

onixis, *s. f.* (ὄνυξ, uña). Nombre dado primitivamente á todas la inflamaiones del dermo sub-unguial ó retro-unguinal. Actualiente se reserva estenombre ara las formas crónicas acompañadas de ulceraciones y de fungosidades, cuyo tipo es la uña encarnada ú *onixis lateral*. Existen diversas variedades de *onixis* : la *o. escrofulosa*, la *o. sifilítica*, etc.

onomatomanía, *s. f.* (ὄνομα, nombre; μανία, locura) (Charcot y Magnan, 1885). Nombre dado á diversas formas de obsesión que presentan como carácter común el que el espíritu del enfermo se halla especialmente preocupado con un nombre ó una palabra. Ora es la busca angustiosa de ese nombre ó de esa palabra; ora la impulsión á repetirlos sin descanso; ora, por lo contrario, el temor angustioso que experimenta el paciente al oir ciertas expresiones.

ontogenia, *s. f.* (ὄν, ὄντος, el ser; γεννᾶν, engendrar). Desarrollo del individuo, por contraposición á *filogenia*, desarrollo de la especie.

ontología, *s. f.* (ὄν; λόγος, discurso). Brousseais designa con este nombre la doctrina, opuesta á la doctrina fisiológica, que no relaciona los fénomenos patológicos con los fenómenos regulares de la vida. — Flourens llama así el estudio de los seres vivos y de los fenómenos individuales.

ooforalgia, *s. f.* (ὠόν,

huevo; φέρειν, llevar; ἄλγος, dolor). Sin. : *ovaralgia*. Dolor situado en el ovario, sin que haya alteración anatómica alguna del órgano.

ooforectomía, *s. f.* (ὠόν; φέρειν; ἐκτομῆ, ablación). Sin. : *castración*, *ovariotomía normal*. Extirpación de los ovarios sanos, ó á lo menos aparentemente sanos. — Algunos autores lo toman como sinónimo de *ovariotomía*.

ooforitis, *s. f.* Véase : *ovaritis*.

ooforo-epilepsía, **ooforo-manía**, *s. f.* Nombre dado por Báttey á accidentes nerviosos graves (epilepsía, histeria, etc.), que atribuía á lesiones de los ovarios, porque coincidían con trastrornos menstruales. Esta doctrina ha tenido como resultado la extirpación de los ovarios á gran número de neurópatas.

ooforo-salpingectomía, *s. f.* Ablación de la trompa y del ovario por la vía abdominal.

ooforo-salpingitis, *s. f.* Véase : *salpingo-ovaritis*.

ooforo-salpingotomía, *s. f.* Ablación de los anejos del útero (ovarios y trompas).

ooforrafia, *s. f.* (ὠόν; φέρειν, sutura). Operación que consiste en fijar el ovario.

open-door (en inglés, puerta abierta). Método de tratamiento de la enagenación mental, caracterizado por la gran libertad en que se deja á los enfermos (supresión, en los asilos, de murallas y de todo lo que recuerde la casa de reclusión).

opiata, *s. f.* (ὄπιον; opio, de ὀπός, jugo). Nombre que se daba antes á los electuarios en cuya composición entra el opio. Actualmente se emplea como sinónimo de *electuario*.

opistión, *s. m.* (ὄπισθην, atrás) (antropología). Punto medio del borde posterior del agujero occipital.

opistognatismo, *s. m.* (ὄπισθην, atrás; γνάθος, mandíbula). Disposición tal de la cara que la línea descendente del perfil se dirige hacia atrás (contrario al prognatismo).

opistótonos, *s. m.* (ὄπισθην, atrás; τόνος, tensión). Variedad de tétanos caracterizada por el predominio de la contracción de los músculos extensores. El cuerpo y la cabeza se doblan hacia atrás, las piernas y los brazos hállanse en extensión.

opocéfalo, *s. m.* (ὤψ, ὀπός, cara; κεφαλή, cabeza).

(I. G. St-Hilaire). Monstruos unitarios autósitos que presentan la atrofia de la región inferior del cráneo, con aproximación ó reunión de las orejas en la línea media (grupo de los otocéfalos), y especialmente caracterizados por la ausencia de boca ó de trompa, un ojo único ó ambos ojos reunidos, los cuales con sus dependencias forman la mayor parte de la cabeza.

opodimo, *s. m.* (ὤψ, cara: δίδυμος, gemelo) (I. G. St-Hilaire). Monstruos dobles que no poseen sino un cuerpo (monosomianos), y cuyas dos cabezas, confundidas hacia atrás, se separan en dos caras á partir de la región ocular.

opoterapia, *s. f.* (ὀπός, jugo; θεραπεία, tratamiento) (Landouzy). Sin. : *órganoterapia*. Método de tratamiento por el empleo de extractos preparados con órganos de animales.

opsiuria, *s. f.* (ὄψε, tarde; οὖρον, orina) (Gilbert y Lereboullet, 1901). Retardo de la eliminación acuosa de la orina después de las comidas, puesto en evidencia por el examen fraccionado. Este síntoma, debido al retardo de la absorción en el intestino, revela la hipertensión portal incipiente.

opsonina, *s. f.* (Wright, 1904) (ὀψωνῶ, preparo). Sustancia susceptible de combinarse químicamente con los microbios para prepararlos á la fagocitosis; existe en el suero de los sugetos normales y con mayor abundancia en los vacunados.

optometría, *s. f.* (ὤψ, ὀπός, ojo; μέτρον, medida). Sin. : *dióptrica del ojo*. Determinación de los límites de la visión distinta, por medio de un instrumento llamado optómetro.

orbitario (índice) (antropología). Relación que, en el esqueleto, existe entre los diámetros vertical y transverso de la órbita.

organicismo, *s. m.* Teoría médica según la cual toda enfermedad es causada por lesión material de un órgano.

organismo, *s. m.* Individuo animal ó vegetal formado de cierto número de partes ó de órganos, y dotado de vida propia.

organito, *s. m.* Elemento celular. Cuerpo organizado que forma la estructura de los seres vivos.

órganogenesia ú **órganogénesis,** *s. f.* (ὄργανον, órgano; γεννᾶν, engendrar). Estudio de la formación y del desarrollo

de cada órgano, en particular, de la economía.

órganografía, (ὄργανον; γραφεῖν) ú **órganología**, *s. f.* (ὄργανον; λόγος). Descripción de los órganos.

organoide (tumor). Véase : *teratoma.*

órganoléptica (propiedad) (ὄργανον; ληπτός, recibido) (Chevreul). Impresión hecha por los cuerpos sobre los órganos de los sentidos.

órganopatía, *s. f.* (ὄργανον ; πάθος, padecimiento). Afección que corresponde á una lesión orgánica, por contraposición á las afecciones *sine materia*.

órganoterapia, *s. f.* Véase : *opoterapia.*

orgasmo, *s. m.* (ὀργασμός, de ὀργᾶν, estar excitado). Excitación genésica llevada al más alto grado.

Oriente (botón ó **úlcera de).** Véase : *botón de Oriente.*

orología, *s. f.* (ὀρός, serosidad; λόγος, discurso) (Landouzy). Parte de la anatomía normal y de la anatomía patológica que comprenden el estudio de los humores del organismo (sangre, linfa, derrames serosos, etc.)

orquialgia, *s. f.* (ὄρχις, testículo; ἄλγος, dolor). Neuralgia testicular.

orquidectomía, *s. f.* (ὄρχις ; ἐκτομή, ablación). Extirpación de un testículo (*orquidectomía simple*) ó de ambos testículos (*orquidectomia doble*).

orquidopexia, *s f.* (ὄρχις; πήξις, fijación. Sin. : *celorrafia.* Operación que consiste en fijar el testículo en las bolsas. Practícase en los casos de torsión del cordón, así como en los de ectopia testicular; entonces se completa con la cura radical de la hernia inguinal coexistente.

orquidoterapia, *s. f.* (ὄρχις; θεραπεία, tratamiento). Empleo terapéutico del jugo testicular (método de Brown-Séquard).

orquido-vaginopexia, *s. f.* (Parona). Operación practicada en la varicocele. Consiste en fijar al anillo inguinal externo el testículo, por medio de la vaginal.

orquitis, *s. f.* (ὄρχις, testículo). Nombre colectivo de todas las inflamaciones agudas ó crónicas del testículo. Ordinariamente se complica con epididimitis.

ortocefálico, *adj.* (ὀρθός, derecho; κεφαλή, cabeza) (antropología). Que se aplica en algunas nomenclaturas al cráneo mesaticefálico. Véase : *mesaticefálico.*

ortodiagrafía, *s. f.* Procedimiento que permite determinar las dimensiones reales de los objetos (con particularidad las del corazón) por la imagen radiográfica.

ortodiascopia, *s. f.* Proyección normal sobre la pantalla fluorescente del contorno de los órganos que van á ser estudiados.

ortodontosia, *s. f.* (ὀρθός, derecho; ὀδους, diente). Parte del arte dental que se ocupa en las deformidades congénitas ó adquiridas de los dientes.

ortofonía, *s. f.* (ὀρθός; φονή, voz). Pronunciación normal, por contraposición al ceceo y demás trastornos de la fonación.

ortofónico (tratamiento). Tratamiento destinado á corregir los vicios de pronunciación (tartamudez, ceceo, etc.).

ortofrenia, *s. f.* (Félix Voisin), **ortofrenopedia**, *s. f.* (ὀρθός; φρήν, espíritu; παῖς, niño). Educación y amaestramiento de los degenerados jóvenes.

ortognatismo, *s. m.* (ὀρθός, derecho; γράτος, mandíbula). Aquella disposición general de la cara en que la línea del perfil de la frente al mentón sea vertical. Esta conformación, en realidad, no se encuentra en raza alguna: todas son más ó menos prognáticas. Dase, no obstante, el epíteto de *ortognatas* á las razas en que dicha línea de perfil se aproxima más á la vertical (raza blanca).

ortomorfia, *s. f.* ú **ortomorfismo**, *s. m.* (ὀρθός; μορφή, forma). « Arte de prevenir y de corregir las deformaciones del cuerpo » (Delpech). Término propuesto para reemplazar la voz *ortopedia*, la cual implica, erróneamente, que dicho arte es especial á la infancia.

ortopedia, *s. f.* (ὀρθός; παῖς, niño). Vocablo creado por Andry (1741) quien le dió como significado: « el arte de prevenir y de corregir en los niños las deformidades del cuerpo ». Actualmente se extiende esta definición á los adultos.

ortopnea, *s. f.* (ὀρθός, derecho; πνεῖν, respirar). Disnea que obliga al enfermo á sentarse ó á permanecer de pie, siéndole imposible acostarse.

ortoscopio, *s. m.* (ὀρθός; σκοπεῖν, examinar). Aparato destinado á examinar bajo el agua el ojo, y más particularmente la cámara anterior y el iris. Poco usado; dicho aparato es ge-

neralmente reemplazado por el alumbrado lateral.

ortostática (albuminuria). Véase : *albuminuria ortostática.*

ortostática (taquicardia). Véase : *taquicardia ortostática.*

ortostatismo, *s. m.* (ὀρθοστατεῖν, tenerse en pie). Conjunto de los fenómenos determinados por la estación vertical. Término empleado en el estudio de la influencia de las actitudes del cuerpo sobre el funcionamiento de los órganos.

ortóstonos, *s. m.* (ὀρθός ; τόνος, contracción, tensión). Variedad de tétanos caracterizada por la contracción sinérgica de los músculos extensores y flexores, que mantiene el cuerpo recto.

ortigada (fiebre). Véase : *urticaria.*

orzuelo, *s. m.* Forúnculo del párpado cuyo punto de partida es una de las glándulas sebáceas anejas al ojo. Su forma y su tamaño lo han hecho comparar con un grano de cebada (*hordeolus* .

osificación, *s. f.* (*ossium; facere*). 1° Véase : *osteogenia* (fenómeno normal). — 2° Producción accidental de tejido óseo à expensas de otro tejido (fenómeno patológico).

osifluente (abceso) (*ossium, fluens*). Abceso de origen óseo.

osiforme (zona). Sin. : *zona osteoide.* Capa observada en el hueso en vía de osificación encondral; la caracteriza la invasión de las cavidades, que contenían células cartilaginosas, por asas vasculares y osteo-blastos.

... osis (... ωσις). Afijo que designa las enfermedades crónicas (*tuberculosis, carcinosis*), y más especialmente las producidas por parásitos animales (*tripanosomosis, filariosis*, etc.).

osmidrosis, *s. f.* (ὀσμή, olor; ἱδρώς, sudor). Sin.: *bromidrosis.* Trastorno de la secreción sudoral, caracterizado por un sudor abundante que despide cierto olor desagradable.

osmonocividad, *s. f.* Trastornos mecánicos observados á consecuencia de la introducción en el organismo, por vía intravenosa, de un líquido cuya concentración molecular no es igual á la del suero con que se halla en contacto. Semejantes trastornos provienen de las variaciones de la presión osmótica de los líquidos en el organismo, y no deben confundirse con los que provoca la toxicidad del líquido inyectado.

osmosis, *s. f.* (ὠσμός, acción de empujar). Paso recíproco de dos líquidos á través de la membrana que los separa.

osqueocele, *amb.* (ὀσχέον, escroto; κήλη, hernia). Hernia escrotal.

ostealgia, *s. f.* (ὀστέον, hueso; ἄλγος, dolor). Véase: *osteócopo* (*dolor*).

osteídeo, *adj.* (ὀστέον; εἶδος, forma). Se aplica á los tejidos incrustados por sales calcáreas.

osteítis, *s. f.* Nombre colectivo de las inflamaciones de los huesos. Tómase á veces como sinónimo de *osteomielitis*.

osteítis hiperémica no supurada, osteítis plástica del crecimiento. Véase: *crecimiento* (*fiebre de*).

osteítis productiva. Nombre dado por Cornil y Ranvier á todas las osteítis que determinan la formación de tejido óseo nuevo.

osteo-artritis, *s. f.* Artritis complicada con lesiones óseas de las superficies articulares.

osteo-artropatía hipertrofiante neumica (Marie). Trastorno trófico del esqueleto de los dedos, que ataca la falangeta, la cual adquiere dimensiones considerables (dedos en clava, en badajo). Las uñas, hipertrofiadas y encorvadas, semejan vidrios de reloj. Estas deformaciones se observan en todas las enfermedades crónicas que turban la hematosis: tisis crónica, cianosis, etc.

osteoblasto, *s. m.* (ὀστέον, hueso; βλαστός, germen). Las células jóvenes que se encuentran en la médula de los huesos y en el periósteo; contribuyen á la formación de los huesos con la elaboración de la sustancia ósea fundamental, donde son aprisionadas, y transfórmanse en células óseas.

osteocia, *s. f.* (ὀστέον; ὠκύς, liviano) (Ferrier, 1900). Disminución, á causa de la decalcificación, de la densidad y consistencia de los huesos. Puede considerarse dicho estado como un esbozo de osteomalacia. Se diagnostica por la odontocia.

osteoclasia, *s. f.* (ὀστέον, hueso; κλάειν, quebrar). Método terapéutico que consiste en enderezar ciertas deformidades de los huesos y de las articulaciones, fracturando un hueso, ya por esfuerzos manuales, ya por medio de aparatos especiales llamados osteoclastos.

osteoclasto ú **ostoclasto,** *s. m.* 1° Nombre

dado por Kölliker á los mieloplaxos (grandes células de la médula ósea), porque son los agentes destructores de la sustancia ósea.—2º Véase: *osteoclasia*.

osteócopo (dolor) (ὀστέον; κόπτειν, quebrar). Sin.: *ostealgia, osteodinia*. Dolor óseo profundo, agudo, que no coincide con signo exterior alguno, debido casi siempre à la sífilis.

osteodinia, *s. f* (ὀστέον; ὀδύνη, dolor). Véase: *osteócopo* (*dolor*).

osteófago, *s. m.* (ὀστέον, hueso; φάγεῖν, comer). Véase: *osteoclasto* 1º.

osteófito, *s. m.* (ὀστέον; φυτόν vegetación) (Lobstein). Nombre dado á ciertas masas óseas irregulares que se desarrollan en la superficie de un hueso á consecuencia de osteítis poco intensas, mas, de larga duración.

osteógena (capa) (Ollier). La parte más profunda del perióstco, que se distingue por una serie de capas de células jóvenes (osteoblastos) que contribuyen activamente á la formación del hueso.

osteogenia ú **osteogénesis**, *s. f.* (ὀστέον, γεννᾶν, engendrar). Estudio del desarrollo de los huesos.

osteoide (condroma, sarcoma, tumor) (ὀστέον; εἶδος, forma). Tumor raro, casi siempre difuso, que se generaliza frecuentemente á gran número de órganos; está constituído por una especie de armazón de células finas, refringentes, infiltradas de granulaciones calcáreas, en cuyas trabas se encuentran células redondas ó fusiformes, análogas á las células sarcomatosas. No se hallan allí los osteoblastos característicos del tejido óseo.

osteoide (zona). Véase: *osiforme* (*zona*).

osteolisis, *s. f.* (ὀστέον; λύσις, disolución) (Lobstein). Destrucción gradual del tejido óseo sin que deje resíduo (el desgaste de los cuerpos vertebrales por una aneurisma aórtica).

osteología, *s. f.* (ὀστέον; λόγος, discurso). Parte de la anatomía que trata de los huesos.

osteoma, *s. m.* Tumor constituído por tejido óseo.

osteomalacia, *s. f.* (ὀστέον; μαλακία, blandura). Afección rarísima del sistema óseo, observada á veces en las mujeres que han tenido una ó varias preñeces, caracterizada anatómicamente por la reabsorción de las sales calcáreas de la sustancia ósea y la disolución de las trabéculas óseas, y, clí-

nicamente, por el reblandecimiento más ó menos completo de diferentes huesos, susceptible de producir extrañas deformaciones. — *osteomalacia senil.* Véase : *osteoporosis.*

osteomielitis, *s. f.* (ὀστέον; μυελός, médula). Inflamación simultánea del hueso y de la médula ósea.

osteomielitis de los adolescentes ú **osteomielitis flegmonosa.** Sin.: *periostitis flegmonosa difusa.* Enfermedad de la infancia y de la adolescencia, que consiste en la inflamación de los elementos embrionarios del hueso, del periósteo y de la cavidad medular, debida al desarrollo del estafilococo piógeno; acompañada de síntomas generales graves, su término es la supuración (flemón óseo).

ósteo-neuralgia, *s. f.* Sin. : *osteitis de forma neurálgica* (Gosselin). Variedad de inflamación crónica de los huesos que no supura ni está acompañada de fenómenos infectivos, caracterizada por dolores rebeldes, muy vivos, con exacerbaciones ora diurnas, ora nocturnas. Se le ha señalado como causas : el traumatismo, la sífilis, el reumatismo articular crónico, la histeria.

osteoperiostitis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica del periósteo y del hueso subyacente.

osteoperiostitis, alveolo-dental. Véase: *periostitis alveolo-dental.*

osteoplasto, *s. m.* (ὀστέον, hueso; πλάστης, formación). Las cavidades excavadas en la sustancia fundamental del hueso, donde se alojan las células óseas.

osteoplastia, *s. f.* (ὀστέον; πλασσεῖν, formar). Nombre dado á las operaciones que tienen por objeto la restauración de un hueso por medio de fragmentos óseos. — *osteoplastia perióstica* (Ollier). Sin. : *periósteoplastia.* Procedimiento operatorio destinado á producir tejido óseo con colgajos de periósteo transplantados.

osteoporosis, *s. f.* (ὀστέον, hueso, πόρος, poro). Rarefacción del tejido óseo debida á la atrofia de las trabéculas, que produce el agrandamiento de los espacios y cavidades medulares. (No hay decalcificación como en la osteomalacia.) — *osteoporosis adiposa* (Cornil y Ranvier). La rarefacción se efectúa en las extremidades epifisiarias, y los espacios

celulares agrandados se llenan de células adiposas. — *osteoporosis senil.* Sin. : *osteomalacia senil.* Los espacios medulares ya casi no contienen células adiposas, sino células semejantes á las de la médula fetal, como en la osteomalacia.

osteopsatirosis, *s. f.* (ὀστέον; ψαθυρός, friable) (Lobstein). Enfermedad hereditaria, familial, que se manifiesta desde la primera infancia por una fragilidad particular de los huesos, la cual determina numerosas fracturas. Por lo demás, estas fracturas se consolidan normalmente. La patogenia no se cononce aún.

osteosarcoma, *s. m.* Sarcoma desarrollado en los huesos. Se describen, según el punto de partida, tres variedades : *osteosarcoma central* ó *mielógeno*, que deriva de la médula y se desarrolla en las epífisis de los huesos largos y el tejido esponjoso de los otros huesos. — *osteosarcoma periférico* ó *periosteal*, que se desarrolla sobre todo en las diáfisis, á expensas de la cara profunda del perióstеo (médula sub-perióstica). — *osteosarcoma parosteal*, que toma origen sobre la cara externa del perióstеo.

osteosclerosis, *s. f.* (ὀστέον; σκλήρωσις, induración). Nombre dado á veces á la eburnación del hueso.

osteosteatoma, *s. m.* (ὀστέον; στέαρ, grasa). Nombre que se da á veces al osteosarcoma que ha sufrido la degeneración grasosa.

osteotomía, *s. f.* (ὀστέον; τομή, sección). Nombre dado á las operaciones en que se practica la sección de un hueso, en una parte sana, para enderezar un miembro diforme.

otalgia, *s. f.* (οὖς, ὠτός, oído ; ἄλγος, dolor). Dolor en el oído, sin alteración del órgano.

otematoma, *s. m.* (οὖς, ὠτός, oreja ; hematoma). Hematoma del pabellón de la oreja.

óticodinosis ú **óticodinia**, *s. f.* (οὖς, ὠτός; δίνος ó δίνη, vértigo). Véase : *Ménière* (*enfermedad de*).

otitis, *s. f.* (οὖς, ὠτος, oído). Inflamación crónica ó aguda del oído. — *otitis externa.* Inflamación del conducto auditivo externo. — *otitis interna.* Inflamación primitiva ó secundaria del oído interno. — *otitis laberíntica.* Véase : *Ménière* (*enfermedad de*). — *otitis media.* Inflamación de la caja del tímpano.

otocéfalo, *s. m.* (οὖς, ὠτός; κεφαλή, cabeza) (I. G.

St-Hilaire). Monstruo que presenta una sola órbita, la cual contiene uno ó ambos ojos; cuyas orejas se hayan muy cerca la una de la otra, ó reunidas en una sola, debajo de la cabeza; cuyas mandíbulas son distintas, y que no tiene trompa nasal.

otoconia, *s. f.* (οὖς, ὠτός; κονία, polvo) (Breschet). Materia blanca que se encuentra en el laberinto membranoso.

otocoposis, *s. f.* Agotamiento temporal de la audición; signo del principio de la sordera. El oído disminuye rápidamente para reaparecer después de algunos instantes de silencio.

otolito, *s. m.* (οὖς; λίθος, piedra). Concreción de carbonato de cal que se encuentra en el oído interno.

otología, *s. f.* (οὖς; λόγος, discurso). Estudio del oído y de las enfermedades que le son especiales.

otomicosis, *s. f.* (οὖς, μυκῆς, hongo). Afección debida al desarrollo de un aspergilo en el conducto auditivo externo. Revélase casi siempre por principio brusco, dolores muy vivos, zumbidos de oídos, sordera casi completa, y á veces produce la perforación del tímpano.

otoplastia, *s. f.* (οὖς; πλασσεῖν, formar). Operación que tiene por objeto restaurar el oído externo destruído ó deformado.

otorrea, *s. f.* (οὖς; ῥεῖν, fluir). Nombre dado á los derrames que se hacen por la oreja, cualesquiera que sean la naturaleza y el punto de partida.

otoscopia, *s. f.* (οὖς; σκοπεῖν, examinar). Nombre dado al examen del oído, cualquiera que sea el procedimiento empleado (otoscopio, espéculo, etc.).

ovaralgia, *s. f.* Véase: *ooforalgia*.

ovariana (facies). Sin. : *facies de Spéncer Wells*. Alteración particular de la fisonomía, que consiste principalmente en la emaciación de los razgos y el tinte terroso, considerada por Spéncer Wells como uno de los signos característicos de los quistes del ovario.

ovariectomía, *s. f.* (*ovarium*; ἐκτομή, excisión). Ablación de los ovarios (término más exacto, aunque menos usado, que *ovariotomía*).

ovariocele, *amb.* (*ovarium*; κήλη, tumor). Hernia del ovario.

ovarioterapia, *s. f.* (*ovarium*; θεραπεία). Empleo terapéutico de las preparaciones ováricas.

ovariotomía, *s. f.* (*ovarium*; τομή, sección). Operación que consiste en extirpar los ovarios. Esta voz se emplea principalmente para designar la ablación completa de un quiste ovárico.

ovaritis, *s. f.* Inflamación del ovario que acompaña generalmente la salpingitis.

ovillado, *adj.* (*ovis*, oveja). Se aplica á las materias fecales que tienen la forma y la dureza de los excrementos de las ovejas.

oviparidad, *s. f.* (*ovum*, huevo; *parere*, parir). Modo de reproducción por huevos.

ovocentro, *s. m.* El centrosoma hembra, en la *cariocinesis*. Existe probablemente en el óvulo antes de la fecundación.

ovogenia, *s. f.* (*ovum*; γένεσις, nacimiento). Estudio del desarrollo del óvulo. Término empleado á menudo como sinónimo de *embriogenia*.

ovulación, *s. f.* Postura ovárica. Ruptura del ovisaco y liberación del óvulo.

oxaluria, *s. f.* (oxalato; οὖρον, orina). Presencia de oxalato de cal en la orina.

oxicefalia, *s. f.* (ὀξυς, agudo; κεφαλή, cabeza) (Virchow). Véase: *acrocefalia*.

oximiel, *s. m.* (ὀξυς, ácido; μέλι, miel). Medicamento compuesto de miel y vinagre.

oxiosmia, *s. f.* (ὀξυς, agudo; ὀσμή, olfato). Sensibilidad exquisita del olfato que se observa en ciertos individuos y en ciertas razas (negros). La *oxiosmia* es fisiológica, mientras que la *hiperosmia* es fenómeno patológico.

oxiregmia, *s. f.* (ὀξυς, ácido; ἐρευγμός, eructo). Eructación ácida.

oxitócico, *adj.* (ὀξυς, pronto; τόκος, parto). Véase: *ocitócico*.

oxiuro, *s. m.* (ὀξύς, agudo; οὐρα, cola). Sin.: *oxiuro vermicular*. Gusano del órden de los Nematodes (familia de los Ascárides), de 4 á 9 milímetros de largo, según el sexo, que vive como parásito en el tubo digestivo. Se le encuentra en toda la extensión de los intestinos delgado y grueso; su presencia en el recto y en el ano determina un prurito insoportable.

ozena, *s. m.* (ὄζειν, heder). Sin.: *rinitis atrófica*, *rinitis crónica fétida*. Afección de la mucosa nasal, cuyo síntoma principal es la exhalación por las narices de un hedor fétido, comparado al de una chinche des-

pachurrada; al mismo tiempo la potencia olfativa se halla disminuída. El examen directo permite comprobar la atrofia de la mucosa y del esqueleto subyacente, así como la presencia de mocopus y de costras oscuras que tapizan las paredes de las fosas nasales.

ozenoso, *adj.* (ὄζειν, heder). Que hiede. — *pleuresía ozenosa.* Nombre genérico dado por Dieulafoy á las pleuresías que despiden mal olor; comprende las *pleuresías fétidas,* pleuresía purulenta cuyo líquido es hediondo sin que haya desprendimiento de gases, ni esfacelo; las *pleuresías pútridas,* acompañadas de desprendimiento de gases dentro de la pleura (pioneumotórax); las *pleuresías gangrenosas,* en las que hay esfacelo de la pared pleural.

P

Páget (enfermedad de) (*Paget's disease of the nipple*). Afección rara del pezón observada en las mujeres después de los cuarenta años, caracterizada primero por lesiones de la piel que recuerdan más ó menos el exema, luego por la infiltración progresiva de la glándula mamaria, que toma el aspecto de un verdadero tumor maligno. Se ha atribuído la causa de la enfermedad à ciertas sorospermias.

Páget (enfermedad ósea de). Sin.: *osteítis deformante hipertrófica.* Enfermedad caracterizada por el aumento de volumen y la deformación de las diversas partes del esqueleto, y particularmente de los huesos de los miembros, del tórax y de la frente; á menudo la acompañan dolores violentos. Para algunos autores, es efecto de sífilis hereditaria.

palanestesia, *s. f.* (πάλλειν, sacudir; anestesia) (Rydel y Seiffer, 1903). Abolición de la sensibilidad vibratoria.

palatitis, *s. f.* (*palatum,* paladar). Estomatitis limitada al paladar.

palatoplastia, *s. f.* (*palatum*; πλάσσειν, formar). Véase: *estafiloplastia.*

palatosquisis, *s. f.*

(*palatum*; σχίζειν, dividir). Prolongación á la bóveda palatina de la fisura del labio leporino.

palestesia, *s. f.* (πάλλειν, sacudir; αἴσθησις, sensibilidad) (Rydel y Seiffer, 1903). Sensibilidad vibratoria estudiada por medio el diapasón aplicado sobre la piel.

paleta, *s. f.* 1° Vaso chato, de estaño, graduado, que sirve en las sangrías para recibir la sangre, de capacidad de 125 gramos. — 2° (dim. de pala). Pequeña tabla, que tiene la forma de la mano, dividida en cinco lengüetas correspondientes á cada uno de los dedos; se emplea en las curas de las heridas de la mano y permite mantener separados los dedos.

palmeadura, *s. f.* (*palmatus*, palmeado). Véase: *sinodactilia*.

palmetación, *s. f.* ó **palmeteo**, *s. m.* Sin.: *ferulación*. Manipulación terapéutica que consiste en golpear el cuerpo con una palmeta ó férula.

paliativo, *adj.* y *s. m.* (*palliare*, ocultar). Remedio para calmar ó suprimir los síntomas penosos de una enfermedad, sin obrar sobre la enfermedad misma.

palmo-espasmo, *s. m.* (Walter). Fenómeno bastante raro, observado en la atrofia muscular progresiva. Es una especie de agitación de la mano que se produce cuando se interumpe una corriente galvánica ó farádica que atraviesa los músculos del miembro superior.

palmo-plantar (signo) (Filipovicz, 1893). La especial coloración amarilla que toman, durante ciertas enfermedades febriles, las regiones palmares y plantares. En la convalescencia estas mismas regiones son asiento de una abundante descamación. Se encuentra en el reumatismo articular agudo, la tuberculosis y sobre todo en la fiebre tifoidea, donde es más frecuente y más clara.

palpación, *s. f.* (*palpare*) « Método de exploración que consiste en aplicar los dedos ó la mano entera sobre las partes exteriores del cuerpo y en las cavidades accesibles, para apreciar por el tacto las cualidades físicas de los tejidos, y para, al mismo tiempo, informarse sobre la consistencia, elasticidad, movilidad, vibraciones, temperatura y, finalmente, sobre la sensibilidad, de los diferentes órganos » (H. Barth).

palpitación, *s. f.* (*pal-*

pitare, frecuentativo de *palpare*). « Latido cardiaco, sensible é incómodo para el enfermo, más rápido que en estado natural, y, á veces, desigual en frecuencia y expansión. » (Laënnec.)

palúdide, *s. f.* Nombre dado á los accidentes cutáneos que parecen derivar directamente de la infección palúdica.

paludismo, *s. m.* **palúdicas** ó **palustres (fiebres)** (*palus*, *paludis*, pantano). Sin. : *malaria*, *impaludismo*, *fiebres maregmáticas*, *f. telúricas*, *f. intermitentes* Enfermedad infectiva causada por un hematozoario especial descrito por primera vez por Laverán. Muy variable en la forma, consiste lo más á menudo en accesos de fiebre que sobrevienen á intervalos regulares, y son susceptibles de ceder ó desaparecer por el empleo de las sales de quinina.

panadizo ó **panarizo**, *s. m.* (*panaricium*). Nombre genérico de todas las inflamaciones agudas de los dedos, cualesquiera que sean la naturaleza, extensión y profundidad.

panadizo analgésico ó **nervioso.** Véase : *Morván* (*enfermedad de*).

pancreatectomía, *s. f.* (páncreas ; ἐκτομή, excisión). Extirpación total ó parcial del páncreas.

pancreáticolitotripsia, *s. f.* Hacer que los cálculos pancreáticos retrocedan.

pancreáticotomía, *s. f.* (pancreático ; τομή, sección). Sin. : *talla pancreática*. Incisión del canal pancreático.

pancreatitis, *s. f.* Las inflamaciones agudas ó crónicas del páncreas. La *pancreatitis aguda* ó *sobreaguda* realiza á menudo el cuadro clínico de la oclusión intestinal aguda ó de la peritonitis por perforación seguida de muerte rápida. La *pancreatitis subaguda* puede empezar tan dramáticamente como la anterior, mas presenta remisiones y recaídas ; suele terminar en la *pancreatitis crónica*, caracterizada por enflaquecimiento rápido, astenia, dolor en el punto pancreático (sobre la línea umbílico-axilar, á 5 ó 6 centímetros del ombligo), ictericia con distensión de la vesícula biliar y trastornos digestivos causados por la insuficiencia del órgano.

pancreato-enterostomía, *s. f.* Establecimiento de una fístula que ponga en comunicación el

canal pancreático con el intestino.

pancreato-gastrostomía, *s. f.* Establecimiento de una fístula que ponga en comunicación el canal pancréatico con el estómago.

pancreato-quistotomía, *s. f.* Incisión de un quiste del páncreas.

pancreatostomía, *s. f.* (páncreas; στόμα, boca). Véase : *pancreato-enterostomía.*

pancreatotomía, *s. f.* (páncreas; τομή, sección). Incisión quirúrgica del páncreas.

pandemia, *s. f.* (πᾶς, todo; δῆμος, pueblo). Enfermedad que ataca á casi todos los habitantes de una región. Ej.: *peste, cólera,* etc.

panflegmón, *s. m.* (πᾶς, todo; φλέγω, quemo). Septicemia sobre-aguda.

paniculitis, *s. f.* Inflamación del tejido grasoso subcutáneo ó panículo adiposo.

panlecítico (óvulo) (πᾶς, todo; λέκιθος, yema de huevo). Nombre dado á los huevos en que el vitelo nutritivo (lecito), muy abundante, se halla acumulado en la parte más lejana al núcleo. Huevo de segmentación total, mas desigual (batracios).

panmastitis, *s. f.* (πᾶς, todo; μαστός, mama). Sin. : *mastitis total.* Flemón difuso que invade la glándula mamaria en su totalidad.

pannus, *s. m.* (*pannus,* pedazo de tela). Sin. : *queratitis vascular.* Afección de la córnea debida generalmente á una irritación prolongada, y caracterizada por el desarrollo en su superficie de una red vascular, con inyección intensa de la conjuntiva. La transparencia de la córnea ó queda intacta (*pannus tenuis*), ó se enturbia más ó menos profundamente (*pannus crassus* ó *sarcomatoso*).

panoftalmía ó **panoftalmitis,** *s. f.* (πᾶς, todo; ὀφθαλμός, ojo). Sin. : *oftalmía purulenta profunda, flegmón del ojo.* Inflamación supurativa que invade el ojo entero, y termina generalmente por supuración y atrofia.

panópticos (anteojos) (πᾶν, todo; ὄπτομαι, veo). Sin. : *anteojos estenopeicos.* Anteojos en que los vidrios son reemplazados por dos pantallas perforadas por orificios de 6 á 7 décimos de milímetro. Sirven para todas las vistas y permiten la visión muy de cerca.

panosteítis, *s. f.* (πᾶν, todo; ὀστέον, hueso). Osteomielitis aguda.

pansinusitis, *s. f.* Sin. : *sinusitis combinadas.* Inflamación simultánea de varios senos de la cara.

pantofobia, *s. f.* (πᾶς, παντός, todo; φόβος, temor). Terror exagerado y demostrativo, que generalmente se refiere á alucinaciones de la vista y del oído ó á concepciones delirantes.

pantoptosis, *s. f.* Tosis generalizada, que no sólo ataca las vísceras abdominales (intestino, hígado, riñones, bazo), sino que coincide con prolapso del recto y de la vejiga, tendencia á las hernias, várices, hemorroides, atonía gástrica é intestinal y desórdenes nerviosos, neurasténicos ó histéricos.

papilares (tumores). Nombre dado á tumores de naturaleza diversa (sarcoma, fibroma, carcinoma, epitelioma) que presentan en la superficie pequeñas eminencias, análogas á papilas hipertrofiadas. Se les confunde á veces, erróneamente, con los papilomas.

papilitis, *s. f.* (oftalmología). Edema de la papila óptica, de causa mal conocida (compresión ó inflamación).

papilitis lingual. Ulceraciones pequeñas muy dolorosas, visibles sólo á la lente, y ocultas en los pliegues de la mucosa lingual al rededor de las papilas fungiformes.

papiloma, *s. m.* Lesión inflamatoria de la piel y de las mucosas, caracterizada por la hipertrofia de las papilas normales. Sus causas son múltiples; pueden ser vulgares, ó al contrario específicas (verrugas, ciertas formas de tuberculosis). El *papiloma* no debe pues clasificarse como tumor.

pápula, *s. f.* Lesión elemental de la piel caracterizada por una eminencia sólida, de formas diversas (cónica, hemisférica, con facetas), cuyas dimensiones varían de un grano de mijo á una lenteja y aún más, de color rosado, rojo, más rara vez oscuro, formada por la infiltración de la capa superficial del dermo, y que al cabo de cierto tiempo desaparece sin dejar cicatriz.

paquicefalia, *s. f.* (παχύς, espeso; κεφαλή, cabeza) (Virchow). Espesamiento de las paredes del cráneo con sinostosis de los parietales y del occipital.

paquicoroiditis, *s. f.* (Despagnet). Forma de coroiditis atrófica congénita, caracterizada por la producción de una capa de tejido fibroso entre la membrana

osificada y el líquido subretiniano.

paquidermatocele, *amb.* (παχύς, grueso; δέρμα, piel; κήλη, tumor) (Valentín Mott). Véase : *dermatolisis*.

paquidermia, *s. f.* Véase : *elefantiasis*.

paquimeningitis, *s. f.* (παχύς, espeso; μήνιγξ, membrana). Inflamación crónica de la dura-madre con espesamiento y formación de neo-membranas. Puede atacar principalmente la cara interna de la dura-madre y constituir la *paquimeningitis interna*, causa común de las hemorragias meningeas; más rara vez es *externa* y constituye la *escleromeningitis*, lesión que no presenta historia clínica.

paquimeningitis cervical hipertrófica (Charcot). Afección caracterizada anatómicamente por el engrosamiento de la dura-madre, que comprime la médula cervical y las raíces raquídeas, y clínicamente, en su primer período, por dolores bastante fuertes en la nuca que irradian hacia los miembros superiores, y más tarde por parálisis con atrofia muscular de las manos, los antebrazos y los brazos.

paqui-pelvi-peritonitis hemorrágica. Peritonitis crónica localizada en la pequeña pelvis y cuyos vasos neo-formados, muy friables, provocarían la hematocele pelviana (proceso análogo á la hemorragia meningea en la paquimeningitis).

paqui-perihepatitis, *s. f.* Perihepatitis acompañada de producción de falsas membranas entre las cuales pueden producirse y enquistarse derrames serosos ó hemorrágicos.

paqui-pleuritis hemorrágica. Pleuresía hemorrágica acompañada de espesamiento de la pleura (generalmente de naturaleza tuberculosa).

paquisalpingitis, *s. f.* Sin. : *salpingitis crónica parenquimatosa*, *salpingitis crónica hipertrófica* Salpingitis crónica caracterizada por la proliferación considerable del tejido conjuntivo y el espesamiento de las paredes de la trompa.

paquisinovitis hemorrágica. Variedad hemorrágica del higroma crónico.

paquivaginalitis, *s. f.* Sin. : *hematocele vaginal*, *periorquitis*, *vaginalitis plástica*. Inflamación crónica de la serosa que envuelve al testículo (vaginal), acompañada de espesamiento y de hemorragias.

paquivaginitis quística. Sin. : *colpohiperplasia, vaginitis enfisematosa.*

para-apendicitis, *s. f.* Nombre dado por algunos cirujanos á peritonitis circunscritas, localizadas en el vecindario del apéndice, pero sin lesión de este órgano. Los síntomas semejan los de la apendicitis, por lo que generalmente se hace. el diagnóstico de esa afección.

parabiosis, *s. f.* (Wedensky, 1902). Modificación determinada en un nervio por cualquiera excitación suficientemente intensa y prolongada, modificación que precede á la abolición de las funciones del nervio.

paracéfalo, *s. m.* (παρά, casi; ἀκέφαλος, sin cabeza, ó παρά, que implica defectuosidad y κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo unitario onfalósito, caracterizado por una cabeza atrofiada en todas sus partes, pero que presenta aún rudimentos de órganos de los sentidos y una cavidad bucal.

paracentesis, *s. f.* (παρά, á través; κεντεῖν, punzar). Sin. : *punción.* Operación cuyo objeto es extraer el líquido contenido en cualquiera cavidad del cuerpo (pleura, pericardio, peritoneo, ojo, oído, etc.).

paracinesia, *s. f.* (παρά, que implica idea de defectuosidad; κίνησις, movimiento). Falta de coordinación de los movimientos voluntarios.

paracolia, *s. f.* (παρά; χολή, bilis) (Pick, 1894). Trastorno de la secreción biliar, debido á una acción refleja de los nervios secretores, que tiene como resultado el paso á los espacios linfáticos de una cantidad de bilis más ó menos grande.

paracusia, *s. f.* (παρακούειν, oir mal). Anomalía en la percepción de los sonidos, cuya tonalidad ó cuya intensidad pueden ser inexactamente percibidas. Algunos autores incluyen en la *paracusia* los zumbidos, retintines y otros ruidos subjetivos — *paracusia doble.* Véase : *diplacusia.* — *paracusia de Wéber.* Exaltación de la audición por contacto. Véase : *Wéber (prueba de).* — *paracusia de Willis.* Exaltación de la audición aérea en los medios sometidos á trepidación (sordos que oyen mejor que nadie en un carruaje en marcha).

paradoxal, *adj.* Se aplica á los fenómenos patológicos que parecen estar en contradicción con el conjunto de los otros signos existentes en el enfermo, ó con al-

guna ley fisiológica. Véase: *percusión paradoxal*, *pulso paradoxal*.

parafasia, *s. f.* (παρά; φάσις, palabra). Trastorno de la utilización de las palabras, en el cual no son empleadas éstas en su verdadero significado. — *parafasia verbal*. Las palabras son pronunciadas correctamente, mas se las emplea sin distinción. — *parafasia literal*. El enfermo comete faltas de articulación y forja palabras nuevas desprovistas de sentido.

parafemia, *s. f.* (παρά; φήμι, hablo). Trastorno del lenguaje hablado, caracterizado por la confusión de las palabras.

parafimosis, *s. f.* (παρά, más allá; φιμόω, ciño). Estrangulamiento del glande por el capullo prepucial, demasiado estrecho, cuando se ha retirado éste hacia atrás de la corona.

parafonía, *s. f.* (παρά; φωνή, voz). Trastorno de la fonación caracterizado por la disonancia de la emisión vocal.

parafrenitis, *s. f.* Véase: *frenitis 2°*.

parafrénico (estado) (Pitres). « Delirio histero-hipnótico, de carácter monoideico, en que el espíritu, dominado por una especie de fascinación síquica, permanece indiferente á todo cuanto no se relacione con el objeto de su delirio, es rebelde á todas las sugestiones extrañas á su sueño, y pierde luego el recuerdo de los actos verificados durante el período delirante ».

parafrosina, *s. f.* (παρά; φρήν, espíritu). Delirio febril.

paragenesia, *s. f.* (παρά, á un lado; γένεσις, generación). Sin.: *homogenesia paragenésica*, *hibridez colateral* (antropología). Nombre dado por Broca á los cruzamientos cuyos productos ó mestizos de primera sangre son estériles entre sí ó á la segunda ó tercera generación; los productos de estos mestizos con una de las dos razas madres (mestizos de segunda sangre) son, por lo contrario, fértiles indefinidamente.

parageusia ó **parageustia**, *s. f.* (παρά; γεῦσις, gusto). Anomalía ó perversión del sentido del gusto.

paraglobina, **paraglobulina**, *s. f.* Véase: *fibrinoplástica* (*sustancia*).

paraglosa, *s. f.* (παρά; γλῶσσα, lengua). Glositis flegmonosa.

paragnato, *s. m.*

(παρά; γνάθος, mandíbula). Monstruo polignato en quien la mandíbula inferior supernumeraria está colocada lateralmente.

paragrafia, *s. f.* (παρά; γράφειν, escribir). Trastorno del lenguaje escrito, caracterizado por la confusión de las palabras.

paralalia, *s. f.* (παρά; λαλεῖν, hablar) (Lordat, 1843). Véase : *parafemia*.

paralelocinesia, *s. f.* (Pick). Fenómeno paralítico que existe en ciertos casos de hemiplejia. El sugeto no puede mover espontáneamente el miembro enfermo, mas, reproduce con este miembro los movimientos pasivos ejecutados por el sano.

paralexia, *s. f.* (παρά; λέξις, palabra). Trastorno de la lectura, caracterizado por el hecho de que el enfermo sustituye con palabras vacías de sentido, las palabras del texto.

parálisis, *s. f.* (παραλύειν, aflojar, relajar). Disminución ó abolición de la motricidad. Presenta numerosas variedades debidas á la intensidad del fenómeno (*parálisis completa* ó *incompleta*, *paresia*), á la topografía (*monoplejia*, *hemiplejia*, *paraplejia*), á la evolución, á la causa, etc. — La disminución ó abolición de la sensibilidad (anestesia) es á veces designada con el nombre de *parálisis sensitiva*.

parálisis agitante. Véase : *Párkinson* (*enfermedad de*).

parálisis alterna. Véase : *Millard-Gubler* (*sindroma de*).

parálisis ascendente aguda. Véase : *Landry* (*enfermedad de*).

parálisis bulbar asténica. Véase : *Erb* (*sindroma de*).

parálisis bulbar atrófica progresiva. Véase : *parálisis labio-glosolaringea*.

parálisis bulbo-ponto-peduncular. Variedad clínica de la *parálisis labio-gloso-laringea*, que se observa cuando la parálisis ataca también los núcleos motores de la protuberancia y del pedúnculo.

parálisis bulbo-espinal. Variedad de la *parálisis labio-glosolaringea*, que se observa cuando se hallan también atacados los núcleos motores de la médula. Vese entonces la asociación de la parálisis bulbar y de la atrofia muscular.

parálisis espinal aguda del adulto.

Afección de la médula análoga en el adulto á la parálisis infantil. La atrofia es aquí menos notable en razón del desarrollo completo del esqueleto. Sobreviene á veces en individuos atacados anteriormente de parálisis infantil.

parálisis espinal infantil. Afección caracterizada clínicamente por la aparición súbita de parálisis más ó menos extensas en medio de síntomas infectivos, parálisis que se localizan luego en uno ó más grupos musculares, provocan la atrofia de éstos y determinan deformaciones indelebles tanto por la atrofia como por la interrupción del desarrollo. Anatómicamente, trátase de una lesión de los cuernos anteriores de la médula.

parálisis espinal espasmódica ó espástica (Erb). Véase : *tabes dorsal espasmódica.*

parálisis general progresiva. Sin. *periencéfalomeningitis crónica difusa, encefalitis crónica intersticial difusa, enfermedad de Bayle.* Afección anatómicamente caracterizada por lesiones difusas de los centros nerviosos y de sus membranas, y clínicamente por el debilitamiento progresivo de la inteligencia, delirio y trastornos somáticos tales como : embarazo de la palabra, paresia pupilar, temblor, etc.

parálisis infantil. Véase : *parálisis espinal infantil.*

parálisis intermitente. Ataque de parálisis debido á la infección palúdica, que dura algunas horas y termina por una crisis sudoral. Estos ataques presentan tipos semejantes á los diferentes tipos de fiebres intermitentes y son favorablemente modificados por la quinina.

parálisis labio-gloso-laringea (Trousseau). Sin. *parálisis muscular progresiva de la lengua, del velo del paladar y de los labios* (Duchenne, 1860), *parálisis labio-gloso-palato-laringea* (Charçot), *parálisis bulbar atrófica progresiva* (Leyden). Síndroma bien definido, caracterizado por la existencia de parálisis múltiples que atacan los músculos de los labios, de la lengua, del velo del paladar, de la faringe y de la laringe. Puede depender, ya de lesiones de los núcleos motores de la parte inferior del bulbo raquídeo (*parálisis bulbar verdadera* ó *polioencefalitis inferior*), ya de lesión bilateral de los hemis-

ferios cerebrales (*parálisis seudo-bulbar de origen cerebral*), ya de lesión de los nervios periféricos (*parálisis seudo-bulbar de origen neurítico*); y podría, finalmente, encontrarse sin lesión apreciable (*parálisis seudo-bulbar por neurosis*).

parálisis muscular seudo-hipertrófica (Duchenne de Boulogne). Variedad de miopatía primitiva en que la atrofia está disimulada por el desarrollo exagerado del tejido adiposo; empieza en la infancia por los miembros inferiores, y más tarde invade los miembros superiores, donde la atrofia es la regla.

parálisis óculo-motriz recidivante (Mauz Mauthner), **parálisis óculo-motriz periódica** (Joachim Senator). Véase : *jaqueca oftálmica*.

parálisis periódica familial (Westphal, 1885). Sin. *mioplejia familial*, *mioatonía periódica*. Estado, lo más frecuentemente hereditario, caracterizado por la pérdida transitoria, periódica, más ó menos generalizada de los movimientos voluntarios, con supresión de los reflejos tendinosos, y trastornos profundos de las reacciones eléctricas, sin tocar la sensibilidad ni la inteligencia. El acceso de parálisis empieza generalmente en la noche y termina gradualmente hacia el mediodía. Los accesos se repiten irregularmente y en el intervalo la motilidad es normal. Esta afección es causada probablemente por una | autointoxicación.

parálisis seudo-bulbar. Véase : *parálisis labio-gloso-laringea*.

paramastitis, *s. f.* (παρά, á un lado; μάστος, mama) (Billroth). Sin. : *flegmón perimamario*. Nombre dado á las inflamaciones desarrolladas al rededor de la mama, ya en la piel ó el tejido celular sub-cutáneo, ya en el tejido celular retroglandular.

parametritis, *s. f.* (παρα; μήτρα, útero). Sin. : *flegmón yuxtauterino* (Bouilly). Variedad de flegmón del ligamento ancho desarrollado en el espacio pelvi-rectal superior de Richet (vaina hipogástrica de Delbet).

paramimia, *s. f.* (παρά; μιμέοναι, imito). Trastorno del empleo de los gestos y ademanes, los cuales no corresponden ni á las ideas ni á los sentimientos.

paramioclonia, *s. f.* (παρά; μῦς, músculo; κλόνος, agitación). Mioclonia que ataca los dos miembros su-

periores, los dos inferiores, ó los cuatro á la vez.

paramioclonus múltiplex (Friedreich, 1881). Sindroma caracterizado por contracciones musculares clónicas, involuntarias é instantáneas, ordinariamente bilaterales, sin que se produzcan movimientos extensos. Estos movimientos empiezan por los miembros inferiores, para ganar los superiores y rara vez la cara. La evolución es lenta, pero termina ordinariamente por la curación. Su naturaleza es desconocida: se la ha atribuído á la histeria y á la neurastenia; otros autores la consideran como una neurosis motora especial, análoga á la corea.

paramiotonía congénita (παρά; μῦς, músculo; τόνος, tensión) (Eulenburg). Afección nerviosa caracterizada por cierta rigidez espasmódica, que aparece á menudo en algunos grupos musculares de una manera simétrica, lo más frecuentemente bajo la influencia del frío. Ha sido comparada con la enfermedad de Thomsen.

paramnesia, *s. f.* (παρά; μνῆσις, memoria) (Lordat). Trastorno de la facultad de expresión, que consiste en la pérdida de la memoria de las palabras y de sus signos, acompañada de sugestión instintiva de sonidos ó de palabras que no tienen relación alguna con el pensamiento que quiere expresar el enfermo.

paramusia, *s. f.* (παρά, preposición que indica defecto; μοῦσα, musa). Turbación de la facultad musical, que permite que el paciente pueda cantar aún, mas, equivocándose en los tonos é intervalos.

paranoya, *s. f.* (παρά; ἄνοια, tontería). Término empleado por los autores alemanes é italianos para designar las modalidades todas del delirio de los degenerados: excitación maniaca, depresión melancólica, delirios sistematizados agudos ó crónicos, etc.

paraosmia, *s. f.* Véase: *parosmia*.

paraplejia, *s. f.* (παρά; πλήσσειν, herir). Parálisis completa de ambos miembros inferiores, de los dos superiores ó de los cuatro miembros; puede ser motora, sensitiva ó mixta.

paraplexia, *s. f.* (παρά; πλῆξις, golpe). Parálisis que no ocupa sino una parte del cuerpo. — Para algunos autores, el término *paraplexia* significaría la parálisis total del cuerpo, y el de

paraplejia una parálisis parcial.

parasifilíticos (accidentes) (Fournier). Accidentes de origen, mas no de naturaleza, sifilítico, que se observan en los individuos atacados de sífilis adquirida ó hereditaria, y sobre los cuales el tratamiento anti-sifilítico no tiene influencia alguna.

parasiticida, *adj.* y *s. m.* (*parasitus; cædere*, matar). Se dice de las sustancias que sirven para destruir los parásitos.

parásito, *s. m.* (παράσιτος, que come al lado de otro, de παρά, al lado; σῖτος, alimento). Sér incapaz de sacar él mismo, en la naturaleza, los elementos de su nutrición, y que está obligado á vivir á costas de otro de más elevada organización.

parásitofobia, *s. f.* (παράσιτος; φόβος, temor). Miedo excesivo de ciertos sugetos á contraer enfermedades parasitarias, particularmente la sarna. La *parásitofobia* es contagiosa, contrariamente á las otras fobias, que son individuales.

parásitología, *s. f.* (παράσιτος; λόγος, discurso). Parte de la historia natural que se ocupa en el estudio de los parásitos animales y vegetales.

parasitosis, *s. f.* Término genérico con que se designan las enfermedades determinadas por parásitos.

paraseriasis, *s. f.* (Brocq). Dermatosis caracterizada por una erupción papulosa que presenta el aspecto de sifílides ó de elementos muy pequeños de soriasis. Se distingue de estas dos afecciones por su larga duración sin modificarse, y por su fijeza.

paratiflitis, *s. f.* (παρά, á un lado; τυφλός, ciego) (Oppolzer). Flegmón del tejido celular de la fosa ilíaca derecha.

paratifoidea (fiebre) ó **paratifus**, *s. m.* Enfermedad que presenta las manifestaciones clínicas de la fiebre tifoidea; mas, se distingue de ella anatómicamente por la ausencia de ulceración de las placas de Peyero, y bacteriológicamente por la presencia de un microbio vecino del bacilo de Eberth, aunque diferente (*bacilo paratífico*).

paratísicos (accidentes). Nombre dado por Marfán á síntomas y lesiones que se observan en los tísicos, mas sin estar bajo la dependencia directa del bacilo de la tuberculosis. Son, por una parte, hiperemias, edemas é inflamaciones (gastritis, nefritis, etc.),

y por otra, esteatosis, degeneraciones amiloides y necrosis celulares de origen infectivo (infecciones secundarias) ó tóxico (toxinas microbianas ó asfixia).

parenquima, *s. m.* (παρά, á un lado; ἔγχυμα, efusión). Nombre dado por los antiguos anatomistas á las masas glandulares, á los « tejidos que segregan » (Robin), tales como hígado, riñón, páncreas, etc.

parenquimatosis, *s. f.* (Aufrecht). Degeneración granulo-grasosa de origen infectivo que ataca simultáneamente varias vísceras (hígado, riñón, etc.)

parenquimatoso, *adj.* Se aplica á las lesiones inflamatorias que atacan especialmente el elemento noble (epitelio) de un órgano. Ej. *nefritis parenquimatosa, hepatitis parenquimatosa*, etc.

parepatía, *s. f.* (παρά; ἧπαρ, hígado). Vicio de funcionamiento de la célula hepática.

paresia, *s. f.* (πάρεσις, debilidad). Parálisis ligera que consiste en el debilitamiento de la contractilidad.

parestesia, *s. f.* (παρά; αἴσθησις, sensibilidad). Anomalía de la percepción de las sensaciones, que consiste, ya en cierta ligera anestesia, ya en sensaciones anormales, ó aún en alucinaciones de los sentidos.

Párkinson (enfermedad de) (1819). : Sin. *parálisis agitante*. Afección esencialmente caracterizada por un temblor especial, notable sobre todo en los dedos (movimiento como de desmigar pan, hacer pelotitas, etc.) y por una rigidez muscular tal que da al enfermo la actitud particular que corresponde á la flexión media de los miembros (piernas ligeramente dobladas, tronco inclinado, brazos medio doblados, etc.), y cierta fisonomía sorprendida y fija llamada *facies parkinsoniana*.

parodontis, *s. f.* (παρά, á un lado; ὀδοῦς, diente). Véase : *parulia*.

paroftalmía, *s. f.* (παρά; ὀφθαλμός, ojo). Inflamación peri-ocular ó palpebral.

paronfalocele, *amb.* (παρά; ὀμφαλός, ombligo; κήλη, hernia). Hernia de la pared abdominal, vecina del ombligo.

paropsia, *s. f.* (παρά; ὄψις, vista). Turbación de la vista.

parorexia, *s. f.* (παρά; ὄρεξις, apetito). Turbación del apetito, que comprende la pica y la malacia.

parosmia, *s. f.* (παρά; ὀσμή, olfato). Perversión de

las sensaciones subjetivas de la olfación, ó alucinación del olfato (sensación permanente ó pasajera de un olor por lo común desagradable).

parosteal (osteosarcoma). Véase : *osteosarcoma.*

parostitis, *s. f.* Inflamación del tejido celular parostal (tejido celular muy denso que rodea al periósteo). Permanece exterior al periósteo que la separa del hueso.

parotiditis, *s. f.* (parótida, de παρά· cerca de; οὖς, ὠτός, oído). Inflamación de la parótida. — *parotiditis epidémica.* Enfermedad infectiva, epidémica y contagiosa, caracterizada por la tumefacción simultánea ó sucesiva de ciertas glándulas, en especial de las glándulas salivares y menos frecuentemente de los testículos, de las glándulas mamarias, de los ovarios, etc.

paroxismo, *s. m.* (παρά, que indica aumento; ὀξύνειν, volver agudo). Período de una enfermedad ó de un estado morboso, en que los síntomas adquieren el máximum de intensidad.

Parrot (cicatrices de). Cicatrices superficiales blancuzcas, de contornos indecisos, situadas sobre todo al rededor de la boca, y consecutivas á fisuras labiales. Tales cicatrices, observadas en los niños, constituyen uno de los estigmas de la heredo-sífilis.

Parrot (enfermedad de) (1869). Seudo-parálisis sifilítica debida al desprendimiento de las epífisis.

Parrot (ley de) (1876). Sin. : *ley de las adenopatías similares.* Siempre que un ganglio brónquico es asiento de lesión tuberculosa, hay análoga lesión en el pulmón.

Parrot (soplo de). Soplo tricuspídeo, suave, ahilado, de tonalidad baja, debido á insuficiencia tricuspídea por dilatación del orificio; es el soplo de la asistolía

partenogénesis, *s. f.* (πάρθενος, virgen ; γένεσις, nacimiento). Producción de seres sin fecundación. Véase: *metagénesis.*

partero (mano de). Actitud particular de la mano, que se observa en la tetania. Los dedos, contracturados, están apretados los unos contra los otros, de tal manera que forman un cono. Es la posición que da el partero á la mano para practicar el tacto manual.

parturición, *s. f.* (*parturire*, parir). Parto natural.

parulia, *s. f.* (παρά, cerca de; οὖλον, encía).

Absceso de las encías; complicación de la periodontitis flegmonosa.

parvicollis (úterus). Utero cuyo cuello ha sufrido una suspensión parcial del desarrollo.

pasteurelosis, *s. f.* (Lignières). Nombre bajo el cual propónese reunir ciertas afecciones pertenecientes todas al grupo de las septicemias hemorrágicas (fiebre tifoidea del caballo, enfermedad de los perros jóvenes, cólera de las gallinas, septicemia hemorrágica del carnero, del buey, del puerco, etc.), las cuales son causadas por coco-bacilos, muy vecinos los unos de los otros, reunidos bajo el nombre de *pasteurella.*

pasteurización, *s. f.* Operación que consiste en someter á 70°-75° por veinte á treinta minutos un líquido fermentescible. Aplícase especialmente á la leche, pues destruye la mayor parte de los microbios patógenos, tales como los bacilos de la fiebre tifoidea, del cólera y de la tuberculosis. No modifica tanto las materias proteicas como la ebullición y permite la conservación durante dos á tres días.

patelar, *adj.* (*patella*, rótula). Que tiene relación con la rótula.

... patía (πάθος, padecimiento, enfermedad). Afijo que, pospuesto al nombre de un órgano, designa de manera general una afección de ese órgano. Ej. : *cardiopatía, encéfalopatía.*

patofobia, *s. f.* (πάθος, enfermedad; φόβος, temor). Miedo morboso (fobia) á las enfermedades.

patogénesis, patogenesia, *s. f.* Véase : *patogenia.*

patogenésica (erupción) (Bazin). Erupción causada por la introducción en la economía de una sustancia nociva cualquiera, alimenticia, medicamentosa.

patogenia, *s. f.* (πάθος, padecimiento; γένεσις, origen). Estudio del mecanismo según el cual obran sobre el organismo las causas morbíficas para producir una enfermedad.

patognomonia, *s. f.* (πάθος; γνώμων, signo indicador). Sin. : *prosoposcopia.* Estudio del aspecto de la cara y de las modificaciones en ella impresas por las enfermedades. La *patognomonia* suele ser de gran importancia en el diagnóstico y pronóstico de las enfermedades.

patognomónico (signo) (πάθος; γνώμων, signo indicador). Sin.

signo diacrítico. Signo que no se encuentra sino en un estado mórbido determinado, y suficiente por sí solo para caracterizar y diagnosticar dicho estado mórbido. Ej. : El ruido de la sucusión hipocrática es *patognomónico* del hidroneumotórax.

patología, *s. f.* (πάθος; λόγος, discurso). Ciencia que tiene por objeto el estudio de las enfermedades.

patología general. Parte de la patología que trata de los elementos comunes á todas las enfermedades (causas, lesiones, síntomas), considerados en sí mismo y no agrupados constituyendo los diferentes tipos mórbidos.

pavimentoso lobulado ó **perlado (epitelioma).** Véase : *epitelioma*.

Pavlov (pequeño estómago de). Aislamiento de una parte del estómago que se fija en la pared cutánea y allí se abre. Esta experiencia, realizada en el perro, tiene por objeto obtener jugo gástrico puro de todo alimento.

Pavlov (reflejo ácido de). Secreción pancreática abundante provocada por la introducción de un ácido en el duodeno.

Pavy (enfermedad de). Sin. *albuminuria intermitente cíclica*, Afección caracterizada por signos subjetivos vagos, malestar general, neuralgias, dispepsia, y por la presencia de la albúmina en las orinas emitidas después de la comida de la mañana y hasta las cinco ó las seis de la tarde. Se encuentra en los jóvenes, hijos de padres gotosos ó reumáticos.

Peán (operación de). Véase : *miomotomía vaginal por pedazos*.

pectoriloquia, *s. f.* (*pectus*, pecho; *loqui*, hablar)(Laënnec). Modificación de la voz perceptible á la auscultación. La voz parece salir directamente del pecho por el canal del estetoscopio (cavernas pulmonares superficiales, etc.).

pectoriloquia afona ó **afónica** (Baccelli). Signo estetoscópico que se observa en los vastos derrames pleurales. Si se hace que el enfermo hable en voz baja, el oído que ausculta percibe claramente las palabras sopladas por el enfermo.

pederastia, *s. f.* (παῖς, niño; ἐραω, yo amo). Inversión del instinto sexual del hombre, que se revela por la satisfacción del deseo genésico con personas del mismo sexo.

pediatría, *s. f.* (παῖς, niño; ἰατρεία, medicina). Rama de la medicina que trata de las enfermedades de los niños.

pedía ó **pediosa (signo de la)** (Teissier, 1902). Hipertensión arterial relativa, en la pedia, en los enfermos atacados de aortitis abdominal. La presión sanguínea, que en la arteria pedia es ordinariamente inferior á la de la radial, es en estos casos superior.

pedicular (enfermedad) (*pediculus*, piojo). Véase : *tiriasis*.

pedículo, *s. m.* (*pediculus*, piecesito). Parte más ó menos angosta que sostiene á algunos tumores y que los hace comunicar con el resto del organismo.

pediculosis, *s. f.* (*pediculus*, piojo). Véase : *tiriasis*.

pediluvio, *s. m.* (*pes, pedis*, pie; *luere*, lavar). Baño de pies.

pedómetro, *s. m.* (παῖς, niño; μέτρον, medida). Instrumento que sirve para medir la talla de los niños.

pedionalgia, *s. f.* (πέδιον, planta del pie; ἄλγος, dolor). Neuralgia plantar, enfermedad descrita por G. Marius en 1779

pelada, *s. f.* (*pilus*, pelo). Dermatosis de las regiones pilosas del cuerpo; la caracteriza una alopecia de marcha rápida, que se manifiesta bajo forma de placas redondeadas, susceptibles de agrandarse, reunirse y determinar la caída total del cabello y de los pelos todos del cuerpo. La piel, en las placas, es lisa, blanca, brillante y absolutamente desprovista de pelo.

pelada acromatosa (Bazin). Variedad de pelada en que la piel se halla descolorida y atrofiada.

pelada decalvante (Bazin). Variedad de pelada que produce rapidísimamente la caída completa del cabello y á veces de todo el pelo del cuerpo.

pelada offásica. Nombre dado por Sabouraud á una variedad de pelada que se observa en el niño, en la nuca, donde forma grandes superficies lampiñas.

pelada seudo-esquilante (Lallier) ó **de cabellos frágiles** (Besnier). Variedad de pelada en que la superficie de las placas se halla provista de algunos vellos poco adherentes.

peladofobia, *s. f.* (pelada; φόβος, temor). Miedo excesivo de ciertos sugetos á contraer la pelada.

peladoide, *s. f.* (Leloir). Variedad de pelada de origen trofo-neurótico.

pelagismo, *s. f.* Mareo.

pelagra, *s. f.* (etimología discutida : 1° *pellis*, piel, *ægra*, enferma; 2° *pellis; agria*, burda ; 3° *pellis*, ἄγρα, afección). Afección de naturaleza desconocida, atribuída por algunos autores á la ingestión de maiz averiado, que se revela clínicamente por desórdenes generales (enflaquecimiento y caquexia), signos digestivos (diarrea) y manifestaciones cutáneas : eritema pelagroso, situado en las partes descubiertas (cuello, cara, dorso de la mano), seguido de descamación.

pelicógena (cifosis) (πέλυξ, pelvis) (Freund) (obstetricia). Incurvación cifótica de arco muy grande, situada dentro de la pelvis, que se observa cuando la quinta vértebra lumbar forma parte integrante del sacro (asimilación simétrica). Resulta de allí la elevación del promontorio, causa posible de distocia

pelicógena (escoliosis) (obstetricia). Escoliosis lumbo-sacra ó sacra que determina cierta deformación de la pelvis, causa frecuente de distocia.

pelioma, *s. m.* (πελιός, lívido). Mancha lívida de la piel (cobriza, verde ó amarilla).

peliósico (edema) (Apert, 1904). Variedad de edema agudo esencial acompañado de dolores reumatoides y desprovisto de todo carácter hereditario y familial.

peliosis, *s. f.* (πελιός, lívido). Esta voz, que antes designaba al púrpura, no se emplea actualmente sola.

peliosis reumatismal. Sin. : *enfermedad de Schœnlein, púrpura exantemático reumatoide, púrpura mielopático.* Afección caracterizada por manifestaciones articulares (ordinariamente artralgias), fenómenos gastro-intestinales generalmente poco intensos, y por erupciones cutáneas (petequias, equímosis).

pelvilogía, *s. f.* (*pelvis;* λόγος, discurso). Estudio de la pelvis normal ó patológica (desde el punto de vista obstétrico).

pelvímetro, *s. m.* (*pelvis* : μέτρον, medida). Instrumento que sirve para medir las dimensiones de la pelvis y, sobre todo, el diámetro antero-posterior del estrecho superior.

pelviperitonitis, *s. f.* Sin. *pelvi-metro-salpingitis* (Pozzi). Peritonitis limitada

á la cavidad pelviana. Rara vez es primitiva y entonces proviene de infección puerperal. En la gran mayoría de los casos es secundaria á las afecciones de la trompa y del ovario.

pelvis obtecta. Sin. *pelvis cubierta*. Pelvis atacada de espondilizema ó de espóndilolistesis, variedades de deformaciones pelvianas que determinan la obstrucción del estrecho superior.

pelvi-soporte, *s. m.* Aparato destinado á sostener la pelvis durante las curas que requieren la elevación del tronco por encima del plano de la cama.

pelvitomía, *s. f.* (*pelvis; τομή*, sección). Nombre dado anteriormente á la isquio-pubiotomía.

pendular (marcha). Modo de progresión de ciertos enfermos atacados de paraplejia con fuerte contractura de los miembros inferiores. La marcha se efectúa con muletas; los pies no asientan en el suelo, sino para permitir que se traigan las muletas hacia adelante, y luego el cuerpo oscila de atrás á adelante como un péndulo.

pendular (ritmo) (Pawinsky). Sin. *embriocardia disociada* (Grasset). Variedad de ritmo fetal sin taquicardia ni debilitamiento de los ruidos. Estos son iguales, y hase comparado el ritmo con las oscilaciones del péndulo.

pénfigo, *s. m.* (πέμφιξ, vejiga). Nombre de todo aquel grupo de dermatosis caracterizadas por una erupción de vejigas llenas de líquido seroso, que se destacan sobre la piel sana; mas, este último carácter no es constante. La erupción de *pénfigo* puede no ser más que un epifenómeno en el curso de otra enfermedad (lepra, sífilis), ó, al contrario, ser el principal fenómeno morboso. Ej. : *dermatitis herpetiforme de Dühring*.

pénfigo agudo de los recién nacidos. Enfermedad epidémica y contagiosa caracterizada por la aparición de vejigas de pénfigo, con ó sin fiebre, en niños vigorosos y de buena salud. Evoluciona por accesos y termina ordinariamente por la curación.

pénfigo foliáceo. Dermatosis rara caracterizada por una erupción de pénfigo, cuyas vejigas se desecan y dejan tras sí costras amarillentas que se desprenden bajo forma de escamas foliáceas de 1 á 4 centímetros de ancho; esta erupción se generaliza; la evolución es lenta y dura varios años. El

pénfigo foliáceo generalmente termina en la muerte, por el progreso de la caquexia ó por una complicación (diarrea, bronco-neumonía).

pénfigo hereditario. Véase : *epidermolisis vejigosa hereditaria.*

penicilados(vasos). Vasos capilares provenientes de la ramificación de una arteriola en un ramillete de finos ramúsculos que han sido comparados á los pelos de un pincel.

penitis, *s. f.* (*penis*, pene). Inflamación total del pene, que invade los tejidos eréctiles y la piel, y termina por supuración y á veces por gangrena.

pentastoma, *s. m.* (πέντε, cinco ; στόμα, boca). Véase : *linguátula.*

pentosuria, *s. f.* (pentosa, azúcar que no contiene sino cinco átomos de carbono). Presencia de la pentosa en la orina. La orina pentosúrica reduce el licor de Féhling, mas no desvía el plano de polarización ni fermenta bajo la influencia de la levadura.

pepsia, *s. f.* (πέψις, cocción). « Término que sirve para designar el conjunto de los caracteres de la digestión revelados por el examen físico-químico del jugo estomacal. » (Hayem y Lion.)

pepsina, *s. f.* Fermento soluble contenido en el jugo gástrico y que sirve para transformar las materias albuminoides de los alimentos en peptonas, esto es, en cuerpos fácilmente solubles y difusibles, susceptibles, por consiguiente, de ser absorbidos y asimilados.

peptógeno, *adj.* y *s. m.* (πεπτός, digerido; γεννᾶν, producir). Las sustancias alimenticias que aumentan en el jugo gástrico la producción de pepsina.

peptonuria, *s. f.* Presencia de peptonas en la orina.

peracéfalo, *s. m.* (πέρα, extraordinariamente; ακεφαλός, acéfalo) (I. G. St.-Hilaire). Monstruo acefálico en que la detención del desarrollo se ejerce también sobre la parte superior del tronco, el cual no presenta miembros superiores.

percusión, *s. f.* (*percutere*, golpear). 1° (Avenbrugger, 1761). Modo de exploración clínica que consiste en producir ciertos sonidos golpeando con los dedos, ó con un instrumento especial, una parte determinada del cuerpo, para reconocer el estado de las subyacentes. Generalmente se interpone un dedo ó una lámina delgada (metálica ú

otra) entre los tegumentos y el dedo ó el instrumento que percute. — 2° Modo de masaje que consiste en golpear más ó menos suavemente con el puño medio cerrado la parte que se quiere amasar.

percusión paradoxal (Hertz). Sonoridad del pecho que coincide con una gran abundancia de estertores; fenómeno observado en el edema agudo del pulmón.

perfora-membrana, *s. m.* Instrumento que sirve para romper artificialmente los membranas en el parto.

pergamino (ruido de). Ruido semejante al que producen dos pedazos de pergamino frotados uno contra otro, que se percibe á veces en algunas enfermedades del corazón (pericarditis seca).

periadenitis, *s. f.* (περί, alrededor; ἀδήν, glándula). Inflamación de la atmósfera conjuntiva periganglionar (complicación de la adenitis aguda).

perianglocolitis, *s. f.* Inflamación y supuración del tejido hepático al rededor de las vías biliares. Acompaña casi siempre la angiocolitis y se revela anatómicamente por numerosos abcesos miliares ó por abcesos areolares del hígado.

periapendicitis, *s. f.* Peritonitis localizada al rededor del apéndice.

periarteritis, *s. f.* Inflamación de la túnica externa de las arterias.

periartritis, *s. f.* (περί, al rededor; ἄρθρον, articulación). Inflamación de las bolsas serosas que rodean la articulación (cadera, rodilla, hombro).

perical, *s. m.* Véase : *Madura (pie de)*

pericardiotomía, *s. f.* (pericardio; τομή, sección). Incisión del pericardio con el fin de evacuar una colección líquida de esta serosa.

pericarditis, *s. f.* Inflamación del pericardio, membrana serosa que rodea al corazón; puede ser aguda ó crónica, seca ó con derrame (seroso, purulento, hemorrágico).

pericardo-perihepática (sínfisis) (Gilbert y Garnier). Tipo morboso que resulta de la asociación de la perihepatitis seca, con sínfisis, y de la sínfisis cardiaca.

pericolecistitis, *s. f.* Inflamación del tejido celular que rodea la vesícula biliar.

pericolitis cicatricial post-apendicular (Tavel). Formación de bridas que estrechan y deforman

el colon, observada á veces á consecuencia de las apendicitis. Está acompañada de dolores, de fiebre y de trastornos digestivos, cuya naturaleza muchas veces se desconoce.

pericondritis, *s. f.* Inflamación, frecuentemente supurativa, del pericondro, membrana fibrosa que rodea al cartílago. Obsérvase sobre todo en la laringe.

pericondroma, *s. m.* (Cruveilhier). Sin. *condroma externo* (Virchow). Condroma que tiene como origen el periósteo ó, alguna vez, las capas corticales del hueso. Se sitúa principalmente sobre los huesos largos de los miembros, sobre la pelvis, sobre el omóplato, y forma tumores á veces voluminosos (causa de distocia).

pericowperitis, *s. f.* Inflamación del tejido celular que rodea á las glándulas de Mery (ó de Cówper), frecuente complicación de la cowperitis.

periencefalitis, *s. f.* (περί, al rededor; ἐγκεφαλός, encéfalo). Inflamación de la corteza gris; acompaña á la meningitis.

periencefalitis crónica difusa, ó **periencéfalo-meningitis crónica difusa** (Calmeil). Véase : *parálisis general progresiva*.

periesofagitis, *s. f.* Inflamación del tejido celular que rodea al esófago.

periflebitis, *s. f.* (περί; φλέψ, vena). Inflamación del tejido conjuntivo que rodea las venas.

perifoliculitis pilar ó **pilo-sebácea.** Inflamación de la piel que rodea á los folículos pilosos; á las veces es aislada, á veces agminada.

perifoliculitis uretral. Inflamación del tejido celular peri-uretral, en los forámina atacados de foliculitis. Complicación de la blenorragia que puede originar un abceso periuretral.

perihepatitis, *s. f.* Inflamación de la cápsula fibrosa del hígado (*capsulitis perihepática*) ó del peritoneo que rodea al órgano (*peritonitis parcial perihepática*).

perihepatógena (cirrosis) (Gilbert y Garnier). Cirrosis del hígado de origen peritoneal; las trabéculas fibrosas que parten de la cápsula penetran en la profundidad del órgano disminuyendo en espesor y en número.

perimeningitis aguda espinal (Albers, 1833). Afección caracteri-

zada anatómicamente por la inflamación primitiva del tejido célulo-adiposo que rodea á la dura-madre raquídea. Se manifiesta ordinariamente, desde el punto de vista clínico, por dolores vivos y lancinantes, luego por parálisis flácida con anestesia en la parte inferior del cuerpo. La parálisis ataca los músculos del tórax y la muerte sobreviene por asfixia

perimetritis, *s. f.* ó **perimetro-salpingitis** (Pozzi). Pelvi-peritonitis secundaria á una afección de los anejos.

perinéauxesis, *s. f.* Variedad de colpo-perineorrafia (procedimiento de A. Martin).

perinefritis, *s. f.* (περί, al rededor; νεφρός, riñón) (Roger). Inflamación de la envoltura célulo-adiposa del riñón, que evoluciona hacia la esclerosis (*perinefritis esclerosa*), hacia la hipertrofia grasosa (*perinefritis fibro-lipomatosa*) ó hacia la supuración (*flegmón perinefrítico*).

perineocele, *amb.* (περίνεος, periné; κήλη, hernia). Hernia perineal.

perineorrafia, *s. f.* (περίνεος; ῥαφή, sutura). Operación que consiste en reparar las desgarraduras del periné, ya suturando directamente los labios de la herida, si se trata de una desgarradura reciente, ya después de avivarlos, si la desgarradura es vieja.

perineostomía, *s. f.* (περίνεος; στόμα, boca). Véase: *uretrostomía perineal.*

perineotomía, *s. f.* (περίνεος; τομή, sección). Incisión del periné.

perineumonía, *s. f.* (περί; πνεύμον, pulmón). 1° Nombre con que se describía antes la neumonía, confundiéndola con otras afecciones torácicas, principalmente con la pleuresía. — 2° Enfermedad infectiva, contagiosa y epizoótica de la raza bovina.

periódica (locura). Sin.: *locura intermitente.* Variedad de vesania caracterizada por la sucesión á intervalos más ó menos lejanos, de accesos de manía ó de melancolía, ya aislados, ya conjuntos. Entre sus modalidades comprende: la *locura alterna*, la *locura de doble forma* y la *locura circular.* Se reserva más particularmente el nombre de *locura periódica propiamente dicha* á los casos en que los accesos de manía ó de melancolía aparecen á intervalos iguales, cada año á la misma época (*manía*

intermitente ó *periódica ; melancolía intermitente* ó *periódica*).

periódica (parálisis). Véase : *parálisis periódica.*

periodontitis expulsiva (περί, al rededor; ὀδούς, diente). Véase : *gingivitis expulsiva.*

periodontitis simple. Véase : *periostitis alveolo-dental.*

perioftalmitis, *s. f.* Véase : *capsulitis.*

periorquitis, *s. f.* (περί; ὄρχις, testículo) (Kocher). Véase : *paquivaginalitis.*

periosteal (osteosarcoma). Véase : *osteosarcoma.*

periósteoplastia, *s. f.* Véase : *osteoplastia perióstica.*

periostitis, *s. f.* Nombre genérico de todas las inflamaciones agudas ó crónicas del periósteo; generalmente están acompañadas de osteítis.

periostitis alveolodental ó **p. dental.** Sin. : *periodontitis simple.* Inflamación de la membrana alveolo-dental que sigue casi siempre á la caries dental.

periostitis exantemática del maxilar (Salter). Osteítis supurada de marcha aguda, que termina por necrosis y se observa sobre todo en los niños convalecientes de fiebres eruptivas.

periostitis flegmonosa difusa. Véase : *osteomielitis de los adolescentes,* ú *osteom. flegmonosa.*

periostosis, *s. f.* Tumefacción inflamatoria del periósteo. Se osifica á veces, á la larga, y transfórmase en exostosis.

peripaquimeningitis purulenta aguda. Inflamación supurativa aguda de la cara externa de la dura-madre espinal y del tejido conjuntivo que la separa de la columna vertebral, con desprendimiento de la duramadre en mayor ó menor extensión. Es casi siempre consecutiva á una lesión localizada del raquis.

peripleuritis, *s. f.* (περί, al rededor; πλευρά, pleura). Flegmón sub-pleural desarrollado entre la pleura y la pared torácica.

periprostatitis, *s. f.* Inflamación del tejido celular que rodea á la próstata. Es lo más á menudo consecuencia de la prostatitis. Más rara vez sigue á la inflamación de un órgano vecino (vejiga, recto, vesícula seminal).

periquerático (círculo) (περί, al rededor; κέρας, córnea). Sin. : *círculo*

pericorneal. Círculo vascular que se observa al rededor de la córnea en las queratitis.

periquistitis, *s. f.* Inflamación de la envoltura conjuntiva, generalmente muy vascular, que rodea á los quistes. La *periquistitis infectiva* es la que determina la supuración de los quistes hidatídicos del hígado.

perisalpingitis serosa. Inflamación del peritoneo que rodea á la trompa; sobreviene generalmente por accesos súbitos en el curso de la pelviperitonitis secundaria á las afecciones de los anexos.

perisigmoiditis, *s. f.* Peritonitis circunscrita al peritoneo del colon ileo-pelviano ó asa sigmoidea del colon.

perisinovitis, *s. f.* Abceso ó flemón de la vaina conjuntiva que rodea la sinovial. Es consecutiva lo más á menudo á la sinovitis supurada

perisplenitis, *s. f.* Peritonitis limitada á la parte del peritoneo que rodea al bazo.

peristálticos (movimientos) (περί, alrededor; στέλλειν, estrechar). Movimientos de contracción, de arriba á abajo, del intestino ó del estómago.

peristaltismo, *s. m.* Véase : *peristálticos (movimientos)*.

peritelioma, *s. m.* Término propuesto por Reclus para designar el tumor maligno formado por la proliferación de las células conjuntivas que componen la túnica adventicia de una arteria (peritelio).

peritiflitis, *s. f.* (περί, al rededor; τυφλός, ciego). Inflamación del peritoneo que rodea al ciego.

peritonización, *s. f.* Sin. : *autoplastia peritoneal*. Tiempo especial de la laparotomía que tiene por objeto recubrir con serosa todas las superficies cruentas, de manera que el intestino, en todos los puntos de la cavidad abdominal, se ponga en contacto, como en los sugetos sanos, con una superficie lisa y cubierta de endotelio.

peritonismo, *s. m.* (Gubler). Sin. : *seudo-peritonitis*. Complejo sintomático que realiza el cuadro de la peritonitis aguda (constipación, vómitos, dolores, etc.), sin que en realidad haya inflamación del peritoneo.

peritonitis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica del peritoneo. Descríbense numerosas variedades, según la extensión : *perit. generalizada*, *perit. localizada* al

rededor de un órgano; — según la causa : *perit. por perforación, perit. tuberculosa*, etc.

peritrico, *s. m.* (περί, al rededor; θρίξ, cabello) (Ellis). Variedad de bacilos provistos, en todo el contorno, de pestañas vibrátiles.

periureteritis, *s. f.* Inflamación, generalmente crónica, del tejido celular que rodea al uréter. Complicación de las ureteritis. La *periureteritis fibrosa* ó *fibrolipomatosa* acompaña á la ureteritis crónica sin dilatación, aumenta mucho el espesor de las paredes del uréter y disminuye su calibre por compresión.

perivaginitis disecante ó **flegmonosa.** Inflamación del tejido celular de la pequeña pelvis, circunscrita al perímetro vaginal.

perivisceritis, *s. f.* (Huchard). Inflamación crónica de las serosas que rodean las vísceras (asociación de peritonitis, pleuresía y pericarditis de forma seca).

perlados (esputos). Expectoración espumosa que contiene pequeños tapones secos, elásticos, opalescentes, difícilmente visibles con la luz. Ellos caracterizan la expectoración que termina el acceso de asma.

pernicioso, *adj.* (*pernicies*, pérdida, destrucción). Se aplica á ciertas formas graves de las enfermedades, en que la gravedad es causada no por una circunstancia accidental, como la edad del sugeto ó su estado anterior, sino por la naturaleza misma del mal. Ej. : *fiebre intermitente perniciosa, anemia perniciosa*.

pernio, *s. m.* (*pernio*, sabañón). Sin. : *eritema pernio*. Sabañón.

perómelo, *s. m.* (πηρός, inválido; μέλος, miembro). Monstruo caracterizado, ya por la ausencia más ó menos completa de uno ó de varios miembros (*ectrómelo*), ya por el estado rudimentario de las manos ó de los pies (*hemimelo*).

Perroncito (signo de). Dolor provocado por la presión del duodeno, acompañado de timpanismo en esta parte del intestino : signo frecuente en la anquilostomasia.

persecución (delirio de) (Lasègue, 1852). Variedad de enajenación mental en que los enfermos, en vez de acusarse á sí mismos, comos los melancólicos y los lipemaniacos, acusan á los demás y se consideran como víctimas.

perspiración, *s. f.*

(*per*, á través; *spirare*, soplar). Exhalación de vapor de agua y de gases á través una membrana. Esta palabra no se emplea mucho fuera de la expresión *perspiración cutánea;* designa entonces los cambios respiratorios que se hacen por la piel (absorción de oxígeno, exhalación de ácido carbónico).

perversión, *s. f.* (*pervertere*, alterar). Transformación que tiene por resultado modificar desfavorablemente, ya las sensaciones físicas (*perversión del gusto, de los sentidos*), ya las concepciones morales (*perversión moral*).

pesario, *s. m.* (πεσσός, pesario, pieza de un juego). Instrumento que se introduce en la vagina para mantener el útero, cuando este órgano se halla dislocado (prolapso, ante ó retroversión, etc.).

peste, *s. f.* (*pestis*). Nombre que se daba antes á todas las grandes epidemias, de donde el nombre de *enfermedades pestilenciales* que aún se aplíca á veces á las enfermedades epidémicas. Este término designa hoy á la *peste bubónica* únicamente.

peste antigua. Enfermedad completamente desaparecida, que se manifestó en la antigüedad por tres grandes epidemias: *peste de Atenas*, relatada por Tucídides, *peste antonina*, descrita por Galeno, y *peste de Cipriano* en el siglo III de nuestra era.

peste bovina. Sin.: *tifus contagioso.* Enfermedad infectiva, inoculable y contagiosa, especial de los bovideos; mas, susceptible de trasmitirse á algunas otras especies (carneros, cabras, camellos). Está caracterizada por cierto estado tífoideo extremadamente grave y por la inflamación de las mucosas (conjuntiva, pituitaria, mucosas bucal y vaginal) acompañada de ulceraciones.

peste bubónica. Enfermedad infectiva, epidémica y contagiosa, caracterizada por marcha aguda febril; bubones en las ingles, axilas, cuello; ántrax, y hemorragias diversas (petequias, equímosis, hematurias, etc.). Es causada por un microbio especial: *el bacilo de Yersin.*

petequias, *s. f. pl.* (latín del siglo XV *pestichiæ*, de *pestis*, peste, porque la peste presentaba frecuentemente *petequias*. Littré). Variedad de hemorragia cutánea caracterizada por manchitas de color rojo violáceo, cuyas dimensiones varían de una cabeza de alfiler á una

lenteja. Son las más pequeñas manchas de púrpura.

petequial, *adj.* Que presenta petequias.

Petit (hernia de J. L.). Hernia lumbar que se produce dentro del triángulo de J. L. Petit, triángulo limitado hacia abajo por la cresta iliaca, hacia atrás por el borde anterior del músculo gran dorsal, hacia adelante por el borde posterior del oblicuo mayor, y cuya área se halla ocupada por el músculo oblicuo menor y la aponeurosis posterior del músculo transverso. No todas las hernias lumbares siguen ese trayecto.

Pettenkófer (reacción de). Reacción que caracteriza la presencia de los ácidos biliares en la orina. Se obtiene vertiendo en la orina algunas gotas de una solución de azúcar al quinto, luego un chorrito de ácido sulfúrico concentrado; la orina, si contiene ácidos biliares, se pone violeta y después púrpura.

Péyer ó **Peyero (placas de).** Aglomeraciones de folículos cerrados, que forman bajo la mucosa de la última parte del intestino delgado eminencias más ó menos notables. Se alteran en la fiebre tifoidea; son entonces asiento de inflamación y aún de ulceración.

Pféiffer (bacilo de). Bacilo de la influenza.

Pféiffer (fenómeno de). Fenómeno que consiste en la transformación en bola de ciertos bacilos (vibrión colérico, bacilo tífico), cuando se les inyecta en la cavidad peritoneal de un cochinillo de Indias inmunizado. Esta transformación se opera en el líquido exudado, fuera de los leucocitos.

Pfuhl (signo de) (1877). Signo que permite determinar la situación de un derrame purulento con relación al diafragma. Si se practica una punción con un aparato provisto de un manómetro, se comprueba que la presión aumenta durante la inspiración y disminuye durante la expiración, en el caso de que la colección sea sub-frénica; la inversa se produce si la colección es supra-diafragmática.

Phelps (operación de). Operación destinada á enderezar el pie zambo varo-equino. Consiste en hender profundamente el borde interno del pie (partes blandas y huesos) para enderezarlo é inmovilizarlo en buena posición.

Philipowicz (signo

de) (ortografía errada de *Filipovitz*). Véase : *palmoplantar* (*signo*).

pian, *s. m.* (voz de la lengua galibi, Littré). Sin. : *frambœsia*. Enfermedad contagiosa, epidémica en las colonias francesas de América (Guadalupe, Guayana), y que parece análoga al *yaws* endémico en los negros de Guinea. Se halla caracterizada por la aparición en la piel de tumefacciones ó *pians*, de superficie granulosa, y más ó menos semejantes á las frambuesas; el comienzo está acompañado de fiebre y dolores en los miembros; más tarde estos botones se ulceran, uno de ellos más considerable que los otros lleva el nombre de *pian-madre* ó *mamá-pian*. Esta enfermedad, que se ha tratado á veces de identificar con la sífilis, sería causada por un parásito muy cercano al de ésta, el *spirochæte pallidula* (Castellani, 1905).

pian del bosque (*pian-bois*). Afección muy común en la región de los bosques de Guayana, diferente del pian propiamente dicho, caracterizada por la aparición de tumefacciones circunscritas, cuyo centro es cavado por una úlcera crateriforme; los ganglios correspondientes se infartan y el estado general vese mas ó menos gravemente comprometido.

pian hemorrágico. Véase : *verruga*.

piaremia, *s. f.* (πῖαρ, grasa; αἷμα, sangre). Estado de la sangre que contiene grasa emulsionada.

piartrosis, *s. f.* (πῦον, pus; ἄρθρον, articulación). Artritis purulenta.

pica, *s. m.* (*pica*, urraca, alusión al gusto de esta ave). Trastorno del apetito que consiste en la tendencia á comer sustancias no alibles.

picaporte (ritmo de) (Perret, 1892). Modificación del ritmo cardiaco, caracterizada por el acortamiento del pequeño silencio. Este ritmo va acompañado de taquicardia; es síntoma grave y revela debilidad del corazón.

picnomorfo (estado) (πυκνός, compacto; μορφή, forma). Estado de las células nerviosas, consecutivo á la cromatolisis.

picnosis, *s. f.* (πύκνωσις, condensación). Transformación del núcleo de la célula, que consiste en la condensación de la cromatina. El núcleo se vuelve homogéneo y uniformemente colorado. Este fenómeno sería efecto de la muerte del núcleo.

pie bot. Véase : *pie zambo*.

pie chato valgus doloroso. Véase : *tarsalgia de los adolescentes.*

pie (fenómeno del). Véase : *clonus.*

pie forzado. Accidente que se observa sobre todo en los soldados jóvenes á consecuencia de caída, paso en falso, esfuerzo ó simplemente marcha forzada. Manifiéstase por una hinchazón dura de la parte media del pie y dolor vivo limitado á un punto de uno de los metatarsianos. Sería causado, según Thiele, por la fractura ó fisura de alguno de estos huesos.

pie tabético. Deformación del pie observada en la tabes, y debida á artropatías que empiezan por la articulación tarso-metatarsiana del dedo gordo. Esta deformación es muy diferente del pie zambo tabético de Joffroy.

pie zambo. Sin. *pie bot.* Deformación permanente del pie, congénita ó adquirida, que le impide el contacto con el suelo de sus puntos de apoyo normales. Existen cuatro grandes variedades de *pie zambo* según el sentido de la desviación : 1° el *pie zambo equino* : el pie está en extensión forzada y reposa sobre el suelo por el extremo anterior (analogía con la pata del caballo); — 2° el *pie zambo talus* : el pie está en flexión forzada sobre la pierna y reposa por el talón; — 3° el *pie zambo valgus* : el pie está desviado hacia afuera y reposa por el borde interno; — 4° el *pie zambo varus* : el pie se halla desviado hacia dentro y reposa por el borde externo. — Muy frecuentemente asocianse las desviaciones de las dos primeras variedades con las de las otras dos, para formar el *pie varo-equino*, y el *pie talus-equino.*

pie zambo tabético (Joffroy). Pie zambo varo-equino que se observa en los atáxicos después de prolongada permanencia en la cama; el peso de las colchas, ejercido sobre un miembro cuyo tonus muscular se ha debilitado ó suprimido, produce dicha deformación.

piedra, *s. f.* Sin. *tricomicosis nudosa.* Enfermedad de los vellos y del cabello debida á un hongo parásito, caracterizada clínicamente por la presencia de nudos escalonados desordenadamente en los pelos ; dichos nudos están formados por el acúmulo de esporos en la superficie del pelo. En los climas templados no se observa esta afección.

piel anserina ó **de ganso**. «Estado particular y transitorio de la piel que consiste en la erección de los folículos pilosos, que toman la forma de pequeñas eminencias cónicas; es debido á la contracción de las fibras lisas de los folículos y sobreviene bajo la impresión del frío, del miedo, etc.» (Brocq).

pielitis, *s. f.* (πύελος, pelvis). Inflamación aguda ó crónica de la mucosa que tapiza la pelvis y los cálices renales.

pielonefritis, *s. f.* Inflamación de la pelvis renal y del riñón; esta inflamación suele extenderse al uréter y es entonces una uréteropielonefritis. La infección sube á veces de la vejiga al riñón (*pielonefritis ascendente*); á veces baja del riñón á la vejiga (*pielonefritis descendente*).

pielostomía, *s. f.* (πύελος, pelvis; στόμα, boca). Establecimiento de una fístula quirúrgica en la pelvis renal.

pielotomía, *s. f.* (πύελος; τομή, sección). Incisión de la pelvis renal con el objeto de extraer un cálculo ó de vaciar una colección líquida.

pielo-vesical (reflejo). Dolor reflejo que se provoca á veces, en los enfermos atacados de pielitis ó de pielonefritis, comprimiendo la pared abdominal á dos ó tres centímetros de la línea media. Se determina de ese modo un dolor que irradia hacia la vejiga, acompañado de ganas de orinar.

piemia, *s. f.* (πῦον, pus; αἷμα, sangre). Véase: *piohemia*.

pigmento, *s. m.* (*pigmentum*, color, de *pingere*, pintar). Sustancia dotada de cierto color particular, que se encuentra en diferentes tejidos y líquidos de la economía, á los cuales imprime su propio color.

pigmentación, *s. f.* Acúmulo de pigmento en ciertos puntos; puede ser normal ó patológica.

pigómelo, *s. m.* (πυγή, nalga; μέλος, miembro) (I. G. St-Hilaire). Monstruo doble polimeliano, caracterizado por la presencia de uno ó dos miembros suplementarios insertos detrás del autósito ó entre los miembros normales de éste.

pigópago, *s. m.* (πυγή, nalga; παγεῖς, unidos) (I. G. St-Hilaire). Monstruo doble cusonfaliano soldado por la región glutea.

píldora, *s. f.* (*pilula*, dim. de *pila*, bola). Medicamento destinado al uso in-

terno, en el cual la sustancia activa, sola ó asociada á un excipiente, forma una esferita de consistencia bastante firme, que puede ser tragada en sustancia sin impresionar el gusto.

pileflebitis, *s. f.* (πύλη, puerta; φλέψ, vena). Inflamación de la vena porta.

piletrombosis, *s. f.* (πύλη; θρόμβος, grumo) (Rommelaere). Trombosis de la vena porta.

pilimicción, *s. f.* (*pilus*, pelo; *mictio*, micción). Emisión de orina con filamentos mucosos capiliformes, ó pelos verdaderos, que suelen estar cubiertos de cristales de ácido úrico. Estos pelos ó han sido introducidos por la uretra dentro de la vejiga ó provienen de un quiste dermoideo.

pilomotor (reflejo) (Haskovec). Reflejo obtenido por una suave excitación mecánica de la piel (percusión). Se observa sobre todo en los neuropatas.

pilorectomía, *s. f.* (πυλωρός, píloro; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en la resección del píloro.

pilorismo, *s. m.* Sin. *pilorospasmo*. Estrechez espasmódica del píloro, provocada generalmente por exulceraciones de la mucosa estomacal en la proximidad de este orificio.

piloroplastia, *s. f.* (πυλωρός; πλασσεῖν, formar). Sin. *operación de Heinicke-Mikulicz*. La incisión longitudinal de la estrechez del píloro, seguida de sutura transversal de la herida. Tiene por resultado transformar la parte estrechada en parte dilatada.

pilorospasmo, *s. m.* Véase : *pilorismo*.

pilorostomía, *s. f.* (πυλωρός, píloro; στόμα, boca) (Lambotte, 1905). Fístula gástrica, destinada á poner remedio á la estenosis del esófago, que se practica en el píloro, cuyo esfínter sirve así de boca al estómago. Al mismo tiempo se establece una anastomosis gastro-intestinal, por donde se vacía el estómago. La operación consta pues de : sección del duodeno y clausura de su extremo inferior, gastro-enterostomía posterior, y fijación del píloro en la herida cutánea. Debería preferirse ésta á la gastrostomía.

pingüécula ó **pingüícula** (*pinguiculus*, dim. de *pinguis*, gordo). Pequeña eminencia amarillenta, cuyo volumen no es mayor que el de una lenteja,

situada sobre la conjuntiva, fuera del limbo de la córnea y formada no por grasa, sino por una aglomeración de células epiteliales y tejido conjuntivo.

Pins (signo de) (1889). Signo observado en la pericarditis con derrame, principalmente en los niños. Consiste en fenómenos seudopleuríticos (sonido mate, soplo) que se perciben en la parte posterior izquierda del tórax, y desaparecen en la posición genu-pectoral.

pinta, *s. f.* Sin. : *mal del pinto.* Enfermedad poco conocida, propia de la América central, caracterizada por la aparición en los tegumentos de manchas de varios colores, rojas, negras, blancas ó azules.

pinzurgía (procedimiento de la) (A. Broca). Procedimiento quirúrgico que consiste en obrar á distancia con pinzas é instrumentos provistos de largos mangos. Muchos cirujanos tocan así las heridas sépticas sin contaminarse las manos.

piociánico (bacilo) (πῦον, pus; κύανος, azul) (Gessard). Bacilo que se encuentra en el pus colorado de azul; se cultiva en los medios habituales, donde produce un color azul verduzco.

piocito, *s. m.* (πῦον; κύτος, célula). Célula de pus.

piocolpos, *s. m.* (πῦον; κόλπος, vagina). Colección purulenta intravaginal consecutiva al hematocolpos.

piodermia ó **piodermitis,** *s. f.* (πῦον; δέρμα, piel). Conjunto de las lesiones supurativas de la piel (impétigo, foliculitis, forúnculo, abcesos subcutáneos), que se presentan en algunos sugetos, y sobre todo en los niños, á consecuencia de trastornos digestivos.

piogenia, *s. f.* (πῦον; γένεσις, generación). Producción de pus.

piogénica (membrana). Nombre dado á la pared de los abcesos; se suponía antes que era esta pared, formada de tejido celular indurado, la que segregaba el pus.

piógeno, *adj.* (πῦον; γεννᾷν, engendrar). Que hace supurar. Nombre dado á los microbios ordinarios de la supuración (*estreptococo, estafilococo piógeno*).

piohemia, *s. f.* (πῦον, pus; αἷμα, sangre). Sin. : *infección purulenta, piemia.* Conjunto de accidentes debidos al ingreso á la circulación de microbios que van á efectuar supuraciones múltiples en las serosas vis-

cerales y articulares y en los parenquimas.

piómetra, *s. m.* (πῦον; μήτρα, matriz). Colección purulenta intrauterina consecutiva al hematómetra.

pionefrosis, *s. f.* (πῦον; νεφρός, riñón) (Rayer). Distención del riñón por una colección purulenta; sigue generalmente á la pielonefritis y se manifiesta por tumor renal y piuria intermitente.

pioneumohidátide, *s. f.* (πῦον; πνεύμα, aire; hidátide). Quiste hidatídico atacado de supuración pútrida con desprendimiento de gases.

pioneumopericardias, *s. m.* (πῦον; πνεύμᾱ; pericardio). Derrame purulento y gaseoso de la cavidad pericardiaca.

pioneumoperihepatitis, *s. f.* (Chauffard). Peritonitis enquistada desarrollada á expensas del peritoneo perihepático, acompañada de formación de pus y de gases; es casi siempre consecutiva á la perforación de un segmento del tubo digestivo. Cuando se encuentra situada entre el hígado y el diafragma realiza los signos habituales del pioneumotórax, de donde los nombres de *pioneumotórax subfrénico* (Leyden), *falso neumotórax* (Cossy), que se le ha dado entonces.

pioneumotórax, *s. m.* (πῦον; πνεύμα; θώραξ, pecho). Derrame gaseoso de la cavidad pleural (neumotórax), acompañado de derrame purulento más ó menos abundante.

pioperihepatitis, *s. f.* Peritonitis purulenta enquistada desarrollada en el peritoneo perihepático; ocupa lo más á menudo el espacio situado entre la cara superior del hígado y el diafragma, y da lugar á un conjunto de signos físicos que recuerdan los de la pleuresía diafragmática (*piotórax subfrénico*).

piorrea, *s. f.* (πῦον, pus; ῥεῖν, fluir). Flujo de pus.

piorrea alveolodental. Véase: *gingivitis expulsiva*.

piosalpinx, *s. m.* (πῦον, pus, σαλπίγξ, trompa). Transformación de la trompa de Falopio en bolsa llena de pus; es una forma de salpingitis supurada.

piotórax subfrénico. Véase: *pioperihepatitis*.

pirético, *adj.* (πυρετός, fiebre). Febril.

piretógeno, *adj.* (πυρετός; γεννᾶν, engendrar). Que da fiebre.

piretología, *s. f.* (πυρετός; λόγος, discurso). Parte de la patología que trata de las enfermedades febriles.

pirexia, *s. f.* (πῦρ, fuego, ἔχειν, tener). Nombre genérico de las enfermedades febriles.

pirgocefalia, *s. f.* (πύργος, torno; κεφαλή, cabeza). Véase : *acrocefalia*.

pirofobia, *s. f.* (πῦρ, fuego; φόβος, temor). Temor morboso (fobia) á los incendios, al fuego, fósforos, etc.

pirógeno, *adj.* (πῦρ; γεννᾶν, generar). Que provoca fiebre.

Pirogoff (operación de) (1853). Procedimiento de amputación del pie en que con la sierra se quitan las superficies articulares del calcáneo y de la pierna, de manera de producir la soldadura íntima del calcáneo con la tibia y el peroné.

piromanía, *s. f.* (πῦρ, fuego; μανία, manía). Sin. *monomania incendiaria* (Esquirol). Impulsión que arrastra á ciertos degenerados á pegar fuego.

piroplasmosis, *s. f.* Enfermedad causada por el *piroplasma*. Las *piroplasmosis humanas* comprenden : 1° cierta fiebre remitente especial rebelde á la quinina, muy esparcida en la India, donde se la conoce con el nombre de *Kala-azar* ó *fiebre negra*; es causada por el *piroplasma Donovani*; — 2° la *fiebre de garrapatas* del Montana. Esta última afección llamada también *fiebre petequial*, *spotted fever*, es causada por el *piroplasma hominis*, inoculado por la garrapata. Está caracterizada por principio brusco (calofríos violentos), temperatura muy elevada desde los primeros días y erupción petequial abundante que sobreviene del segundo al quinto día. La muerte es casi la regla y sobreviene del sexto al undécimo día.

pirosis, *s. f.* (πυρόω, ardo). Sensación de quemadura que parte del epigastrio, sube el esófago hasta la garganta, acompañada de eructo y de regüeldo de un líquido ácido y urente; síntoma de dispepsia.

pitiático, *adj.* Dícese de los trastornos curables por la persuación.

pitiatismo, *s. m.* (πειθώ, persuasión; ἰατος, curable) (Babinski, 1901). Estado síquico que se manifiesta por trastornos curables por la persuasión (histeria).

pitiriasis, *s. f.* (πίτυρον, salvado). Esta palabra, em-

pleada sola, significa : « afección cutánea caracterizada por una fina descamación » (Brocq).

pitiriasis lingual. Véase : *descamación marginada aberrante de la lengua.*

pitiriasis rosada de Gibert. Dermatosis que empieza por una placa única llamada primitiva, rosada, cubierta de finas escamas adherentes, seguida pronto de una erupción secundaria generalizada, formada de máculas que se cubren igualmente de escamas. Su evolución dura de 6 á 8 semanas y termina por curación.

pitiriasis rubra pilar (Devergie, Besnier, Richaud). Dermatosis inflamatoria que se ha comparado con la soriasis, caracterizada clínicamente por tres elementos principales : asperezas foliculares, descamación pitiriásica, y, rubor con exageración de los pliegues de la piel. Es una afección crónica que dura años, con períodos de remisión más ó menos largos

pitiriasis versicólor. Dermatosis caracterizada por el desarrollo de manchas amarillas ó flavas, que ocupan de preferencia el tronco y son causadas por la germinación en la epidermis de un hongo parásito, *micrósporon fúrfur.*

pitiriasis rubra (Hebra). Sin. *eritrodermia exfoliante* (Besnier). Dermatosis caracterizada por rubor general del dermo con abundante descamación de la epidermis; puede ser secundaria á otra dermatosis (exema, soriasis), y primitivamente, como entonces, va acompañada de fiebre.

Pitres (signo de). Véase : *cordel (signo del).*

pituita, *s. f.* (*pituita*, mucosidad). Líquido viscoso, acuoso, que algunos enfermos, y particularmente los alcohólicos, botan en ayunas, por la mañana, ya por expectoración, ya por una especie de regurgitación.

pituita hemorrágica (Mathieu y Milian). Véase : *hemosialemesis.*

piuria, *s. f* (πῦον, pus; οὐρεῖν; orinar). Emisión de orina cargada de pus.

placas mucosas. Véase : *mucosas (placas).*

placas terigoideas. Véase : *terigoideas (placas).*

placenta, *s. f.* (*placenta*, torta). Masa carnosa, blanduzca, aplanada, inserta sobre la cara interna del útero durante la preñez, de cuya cara libre nace el cordón umbilical. Su función es nu-

trir el feto durante la vida intra-uterina.

placenta previa (*prœvius*, que va delante). Inserción viciosa de la placenta : inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. — Este modo de inserción predispone á ciertos accidentes : parto prematuro, presentación viciosa, etc. Se manifiesta sobre todo por hemorragias repetidas en los tres últimos meses del embarazo.

placentitis, *s. f.* Nombre dado por Brachet á la inflamación de la placenta. Se han descrito con este nombre las lesiones de la caduca, los hematomas de la placenta, etc.

placentoma, *s. m.* Variedad de *deciduoma* desarrollada á expensas de la placenta.

plagiocefalia, *s. f.* (πλάγιος, oblícuo; κεφαλή, cabeza) (Linné). Deformación craneana que consiste en ensanchamiento con aplanamiento de la frente. — *plagiocefalia atrépsica* (Parrot). Deformación general de la cabeza de los atrépsicos. Consiste en el achatamiento lateral del cráneo, que parece alargado de adelante á atrás. La rarefacción del líquido céfalo-raquídeo y el decúbito lateral producen el cabalgamiento de los huesos del cráneo.

plasma, *s. m.* (πλάσμα, de πλάσσειν, dar forma). Parte líquida que entra en la composición de ciertos tejidos. Ej. : *plasma muscular*, *plasma sanguíneo*.

plasmarrexis, *s. f.* (Klebs). Desaparición de la membrana celular y liberación de las granulaciones del protoplasma. Es el último término de la degeneración celular.

plasmáticas (células) (Virchow). Células huecas del tejido conjuntivo que constituyen por sus anastomosis una red por la cual circularía la linfa. No se admite ya hoy la existencia de dichas células, así como tampoco la de la red.

plasmazellen (πλάσμα; alemán *Zellen*, células) (Unna). Variedad de células conjuntivas que no se encuentra sino en estado patológico; dichas células, de 15 á 20 μ de diámetro, están formadas por un protoplasma que se colora uniformemente por los colores básicos de anilina, y por un núcleo excéntrico situado en uno de los polos de la célula que posee 5 á 6 gránulos de cromatina muy colorables.

plasmodias, *s. f. pl.* Masas protoplasmáticas cons-

tituídas por la reunión de los esporos de hongos mixomicetes. Son completamente análogas á los plasmodios.

plasmodio, *s. m.* Masa formada por la fusión de varias amibas. Constituye una enorme masa protoplasmática muy favorable á los estudios experimentales. Los fisiólogos han estudiado en el plasmodio la mayor parte de las propiedades del protoplasma.

plasmodioma, *s. m.* Nombre bajo el que Brindeau y Nattan reúnen la *mola hidatiforme* y el *deciduoma maligno*. Estos dos neoplasmas se desarrollan á expensas del ectodermo ovular y presentan idénticos caracteres infectantes é idénticos elementos histológicos.

plasmolisis, *s. f.* (πλάσμα; λυεῖν, separar).

plasmosquisis, *s. f.* (πλάσμα; σχίζειν, hender) (Lövit). Fenómeno de osmosis á través la membrana de las células. Se produce este fenómeno cuando se ponen las células en contacto con una solución salina, la cual tiene la propiedad de quitarles una parte de su agua y de retraer su protoplasma.

plasticidad, *s. f.* (πλάσσειν, formar). Propiedad que poseen ciertos humores, y en particular la sangre, de nutrir los tejidos.

plastídula, *s. f.* Véase: *citomicrosoma*.

platibásico (cráneo) (πλατύς, ancho; βάσις, base) (Broca). Cráneo de base chata y ensanchada. Esta deformación es debida al hundimiento de los cóndilos del occipital, y á veces del perímetro entero del agujero occipital. Se observa principalmente en la infancia y en la vejez, cuando los huesos han sufrido alteración en su consistencia.

platicefalia, *s. f.* (πλατύς, ancho; κεφαλή, cabeza) (antropología). Tipo de cráneo achatado, cuya bóveda se halla rebajada.

platicnemiana (tibia) (πλατύς, ancho; κνημή, pierna) (Broca). Tibia achatada como la hoja de un sable (razas prehistóricas).

platipodia, *s. f.* (πλατύς; πούς, pie). Pie chato.

platirrinio, *s. m.* (πλατύς; ῥίς, ῥινός, nariz) (Broca). Nombre dado en antropología y etnografía á aquellos individuos y razas cuyo índice nasal es grande (de 53 á 58) (nariz ancha relativamente á su longitud. — Raza etiópica).

pleomorfismo, *s. m.* (πλέως, numerosos; μορφή,

forma). Propiedad de ciertas bacterias de cambiar de forma bajo determinadas influencias.

pletismógrafo, *s. m.* (πληθυσμός, aumento; γράφειν, escribir). Aparato destinado á inscribir el aumento de volumen de los miembros.

plétora, *s. f.* (πλήθειν, estar lleno). Nombre dado por los humoristas á la superabundancia de sangre, ó de diversos humores, en todo el organismo ó en una de sus partes. Como indicación terapéutica tenía la depleción, esto es, la sangría.

pleuresía, *s. f.* (πλευρά, costado). Sin. : *pleuritis*. Nombre genérico de todas las inflamaciones pleurales agudas ó crónicas, con ó sin derrame. Se describe gran número de formas : 1° según la naturaleza del líquido derramado (*pleuresía serofibrinosa, hemorrágica, purulenta*); 2° según la causa determinante (*pleur. reumatismal, cancerosa, gangrenosa, tuberculosa, de microbios varios : neumococo, neumobacilo, estreptococo, estafilococo*, etc.); — 3° según el sitio y la extensión del derrame (*pleur. doble, diafragmática, interlobular, mediastínica, areolar*, etc.); — 4° según el estado del sugeto atacado (*pleur. de los cardiacos, de los niños, de los ancianos*, etc.).

pleuritis, *s. f.* Véase : *pleuresía*. Comúnmente se designan con este nombre las pleuresías secas, localizadas, que acompañan á los accesos de congestión en la tuberculosis pulmonar.

pleurodinia, *s. f.* (πλευρά, costado ; ὀδύνη, dolor). Dolor reumático de los músculos intercostales.

pleurómelo, *s. m.* (πλευρά ; μέλος, miembro) (Pictet). Monstruo polimeliano caracterizado por la existencia de dos miembros anteriores accesorios.

pleuro-neumonía, *s. f.* Neumonía acompañada de pleuresía.

pleuro-pericarditis, *s. f.* Inflamación simultánea de la pleura y del pericardio.

pleuro - peritoneal (cavidad). Véase: *celoma*.

pleurosoma, *s. m.* (πλευρά, costado; σῶμα, cuerpo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por una eventración lateral que ocupa principalmente la porción superior del abdomen y se extiende aún hasta el interior del pecho. El miembro torácico del lado de la eventración se haya más ó menos atrofiado.

pleuro-tifoidea (**fiebre**) ó **pleuro-tifus**, *s. m.* Fiebre tífoidea que empieza con pleuresía.

pleurotomía, *s. f.* (πλευρά; τομή, sección). Operación del empiema. Abertura de la pleura por el bisturí para vaciar una pleuresía purulenta.

pleurotótonos, *s. m.* (πλευρόθην, lateralmente; τόνος, tensión). Posición tomada á veces por el cuerpo en el tétanos : á consecuencia de la contracción de todos los músculos de un lado, el enfermo se encorva en arco dirigido á la derecha ó á la izquierda.

pleximétrica (**percusión**). Percusión practicada con el plexímetro, ó más simplemente con dos monedas : una se aplica en el punto que se examina y se percute con la otra. Generalmente se combina con la auscultación.

plexímetro, *s. m.* (πλήσσειν, herir; μέτρον, medida) (Piorry). Instrumento empleado por Piorry para practicar la percusión mediata; está casi completamente abandonado hoy.

pleyade ganglionar. Grupo de ganglios aumentados de volumen.

pleyocrómica (**ictericia**) (πλείων, más abundante; χρῶμα, color) (Stadelmann, 1891). Ictericia cuya causa es la existencia de una gran cantidad de pigmentos que espesan la bilis é impiden su derramamiento. La acompaña una coloración muy oscura de las materias fecales.

pleyomazia ó **pleomazia**, *s. f.* (πλείων ó πλέως, numerosos; μαξός, mamila). Véase : *polimastia*.

plica, *s. f.* (*plicare*, de πλέχειν, mezclar). Enredo tal de los cabellos, que forman un verdadero tejido de fieltro en el que se alojan parásitos, polvo y grasa. Esta afección es lo más á menudo resultado de la falta de cuido higiénico.

plomo (**cólico de**). Véase : *cólico de plomo*.

pn... Las voces tomadas del griego que principian por *pn*, como *pneumatosis*, *pneumonía*, etc., ahora se escriben sin *p*, y de consiguiente deben buscarse en la N.

poción, *s. f.* (*potio*). Preparación magistral líquida, destinada á ser tomada por ingestión. Se compone de diversos elementos : la base (el medicamento activo), el adyuvante, el excipiente, el correctivo y el intermedio.

podagra, *s. f.* (πούς,

pie; ἄγρα, presa). Manifestación de la gota en las articulaciones del pie.

podálica, *adj.* Véase : *versión*.

podencéfalo, *s. m.* (πούς, pedículo; ἐγκεφαλός, encéfalo) (I. G. St-Hilaire). Monstruo cuyo encéfalo se halla en gran parte situado fuera de la caja craneana, á cuya bóveda está unido por un pedículo.

podredumbre de hospital. Sin. : *gangrena nosocomial, mal de hospital. tifus traumático, úlcera pútrida ó gangrenosa, difteria de las heridas*. Afección contagiosa y parasitaria que se observa como complicación de las heridas; está caracterizada por la formación de exudados membranosos y de focos de reblandecimiento gangrenoso. Ha desaparecido por completo hoy de los hospitales.

poiquilocitosis, *s. f.* (ποικίλος, variado; κύτος, célula). Nombre dado por Quincke á las deformaciones de los glóbulos rojos observadas en la anemia de 4° grado.

polacuria, *s. f.* (πολλακίς, á menudo; οὐρεῖν, orinar) (Dieulafoy). Frecuencia de la micción, sin que sea necesario que coincida con el aumento del volumen total de la orina. Signo de nefritis intersticial.

poliadenoma, *s. m.* (πολύς, numerosos; adenoma). Sin. : *adenoma multiglandular*. Nombre dado por Broca á adenomas constituídos por la hipertrofia simultánea de gran número de glándulas de igual naturaleza.

poliartritis aguda febril (πολύς, numerosos; ἄρθρον, articulación). Reumatismo articular agudo.

poliartritis deformante. Véase : *reumatismo nudoso*.

policanaliculitis, *s. f.* Inflamación de numerosos conductos glandulares, por infección ascendente, en un mismo individuo, el cual presenta especial predisposición á los forúnculos, otitis, dacriocistitis, angiocolitis, etc. (diátesis de autoinfección).

policitemia, *s. f.* (πολύς; κύτος, célula ; αἷμα, sangre). Véase : *poliglobulia*.

policlínica, *s. f.* (πόλις, ciudad; clínica). 1° Clínica ejercida cerca de los enfermos de la ciudad no hospitalizados (consultas, visitas). — 2° Establecimiento destinado al tratamiento de las enfermedades y á la enseñanza de la medicina, en el que los enfermos no están hospitalizados.

policólica (ictericia) (πολύς. mucho; χολή, bilis). Ictericia cuya causa sería debida á la secreción exagerada de bilis.

policoria, *s. f.* (πολύς; κόρη, pupila). Anomalía congénita ó adquirida del iris. Existencia de dos ó de varios orificios pupilares, sin que resulte de allí turbación notable de la vista.

policromatofilia, *s. f.* Estado de los glóbulos rojos que se coloran por dos ó tres tintes diferentes, ya difusamente, ya por rasgos ó puntos. Este fenómeno sería, según Ehrlich, indicio de la muerte del glóbulo.

polidactilia, *s. f.* ó **polidactilismo,** *s. m.* (πολύς, numerosos; δάκτυλος, dedo). Anomalía congénita que consiste en la existencia de dedos supernumerarios.

polidipsia, *s. f.* (πολύς; δίψα, sed). Exagerada necesidad de beber.

polifagia, *s. f.* (πολύς, mucho; φαγεῖν, comer). Necesidad excesiva de comer y ausencia de la sensación de saciedad.

polifarmacia, *s. f.* (πολύς, numeroso; φάρμακον, medicamento). Receta ó prescripción de gran número de medicamentos á la vez.

polifibromatosis neurocutánea pigmentaria. Sin.: *enfermedad de Recklinghausen.* Afección caracterizada por la presencia de tumores cutáneos (fibromas), de tumores de los nervios, y de pigmentación anormal de la piel. Según Recklinghausen, esta afección sería de origen nervioso.

poligalactia, ó **poligalia,** *s. f.* (πολύς, numerosa, γάλα, leche). Hipersecreción láctea.

poligenismo, *s. m.* (πολύς; γένος, raza). Doctrina antropológica según la cual las diferentes razas humanas derivan de otros tantos tipos primitivos y constituyen igual número de especies irreductibles.

poliglobulia, *s. f.* (πολύς; glóbulo). Aumento del número de los glóbulos rojos, los que ora conservan las dimensiones normales, ora tienen mayor diámetro (cianosis congénita).

polignatia, *s. f.* (πολύς; γνάθος, mandíbula). Monstruosidad caracterizada por la implantación en uno de los maxilares de un tumor que reproduce más ó menos exactamente los caracteres de un maxilar suplementario.

polignato, *s. m.* Nombre que da I. G. St.-Hilaire á los monstruos

dobles parasitarios atacados de polignatia.

polihidramnios, *s. m.* Véase: *hidramnios.*

polimastia, *s. f.* (πολύς; μαστός, mama). Sin. *pleyomazia.* Multiplicidad de las mamas (anomalía).

polimeliano, *s. m.* (πολύς μέλος, miembro). Nombre dado por I. G. St.-Hilaire á la familia de monstruos dobles parasitarios, caracterizada por la existencia de miembros suplementarios insertos en el autósito, ya directamente, ya por intermedio de un rudimento de tronco.

polimerismo, *s. m.* (πολύς; μέρος, parte). Monstruosidad que consiste en la existencia de órganos suplementarios.

polimiositis infectiva aguda. Afección muy rara, caracterizada por la formación de núcleos inflamatorios intramusculares dolorosos, duros, semejantes á tumores, acompañados de fiebre y á menudo de trastornos de la piel (*dermatomiositis*), de los nervios periféricos (*neuromiositis*), de la sangre ó de los vasos (*polimiositis hemorrágica*).

polimorfia, *s. f.* ó **polimorfismo**, *s. m.* (πολύς; μορφή, forma). Estado particular de un cuerpo inorgánico, de una célula ó de un ser vivo, susceptibles de revestir diferentes formas sin cambiar, á pesar de eso, de naturaleza. Ej.: *polimorfismo de los cuerpos simples, polim. de los microorganismos, polim. canceroso.*

polineuritis, *s. f.* Sin. *neuritis múltiple.* Nombre dado á las neuritis periféricas de origen interno, esto es, infectivas ó tóxicas, por razón de la pluralidad de los nervios atacados.

polinucleares (leucocitos). Variedad de glóbulos blancos constituídos por un protoplasma provisto de núcleos. Actualmente sábese que en realidad no hay más que un núcleo, anfractuoso é irregular, que, por eso, parece múltiple en las preparaciones.

polinucleosis, *s. f.* Variedad de leucocitosis en la que sólo ha aumentado la cifra de los leucocitos polinucleares.

polioencefalitis, *s. f.* (πολιός, gris; ἐγκέφαλος, encéfalo). Lesión de los núcleos grises bulbo-protuberanciales. — *polioencefalitis aguda* y *subaguda.* Lesiones que se revelan clínicamente por la parálisis aguda ó subaguda de los nervios bulbo-protuberanciales, y que sobrevienen á conse-

cuencia de enfermedades infectivas (difteria, escarlatina, etc.) ó de intoxicaciones (alcohol, plomo, etc).

polioencefalitis inferior. Afección caracterizada por el sindroma de la parálisis labio-gloso-laringea, cuando éste es debido á lesiones de los núcleos motores de la región subprotuberancial del bulbo.

polioencefalitis superior. Véase : *oftalmoplejia nuclear.—polioencef. superior hemorrágica* (Wernicke). Afección que empieza bruscamente por cefalalgia, vómitos, paresia de los miembros, y se complica pronto con oftalmoplejia externa. Está acompañada de obnubilación ó de delirio, y termina rápidamente por la muerte.

poliomielitis, *s. f.* (πολιός. gris; μυελός, médula). Lesión del eje gris de la médula espinal. —*poliomielitis crónica.* Destrucción lenta y progresiva de las células de los cuernos anteriores de la médula, que provoca la atrofia muscular progresiva. Su marcha es ordinariamente muy lenta. —*poliom. infantil.* Véase : *parálisis infantil.* — *poliom. aguda del adulto.* Véase : *parálisis espinal aguda del adulto.*

poliopia monocular (πολύς, numeroso; ὄψις, vista). Trastorno de la visión monocular que consiste en la percepción de varias imágenes de un solo objeto. No se observa sino en la lujación del cristalino ó en la histeria.

poliorquidia, *s. f.* (πολύς; ὄρχις, testículo). Existencia de más de dos testículos; anomalía muy rara.

poliosis, *s. f.* (πολιός, gris). Descoloramiento de los pelos.

polípago, *s. m.* (πολύς. numeroso; παγεῖς, unido) (Pictet). Monstruo de la familia de los monocefálicos formado por dos cuerpos con ejes paralelos.

polipnea, *s. f.* (πολύς; πνεῖν, respirar). Respiración rápida y superficial.

pólipo, *s. m.* (πολύς; ποῦς, pie). Tumores generalmente benignos, fibrosos ó mucosos, que se implantan por un pedículo, ora ancho y corto, ora largo y delgado, en una cavidad natural. Puede hallárselos en la mayor parte de las mucosas y en el conducto auditivo externo. Ej. : *pólipo nasofaringeo, p. del esófago, p. del útero, p. de la vagina,* etc.

poliposis intestinal. Nombre dado á la enfermedad caracterizada por la formación de pólipos múltiples en el intestino.

polisarcia, *s. f.* (πολύς; σάρξ, carne). Obesidad.

polispermia, *s. f.* (πολύς; σπέρμα, semen). Presencia en el huevo fecundado, de más de un pronúcleo macho, á consecuencia de la penetración anormal de dos ó más espermatozoides. De ella resulta la producción de monstruos dobles.

politelia, *s. f.* (πολύς; θηλή, pezón). Multiplicidad de pezones en una misma mama.

politricosis ó **politriquia**, *s. f.* (πολύς; θρίξ, τριχός, cabello). Superabundancia del cabello ó de pelos (*politr. del tórax*).

politritomo, *s. m.* (Péan). Instrumento que permite desarrollar una fuerza muy grande y sirve para trepanar los huesos.

Politzer (experiencia de). Maniobra que consiste en insuflar aire en la caja del tímpano por medio de una pera de caucho, cuya cánula es introducida en la nariz; se aprovecha un movimiento de deglución para comprimir bruscamente la pera.

poliuria, *s. f.* (πολύς, mucho; οὖρον, orina). Secreción más abundante de orina que la normal.

polución, *s. f.* (*polluere*, manchar). Emisión involuntaria de esperma.

Poncet (operación de). Véase: *cistostomía suprapubiana.*

pónfolix, *s. m.* (πομφόλυξ, vesícula). Véase: *pénfigo.*

ponosis, *s. f.* Véase: *cinesismo.*

porencefalia, *s. f.* (πόρος, cavidad: ἐγκέφαλος, cerebro) (Heschl). Variedad de encefalopatía infantil, caracterizada por la presencia de cavidades que se abren en la superficie de los hemisferios y comunican con los ventrículos. Es la consecuencia de una suspensión del desarrollo, y casi constantemente se halla situada en el territorio de la arteria silviana. Manifiéstase clínicamente por idiotez, contractura hemipléjica y á veces por crisis epileptoides ó atetosis doble.

porfirización, *s. f.* Acto de reducir á polvo finísimo una sustancia medicamentosa. Para obtener este resultado conviene servirse de un mortero de pórfiro: de allí el nombre.

poroqueratosis, *s. f.* (πώρος, callosidad; κέρας, cuerno). (Mibelli, 1893). Sin. *hiperqueratosis figurada centrífuga atrofiante* (Ducrey y Respighi). Dermatosis caracterizada por el desarrollo de eminencias córneas su-

perficiales, ya redondas, ya irregulares, que tienen su punto de partida en los conductos sudoríparos. Es de evolución muy lenta y no parece susceptible de retroceso.

porosis cerebral (P. Marie). Lesión cadavérica observada en las autopsias hechas en verano. Consiste en cavidades múltiples, como talladas con saca-bocado, del volumen de una arveja al de una avellana, diseminadas en el centro oval, los ganglios centrales, la protuberancia; las cuales dan al encéfalo el aspecto descrito con el nombre de *estado de queso Gruyere*. Es causada por el desarrollo de microbios anaerobios.

porráceo (vómito) (*porrum*, puerro). Vómito de color verde semejante al del puerro.

porrigo, *s. m.* (*porrigere*, extender). Nombre que se daba antes á diversas variedades de alopecias. El *porrigo decalvans* de Willan y Bateman corresponde á la pelada. — el *porrigo scutulata* á la tiña tundente tricofítica. — Mas, á consecuencia de una confusión, el término *porrigo decalvans* fué tomado por ciertos autores (Gruby, 1843) para designar no la pelada sino una variedad de tiña tricofítica.

Porro (operación de) (1876). Operación cesárea seguida de la ablación del útero y de los anexos.

posición, *s. f.* Nombre dado en obstetricia á las relaciones existentes entre la parte fetal que se presenta en el estrecho superior, y los puntos de relación de la pelvis materna.

posología, *s. f.* (ποσόν, cantidad; λόγος, discurso). Estudio de las dosis terapéuticas de los diversos medicamentos según la edad, el sexo y el estado del enfermo.

post-expiratorios (estertores). Estertores subcrepitantes, que aparecen al final de la expiración, después de una primera serie de estertores, de la que se hallan separados por una pausa muy clara y muy breve : es signo de caverna pulmonar.

postitis, *s. f.* (πόσθη, prepucio). Inflamación del prepucio. Generalmente la acompaña la inflamación del glande (*balanitis*); hay entonces *balano-postitis*.

postración, *s. f.* (*prosternere*, derribar, á causa del decúbito dorsal en que permanece el enfermo). Abatimiento extremado, aniqui-

lamiento completo de las fuerzas musculares, que se observa en las formas graves de las enfermedades agudas (fiebre tifoidea adinámica), y á los que á menudo acompaña el estupor.

potamofobia, *s. f.* (ποταμός, río; φόβος, temor). Miedo mórbido á las aguas corrientes.

potasismo, *s. m.* Véase : *calismo.*

potomanía, *s.f.* (πότος, acción de beber; μανία, manía) (Achard). Impulsión mórbida que mueve á algunos degenerados á beber grandes cantidades de cualesquiera líquidos. No debe confundirse ni con la *dipsomanía*, en que el paciente bebe movido por el sabor de los líquidos, ni con las diversas *diabetes*, en que la polidipsia es consecuencia de la deshidratación producida por la poliuria.

Pott (mal de). Sin. : *mal vertebral.* Tuberculosis vertebral, que se manifiesta ordinariamente por una jiba, debida al hundimiento de las vértebras enfermas, por paraplejia y abcesos fríos, llamados *abcesos por congestión.*

Pouey (operación de). Excisión de la mucosa del canal cervical uterino en los casos de inflamación.

precipitina, *s. f.* Sustancia capaz de precipitar una albúmina en una solución. Aparece en el suero de animales á los que se han hecho inyecciones repetidas de esa albúmina.

precirrosis, *s. f.* Nombre dado á un conjunto de signos (trastornos gástricos é intestinales, acolia pigmentaria, urobilinuria, glicosuria alimenticia, etc.), que preceden los de la cirrosis y que corresponden al trastorno de la función hepática.

precordialgia, *s. f.* (Huchard). Nombre dado á los dolores de la región precordial, principalmente á las seudo-anginas de pecho.

prediastólico, *adj.* Que precede la diástole cardiaca.

predicador (mano de) (Charcot). Actitud especial de la mano derecha que está extendida sobre el antebrazo, mientras las falanges están en flexión. Es debida á la parálisis de los músculos inervados por el cubital y el mediano, mientras los extensores (inervados por el radial) están intactos.

predisposición mórbida (*præ*, de antemano; *disponere*, disponer). Estado del organismo que lo hace apto para contraer fácilmente una enfermedad.

preedema (período del) (Widal y Javal). Período que precede la aparición del edema, y durante el cual los tejidos del organismo aumentan su grado normal de hidratación, bajo la influencia de la retención de los cloruros. Se reconoce su existencia por el método de las pesadas.

prematuro, *adj.* Que se dice del niño venido al mundo antes de término, pero viable, á partir del 6° mes de la preñez.

prematuro (parto). Parto antes del término de la preñez (á partir del 6° mes).

premonitorio, *adj.* (*præ*, antes; *monere*, advertir). Se aplica á los signos que preceden á veces la aparición de una enfermedad epidémica y contagiosa, signos que, reconocidos á tiempo, permiten tomar las medidas profilácticas necesarias. Ej.: *diarrea premonitoria* del cólera asiático.

preparatorios ó **preparantes (dolores).** Nombre dado á los dolores que experimenta la parturienta en el período de dilatación del orificio del cuello.

presbiacusia, *s. f.* Modificación del oído que suele observarse en los ancianos. Estos oyen mejor de lejos que de cerca, y perciben mejor la voz cuchicheada, sin duda porque el órgano debilitado se acomoda menos fácilmente y es turbado en su función por la demasiada sonoridad.

presbicia, *s. f.* (πρεσβύτης, anciano). Dificultad de ver claramente, sin fatiga, los objetos próximos, que es causada por la disminución de la amplitud de acomodación, debida á la vejez.

presentación, *s. f.* Nombre dado por los parteros á la parte fetal que tiende á penetrar la primera en el canal pelviano (*presentación de cara*, *de vértice*, *de nalgas*, *de tronco*).

preserva, *s. f.* (Ekelof, 1905). Término propuesto para designar las sustancias y productos alimenticios que han sido puestos al abrigo de la descomposición por cualquier procedimiento: calefacción, salazón, ahumaje, desecación, congelación. La palabra *conserva* se aplicaría con particularidad á los alimentos esterilizados por el calor, y conservados en recipientes cerrados al abrigo del aire.

presístole, *s. f.* El instante que precede inmediatamente la sístole cardiaca y durante el cual pueden percibirse algunos ruidos

mórbidos llamados presistólicos. Ej.: *soplo presistólico* de la estrechez mitral.

presura, *s. f.* (del italiano *presura*, acción de tomar). Materia extraída del 4º estómago, ó cuajar, de la ternera y de otros rumiantes jóvenes, cuando aún no se alimentan más que con leche; está compuesta de leche y jugos del estómago; contiene en gran cantidad el fermento *lab*, gracias al cual puede emplearse para cuajar la leche.

prevértebra, *s. f.* Véase: *metámero*.

Prevost (fenómeno de) (1868). Nombre dado á veces á la desviación conjunta de los ojos y á la rotación de la cabeza, que se observa á consecuencia del ictus apoplético, por el nombre del autor que primero hizo la descripción exacta del fenómeno.

priapismo, *s. m.* (Πρίαπος, Priapo, miembro viril). Erección violenta y dolorosa generalmente sintomática del envenenamiento por la cantárida, de cistitis, de blenorragia, etc.

primíparo, *adj.* (*primus*, primero; *parere*, parir). Se aplica á la mujer que pare por primera vez.

proceso, *s. m.* (*procedere*, avanzar). Evolución de una serie de fenómenos ó de lesiones anatómicas que tienen relación con una enfermedad.

procidencia, *s. f.* (*procidere*, caer). Caída de una parte. Ej.: *procidencia del recto*. — En obstetricia: *proc. del brazo, del cordón*. Descenso del brazo, del cordón, por delante de la parte fetal que se presenta.

procolis, *s. m.* Variedad de tortícolis en la que la cabeza está proyectada hacia delante.

proconsular (cuello) (de Saint-Germain). Tumefacción considerable de la región cervical, que borra los límites del cuello con la mandíbula y recuerda el aspecto del busto del procónsul Vitelio. La causa una adenopatía intensa con infiltración de los tejidos vecinos. Se observa en casos de difteria maligna.

proctalgia, *s. f.* (πρωκτός, ano; ἄλγος, dolor). Neuralgia anal.

proctectomía posterior (πρωκτός; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en resecar un colgajo de la pared posterior de la ampolla rectal con el objeto de poner remedio al prolapso del recto.

proctitis, *s. f.* (πρωκτός, ano). Inflamación del ano.

proctopexia, *s. f.* (πρωκτός; πῆξις, fijación). Fijación del extremo inferior del recto al sacro; operación destinada á corregir el prolapso rectal.

proctorrea, *s. f.* (πρωκτός; ῥεῖν, fluir). Flujo mucoso por el ano.

proctoscopia, *s. f.* (πρωκτός; σκοπεῖν, examinar). Examen del ano y del recto.

procúbitus, *s. m.* (latín; acostado hacia adelante) (obstetricia). Caída del cordón umbilical por delante de la parte fetal que se presenta, estando intacta la bolsa de las aguas; el cordón reposa sobre las membranas que detienen su descenso.

prodigioso (bacilo) (llamado erróneamente á veces *micrococo*). Pequeño bacilo que en los medios de cultivo habituales se desarrolla bien, dando un bello color rojo, siempre que se halle al aire y á la temperatura de 15° á 20°. Se desarrolla algunas veces sobre el pan, la leche, las papas expuestos al aire. Este desarrollo del *bacilo prodigioso* es el que realiza el fenómeno de las hostias sangrientas.

prodromo, *s. m.* (πρό, delante; δρόμος, carrera). Signo precursor de una enfermedad. Estado de malestar que á veces precede la enfermedad.

proencéfalo, *s. m.* (πρό, delante; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. St-Hilaire). Monstruo exencefálico en que el encéfalo hace bulto en gran parte fuera de la caja craneana, por una abertura de la región frontal.

Profeta (ley de). Un niño nacido de madre sifilítica, y aparentemente sano, puede ser amamantado por la madre sin peligro de contaminación. No todos los autores admiten la *ley de Profeta*.

profilaxia ó **profilaxis**, *s. f.* (προφυλάσσειν, garantir). Parte de la terapéutica que tiene por objeto prevenir el desarrollo de las enfermedades.

prognatismo, *s. m.* (πρό, delante; γνάθος, mandíbula). Disposición general de la cara en que la línea del perfil se dirige oblicuamente hacia adelante, de la frente al mentón. Esta conformación, que existe en grados diversos en todas la razas, es exagerada en los negros y constituye uno de los caracteres étnicos de esa raza.

prolapso, *s. m.* (*pro*, adelante; *labi*, caer). Caída ó descenso de un órgano, ó de una parte, por relajación

de los medios de fijeza (*prol. del útero, del recto*); — *prol. del cordón* durante el parto. Véase : *procidencia*.

prolígero (quiste) (Pozzi), **prolífero (quiste)** (Cornil y Ranvier). Véase : *cisto-epitelioma*.

promontorio, *s. m.* 1° Nombre dado en obstetricia á la protuberancia del ángulo sacrovertebral sobre la pelvis. — 2° Eminencia ósea de la pared interna de la caja del tímpano.

pronación, *s. f.* (*pronus*, inclinado adelante). Movimiento del antebrazo por el que la mano ejecuta una especie de rotación de fuera á adentro.

pronóstico, *s. m.* (πρό, de antemano; γνωσκεῖν, conocer). Acto por el cual prevé el médico el éxito probable de la enfermedad, así como las diferentes peripecias posibles.

propatía, *s. f.* (πρό, adelante; παθός, afección). Afección anterior al estado mórbido actual.

propedéutica, *s. f.* (πρό, adelante; παιδεύω, enseñar, de παῖς, niño). Enseñanza elemental cuyo objeto es preparar al estudiante á recibir otra más completa; este término, bien que de significado general, no se emplea mucho fuera de la medicina.

propeptonuria, *s. f.* Véase : *albumosuria*.

propulsión, *s. f.* (*pro*, adelante; *pellere*, empujar). Tendencia de ciertos enfermos á acelerar el paso hasta llegar á correr (*enfermedad de Párkinson*). « Parece que corrieran en pos de su centro de gravedad » (Trousseau).

prosecretina, *s. f.* (Bayliss y Starling). Sustancia específica contenida en la mucosa duodenal, que, en presencia de un ácido (quimo acidificado por el jugo gástrico), transfórmase en secretina.

prosfisectomía, *s. f.* (πρόσφυσις, apéndice; ἐκτομή, excisión) (Guinard). Véase : *apendicectomía*.

prosopalgia, *s. f.* (πρόσωπον, rostro; ἄλγος, dolor). Neuralgia facial; neuralgia del trigémino.

prosoposcopia, *s. f.* (πρόσωπον, σκόπεω, examino la cara). Véase : *patognomonia*.

prostatectomía, *s. f.* (πρόστατης, próstata; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en extirpar la próstata en totalidad ó en parte.

prostatismo, *s. m.* Conjunto de los accidentes determinados por la hipertrofia de la próstata.

prostatitis, *s. f.* Inflamación de la próstata.

próstatomenosis, *s. f.* (πρόστατης; μενόω, aislar) (Audry, 1902). Aislamiento de la próstata, cuyas caras se liberan todas, excepto la que está en contacto con la uretra (operación análoga á la *próstatopexia*).

próstatopexia subperineal (πρόστατης; πῆξις, fijación) (Delagenière, 1902). Lujación de la próstata fuera de su caja aponeurótica, y aislamiento del órgano. El objeto de esta operación es provocar la atrofia de la próstata hipertrofiada.

próstatorrea, *s. f.* (πρόστατης; ῥεῖν, fluir). Flujo uretral, fuera de la eyaculación, de un líquido mucoso: se observa este síntoma en la prostatitis crónica.

próstatotomía, *s. f.* (próstata; τομή, sección). Incisión de la próstata.

proteolisis, *s. f.* (proeico, de πρῶτος, primero; λύειν, disolver). Disolución ó digestión de las sustancias albuminoides ó protéicas.

proteolítico, *adj.* Se dice de las sustancias que disuelven las materias albuminoides ó proteicas.

protesis, *s. f.* (πρό, en lugar de; τίθημι, coloco). Parte de la cirugía cuyo objeto es reemplazar un órgano, ó parte de órgano, con un aparato artificial que reproduce más ó menos exactamente la parte extirpada. Ej.: *protesis dental*, *protesis ocular*.

protoneurona, *s. m.* Primer neurona de la cadena centrípeta ó centrífuga del arco reflejo.

protopatía, *s. f.* (πρῶτος, primero; πάθος, afección). Enfermedad que no es ni secuela ni consecuencia de otra.

protoplasma, *s. m.* (πρῶτος; πλάσμα, formación) (Purkinje, 1840). Sin.: *plasma celular*, *bioplasma*, *citoplasma*, *sarcodo*. Sustancia que forma el cuerpo de la célula y en medio de la cual se encuentra el núcleo. Posee sensibilidad, motilidad (movimientos amiboideos) y es capaz de nutrirse.

protovértebra, *s. f.* Véase: *metámero*.

prueba (signo de la) (Lannelongue). Signo de la coxalgia incipiente, revelado de la manera que sigue: colocado el enfermo de pie con el peso del cuerpo igualmente repartido sobre ambas piernas, no tarda en inclinarse apoyándose sobre el lado sano, para aliviar la articulación enferma.

prurigo, *s. m.* (*prurire*, sentir ó producir comezón). Nombre genérico de ciertas afecciones de la piel, caracterizadas por la existencia de pápulas bastante voluminosas, cubiertas lo más á menudo de una costrilla negruzca debida á las excoriaciones producidas al rascarse.

prurigo diatésico (Besnier). Dermatosis caracterizada por prurito y lesiones polimorfas de la piel: urticaria, liquen, exema.

prurigo de Hebra. Sin.: *liquen polimorfo crónico*. Dermatosis caracterizada por prurito intenso y una erupción polimorfa: urticaria, pápulas de prurigo, placas de exematización. Empieza en tierna edad, en la época de la primera dentición; es de marcha crónica, esencialmente rebelde, mas, cura en general hacia la pubertad.

prurito, *s. m.* (*prurire*). Trastorno funcional de los nervios de la piel, que produce comezón sin que dependa de lesiones premonitorias de la piel apreciables. Se han descrito diferentes variedades de prurito, según la topografía (*prurito del ano, del escroto, de las narices*, etc.) ó según la causa (*prurito ictérico, brightico*, etc.).

ps... Las voces tomadas del griego que antiguamente principiaban por estas dos letras, como *psammoma*, el radical invariable *pseudo*, etc., escríbense ahora sin la *p*, y de consiguiente han de buscarse en la letra **S**.

pt... A las voces que, como *pterigion*, *ptialismo*, etc., derivadas del griego, se escribían con *pt*, suprímesele la *p* en la ortografía actual, y deben por lo tanto buscarse en la **T**.

pubiotomía, *s. f.* (*pubis*; τομή, sección). Operación que consiste en la sección de la articulación pubiana (sínfisiotomía) ó del pubis mismo.

puericultura, *s. f.* (*puer.*, niño; *cultura*, cultivo) (Pinard). Conjunto de los medios propios para favorecer el desarrollo fisiológico del niño, ya antes del nacimiento (*puericultura intrauterina*), ya después (*puericultura extrauterina*).

pueril (respiración). Respiración exagerada. Los dos tiempos se oyen más fuertemente que en estado normal; recuerda el murmullo vesicular del pulmón de los niños.

puerilismo, *s. m.* (Dupré, 1901). Síndroma sicopático que consiste en la reversión de la personalidad:

en él toda una serie concordante y sistemática de manifestaciones síquicas y de expresión revela la vuelta al estado de alma de la infancia, con las tendencias, sentimientos, gustos, expresiones mímicas y lenguaje propios de esta edad. Se ha observado dicho estado mental en los histéricos.

puerperal (fiebre). Estado febril, acompañado de síntomas generales más ó menos graves, que se presenta en las recién paridas y es debido á una infección de origen uterino.

puerperal (estado), puerperalidad, *s. f.* **puerperio,** *s. m.* (*puerpera*, recién parida). Condiciones en que se encuentra el organismo de la recién parida, en el período de tiempo necesario para volver al estado normal.

pujos, *s. m. pl.* Deseo frecuente de hacer cámara, con tenesmo doloroso y cólicos violentos, que precede las evacuaciones en las inflamaciones del intestino grueso (disenteria).

pulpitis, *s. f.* Inflamación de la pulpa dental, complicación de la caries.

pulsación, *s. f.* (*pulsare*, latir). Latido del corazón y de las arterias.

pulsación negativa normal (Marey). Sin. : *latido negativo.* Depresión sistólica que se observa á veces en la región de la punta del corazón fuera de toda lesión cardiaca.

pulsátil (estertor). Nombre dado á diferentes estertores determinados por la diástole del corazón cuando ésta llega hasta comprimir el pulmón.

pulsátil (tumor). Nombre dado á tumores de diversa naturaleza que presentan como carácter común el estar animados de latidos.

pulso, *s. m.* (*pulsus*, de *pellere*, empujar). Levantamiento percibido por el dedo que palpa una arteria superficial, y debido á la onda sanguínea.

pulso bulbar de Bambérger. Véase : *Bambérger* (*pulso bulbar de*).

pulso capilar. Alternativas de rubor y de empalidecimiento de la piel, debidas á la distensión y á la retracción de los capilares, observadas en la insuficiencia aórtica; este fenómeno no es perceptible sino en los puntos muy vasculares (dermo subunguinal, frente, retina, placa de urticaria).

pulso hepático. Movimiento rítmico de expansión

total del hígado, que sigue inmediatamente al choque de la punta del corazón y precede muy ligeramente la pulsación radial, observado en la insuficiencia tricúspide y debido al reflujo de la sangre á las venas cavas y las venas suprahepáticas.

pulso instable. Variedad de *pulso* caracterizada por la diferencia entre el número de las pulsaciones en el decúbito y en la posición vertical. Cuando la persona está de pie el aumento puede ser de 10 á 20 pulsaciones por minuto. El *pulso instable* está casi siempre asociado con la hipotensión arterial.

pulso lento permanente. Sin. : *bradicardia*, *enfermedad de Stokes-Adams*. Tipo clínico caracterizado por la lentitud permanente del pulso y por ciertos accidentes nerviosos, como vértigos, ataques apoplectiformes y sobre todo epileptiformes.

pulso miuro (*μύς*, ratón ; *οὐρά*, cola). Pulso cuyos latidos se hacen más y más débiles y finalmente desaparecen. — *pulso miuro recíproco*. Pulso cuyos latidos, después de haberse hecho progresivamente más y más débiles, vuelven á aumentar en intensidad.

pulso paradoxal (*pulsus inspiratione intermittens*) (Küssmaul, 1873). Debilitamiento, en la inspiración, del pulso radial, que puede hasta desaparecer, aunque el corazón continúa latiendo regularmente; lo cual es la inversa del estado normal. Este síntoma puede observarse en las mediastinitis, los derrames y la sínfisis pericárdicos, y finalmente, según F. Franck, en todos aquellos casos en que existe un obstáculo contra la entrada del aire al pecho (crup, estenosis laríngea, etc.).

pulso venoso. Pulsaciones observadas en la yugular externa y debidas al reflujo de la sangre venosa á las venas cavas á cada sístole cardiaca.

pulso venoso (falso). Nombre dado á las pulsaciones observadas en las yugulares cuando no son determinadas por el reflujo de la sangre del ventrículo derecho á las venas á través del orificio tricuspídeo dilatado. Existen dos variedades : 1° el *falso pulso venoso presistólico*, debido al reflujo venoso en el momento de la sístole auricular ; 2° el *falso pulso venoso sistólico*, debido á la trasmisión de los latidos arteriales de la carótida.

pulso venoso nega-

tivo (autores alemanes). Véase : *pulso venoso normal* ó *fisiológico*.

pulso venoso normal ó **fisiológico** (Potain, 1867). Movimiento de expansión que se observa en las yugulares dilatadas en el momento de la sístole auricular. Es debido al éstasis intermitente más ó menos completo, y no al reflujo de la sangre venosa, ni obedece tampoco á trastorno circulatorio alguno.

pulso venoso progresivo (Quincke). Pulsaciones retardadas con respecto al pulso radial, que se pueden observar en las venas dorsales del pie y de la mano en el curso de las flegmasías, de la anemia y de la insuficiencia aórtica. Se produce al mismo tiempo que el pulso capilar y presenta una dirección centrípeta (si se comprime la vena, sólo el cabo periférico continúa latiendo).

pultáceo, *adj.* (*puls*, *pultis*, papilla). Se aplica al exudado que presenta la consistencia de una papilla y se disocia fácilmente en el agua (*exudado pultáceo* de ciertas anginas, que para abreviar se llaman *anginas pultáceas*).

pulverización, *s. f.* (*pulvis*, polvo). Acción de reducir á polvo una sustancia sólida. — Por extensión, operación que consiste en esparcir en la atmósfera de una pieza, ó sobre una parte enferma, alguna sustancia sólida ó líquida reducida á partículas finísimas.

pulverulencia de las narices. Acumulación de polvo en los pelos de las narices, con estado de sequedad de éstas. La *pulverulencia de las narices* se observa en las formas adinámicas de las grandes piréxias.

punción, *s. f.* (*pungere*, punzar). Operación que consiste en practicar una abertura estrecha á un órgano con el objeto de dar salida á un líquido, normal ó patológico. Puede ser exploradora (con el fin de precisar un diagnóstico), ó curativa (paracentesis, toracentesis, punción de abceso, etc.).

pungitivo (dolor) (*pungere*, punzar). Dolor análogo al que produce una punta que penetrara profundamente (pleuresía).

pupiloscopia, *s. f.* Véase : *esciascopia*.

purgante, *adj.* y *s. m.* (*purgare*, purificar). Nombre genérico de los medicamentos que provocan evacuaciones.

púrpura, *amb.* Lesión

elemental de la piel caracterizada por la salida de glóbulos rojos fuera de los vasos; es una hemorragia cutánea. Esta lesión ha dado su nombre á cierto número de sindromas en que constituye el fenómeno principal

púrpura fulminante (*purpura fulminans*) (Henoch). Variedad de púrpura caracterizada por la evolución rápidamente fatal y por la ausencia de hemorragias en las mucosas.

púrpura hemorrágica. Variedad de púrpura en que la erupción cutánea coincide con hemorragias por las mucosas. A veces se da este nombre á la enfermedad de Wérlhoff.

púrpura infectiva. Enfermedad caracterizada por síntomas infectivos graves, erupción de púrpura y múltiples hemorragias. Con esta afección, muy vagamente determinada, se relacionan el *tifus angiohemático* de Landouzy y Gomot, la *púrpura hemorrágica primitiva* de Martin de Gimard y la *púrpura fulminante* de Henoch.

púrpura mielopática (Faisans). Sindroma caracterizado por algunos fenómenos generales y una erupción de púrpura dispuesta más ó menos regularmente en el trayecto de los nervios; ha sido atribuído á una alteración difusa del sistema posterior de la médula.

púrpura reumatoide ó **exantemática.** Véase : *peliosis reumatismal.*

purulenta (infección). Véase : *piohemia.*

pus, *s. m.* (πῦον, pus). Exudado patológico de consistencia líquida, de aspecto turbio y opaco, que tiene en suspensión células llamadas glóbulos de pus, los cuales son simplemente leucocitos polinucleares; junto con estos elementos hállanse células provenientes de tejidos vecinos, leucocitos de las otras variedades, y microbios.

pústula, *s. f.* Lesión de la piel que consiste en un levantamiento circunscrito de la epidermis, dividido en varias cavidades que contienen un exudado purulento.

pústula maligna. Nombre de la forma más común del carbón, en el hombre. Empieza por una pequeña vesícula llena de serosidad, cuya base se indura rápidamente, y sobre la cual se forma una placa de gangrena rodeada por una zona inflamatoria. Pronto aparece el edema, que se extiende

progresivamente, y se presentan fenómenos generales debidos á la infección generalizada. (Véase : *carbón*).

pústulas de Colles. Véase: *Colles* (*pústulas de*).

putrílago, *s. m.* (*putris*, podre). Materia pultácea producida por la necrosis y la putrefacción de los tejidos en la gangrena.

Q

queilofagia, *s. f.* (H. Meige). Tic de los labios, que consiste en morderlos constantemente.

queiloplastia ó **quiloplastia**, *s f*, (χεῖλος, labios; πλάσσειν, formar). Operación que consiste en restaurar más ó menos completamente uno de los labios.

queiropónfolix, *s. m.* (Hútchinson). Véase : *disidrosis*.

queloide, *s. m.* (χηλή, boca de cangrejo; εἶδος, forma) (Alibert, 1810). Tumor cutáneo que ordinariamente se presenta con la forma de un rodete alargado, provisto de prolongamientos ó digitaciones radiculares (comparadas á las uñas del cangrejo), más ó menos semejante á una cicatriz hipertrófica. Puede ser primitivo (*queloide espontáneo* ó *verdadero* de algunos autores), ó secundario á una lesión anterior, particularmente á una cicatriz operatoria (*queloide secundario* ó *falso*). También lo caracteriza su notable tendencia á la recidiva después de la extirpación.

quelotomía, *s. f.* Véase : *celotomía*.

quémosis, *s. f.* (χήμη, agujero). Infiltración edematosa de la conjuntiva, que forma un rodete circular al rededor de la córnea. Este edema es casi siempre de orígen inflamatorio.

queratitis, *s, f.* (κέρας, córnea). Nombre colectivo de las inflamaciones de la córnea.

queratitis filamentosa ó **fibrilar.** Afección de la córnea caracterizada por el desarrollo rápido y repetido, en la superficie de esta membrana, de excrecencias largas y delgadas, semejantes á hilos de seda tensos, de origen epitelial.

queratitis flictenu-

lar. Sin. : *queratitis pustulosa* ó *linfática* (Panas). Queratitis superficial caracterizada por la aparición, en la superficie de la córnea, de una manchita grisácea acompañada de inflamación intensa y fotofobia.

queratitis parenquimatosa ó **intersticial difusa.** Afección de la córnea que se manifiesta por enturbiamiento difuso de las láminas medias y profundas de dicha membrana.

queratitis puntuada. Sin. : *acuocapsulitis, descemetitis.* Inflamación de la capa más profunda de la córnea (membrana de Descemet). Va acompañada casi siempre de una iritis serosa, con enturbiamiento del humor acuoso y aumento de la tensión del ojo.

queratitis vascular. Véase : *pannus.*

queratitis vesicular. Herpes de la córnea.

queratocele, *amb.* (κέρας. córnea; κήλη, hernia). Hernia de la membrana de Descemet á través de una ulceración de la córnea.

querato-conjuntivitis, *s. f.* Queratitis flictenular que presenta muchas flictenas, acompañada de inyección general de la conjuntiva, con fotofobia, lacrimación y blefarospasmo.

queratocono, *s. m.* Sin. *estafiloma transparente cónico, córnea cónica.* Alteración de la curvatura de la córnea, la cual, sin perder la transparencia, toma la forma cónica. Esta deformación coincide con miopía, á menudo excesiva, y á veces con astigmatismo y poliopía.

queratodermia, ó **queratosis,** *s. f.* (κέρας, cuerno; δέρμα, piel). Lesión de la piel caracterizada por la hipertrofia considerable de las capas córneas de la epidermis, acompañada ó no de la hipertrofia de las papilas del dermo.

queratodermia simétrica de las extremidades. Dermatosis de naturaleza poco conocida, ya congénita y hereditaria, ya adquirida (*queratodermia eritematosa*), caracterizada por el espesamiento de la capa córnea de la palma de las manos y de la planta de los pies.

queratoglobo, *s. m.* Sin. *estafiloma transparente globuloso, córnea globulosa.* Distensión general de la córnea, la cual se vuelve hemisférica y á veces de tal modo saliente que los párpados no alcanzan á cubrirla. Esta dilatación acompaña general-

mente la *buftalmia*, y coincide con el rápido debilitamiento de la visión.

queratolisis, *s. f.* (κέρας, cuerno; λύειν, disolver). Desprendimiento de la epidermis y descamación abundante y generalizada que presentan á veces los recién nacidos.

queratolítico, *adj.* y *s. m.* (κέρας; λύειν). Agente terapéutico que goza de la propiedad de disolver la queratina. Ej. : ácido sulfídrico (empleado en el acné, la ictiosis, etc.).

queratomalacia, *s. f.* (κέρας, córnea; μαλακία, blandura). Queratitis profunda propia de los recién nacidos atrépsicos. Manifiéstase por un estado de sequedad particular de la conjuntiva, al cual sigue, sobre el meridiano córneo transversal, una infiltración gris que invade rápidamente la mitad inferior de la córnea, la cual no tarda en perforarse y hundirse.

queratomicosis, *s. f.* (κέρας, córnea; μύκης, hongo). Infección de la córnea debida á un hongo (*aspergillus fumigatus*). Se manifiesta por una úlcera en el centro de la córnea, que consecutivamente deja un leucoma más ó menos extenso.

queratonixis, *s. f.* (κέρας; νύσσειν, perforar). Punción de la córnea con el objeto de operar la catarata.

queratoplástico, *adj. y s. m.* (κέρας, cuerno; πλάσσειν, formar). Agente terapéutico que tiene la propiedad de activar la queratinización de las células epiteliales (empleado en el exema).

queratoscopia, *s. f.* (κέρας, córnea; σκοπεῖν, examinar) (Cuignet). Véase : *esciascopia*.

queratosis, *s. f.* 1° Véase : *queratodermia*. — 2° (Kaposi). Véase : *leucoplasia bucal*.

queratosis obturante (Wreden). Sin. *otitis externa descamativa* (Hartmann). Afección del conducto auditivo externo y del tímpano, que determina una descamación intensa y la formación de tapones epidérmicos profundos, adherentes, que pueden disminuir considerablemente la agudeza auditiva.

queratosis pilar (Brocq). Dermatosis caracterizada por cierta sequedad de la piel y por pequeñas eminencias secas, córneas, cuyo centro lo forma un pelo atrofiado. Tiene localizaciones particulares : parte posterior del brazo, cara externa

del muslo, y, finalmente, la cara, donde la acompaña el rubor de los tegumentos. Las formas atenuadas son frecuentes y no dan lugar á síntomas subjetivos.

queratotomía, *s. f.* (κέρας, córnea; τομή, sección). Incisión de la córnea.

querion, *s. m.* Variedad de tricofitia del cuero cabelludo, en la que el dermo está espeso y deja escapar un líquido puriforme por los orificios de los folículos pilosos; termina á menudo por la destrucción del folículo y la alopecia definitiva.

quilotórax, *s. m.* Derrame de quilo en la pleura.

quiluria, *s. f.* (χύλος, quilo; οὐρεῖν, orinar). Presencia de quilo en la orina. Está acompañada, frecuentemente, de hematuria (hematoquiluria). — La *quiluria* á veces es parasitaria; es causada entonces por la *filaria de la sangre* ó por la *bilharzia hematobia*, que no se encuentran sino en los países cálidos. En nuestros climas puede observarse en personas que no presentan otros trastornos; la causa de esta *quiluria* es desconocida.

quilla (tórax en). Sin.: *tórax careniforme.* Deformación raquítica del tórax caracterizada por la prominencia del esternón y el achatamiento lateral de las costillas.

quimiatria, *s. f.* (χυμία, química; ἰατρός, médico). Teoría antigua que pretende explicar todos los fenómenos fisiológicos por reacciones químicas.

quimiotaxia, *s. f.* (χυμία; τάξις, ordenamiento). Sin.: *quimiotactismo*, *quimiotropismo*, *trofotropismo*. Propiedad que posee el protoplasma de ser atraído (*quimiotaxia positiva*), ó rechazado (*quimiotaxia negativa*) por ciertas sustancias químicas, con parlicularidad por las toxinas microbianas. El repetido ejercicio del *quimiotactismo* puede producir la inversión de las propiedades quimiotáxicas. La quimiotaxia positiva ó negativa de los leucocitos les permite luchar más ó menos eficazmente contra los agentes infectivos.

quimismo estomacal. Estado del jugo gástrico considerado desde el punto de vista de la composición química.

Quincke (enfermedad de) (1882). Sin.: *edema reumatismal de repetición*, *angioneurosis cutánea ó mucosa*, *edema agudo paroxístico hereditario*. Afección hereditaria y familial

caracterizada por ataques sucesivos de edema circunscrito de la piel y de las mucosas, sin modificación del estado general, capaz de repetir durante toda la vida del enfermo.

Quincke (punción lumbar de) (1891). Véase: *raquicentesis*.

Quincke (pulso de). Véase : *pulso venoso progresivo*.

quínico, *adj.* (*quina*). Que tiene relación con la quinina ó la quina.

quininismo, *s. m.* Conjunto de los fenómenos de intoxicación producidos por las sales de quinina. Se manifiestan por zumbidos de oído con ó sin atontamiento, y por sordera temporal.

Quinquaud (signo de). Especie de crepitación de las falanges (perceptible al oído y debida sin duda á lesiones articulares mínimas) que se produce en ciertos individuos en los dedos de la mano, si se aplican éstos verticalmente por la punta, con una presión moderada, sobre un plano resistente como la palma de la mano. Se tiene por signo de alcoholismo.

quinta, *s. f.* (*quintus*, quinto). Nombre dado primiero, según unos, al acceso de tos de la hora quinta (tuberculosos) ; según otros (Baillou), á cierta tos á que son propensos los niñitos *quod quinta quaque hora fere videatur recurrere* (Guy Patin). — Este vocablo sirve actualmente para designar cualquier acceso de tos y más particularmente el acceso tan característico de la coqueluche.

quintana (fiebre) (*quintus*, quinto). Forma de fiebre intermitente en la que los accesos vuelven al quinto día, dejando tres días de intervalo entre sí.

quiralgia parestésica (χείρ, mano; ἄλγος. dolor) (Bivona. 1902). Síndroma mórbido que ofrece gran analogía con la *meralgia parestésica*, y que se manifiesta por sensibilidad dolorosa, á la presión, en la mano.

quiromegalia, *s. f.* (χείρ, mano ; μέγας, grande). Hipertrofia de los dedos y de las manos, análoga á la que se observa en la acromegalia, señalada por Charcot y Brissaud en la siringomielia.

quiste, *s. m.* (κύστις, vejiga). Producción patológica formada por una cavidad incomunicada con el exterior, que contiene una sustancia líquida, blanda ó, rara vez, sólida, y cuya pared no tiene relaciones vasculares con el contenido.

quistectomía, *s. f.* (κύστις, cápsula; ἐκτομή, excisión). Arrancamiento de un colgajo de la cápsula anterior en el curso de la extracción de la catarata.

quiste dermoide ó **dermoideo.** Véase : *dermoide* (*quiste*).

quiste metaclástico (μετά, después; πλαστός; quebrado) (Brunswic Le Bihan). Quiste hemático observado en los países de paludismo, que sobreviene á consecuencia de un traumatismo de la región esplénica, provocado por la ruptura subcapsular de un bazo voluminoso y adherente á los órganos vecinos.

quiste sacular (Duplay). Quiste formado por el acúmulo de serosidad en un saco herniario cuyo cuello se ha obliterado. — Si la obliteración del cuello no es completa dase al tumor el nombre de *seudo-quiste sacular*.

quiste sebáceo. Sin. *lupia* y anteriormente *ateroma*. Tumor formado por una bolsa desarrollada á expensas de una glándula sebácea y llena de células epidérmicas y de materias grasosas.

quistes sinoviales. Sin. : *ganglios sinoviales*. Pequeños tumores quísticos situados generalmente en la cara dorsal del puño y desarrollados á expensas de las sinoviales articulares del carpo.

quística de la mama (enfermedad) (Reclus). Sindroma clínico que consiste en la producción, en ambas mamas, de quistes múltiples, muy pequeños en su mayor parte. Considerada por algunos autores como una forma de cáncer, esta afección sería para otros una variedad de mamitis crónica.

quística del riñón (enfermedad). Afección caracterizada por la aparición de quistes múltiples en ambos riñones, que á veces da lugar a la formación de un verdadero tumor. Se la considera, ya como un epitelioma, ya como una forma de esclerosis renal con estrangulamiento de los tubos.

quística del testículo (enfermedad) (A. Cooper). Afección caracterizada por la formación de numerosos quistes en los testículos. Ha sido considerada por Malassez como un epitelioma mucoide y comparada á los quistes del ovario.

quistitomía, *s. f.* Sección de la cristaloide anterior en el curso de la extracción de la catarata.

quistitomo, *s. m.* (κύστις, vesícula, cápsula; τομή, sección). Instrumento que sirve para dividir la cristaloide anterior en la operación de la catarata.

R

rabdomioma, *s. m.* (ῥάβδος, estria; mioma). Mioma de fibras estriadas.

rabia, *s. f.* (*rabies*). Enfermedad virulenta común al hombre y á ciertos animales (perro, lobo, gato, etc.), que se manifiesta por síntomas nerviosos, primero signos de excitación (hiperestesia, espasmos, hidrofobia, furor, convulsiones), luego signos de depresión (parálisis), y termina por la muerte.

radiculalgia, *s. f.* (Chipault). Dolor debido á la compresión de las raíces raquídeas por un exudado meningeo. Reviste una topografía netamente radicular.

radiculitis, *s. f.* (Chipault). Inflamación de las raíces raquídeas consecutiva á la inflamación de las meninges.

radientómetro, *s. m.* (Mergier). Aparato que sirve para determinar la posición exacta de los cuerpos extraños en el organismo, por medio de dos radiografías.

radiodermitis, *s. f.* (*radius*, rayo; dermitis). Lesión cutánea determinada por la aplicación de los rayos X.

radiodiagnóstico, *s. m.* Aplicación de los rayos X al diagnóstico de las enfermedades y á la busca de los cuerpos extraños.

radiografía, *s. f.* (*radius*, rayo; γραφεῖν, inscribir). Sin.: *esciagrafía*. Impresión por los rayos X de una placa sensible, ante la cual se ha colocado el objeto cuya imagen radiográfica se desea obtener (esciagrama).

radiopelvigrafía, *s. f.* Radiografía aplicada al examen obstétrico de la pelvis.

radiopelvimetría, *s. f.* Aplicación de la radiografía á la mensuración de los diversos diámetros de la pelvis.

radioscopia, *s. f.* (*radius*; σκοπεῖν, examinar). Sin. *fluoroscopia*. Examen de la imagen formada sobre

la pantalla fluorescente por un cuerpo interpuesto entre dicha pantalla y el foco de rayos X.

radioterapia, *s. f.* (*radius*; θεραπεία, tratamiento). Aplicación terapéutica de los rayos X.

radiumterapia, *s. f.* (*radium*; θεραπεία tratamiento). Empleo terapéutico del radium.

rafania, *s. f.* (Linné). Enfermedad convulsiva atribuída á la intoxicación por las semillas del *raphanus raphanistrum*, mezcladas con el trigo. Para los autores contemporáneos la *rafania* es la forma convulsiva del ergotismo.

ragadía, *s. f.* (ῥαγάς, hendedura). Grieta, resquebradura.

railway-brain (del inglés: *railway*, ferrocarril; *brain*, cerebro). Trastornos cerebrales consecutivos á un accidente de ferrocarril.

railway-spine (*railway*, ferrocarril; *spine*, médula espinal). Trastornos medulares consecutivos á un accidente de ferrocarril.

ranilla ó **ránula**, *s. f.* (dim. de rana). Tumor enquistado líquido, de origen salival, situado en la cara inferior de la lengua y en el espesor del suelo de la boca.

ránula concreta. Nombre dado á los cálculos salivales por los antiguos anatómicos, quienes los tenían por independientes del canal de Whárton y de la misma naturaleza de la ranilla.

raptus hemorrágico (*rapere*, quitar). Aflujo de sangre hacia una parte y hemorragia.

raquialgia, *s. f.* (ῥάχις, raquis; ἄλγος, dolor). Dolor á lo largo de la columna vertebral.

raquialgitis, *s. f.* (ῥάχις; ἄλγος). Véase: *espinitis*.

raquianestesia, *s. f.* (ῥάχις; anestesia). Método de anestesia parcial que consiste en inyectar en el canal raquídeo una sustancia que, obrando directamente sobre la médula, provoca la anestesia de las regiones inervadas por los nervios subyacentes.

raquicentesis, *s. f.* (ῥάχις; κεντεῖν, punzar) (Marfan, 1893). Sin. *punción lumbar* (Quincke, 1891). Operación que consiste en introducir un trócar fino entre dos arcos vertebrales de la columna lumbar, con el fin de evacuar, sin aspiración, el líquido céfalo-raquídeo.

raquicocainización. *s. f.* Sin. *método de Bier*,

Aplicación de las sales de cocaína á la raquianestesia.

raquistovainización, *s. f.* Aplicación de la estovaína á la raquianestesia.

raquitis, *s. f.* Nombre con que en 1650 describía Glisson las deformaciones óseas del raquitismo.

raquitismo, *s. m.* (ῥάχις. raquis). Sin. *enfermedad de Glisson.* Enfermedad del período de crecimiento, manifiesta por desviaciones variables del esqueleto, hinchazón de las epífisis, inflexión de las diáfisis; éstas alteraciones coinciden con trastornos gastrointestinales. Se la considera en general como una enfermedad de la nutrición; algunos autores, sin embargo, tienden á considerarla como enfermedad infectiva.

raquitismo hemorrágico. Véase : *Bárlow* (*enfermedad de*).

raquitomía, *s. f.* (ῥάχις; τομή, sección). Sin. *embriotomía raquídea.* Sección de la columna vertebral cuando el feto se presenta de hombro y no puede practicarse la versión.

raquitomo, *s. m.* (ῥάχις; τέμνειν, cortar). Instrumento con el cual se puede abrir el canal raquídeo sin herir la médula, en las autopsias.

rash, *s. m.* (palabra inglesa equivalente á erupción). Erupción transitoria que presenta el aspecto de las del sarampión, escarlatina, erisipela ó púrpura, observada á veces en el período de invasión de la viruela y en el curso de cierto número de enfermedades febriles no eruptivas.

Rasmüssen (aneurismas de) (1868). Pequeñas aneurismas del volumen de una lenteja ó de un garbanzo, situadas en los ramúsculos de la arteria pulmonar que recorren las paredes de las cavernas tuberculosas. Pueden ser origen de hemoptisis abundantes y aun mortales.

rasoriano (método) (Rasori). Método que consiste en administrar el tártaro estibiado á altas dosis en la neumonía para obtener una acción contraestimulante.

rasorismo, *s. m.* (Rasori, médico italiano de á principios del siglo XIX). Sin . : *contraestimulismo* . Doctrina según la cual las enfermedades se deberían á exceso de estímulo. Su consecuencia es el empleo sistemático de medicamentos hipostenizantes ó contraestimulantes.

raspado, *s. m.* Sin.

curetaje. Operación que consiste en despojar una cavidad natural de las producciones mórbidas que puede contener, así como de su mucosa enferma (aplícase sobre todo á la cavidad uterina).

rastrilleo de los nervios (calco del francés *hersage*). Operación que consiste en dislacerar las fibras nerviosas y en separar las unas de las otras con un instrumento de puntas obtusas. Se practica en las neuralgias rebeldes (ciática).

raya meningítica (Trousseau). Línea roja persistente que se produce trazando sobre la piel una raya con la uña. Este trastorno vaso-motor, primero señalado en las meningitis y considerado como signo patognomónico de dichas afecciones, ha sido comprobado después en gran número de estados morbosos. La raya de que se trata no tiene valor en el diagnóstico de la meningitis sino cuando tarda en aparecer así como en desaparecer.

Raymond-Cestán (síndroma de) (1903). Variedad de parálisis alterna motriz debida á la lesión de la parte superior de la protuberancia. La caracterizan : la parálisis de los movimientos de lateralidad de los globos oculares, una hemiplejia que se manifiesta principalmente por trastornos de la función de la motilidad voluntaria (temblor, incoordinación, movimientos atetosiformes, asinergia cerebelosa) y trastornos profundos de la sensibilidad subjetiva y objetiva.

Raynaud (enfermedad de) (1862). Sin. : *gangrena simétrica de las extremidades*. Afección caracterizada por trastornos circulatorios de las extremidades, que consisten en cianosis, asfixia local, sensación de dedo muerto, capaz de terminar en la gangrena seca. No se conoce la naturaleza de la afección ; se la considera como una neurosis vasomotora.

reabsorción, *s. f.* Desaparición parcial ó total de un órgano ó de cualquier producto patológico, sólido, líquido ó gaseoso, cuyos elementos vuelven poco á poco á entrar á la circulación sanguínea ó linfática.

reacción de degeneración, ó, por abreviatura, **R. D.** Disminución ó pérdida de la excitabilidad farádica de un músculo, con aumento de la excitabilidad galvánica, la que además se halla cualitativamente modificada. Esta modificación

consiste en la inversión de la fórmula normal de la ley de las sacudidas musculares : la contracción al cerrar es más fuerte en el polo positivo que en el negativo. La normal es N F C > P F C; en la reacción de degeneración se obtiene, por lo contrario, N F C < P F C.

reblandecimiento cerebral. Sin. : *encéfalomalacia.* Lesión cerebral que consiste esencialmente en un infarto por alteración arterial (trombosis ó embolía), que trae como resultado secundario la mortificación y el reblandecimiento del territorio cerebral privado de aflujo sanguíneo. Desde el punto de vista clínico el reblandecimiento cerebral empieza á menudo por un ictus y se revela por una hemiplejia más ó menos completa.

recaída, *s. f.* Nueva evolución mórbida que sigue á una afección anterior de idéntica naturaleza, sin que haya habido nueva infección. La *recaída* aparece ordinariamente cuando el enfermo ha vuelto ya á la apirexia y en momentos en que va á entrar en convalescencia. Puede haber varias recaídas sucesivas.

Recamier (operación de). Véase : *histerectomia vaginal.*

recidiva, *s. f.* (*re; cadere*, recaer). Aparición de una enfermedad en un individuo que ha padecido ya esa misma enfermedad, en tiempo anterior más ó menos lejano. La *recidiva* difiere de la recaída en que se debe á una nueva infección.

recién nacido. Nombre con el que propiamente se designa al niño desde el nacimiento hasta la caída del cordón.

Recklinghausen (enfermedad de). Véase: *polifibromatosis neurocutánea pigmentaria.*

Reclus (enfermedad de) Véase : *quística de la mama (enfermedad).*

recrudescencia, *s f.* (*re*, iterativo; *crudescere*, irritarse). Agravación de la enfermedad después de una remisión temporal.

rectitis, *s. f.* Inflamación del recto.

rectocele, *amb.* (*rectum*, recto; κήλη, hernia). Hernia del recto.

recto-coccipexia, *s. f.* (Gérard-Marchant). Fijación del recto al tejido fibroso que rodea el coccis. Con algunas suturas en alforza de la pared rectal se disminuye la longitud del órgano. El objeto de la operación es obviar al prolapso del recto.

recto-perineorrafia,

s. f. Nombre de dos operaciones autoplásticas (*rectoper. anterior* de Schwartz, y *rectoper. posterior* de Duret) cuyo objeto es poner remedio al ensanchamiento del ano y á la carencia de tonicidad del esfínter, en el prolapso rectal.

rectopexia posterior (Verneuil). Fijación del recto al tejido fibroso que rodea el coccis, después de haber resecado parte del esfínter. Operación destinada á poner remedio al prolapso rectal.

rectoscopia, *s. f.* (*rectum*; σκοπεῖν, examinar). (Dmitri de Ott, 1903). Examen de la cavidad rectal y aun de la S ilíaca por medio de dos válvulas, destinadas á dilatar los esfínteres, y de una lámpara incandescente que se introduce más ó menos profundamente.

rectotomía, *s. f.* (*rectum*; τομή, sección). Operación que consiste en seccionar una estrechez del recto, ya por vía interna (*rect. interna*), ya abriendo ancha brecha á través de las partes blandas comprendidas entre el recto, el ano y el coccis (*rect. externa*).

recurrente (fiebre) (*recurrere*, volver á correr lo corrido). Sin. : *tifus recurrente, tifus de recaída*. Enfermedad infectiva, epidémica y contagiosa, no observada nunca en Francia, mas, común en Irlanda y en Rusia, debida á un microbio especial llamado *espirilo* ó *espiroquete de Obermeier*. La caracteriza clínicamente su tipo febril especial : la fiebre empieza bruscamente, alcanza inmediatamente su máximum, se mantiene muy elevada durante 5 á 7 días, luego desciende súbitamente á la normal; después de un período de apirexia igual al período febril, aparece un segundo ataque de fiebre análogo al primero y seguido ordinariamente por la curación; á veces hay un tercer acceso.

recurrente (sensibilidad) (Magendie, 1839). Nombre dado desde Magendie y Cl. Bernard á la sensibilidad de las raíces anteriores de la médula, sensibilidad debida á algunos filetes nerviosos provenientes de las raíces posteriores correspondientes, los cuales siguen un trayecto recurrente. — Los nervios periféricos tienen también una *sensibilidad recurrente*, gracias á sus anastomosis, por modo que el cabo periférico de un nervio seccionado puede ser sensible (Arloing y Tripier).

redoble (ruido de) (Bouillaud). Sin. : *ruido de*

codornix. Modificación del ritmo cardiaco, que consiste en el desdoblamiento del segundo ruido, ó en la adjunción de un tercer ruido; se le ha comparado con el redoble del tambor (estrechez mitral, etc.).

reducción, *s. f.* (*reducere*, volver á llevar). Operación que consiste en volver á llevar á su lugar, ya huesos lujados ó fracturados, ya órganos dislocados accidentalmente (riñón flotante, intestino herniado, etc.).

reducción (banda de). Ancha banda que aparece en el espectro de la hemoglobina reducida, en vez de las dos bandas de absorción características de la oxihemoglobina.

reflejo (acto ó fenómeno). Acto nervioso que sigue á una excitación venida del exterior. La excitación, transmitida por las fibras sensitivas ó centrípetas, se refleja en la célula nerviosa central y es enviada por una fibra centrífuga á otro órgano más ó menos lejano (músculo, glándula).

reflujo hepato-yugular (Rondot). Distensión de la vena yugular determinada por la compresión lenta y metódica del hígado. Este síntoma, debido al debilitamiento del miocardio de la aurícula derecha, se observa en la asistolía y en ciertas dilataciones cardiacas.

regeneración, *s. f.* Reproducción de un órgano destruído.

régimen, *s. m.* (*regere*, gobernar). Administración razonada y metódica de la alimentación. — Desde el punto de vista etimológico estricto, esta voz tiene un significado más vasto y comprende el uso razonado de todo lo necesario á la existencia, tanto en estado de salud como en el de enfermedad; algunos autores le dan este sentido.

regresión, *s. f.* (*regressio*, regreso). Vuelta de un tejido ó de un órgano á cualquiera de las fases anteriores de su evolución.

regurgitación, *s. f.* Vuelta de los alimentos del estómago ó del esófago á la boca, sin esfuerzo de vómito; este acto, comparable con la rumiación, es frecuente en los niños de pecho. Se le observa igualmente en las estrecheces del esófago y en cierto número de afecciones estomacales.

Reichmann (enfermedad ó síndrome de). Véase : *gastrosucorrea*.

Reid (método de) (1875). Empleo de la com-

presión elástica general en el tratamiento de las aneurismas arteriales circunscritas.

remisión, *s. f.* (*remittere*, relajar). Debilitamiento transitorio de los síntomas de una enfermedad aguda ó crónica.

remitente (fiebre). Fiebre que se presenta con la forma de una serie de accesos muy próximos, en el intervalo de los cuales la temperatura no vuelve á la normal, y no presenta sino una remisión más ó menos marcada.

renitencia, *s. f.* (*reniti*, resistir). Estado de un órgano ó de una parte de los tegumentos que resiste, aun cuando cediendo un poco, á la presión, sin fluctuación propiamente dicha.

reno-renal (reflejo) Reflejo por intermedio del cual el riñón enfermo provoca en el sano perturbaciones funcionales (anuria refleja).

reóforo, *s. m.* (ῥεῖν fluir; φέρειν, llevar). Nombre dado á los instrumentos de diversa forma, que se adaptan al extremo de los electrodos, para llevar la electricidad á los órganos enfermos.

resección, *s. f.* (*resecare*, recortar). Operación que consiste en extirpar una parte más ó menos extensa de un órgano.

resolución, *s. f.* (*resolvere*, resolver). Terminación de las inflamaciones por la vuelta de las partes enfermas al estado fisiológico, sin supuración.

retención, *s. f.* Dícese que hay *retención* de una sustancia, sólida ó líquida, destinada á ser evacuada fuera del organismo, cuando dicha sustancia permanece retenida en el receptáculo que la contiene y llega á ser causa de peligro ya por su presencia, ya por su acumulación. Ej. : *retención de la placenta, retención biliar, retención de orina.*

retencionista, *s. m.* Nombre dado á los enfermos que padecen de retención de orina.

retículo ó **retículum,** *s. m.* (redecilla, en latín). Nombre dado en anatomía á toda red de fibras ó de vasos.

retinitis, *s. f.* Nombre colectivo de las inflamaciones de la retina; la *retinitis* es lo más frecuentemente sintomática de una enfermedad general ó de una afección de otro órgano : *retinitis sifilítica, albuminúrica, diabética*, etc.

retinolado, *s. m.* (ῥητίνη, resina). Medicamento externo

compuesto de la mezcla de una resina y de diferentes sustancias.

retinoscopia, *s. f.* Véase: *esciascopia*.

retintín metálico, (Laënnec). Ruido ligero, argentino, comparado por Laënnec al que se produciría dejando caer un grano de arena en una copa de cristal, y que se percibe á la auscultación de vastas cavernas y principalmente en el neumotórax. La patogenia no se conoce aún muy bien.

retractilidad, *s. f.* Propiedad de ciertos tejidos de volver sobre sí mismos disminuyendo de longitud.

retracción de la aponeurosis palmar. Sin.: *enfermedad de Dupuytrén*. Afección caracterizada por el acortamiento de las bridas fibrosas que la aponeurosis palmar envía á la piel, retracción que produce la flexión de las primera y segunda falanges de los dedos de la mano. Empieza siempre por el borde cubital de la mano, y los últimos dedos son los que más se doblan.

retrocolis, *s. m.* (*retro*, hacia atrás; *collum* cuello). Variedad de tortícolis en que la cabeza se halla tirada hacia atrás, á consecuencia de la contracción de los músculos de la nuca.

retrodesviación del útero. Término general que comprende todas las dislocaciones del útero hacia atrás, en totalidad ó en parte.

retroflexión del útero. Desviación del útero, en la que el fondo del órgano se halla inclinado hacia atrás, mientras el cuello conserva la situación normal.

retroperitonitis callosa. Peritoaitis crónica localizada á la cavidad posterior de los epiplones y caracterizada por un espesamiento escleroso del peritoneo. Complicación de la linitis plástica.

retroposición del útero. Dislocación total del útero hacia atrás.

retropulsión, *s. f.* (*retro*, hacia atrás; *pellere*, empujar). Propensión de ciertos enfermos (*enfermedad de Párkinson*) á acelerar más y más la marcha hacia atrás cuando han empezado á recular.

retrovacunación, *s. f.* Inoculación á la ternera de vacuna más activa (regeneración de la vacuna).

retroversión del útero. Desviación del útero en que el órgano se encuentra llevado hacia atrás, mientras el cuello sube adelante hacia el pubis.

reumatismo articular agudo (ῥεῦμα, fluxión). Sin. : *fiebre reumatismal, poliartritis aguda febril.* Enfermedad infectiva caracterizada por manifestaciones inflamatorias múltiples principalmente en las serosas, y particularmente en las serosas articulares.

reumatismo nudoso, reumatismo crónico deformante, reumatismo crónico progresivo. Sin. *artrodinia* (Cullen), *gota asténica primitiva* (Landrée-Beauvais), *poliartritis deformante.* Enfermedad crónica caracterizada por manifestaciones articulares ordinariamente bilaterales y simétricas, situadas con preferencia en las pequeñas articulaciones y permanentemente fijas en las articulaciones una vez atacadas, en las que determina deformaciones y actitudes viciosas. Esta afección se encuentra sobre todo en mujeres pobres y hacia el final de la edad adulta; el frío húmedo parece tener gran importancia en la etiología; se ignora aún su naturaleza real.

reunión por primera intensión. Véase: *intensión* (*reunión por primera*).

Reverdin (ingerto de). Ingerto dermo-epidérmico.

reversión, *s. f.* (*revertere*, volver). 1° (antropología). Sin. *anomalía reversiva.* Desarrollo anormal de un órgano rudimentario que recuerda el parentezco, en lo pasado, de dos especies actualmente muy diferentes. Ej. : en el hombre, el repliegue semilunar del ángulo interno del ojo representa el tercer párpado de los marsupiales. — 2° (biología) « Vuelta, después de generaciones más ó menos numerosas, de individuos cruzados, al tipo de la especie primitiva » (Littré). — 3° (patología) Nombre dado por Jaccoud á la nueva erupción exantemática que sobreviniere, en las fiebres eruptivas, poco después de la desaparición del primer exantema.

reviviscencia, *s. f.* (*reviviscere*, revivir). Propiedad de ciertos seres inferiores (rotíferos, tardígrados, etc.), de volver á la vida, si, después de haber permanecido desecados y aún cuando presenten el aspecto de cadáveres, se les vuelve el agua que se les había sustraído.

revulsión, *s. f.* (*re; vellere*, arrancar), Acto terapéutico que consiste en

producir aflujo sanguíneo en un punto más ó menos lejano del órgano enfermo, con el propósito de desembarazar este órgano. La revulsión puede obtenerse directamente (ventosas, sangría), ó indirectamente por agentes que producen un trabajo patológico particular (vejigatorio, sedal, cauterio).

revulsivo, *adj.* y *s. m.* Los medios todos propios para producir revulsión.

rey (mal del) (*King's evil*). Nombre dado antes en Francia y en Inglaterra á las adenopatías cervicales, porque el rey, en cada uno de estos países tenía el privilegio de curar *los lamparones* con simplemente tocarlos.

rictus, *s. m.* (en latín : abertura de la boca). Contracción espasmódica de los cutáneos de la cara, que da al rostro el aspecto de la risa forzada (*rictus sardónico del tétanos*).

Riga (enfermedad de). Véase : *subglositis difteroide.*

rigidez cadavérica. Fenómeno cadavérico que se manifiesta de un cuarto de hora á siete horas después de la muerte. Consiste en endurecimiento de los músculos con pérdida de su elasticidad. Es debido á la coagulación de la miosina.

rígor, *s. m.* (*rigor*, escalofrío). Escalofrío.

rinelcosis, *s. f.* (ῥίς, nariz; ἕλκός, úlcera). Ulceración de una de las narices.

rinencéfalo, *s. m.* (ῥίς, nariz; ἐγκεφαλός, encéfalo). Sin. *rinocéfalo.* Nombre dado por I. G. St-Hilaire á monstruos ciclocéfalos cuyo aparato nasal está representado por una trompa inserta en la parte inferior de la frente.

rinitis, *s. f.* (ῥίς, nariz). Inflamación aguda ó crónica de la mucosa de las fosas nasales.

rinitis atrofiante ó **rinitis crónica fétida.** Véase : *ozena.*

rinitis crónica hipertrófica. Coriza crónico.

Rinne (experiencia de). Experiencia que consiste en comparar la percepción aérea y la percepción craneana de un mismo oído, por medio del diapasón colocado primero delante de la oreja y luego sobre la apófisis mastoide. En estado normal el sonido se oye mejor y por más tiempo por la vía aérea. Cuando el aparato de transmisión está enfermo se efectúa el fenómeno inverso (se dice enton-

ces que el *Rinne* es *negativo*).

rinocéfalo, *s. m.* (ῥίς, nariz; κεφαλή, cabeza). Véase : *rinencéfalo*.

rinofima, *s. m.* (ῥίς; φύμα, tumor). Sin. : *acné hipertrófico* ó *elefantiásico*. Hipertrofia á veces considerable de la nariz, debida al espesamiento de la piel y al desarrollo de las glándulas sebáceas; la piel es allí lisa, brillante y roja.

rinofonía, *s. f.* (ῥίς; φωνή, voz). Véase: *rinolalia*

rinohidrorrea, *s. m.* Véase : *hidrorrea nasal*.

rinolalia, *s f.* (ῥίς; λαλιά, palabra) (Küssmaul). Sin. : *rinofonía*. Nombre dado á los trastornos de la fonación determinados por modificaciones de la resonancia en las cavidades nasales. — 1° *rinolalia abierta*. Modificación de la voz debida á la exageración de la permeabilidad nasal (parálisis, perforación de la bóveda ó del velo, etc.); las vocales bucales toman entonces cierto timbre nasal (*gangueo*). — 2° *rinolalia cerrada*. Modificación de la voz por supresión de la permeabilidad nasal; si el obstáculo está situado atrás, el enfermo no puede emitir vocales nasales: en realidad, habla por la boca (*estomatolalia*); si el obstáculo se halla en la parte anterior de las fosas nasales, hay exceso de resonancia (*voz de polichinela*).

rinolito, *s. m.* (ῥίς; λίθος, piedra). Cálculo de las fosas nasales.

rinología, *s. f.* (ῥίς; λόγος, discurso). Estudio de la nariz, de las fosas nasales y de las afecciones que les son propias.

rinometría, *s. f.* (ῥίς; μέτρον, medida). Medida del grado de permeabilidad al aire de las fosas nasales.

rinoplastia, *s. f.* (ῥίς; πλάσσειν, formar). Operación autoplástica destinada á remediar las deformidades de la nariz, reconstituyéndola en totalidad ó en parte.

rinorrea, *s. f.* (ῥίς; ῥεῖν, fluir). Flujo de líquido por la nariz, fuera de todo fenómeno inflamatorio.

rino-salpingitis, *s. f.* Inflamación de la mucosa de la trompa de Eustaquio, cuyo punto de partida es la rinitis atrofiante ó hipertrófica, y cuya consecuencia es la otitis media crónica con esclerosis del tímpano.

rinoscleroma, *s. m.* (ῥίς; σκληρός, duro) (Hebra). Enfermedad infectiva debida á un bacilo especial y caracterizada, desde el punto de vista clínico, por la tumefacción de las narices, del

tabique nasal y del labio superior, los cuales se cubren de placas salientes, muy duras. Histológicamente esta infiltración recuerda la estructura del sarcoma.

rinoscopia, *s. f.* (ῥίς; σκοπεῖν, examinar). Examen de las fosas nasales por medio del espejo frontal y del espéculo de la nariz.

rinotomía, *s. f.* (ῥίς; τομή, sección). Operación que consiste en practicar una abertura amplia en la cara para descubrir la parte anterior de las fosas nasales.

riñón flotante, ó **riñón móvil.** Véase : *nefroptosis*.

riñón sacciforme. Término bajo el cual ha reunido Küster las dilataciones del riñón, cualquiera que fuere su naturaleza : séptica (*pionefrosis*), ó aséptica (*hidronefrosis*).

risiformes (deposiciones). Deposiciones compuestas por un líquido acuoso, incoloro, en el que nadan copos blanquecinos que se han comparado á granos de arroz cocido, y que están formados de detritus epitelial. Se observan en el cólera asiático.

ritmo pareado. Véase : *disistólico* (*pulso*).

riziformes (granos). Cuerpos extraños no organizados, cuyo volumen varía de una cabeza de alfiler á una arveja, que se encuentran en mayor ó menor número en ciertas sinovitis tendinosas. Son de origen tuberculoso, constituídos por fragmentos de la sinovial enferma, desprendidos por los movimientos del tendón en su vaina.

rizómero, *s. m.* (ῥίζα, raiz; μέρος, parte). Sin. : *zona radicular de sensibilidad tactil* (Sherrington). Territorio cutáneo en forma de banda mal limitada, cuyos nervios están en relación con un ganglio raquídeo y las raíces que de él parten.

rob, *s. m.* (árabe, *robb*, mosto de vino purificado al fuego). Extracto de jugo de frutas preparado por evaporación hasta consistencia de miel.

Róbert (pelvis de) (obstetricia). Pelvis oblicua ovalar doble.

roentgenoscopia, roentgenterapia, *s. f.* Término con que se conocen en Alemania la *radioscopia* y la *radioterapia*, del nombre de Rœntgen, el descubridor de los rayos X.

Roger (enfermedad de). Deformación congénita del corazón, que consiste en

la inoclusión del séptum ventricular sin estrechez de la arteria pulmonar, y se manifiesta clínicamente por un soplo especial, llamado *soplo de Roger*, sin disnea, ni cianosis, en estado de reposo.

Roger (soplo de). Soplo sistólico, rudo y rasposo, que ocupa toda la parte media de la región precordial, con máximum en el tercer espacio intercostal izquierdo, y que se propaga trasversalmente. Revela la existencia de comunicación entre los dos ventrículos.

Rómberg (signo de). Signo que se comprueba en la tabes y que consiste en que, si el enfermo se pone de pie con los talones juntos, oscila y pierde el equilibrio al cerrar los ojos.

roncante (estertor). Sin.: *estertor sonoro grave.* Nombre dado en auscultación á cierto ruido musical que acompaña al murmullo respiratorio, el cual se ha comparado al ronquido de una persona dormida.

ronquera, *s. f.* Modificación del timbre de la voz que se vuelve más grave y como velada. Se observa en las lesiones de las cuerdas vocales, del nervio recurrente y en muchos afecciones nerviosas.

ronquido, *s. m.* (*rhoucus*, de ῥόγχος). Véase: *estertor.*

rosario raquídeo. Serie de nudosidades salientes observadas en los raquíticos en la unión de las costillas con los cartílagos costales. Forman una doble fila moniliforme por fuera del esternón.

Rosenbach (signo de). Persistencia del reflejo abdominal, á pesar de la anestesia cutánea, en la hemiplejia histérica; si la hemiplejia es de origen orgánico, el reflejo está abolido.

Rosenbach (síndroma de). Variedad de *taquicardia paroxística* en que hay asociación de perturbaciones cardiacas, respiratorias y gástricas.

roseola, *s. f.* Erupción de manchas rosadas no salientes, ó apenas, que desaparecen al cabo de algunos días dejando á veces tras sí una ligera descamación furfurácea. La *roseola* es un sindroma que se observa en estados mórbidos diversos, tales como *enfermedades infectivas* (manchas lenticulares de la fiebre tifoidea, roseola del tifus, de la sífilis, etc.), *intoxicaciones* (copaiba, yoduros). Manifiéstase igualmente como fenómeno vasomotor debido á la emoción (*roseola púdica*).

roseola epidémica. Véase : *rubeola.*

Rossbach (enfermedad de). Véase : *gastroxinsis.*

rotacismo, *s. m.* (ῥωτακίσμος, empleo frecuente de la letra ρ). Vicio de pronunciación caracterizado por la dificultad ó la imposibilidad de pronunciar la letra *r.*

rotatoria (corea). Véase : *corea histérica.*

rotatorio (ruido). Sin. : *ruido muscular.* Ruido como de continuo rodar que se percibe cuando se coloca el estetoscopio sobre un músculo en estado de contracción.

rótula (fenómeno de la). Sin. : *trepidación rotuliana.* Fenómeno análogo al *clonus del pie* y de la misma significación Se le produce imprimiendo á la rótula un movimiento brusco de arriba abajo por medio de los dedos aplicados y mantenidos sobre el borde superior (con la pierna en extensión); la rótula ejecuta entonces una serie de oscilaciones de arriba abajo y de abajo arriba que cesan cuando se la suelta.

Rouge (operación de) (1873). Sin. : *rinotomía sublabial.* Variedad de rinotomía en que la incisión se practica bajo el labio superior. Tiene la ventaja de evitar el esqueleto y de no dejar cicatriz visible.

Rouget (ley de) (fisiología). Ley según la cual los nervios vasodilatadores no llegan nunca á los órganos en que terminan sin pasar antes por células ganglionares.

Rougnon-Heberden (enfermedad de) (1768). Angina de pecho.

....rragia (ῥαγή, erupción). Afijo que significa derramamiento. Ej. : *blenorragia, hemorragia.*

Ruault (signo de). Signo del comienzo de la tuberculosis pulmonar. El médico, colocado detrás del paciente, con una mano en cada hombro de este, percibe fácilmente la disminución de amplitud respiratoria y el retardo, existentes en el lado enfermo, en las respiraciones profundas.

rubefaciente, *adj.* y *s. m.* (*ruber,* rojo; *facere* hacer). Nombre que se da á una serie de agentes medicamentosos cuya aplicación sobre la piel determina una congestión intensa y pasajera.

rubeola, *s. f.* (*ruber,* rojo). Sin. : *roseola epidémica.* Enfermedad infectiva, contagiosa y epidémica, caracterizada por una erupción

polimorfa que á la vez recuerda la del sarampión y la de la escarlatina, y por infartos ganglionares. Parece que constituye una enfermedad atónoma distinta del sarampión. Pertenece á la clase de las fiebres eruptivas.

rubeoloso, *adj.* Lo que tiene relación con el sarampión.

rubeoliforme, *adj.* Se dice de la erupción que recuerda la del sarampión.

rueca (ruido de). Véase : *diablo* (*ruido de*).

ruido de bronce. Véase : *acero* (*ruido de*).

Rummo (enfermedad de). Véase : *gerodermia génitodistrófica.*

rupia, *s. f.* (ρύπος, mugre). Lesión de la piel caracterizada por la formación de una costra central negruzca levantada por el pus y rodeada por una areola inflamatoria. A esta costra añádense pronto otras nuevas que forman capas concéntricas estratificadas, de tal modo que el revestimiento costroso presenta el aspecto de una concha de ostra. Dicha lesión puede encontrarse en diferentes enfermedades (sífilis, infección vulgar de la piel en forma de ectima en los caquécticos).

S

saburral, *adj.* (*saburra*, lastre). Se dice de la mucosa lingual cuando está cubierta de una capa blanco-amarillenta. El *estado saburral* de la lengua es síntoma que se comprueba ordinariamente en los casos de trastorno gástrico, ligado ó no á una enfermedad general.

sacarimetría, *s. f.* (σάκχαρον, azúcar; μέτρον, medida). Evaluación del azúcar contenido en un líquido, y con particularidad en la orina.

sacarismo, *s. m.* Véase : *glicosismo.*

sacarolado, *s. m.* Medicamento pulverulento que se obtiene mezclando con azúcar sustancias medicinales.

sacaromicosis, *s. f.* (σάκχαρον, azúcar; μύκης, hongo). Enfermedad producida por los *saccharomyces*; no es conocida sino en medicina experimental y

no ha sido realizada sino en el cochinillo y el ratón.

sacaruro, *s. m.* Sacarolado obtenido vertiendo alguna tintura alcohólica ó etérea sobre azúcar, y luego secando y pulverizando.

saccharomyces álbicans. Hongo cuyo desarrollo en las mucosas de epitelio pavimentoso, y particularmente en la mucosa bucal, produce la afección llamada *muguete.* La mayoría de los autores actuales lo consideran como una levadura.

sacro-coxalgia, *s. f.* (*sacrum*; *coxa*, hueso coxal; ἄλγος, dolor). Artritis crónica de la sínfisis sacro-ilíaca. — Ordinariamente se reserva este nombre para la tuberculosis de dicha articulación.

Sæmisch (úlcera de). Sin. *ulcus serpens, queratitis con hipopión* (Roser) Variedad de queratitis infectiva caracterizada por una ulceración serpiginosa de la córnea, acompañada á menudo de formación de pus en la cámara anterior. Al neumococo se le tiene como agente causal de esta afección.

Sahli (prueba de). Método de exploración de la secreción externa del páncreas. Se hace tomar al enfermo una píldora de yodoformo encerrada en una cápsula de gluten, inatacable por el jugo gástrico y que se disuelve rapidísimamente en el jugo pancreático. Normalmente, la reacción del yodo aparece en la orina seis horas después de la ingestión de la cápsula.

salaam (tic de). (árabe, *salám.* salud). Sin. : *spasmus nutans, nictitatio spastica.* Sindroma que se observa en la primera infancia, caracterizado por accesos en los que la cabeza está animada de movimientos frecuentísimos que recuerdan el gesto de la salutación. Este sindroma puede ser ó indicio de un tumor cerebral ó una forma de epilepsía : en este último caso el acceso está acompañado de pérdida del conocimiento.

salacidad, *s. f.* Propensión á las relaciones sexuales; se dice más comunmente tratándose de animales.

Salkowski (procedimiento de). Procedimiento utilizado en la busca del pigmento biliar en la orina. Consiste en precipitar este pigmento por medio del cloruro de calcio, diluir en seguida el precipitado en alcohol, disolverlo en ácido clorídrico y añadir

ácido nítrico nitroso que hace aparecer la sucesión de los colores, azul, violeta, rojo.

salol (prueba del). Método de exploración de la secreción externa del páncreas. Se hace ingerir al enfermo un gramo de salol y se busca en la orina la presencia del ácido salicílico. En el caso de cáncer del páncreas no se obtiene la reacción característica.

salpingectomía, *s. f.* (σαλπίγξ, trompa; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en la ablación de una trompa uterina.

salpingitis, *s. f.* (σαλπίγξ, trompa). 1° Nombre genérico de todas las lesiones inflamatorias agudas ó crónicas de las trompas uterinas. La *salpingitis* va acompañada casi siempre de inflamación del ovario, y clínicamente no difiere de la *salpingo-ovaritis.* — 2° Inflamación de la trompa de Eustaquio que precede ó acompaña ordinariamente á la otitis media.

salpingo-ovariopexia, *s. f.* (σαλπίγξ; *ovarium*, πῆξις, fijación). Fijación del ovario á la trompa.

salpingo-ovariosindesis, *s. f.* (σαλπίγξ; *ovarium*; σύν, con; δέσις, ligadura). Sutura del ovario á la trompa.

salpingo-ovariotripsia, (*s. f.* (σαλπίγξ; *ovarium*; τρίψις. trituración). Ablación de los anejos del útero, por la vagina sin histerectomía.

salpingo-ovaritis, *s. f.* Sin. : *tubo-ovaritis, ooforosalpingitis, anexitis.* Nombre genérico de las inflamaciones de los anejos del útero (trompas y ovarios).

salpingorrafia, *s. f.* (σαλπίγξ; ῥαφή, sutura). Sutura de la trompa.

salpingoscopia, *s. f.* (σαλπίγξ; σκοπεῖν, examinar) (Valentin, 1903). Examen del orificio interno de la trompa de Eustaquio por medio de un aparato (salpingoscopio) análogo al citoscopio, que se introduce en la nasofaringe pasando por el meato nasal inferior.

salpingostomía, *s. f.* (σαλπίγξ; στόμα, boca). Operación que consiste en crear un pabellón artificial en los casos de salpingitis quística aséptica. Los cirujanos que intentan esta operación abrigan la esperanza de evitar la esterilidad que resulta de la ablación de la trompa.

salpingotomía, *s. f.* (σαλπίγξ; τομή, sección). Abertura de una trompa quística.

saltatoria (corea). Véase: *corea histérica.*

sammoma, *s. m.* (ψαμμός, arena). Nombre dado por Virchow á los endoteliomas, á causa de los nódulos calcificados, semejantes á granos de arena, que se encuentran en estos tumores. Véase: *endotelioma.*

sanatorio, *s. m.* (*sanator*, el que cura). Establecimientos situados en condiciones climatéricas determinadas, destinados al tratamiento de las enfermedades crónicas, tales como la tuberculosis pulmonar, las afecciones cardiacas, nerviosas, etc., por medios puramente higiénicos, ó al restablecimiento de la salud alterada por diversas enfermedades (lo más frecuentemente por enfermedades de los países cálidos, malaria, disenteria).

Sánders (signo de). Véase: *Heim y Sánders (signo de).*

sangría, *s. f.* Operación que consiste en provocar la evacuación de cierta cantidad de sangre. Es *general* cuando la sustracción se hace en una vena ó una arteria; *local* cuando la sangre proviene de los capilares (ventosas escarificadas, sanguijuelas). — Se da también alguna vez este nombre á la sangre recién sustraída por la sangría, y á la región del cuerpo en que preferentemente se practica la operación (pliegue del codo).

sanguijuela (procedimiento de la) (Lesieur). Procedimiento especial de investigación de los microbios contenidos en la sangre. La sangre que se va á examinar se obtiene por la aplicación de una sanguijuela y de ese modo se vuelve incoagulable; puede entonces centrifugarse y el residuo del fondo se examina al microscopio.

sanies, *s. f.* (*sanies*). Materia purulenta, fétida, mezclada con sangre, que mana de las heridas infectadas, de las úlceras descuidadas, etc.

sápido, *adj.* (*sapor*, gusto). Que tiene sabor.

saponado, *s. m.* (*sapo*, jabón). Medicamento en cuya composición entra el jabón.

saponulado, *s. m.* Nombre dado á algunos alcoholados suficientemente cargados de jabón para tomar consistencia gelatinosa.

saponuro, *s. m.* Mezcla de jabón en polvo y de sustancia resinosa ó extractiva.

saprófito, *s. m.* (σαπρός, pútrido; φυτόν, vegetal). Los microbios que no se desar-

rollan en el organismo vivo, sino á expensas de las sustancias muertas. Cuéntanse entre ellos los microbios de la putrefacción que, á causa de los venenos que segregan, pueden llegar á ser patógenos.

saprógeno, *adj.* (σαπρός, pútrido; γεννᾶν, engendrar). Que engendra la putrefacción.

saprozoito, *s. m.* (σαπρός; ζῶον, animal) (R. Blanchard, 1906). Animálculos que, sin ser parásitos, viven en las materias orgánicas en descomposición.

sarampión, *s. m.* Enfermedad infectiva contagiosa y epidémica, caracterizada por un exantema formado de manchitas rojas poco salientes, que empieza por la cara, precedido por un catarro de las mucosas óculonasal y faringo-laringea con exantema de la faringe y especialmente del velo del paladar. Entra en la clase de las fiebres eruptivas.

sarcina, *s. f.* *sarcina*, fardo). Bacterias cuyos elementos se disponen en masas cúbicas por su modo especial de segmentación que se hace según tres planos. Son microbios saprófitos que viven en el estómago enfermo (*sarcina ventriculi*), en la gangrena pulmonar, etc.

sarcocele, *amb.* (σάρξ, carne; κήλη, tumor). Nombre dado á las tumefacciones del testículo y del epidídimo, de cualquiera naturaleza. Ej.: *sarcocele tuberculosa, sifilítica, cancerosa.*

sarcódicos (movimientos ó deformaciones). Fenómenos cadavéricos observados en los infusorios, consistentes en deformaciones y en la producción de bolas (*bolas sarcódicas*) que desaparecen en el medio ambiente.

sarcodo, *s. m.* (σαρκώδης, carnoso). Protoplasma.

sarcoide cutáneo ó **sub-cutáneo** (Boeck, 1904). Afección cutánea benigna, cuya naturaleza es aún poco conocida, que se presenta bajo la forma de nódulos múltiples diseminados en la superficie del cuerpo.

sarcoma, *s. m.* (σάρξ, carne). Sin.: *tumor fibroplástico, tumor embrioplástico* (Robin). Tumor constituido por tejido embrionario, y desarrollado á expensas del tejido conjuntivo. Se ha descrito cierto número de variedades según el tipo de célula predominante. Cada una de estas diferentes formas celulares corresponde á una de las faces de la evolución de las células embrionarias.

sarcomatosis, *s. f.* La enfermedad caracterizada por la formación de sarcomas.

sarcoplasma, *s. m.* Protoplasma de las células musculares. Rodea los núcleos y se insinúa en irradiaciones más ó menos largas por entre los grupos de fibrillas musculares.

sarcopte, *s. m.* (σάρξ, carne; κόπτειν, cortar). (*sarcoptes scabiei*, s. de la sarna). Véase : *acaro*.

sarcotripsia, *s. f.* (σάρξ; τρίψις, trituración). Véase : *aplastamiento lineal*.

sarna, *s. f.* Sin. : *scabies*, *galla*. Afección cutánea producida por un parásito animal (*sarcoptes* ó *acarus scabiei*), y caracterizada por comezón y una lesión específica (el surco).

satelismo cultural (H. Meunier). Influencia ejercida por el desarrollo de ciertas bacterias sobre las colonias de otra bacteria distinta cultivada en el mismo medio. Fenómeno estudiado sobre las colonias del bacilo de Pfeiffer en cultivos mixtos. El desarrollo del bacilo de Pfeiffer lo favorece la siembra del estafilococo, del colibacilo, del tífico, etc., sobre el mismo medio de cultivo. Se obtienen así colonias 10 á 15 veces más extensas que con cultivos puros.

satiriasis, *s. f.* (Σάτυρος, Sátiro). Afrodisia ó exageración de los deseos sexuales en el hombre.

saturnismo, *s. m.* (*saturnus*, plomo). La intoxicación crónica por el plomo ó las sales de plomo. Se manifiesta lo más á menudo por trastornos digestivos (cólicos de plomo), trastornos nerviosos (parálisis, encéfalopatía), trastornos renales (albuminuria, uremia).

sauriasis, *s. f.* (σαῦρα, lagarto). Véase : *ictiosis*.

Sayre (método de). Tratamiento ortopédico del mal de Pott por medio de un corsé enyesado que se aplica estando el enfermo suspendido por la nuca, el mentón y las axilas, de manera de enderezar y estirar el raquis. Este corsé abarca y mantiene el tronco desde las caderas á las axilas.

Schaudinn (bacilo de) (1905). Microbio descubierto por Schaudinn en los lesiones sifilíticas (chancro, placas mucosas) y que tiene la forma de un espiroquete (*spirochete pallida*).

Schede (operación de). Resección de una parte de la caja torácica en los enfermos atacados de empiema crónico.

Schröder (operación de). Operación que

consiste en practicar la amputación del cuello del útero por el método llamado de un solo colgajo : se practica sobre cada lado del cuello la excisión de la mucosa uterina, y en seguida sutúrase la extremidad de la incisión.

Schoenlein (enfermedad de) (1829). Véase: *peliosis reumatismal.*

sebáceo (quiste) (*sebum*, grasa). Tumor subcutáneo formado por una bolsa que contiene células epidérmicas y materias grasas. Su origen parece residir en la dilatación quística de una glándula sebácea cuyo orificio se ha obstruido.

seborrea, *s. f.* (*sebum*, grasa; ῥεῖν, fluir) (Fuchs de Gottingen, 1840). Trastorno de la secreción de las glándulas de la piel (sebáceas y sudoríparas), caracterizado por un aumento de dicha secreción acompañado frecuentemente de hipertrofia de la glándula. Según la forma de la secreción, la *seborrea* puede ser *seca*, *grasosa* ó *aceitosa*. Acompaña á menudo diversas dermatosis (exema, soriasis), á las que imprime caracteres especiales. Favorece el desarrollo del acné.

seborreides, *s. f. pl.* Dermatosis caracterizada por elementos pitiriásicos escamosos ó escamo-costrosos, que se presenta con predilección en las pieles gordas. Corresponde al *exema seborreico* de Unna.

secreción, *s. f.* (*secernere*, separar). Acto fisiológico en virtud del cual ciertos tejidos (epitelios glandulares) producen sustancias líquidas cuyos elementos son tomados á la sangre por elección y selección químicas. Ej. : *secreción salival, secreción láctea.*

secreción interna. Secreción cuyo producto es vuelto á tomar por la sangre ó la linfa, á contraposición de las *secreciones externas* que son vertidas inmediatamente al exterior ó en uno de los órganos huecos de la economía. Ciertas glándulas tienen sólo secreción interna (glándula tiroide, cápsulas suprarrenales): otras tienen á la vez secreción interna y secreción externa (páncreas, hígado, etc.).

secreta, *s. n. pl.* Conjunto de los productos de secreción.

Secretán (enfermedad de). Edema duro del dorso de la mano consecutivo á un traumatismo, á veces insignificante, y del que resulta una incapacidad funcional de larga duración.

secretina, *s. f.* (Bayliss

y Starling). Sustancia soluble producida en la mucosa duodenal en el momento de la llegada del quimo acidificado por el jugo gástrico. Puede también fabricarse in vitro tratando un pedazo de esta mucosa por ácido clorídrico. La *secretina* es trasportada por la circulación sanguínea al páncreas, cuya secreción provoca. Excita también, pero en menor grado, la secreción de la bilis, del jugo intestinal y de la saliva.

secuestro, *s. m.* (*sequestrare*, separar). Hueso mortificado en vía de eliminación.

secundinas, *s. f. pl.* Las partes del huevo que quedan en el útero después de la expulsión del feto (placenta y membranas).

secundípara, *s. f.* (*secundus*, segundo; *parere*, parir). Mujer que ha parido por segunda vez.

sedación, *s. f.* (*sedare*). Apaciguamiento. Ej. : *sedación del dolor*.

sedal, *s. m.* (seda). Mecha de algodón que se pasa bajo la piel por una abertura y una contraabertura, destinada á mantener un exutorio (ya no se emplea mucho).

sedante, sedativo, *adj.* y *s. m.* Calmante. Medicamento que modera la acción de un órgano ó de un aparato.

sedimento, *s. m.* (*sedere*, descender). Depósito formado por la precipitación de materias que estaban en suspensión ó en disolución en un líquido. — Se dice sobre todo de los depósitos urinarios.

selina, *s. f.* (σελήνη, luna). Nombre dado al estado de las uñas caracterizado por la formación de manchas blancas debidas á la ausencia de pigmento.

Selivanov (reacción de). Reacción característica de la levulosa.

semeyología ó **semiología**, *s. f.* (σημεῖον, signo; λόγος, discurso). Parte de la medicina que se ocupa en el estudio de los signos de las enfermedades.

semeyótica ó **semiótica**, *s. f.* (σημειωτική). Véase : *semeyología*.

senestrogiro, *adj.* (*sinister*, izquierdo; *gyrare*, girar). Véase : *levogiro*.

senilidad, *s. f.* « Debilitamiento lentamente progresivo de las facultades corporales y mentales en el anciano ».

sensibilizatriz, *s. f.* (Bordet. Sin. : *amboceptor*, *cuerpo inmunizante*, *desmón*, *fijador*, *filocitasis*. Sus-

tancia que aparece en el suero de un animal vacunado y que goza de la propiedad de hacer que el microbio, contra el cual ha sido vacunado el animal, sea sensible á la acción de la alexina. La propiedad bactericida de dicho suero es, pues, debida á la acción de dos sustancias: una específica que resiste á la temperatura de 55°, llamada *sensibilizatriz;* otra no específica, anterior á la vacunación, existente en todos los sueros, que se destruye á 55°, y á la que se da el nombre de *alexina*.

sensitivo (neurona). El conjunto formado por una célula de los ganglios raquídeos y sus dos prolongamientos, uno periférico proveniente de un nervio sensitivo, otro central que va á ramificarse en la médula.

sensorio, *s. m.* (*sensus*, sentido). El cerebro, considerado como foco intelectual y centro á donde van todas las sensaciones.

sentido muscular. Sin.: *función cinestésica*. Sensibilidad particular que poseen los músculos, intermedia entre las sensaciones generales y las sensaciones especiales. El *sentido muscular* da la noción del movimiento ejecutado, del esfuerzo, de la situación ocupada á cada instante por los miembros.

septana (fiebre) (*septanus*, séptimo). Forma de fiebre intermitente en que los accesos vuelven al séptimo día, dejando entre ellos cinco días de intervalo.

septenario, *s. m.* Espacio de siete días.

septicemia, *s. f.* (σηπτικός, de σήπειν, corromper; αἷμα, sangre) (Piorry). Nombre genérico de las enfermedades causadas por la introducción en la economía de un germen infectivo que se desarrolla en ella sin suscitar reacción local.

septicemia crónica. Fiebre de tipo intermitente, con enflaquecimiento progresivo, insomnio, sudores nocturnos abundantes, degeneración de las vísceras, particularmente del hígado, que se observa en los casos de supuraciones prolongadas y que es debida al ingreso á la sangre de venenos sépticos y á veces de microbios provenientes de focos purulentos. Corresponde á la antigua *fiebre héctica*.

septicemia peritoneo-intestinal. Septicemia causada por la invasión del organismo por los microbios del intestino (coli-

bacilo) provenientes de una asa intestinal estrangulada, ya en una hernia, ya en un estrangulamiento interno.

septicemia sobreaguda. Sin. : *septicemia gangrenosa, erisipela bronceada, panflegmón, gangrena gaseosa* ó *fulminante, neumohemia pútrida.* Nombre con que se designa á veces cierta complicación de las heridas caracterizada por un esfacelo de marcha rápida y estado general grave que termina casi siempre en la muerte; es causada por el *vibrión séptico* de Pasteur.

septicidad, *s. f.* Carácter séptico é infectivo de una enfermedad.

séptico, *adj.* (σηπτικός, de σήπειν, corromper). Se dice de los accidentes causados por los microbios y por las toxinas que éstos segregan.

sépticopiemia, *s. f.* Variedad de septicemia en que los microbios van á localizarse secundariamente en ciertos puntos de la economía, y dan lugar á la producción de focos purulentos.

septus (úterus) (*septum*, tabique). Véase : *bilocular* (*útero*).

serina, *s. f.* Véase : *fibrinoplástica* (*sustancia*).

serinuria, *s. f.* Variedad de albuminuria caracterizada por la presencia de *serina* sola en la orina.

sero-apéndice, *s. m.* Hidropesía intra-apendicular observada á veces en personas que han tenido una crisis de apendicitis aguda y que han sido operadas en frío.

serafina, *s. f.* (del francés *serre-fine*, garra ó prensa fina). Pequeñas pinzas de presión continua que se emplean para reunir los labios de las heridas.

serodiagnóstico, *s. m.* (Widal). Sin. : *sero-reacción, reacción de Widal.* Aplicación del fenómeno de la aglutinación de los microbios al diagnóstico de ciertas enfermedades (fiebre tifoidea, cólera). La aparición de este fenómeno en un cultivo fresco de bacilo de Erberth, al cual se acaba de añadir una proporción determinada del suero de un enfermo, autoriza para diagnosticar que dicho enfermo padece de una infección por el bacilo de Erberth, lo más frecuentemente de fiebre tifoidea. (Véase : *aglutinación*).

seropronóstico, *s. m.* Pronóstico basado sobre la intensidad y la época de aparición de la reacción de Widal en la fiebre tifoidea; el pronóstico será grave si el poder aglutinante aparece tardíamente, cuando ya los

síntomas son absolutamente claros.

sero-reacción, *s. f.* Véase : *serodiagnóstico.*

serosa (anemia) (Gilbert y Garnier). Variedad de anemia parcial en que la sangre se empobrece notablemente en suero; es consecutiva á la sustracción de grandes cantidades de suero sanguíneo, y con particularidad se realiza en las cirrosis á consecuencia de la punción de la ascitis.

serosa (caquexia). Estado particular de ciertas recién paridas que presentan una anemia profunda con hidropesías múltiples y sin albuminuria.

serosidad, *s. f.* (*serum*, suero). Líquido coagulable como la linfa, contenido en la cavidad de las serosas. — También se da ese nombre á los líquidos de las hidropesías, edemas y flictenas.

seroterapia, *s. f.* (*serum*; θεραπεία, terapéutica). Método de tratamiento de las enfermedades infectivas, que consiste en la utilización de las propiedades curativas del suero de los animales vacunados contra una de estas enfermedades. Empléase generalmente este suero en inyecciones subcutáneas, más rara vez en inyecciones intravenosas, ó aun intraparenquimatosas (inyección de suero antitetánico en el cerebro).

serpiginoso, *adj.* (*serpere*, serpear). Se dice de las úlceras, erisipelas, que curan de un lado y se extienden del otro, de manera que parecen caminar como una serpiente.

serrátil (ruido) (*serra*, sierra). Ruido de sierra. Timbre especial que presenta á veces el cornaje.

serrezuela, *s. f.* Instrumento empleado en cirugía ocular, particularmente en la operación de la catarata, con el que se puede agarrar la cápsula del cristalino y arrollarla sobre sí misma después de desgarrarla.

serumterapia, *s. f.* Véase : *seroterapia.*

seudartrosis, *s. f.* (ψευδής, falso; ἄρθρον, articulación). Articulación accidental desarrollada á consecuencia de un defecto de consolidación de un hueso fracturado, en la cual se producen movimientos más ó menos amplios.

seudencefalo, *s. m.* (ψευδής, falso; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo cuyo cráneo y canal vertebral están anchamente abiertos por detrás, y en el cual el encéfalo

está reemplazado por un tumor vascular.

seudestesia, *s. f.* (ψευδής; αἴσθησις, sensibilidad). Fenómeno que consiste en asociar dos percepciones sensoriales diferentes consecutivas á la excitación de un solo órgano. Una de las dos sensaciones es la que se percibe siempre que se excita dicho aparato sensorial; la otra corresponde á otro órgano de los sentidos. La audición colorada es la más frecuente de las *seudestesias*; empero, las sensaciones visuales son capaces de evocar sensaciones acústicas, gustativas, olfativas, tactiles, de allí la visión auditiva, olfativa, etc.

seudo-anemia angiospástica (Vermehren. 1902). Afección que se observa principalmente en los neurópatas, caracterizada por los mismos síntomas de la clorosis. mas sin presentar modificación en la composición de la sangre. Sería debida á la vaso-constricción de ciertos territorios vasculares y análoga á la enfermedad de Raynaud.

seudo-bulbar (parálisis). Parálisis labio-gloso-laringea, en la que este sindroma no corresponde á una lesión del bulbo, sino á la de otro punto del trayecto nervioso de los centros á los músculos paralizados; en general la lesión se halla situada entonces en el cerebro (parálisis seudo-bulbar de origen cerebral).

seudo-cromestesia, *s. f.* (ψευδής, falso; χρῶμα, color; αἴσθησις, sensibilidad). Véase : *fotismo* y *audición colorada*.

seudo-enartrosis, *s. f.* Sin. : *seudartrosis fibrosinovial.* Seudartrosis que posee ligamentos, una sinovial, superficies articulares, y que reproduce el tipo de la enartrosis.

seudo-fotestesia, *s. f.* Véase : *fotismo.*

seudo-hematocele, *amb.* Hematocele extraperitoneal ó subperitoneo-pelviano.

seudo-hermafrodismo, *s. m.* Véase : *hermafrodismo 2°.*

seudo-himen, *s. m.* (ψευδής; falso; ὑμήν, membrana) (Laboulbène). Falsa membrana.

seudo-lipoma, *s. m.* Masa grasosa difusa situada lo más á menudo en la fosa supraclavicular, la cual rellena, y donde puede comprimir el plexo braquial y los vasos. Los *seudo-lipomas* son muy frecuentemente simétricos.

seudomembrana, *s. f.* Exudado patológico que se produce en la superficie de las mucosas, más rara vez en las serosas, constituído lo más á menudo, no siempre, por un tejido fibrinoso semejante al fieltro, que se desprende por colgajos no disociables en el agua.

seudomembranosa (angina). Sin. *angina lardácea*. Nombre genérico de todas las anginas que presentan exudados seudomembranosos. Dichas anginas son debidas, lo más á menudo, al bacilo de Loeffler (*difteria*), más rara vez al estreptococo, al neumococo ó al estafilococo (*seuddifteria*).

seudomeningitis, *s. f.* Véase : *meningismo*.

seudoneuralgia, *s. f.* Dolor que se manifiesta en una rama ó tronco nervioso del mismo modo que una neuralgia, pero que difiere de ésta por la ausencia de los puntos dolorosos característicos. Las *seudoneuralgias* son debidas á la compresión de las raíces raquídeas; aparecen en el curso del mal de Pott, del cáncer vertebral, etc., y en general preceden los signos de compresión de la médula.

seudopelada, *s. f.* (Brocq, 1885). Dermatosis caracterizada por la formación de islotes cicatriciales, en los que la destrucción del cabello es definitiva.

seudoperitonitis, *s. f.* Véase : *peritonismo*.

seudoplasma, *s. m.* Véase : *heterólogo* (*tejido*).

seudopodo, *s. m.* (ψευδής, falso; πούς, pie). Sin. : *lobopodo*. Las prolongaciones cortas y lobuladas que emiten ciertos organismos inferiores (moneras, amibas) para cambiar de lugar. Los leucocitos se mueven igualmente emitiendo *seudopodos*.

seudoporencefalia, *s. f.* Lesión cerebral caracterizada, como la porencefalia verdadera, por una depresión situada sobre el córtex, pero esta depresión no comunica con los ventrículos : es una formación quística desarrollada á expensas de la pía-madre, la que tapiza sus paredes. Se encuentra en la idiotez, como la porencefalia verdadera.

seudo-reumatismo infectivo. Nombre dado á las manifestaciones articulares que aparecen en el curso de ciertas enfermedades infectivas agudas. Son debidas, ya al microbio de la enfermedad causal, ya á una

infección secundaria, y nada tienen de común con el reumatismo articular agudo.

seudotabes, *s. f.* Síndroma nervioso que comprende algunos de los principales signos de la tabes (dolores fulgurantes, pérdidas de los reflejos, signo de Rómberg, etc.) y debido ora á neuritis periféricas (*neurotabes*) ora á la neurastenia

seudotuberculosis, *s. f.* Nombre dado á un grupo de enfermedades caracterizadas por lesiones cuyo aspecto macroscópico recuerda el de la tuberculosis, aunque no son causadas por el bacilo de Koch.

sexdigitismo, *s. m.* (*sex*, seis; *digitus*, dedo). Sin. : *hexadactilia*. Anomalía congénita que consiste en la existencia de un dedo supernumerario. Estos dedos frecuentemente están desprovistos de esqueleto y unidos por un pedículo á la superficie cutánea.

sextana (fiebre). Forma de fiebre intermitente en que los accesos vuelven al sexto día, dejando entre sí un intervalo de cuatro días.

shock, *s. m.* (inglés : choque). Véase : *choque operatorio*.

sialodocitis fibrinosa (*sialodochitis fibrinosa*). Nombre dado en Alemania á la *ranilla aguda*.

sialogogo, *adj.* y *s. m.* (σίαλον, saliva; ἄγειν, arrojar). Medicamento destinado á provocar la hipersecreción salival.

sialorrea, *s. f.* (σίαλον, saliva; ῥεῖν, fluir). Véase : *tialismo*.

sialo-semiología. Estudio clínico del quimismo salival.

sibilante (estertor) (*sibilare*, silbar). Sin. : *estertor sonoro agudo*. Nombre dado en auscultación al silbido musical de tono más ó menos agudo, que acompaña al murmullo respiratorio y aun puede ocultarlo. Se le ha comparado, ya con el arrollo de la tórtola, ya con el silbido del viento.

Sibson (escotadura de). Deformación que sufre la zona mate del corazón en los derrames pericárdicos. Esta zona tiene la forma de un triángulo; pero hacia el tercio superior del borde izquierdo presenta, entonces, una depresión ó escotadura.

Sicard (método de). Véase : *epidural (método)*.

sicastenia, *s. f.* (ψυχή, alma; ἀ, priv ; σθένος, fuerza). Indecisión del espíritu, propensión á la duda, á las aprensiones instintivas é irrazonables, que se observa

en los degenerados y que termina en la locura de la duda, en las diversas fobias, impulsiones ó abulias.

sicefaliano, *s. m.* (σύν, con; κεφαλή, cabeza) (I. G. Saint-Hilaire). Sin. *janicéfalo*, *janiforme*. Nombre dado á una familia de monstruos dobles caracterizados por la fusión de las dos cabezas.

sicnosfigmia, *s. f.* (συχνός, frecuente; σφυγμός, pulso) (Spring, 1866). Frecuencia del pulso, correspondiente á la taquicardia.

sicnuria, *s. f.* (συχνός, frecuente; οὖρον, orina) (Laboulbène). Véase : *polacuria*.

sicometría, *s. f.* (ψυχή, alma; μέτρον, medida). Registro y mensuración de la actividad intelectual.

sicopatía, *s. f.* (ψυχή; πάθος, afección). Enfermedad mental.

sicosis, *s. f.* 1° (ψυχή, alma). Sin. *vesania*. Nombre genérico de las enfermedades mentales.—2° *s. m.* (σύκωσις, tumor en forma de higo, de σῦκον, higo). Nombre con que se han descrito diferentes lesiones situadas en la región de la barba y del bigote. Debe limitarse esta segunda acepción del término á una variedad particular de foliculitis del bigote, caracterizada por la formación en la base de los pelos de pústulas, de nudosidades y aún de abcesos intradérmicos.

sicosis sistemática progresiva (Garnier). Véase : *persecución (delirio de)*.

sicoterapia, ó **sicoterapéutica**, *s. f.* (Bernheim). Nombre dado á la aplicación metódica de la sugestión al tratamiento de las enfermedades.

sicroterapia, *s. f.* (ψυχρός, frío; θεραπεία, tratamiento). Medicación refrigerante. Método terapéutico cuyo objeto es combatir la fiebre por medio del frío : baños fríos, afusiones ó lociones frías, sábanas húmedas, lavativas frías, etc.

sideración, *s. f.* (*siderare*, herir por influencia maligna, de *sidus*, astro; Littré). Aniquilamento súbito de las fuerzas vitales (acción del rayo, apoplejía, etc.) atribuído antiguamente á influencias de los astros.

siderina, *s. f.* (Quincke). Véase : *hemosiderosis*.

siderosis, *s. f.* (σίδηρος, hierro). Infiltración de los tejidos por el hierro proveniente del exterior (*siderosis pulmonar*), ó formado en el organismo (*siderosis hepática*).

siderosis hepática (Quincke, 1875). Infiltración de las células y del tejido conjuntivo del hígado por un compuesto férrico (rubigina). La *siderosis hepática* corresponde á menudo al tipo clínico de la *cirrosis pigmentaria* de Hanot y Chauffard.

siderosis pulmonar. Neumoconiosis provocada por la inhalación de polvillo de hierro (talladores de limas, obreros que trabajan con óxido de hierro).

sidráceo, *adj.* (ψυδράκιον, pustulilla). Se aplica á veces á la pústula pequeña que no presenta areola inflamatoria clara; la costra que le sucede es amarillenta y poco espesa.

sídracio, *s. m.* (*psydracium*, de ψυδράκιον, pustulilla) (Willan y Bateman). Erupción pustulosa del impétigo.

sierra (ruido de). Véase: *lima* (*ruido de*).

sífilide, *s. f.* Nombre genérico dado al conjunto de las manifestaciones cutáneas de la sífilis (excepto el chancro).

sífilide pigmentaria. Manifestación cutánea de la sífilis secundaria, que se revela por el aumento de la pigmentación en superficies más ó menos extensas que rodean otras regiones de coloración normal. Se observa sobre todo en el cuello en la mujer.

sifiligrafía, sifiliografía, sifilografía, *s. f.* (sífilis; γράφειν, describir). Tratado de la sífilis.

sífilis, *s. f.* (etimología discutida: σύν, con; φιλεῖν, amar; ὁ σίφλος odiable) (Fracastor). Sin. *gálico, lues venérea*. Enfermedad general, contagiosa é inoculable, cuyo agente patógeno parece ser el *spirochete pallida* de Schaudinn. Empieza siempre por un chancro indurado acompañado de adenopatía (accidente primitivo), excepto cuando se trasmite por herencia; se manifiesta en seguida por erupciones cutáneas y mucosas, á veces por inflamaciones viscerales (accidentes secundarios), y más tardíamente por lesiones degenerativas ó proliferantes de los diversos tejidos y órganos (accidentes terciarios, gomas).

sifilización, *s. f.* Inoculación experimental de la sífilis.

sífilofobia, *s. f.* (sífilis; φόβος, temor) (Ricord). Temor enfermizo á las afecciones venéreas.

sifiloide, *s. f.* (sífilis; εἶδος, forma). Erupciones cutáneas que por el aspecto

recuerdan las de la sífilis, siendo, no obstante, independientes de esta enfermedad.

sifiloide post-erosiva (Jacquet). Sin.: *eritema lenticular* (Sevestre), *eritema papuloso posterosivo*. Erupción de la primera infancia dependiente de trastornos gastro-intestinales, situada en las nalgas y los muslos, mas, sin tocar el fondo de los pliegues (signo diagnóstico con la sífilis), formada de placas eritematosas, levantadas, redondas, á veces confluentes.

sifiloma, *s. m.* Producto patológico que semeja un tumor, mas, de origen sifilítico (goma).

sifilomanía, *s. f.* (sífilis; μανία, locura). Forma de nosomanía en la que el enfermo se cree atacado de sífilis.

sifonoma, *s. m.* (Henle). Véase: *cilindroma*.

sigmatismo, *s. m.* (de la letra griega *sigma* ς). Vicio de pronunciación caracterizado por la dificultad ó la imposibilidad de pronunciar la letra *s*.

sigmoiditis, *s. f.* Inflamación de la cuarta porción del colon (colon íleopelviano ó asa sigmoidea).

signo, *s. m.* Fenómeno que, reconocido por el médico en el organismo del enfermo y apreciado por él, permite que se llegue al diagnóstico y al pronóstico de la enfermedad. Los *signos* son deducidos de los síntomas de la enfermedad, como también de la constitución, del estado anterior, de la herencia del enfermo.

silosis, *s. f.* (ψιλός, desprovisto de pelo). Véase: *alopecia*.

simbiosis, *s. f.* (σύν, con; βίος, vida). Existencia simultánea y asociada de dos ó varios organismos que viven y se desarrollan en las mismas condiciones.

simblefarón, *s. m.* (σύν, con; βλέφαρον, párpado). Adherencia entre los párpados y el globo ocular, de origen cicatricial, ó, muy rara vez, congénita.

simelo, *s. m.* (σύν, con; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo caracterizado por la soldadura de los dos miembros inferiores, que terminan en un pie doble.

Simon (operación de). Véase: *Marckwald* (*operación de*).

simpatectomía, simpaticectomía, *s. f.* (simpático; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en resecar una parte más ó menos grande del simpático cervi-

cal, particularmente para el tratamiento de la epilepsia.

simpática (locura) (σύν, con; πάθος, afección). Nombre dado « á toda locura desarrollada bajo la influencia de un proceso fisiológico ó patológico del organismo, que influye á distancia é indirectamente sobre el cerebro » (Régis).

simpática (oftalmía). Variedad de oftalmia (ordinariamente iridocoroiditis) en la que el ojo sano es atacado consecutivamente al ojo enfermo, sin que pueda comprobarse la causa del trasporte de la afección.

simpaticismo, *s. m.* (M. Buch). Nombre genérico con el que designa Buch las neuralgias simpáticas.

simpáticotripsia, *s. f.* (simpático; τρίψις, trituración) (Chipault). Operación que consiste en aplastar el ganglio cervical superior, y que determina los mismos efectos nerviosos de la simpatectomía.

Sims (operación de). Operación destinada á reducir á su puesto normal el cuerpo del útero que padece de anteflexión. Consiste en recortar la pared anterior de la vagina avivando y suturando el borde de un pliegue que al efecto se hace en esta pared.

simulación, *s. f.* Fraude en las enfermedades; cometido por los que se hacen pasar por atacados de males que en realidad no padecen. Los *simuladores* son generalmente degenerados ó histéricos.

sinadelfo, *s. m.* (σύν, con; ἀδελφός, hermano) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble, monocefaliano, caracterizado por una sola cabeza y un solo tronco que lleva ocho miembros, de los cuales cuatro parecen dorsales y están dirigidos hacia arriba.

sinancia ó **sinanquia,** *s. f.* Véase : *cinanquia.*

sinapismo, *s. m.* (σίναπι, mostaza). Cataplasma ó emplasto cuya base es la mostaza; sirve para producir rubefacción ó revulsión.

sincinesias, *s. f. pl.* (σύν, con; κίνησις, movimiento). Sin. : *movimientos asociados.* Movimientos involuntarios que se producen en los miembros paralizados y contracturados, con ocasión de los movimientos voluntarios ó pasivos de los músculos del lado opuesto.

sinclitismo, *s. m.* (σύν; κλίνειν, inclinar) (obstetricia). Teoría según la cual la cabeza del feto, durante el encajamiento, desciende

de tal suerte que su diámetro parietal es paralelo al plano del estrecho superior y á los diferentes planos de la excavación que sucesivamente atraviesa; la sutura sagital se mantiene á igual distancia del pubis y del sacro en ese descenso.

sincondrotomía, *s. f.* (σύν; χόνδρος, cartílago; τομή, sección). Véase : *sinfisiotomía*.

síncopal (respiración) (Holovtschiner). Respiración entrecortada, interrumpida por largas pausas, y que progresivamente se hace más superficial hasta la cesación final. Tipo respiratorio de las hemorragias finales.

síncope, *s. m.* (σύν, con; κοπτεῖν, cortar). Suspensión ó debilitamiento considerable de los latidos cardiacos, con detención más ó menos completa de la respiración y pérdida súbita y total del conocimiento.

sindactilia, *s. f.* (σύν; δάκτυλος, dedo). Deformación congénita que consiste en la soldadura de los dedos entre sí.

síndroma, *s. m.* (συνδρομή, concurso). Reunión de un grupo de síntomas que simultáneamente se repiten en cierto número de enfermedades.

sinencefalocele, *amb.* (σύν, encefalocele). Encefalocele congénito que presenta adherencias más ó menos extensas con la placenta, el cordón ó las membranas.

sinequia, *s. f.* (σύν; ἔχειν, tener). 1° Lesión del globo del ojo que consiste en la adherencia del iris adelante con la cara posterior de la córnea (*sinequia anterior*), ó atrás con la cápsula del cristalino (*sinequia posterior*). — 2° *sinequia intranasal*. Adherencia del tabique de la nariz con una concha, generalmente la concha inferior.

sinergia, *s. f.* (σύν; ἔργον, obra) (fisiología). Asociación de varios órganos, de varios músculos, para realizar una función, ó un movimiento.

sinestesia, *s. f.* (σύν; αἴσθησις, sensibilidad). Desorden de la percepción de las sensaciones. Consiste en la « producción de una sensación doble bajo la influencia de la impresión proveniente de una región sensible limitada. Una de las sensaciones se percibe como proveniente de la región indicada, la otra corresponde á otra región más ó menos lejana de la precedente y que no ha recibido ninguna es-

pecie de excitación directa » (Vulpian).

sinfisiotomía, *s. f.* (σύμφυσις, sínfisis; τομή, sección) (Sigault, 1768). Sin.: *sincondrotomía*. Operación que consiste en seccionar la articulación pubiana, de manera de obtener la separación momentánea de los dos huesos ilíacos y, de consiguiente, un ensanchamiento de la pelvis. Su objeto es facilitar el parto por la vía natural, en los casos de estrechez.

sínfisis, *s. f.* (σύν, con; φύσις, producción). 1° Adherencia anormal de las dos hojas de una serosa. Ej.: *sínfisis cardiaca* (adherencia de las dos hojillas del pericardio), *sínfisis pleural*. — 2° Modo especial de articulación (sínfisis pubiana).

singultosa (respiración) (*singultus*, sollozo). Respiración dificultosa que parece entrecortada de sollozos.

sínoca (fiebre) (σύν, con; ἔχειν, tenerse). Nombre con el que se describían antes enfermedades febriles de corta duración, cuya causa se ignoraba.

sinopsia, *s. f.* (σύν; ὤψις, vista). Término general con que se designa la asociación de fenómenos visuales con sensaciones percibidas con otros sentidos. Ej.: audición colorada.

sinorquidia, *s. f.* (σύν, ὄρχις, testículo). Reunión de los dos testículos soldados en la línea media del cuerpo. (Es siempre intra-abdominal.)

sinostosis, *s. f.* (σύν; ὀστέον, hueso). Soldadura de los huesos. Esta palabra no se emplea, generalmente, sino para designar la soldadura de los huesos del cráneo.

sinovectomía, *s. f.* (Ollier). Véase: *artrectomía*.

sinovitis, *s. f.* Nombre colectivo de todas las inflamaciones de las sinoviales tendinosas, agudas ó crónicas, secas ó con derrame.

sinovitis con granos riziformes. Forma de sinovitis tuberculosa, caracterizada por la presencia de granos riziformes en la sinovial distendida. Véase: *riziformes* (*granos*).

sinovitis crepitante. Sin.: *tenalgia crepitante*, *tenositis crepitante*, *tenosinovitis aguda seca* (Volkmann). Inflamación aguda de las vainas tendinosas, caracterizada por vivos dolores y una crepitación muy fina.

sinovitis fungosa. Forma de sinovitis tuberculosa caracterizada por la

formación de fungosidades en la vaina sinovial.

sinovitis plástica. Variedad de sinovitis aguda seca, caracterizada por la formación en la serosa de una ganga embrionaria, que se vuelve fibrosa y crea adherencias tendinosas.

sinqueilia ó **sinquilia**, *s. f.* (σύν, con; χείλος, labio). Atresia cicatricial del orificio bucal, con pérdida de sustancia de los labios y de las mejillas, y adherencia de éstas al borde alveolar.

sinquisis, *s. f.* (συγχύσις, confusión). Lesión del globo del ojo consistente en el reblandecimiento del cuerpo vítreo acompañado á menudo de opacidades flotantes en su interior. — *sinquisis centelleante*. Forma rara de reblandecimiento del cuerpo vítreo, caracterizada por la presencia de numerosas pajillas de colesterina, flotantes en su interior, que reflejan la luz como polvos de oro.

síntesis (deformidad por). Monstruosidad que resulta de la soldadura de partes normalmente separadas.

síntesis morfológica (Cl. Bernard). Véase: *histopoyesis*.

síntoma, *s. m.* (σύν, con; πίπτειν, llegar). Fenómeno particular provocado en el organismo por un estado morboso. Reconocidos y apreciados por el médico, los *síntomas* son los signos sobre los cuales se basa el diagnóstico.

síntomatología, *s. f.* (σύμπτωμα, síntoma; λόγος, discurso). Estudio de los síntomas de las enfermedades.

sinusectomía, *s. f.* (*sinus*, seno; ἐκτομή, excisión) (G. Laurens, 1904). Operación que consiste en suprimir el seno frontal resecando la pared anterior y el suelo.

sinusitis, *s. f.* Inflamación de los senos de la cara.

sinuso-hidrorrea, *s. f.* Véase: *hidrorrea nasal*.

siquiatria, *s. f.* (ψυχή, alma; ἰατρεία, medicina). Medicina mental.

sirenómelo, *s. m.* (σιρήν, sirena; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo simeliano caracterizado por la soldadura y la suspensión de desarrollo de los miembros inferiores, que terminan en punta sin que existan los pies.

siringomielia, *s. f.* (σύριγξ, canal; μυελός, médula). (Ollivier d'Angers, 1837). Sin. *gliomatosis m*

dular. Afección de la médula espinal caracterizada, desde el punto de vista anatómico, por la formación de una cavidad vecina al canal del ependimo, cavidad más ó menos extensa en longitud y que resulta, ya de una mielitis central, ya de la fusión de un glioma; y, desde el punto de vista clínico, por un conjunto de síntomas de los que los principales son: la atrofia muscular, la termoparestesia, la analgesia con conservación de la sensibilidad tactil, y desórdenes tróficos.

sismoterapia, *s. f.* (σεισμός, sucusión; θεραπεία, terapéutica). Modo de tramiento que consiste en imprimir, ya á todo el organismo, ya á una parte del cuerpo, vibraciones rápidas, regulares y de poca amplitud. La *sismoterapia* se practica con la mano ó con aparatos especiales.

sisomiano, *s. m.* (σύν, con; σῶμα, cuerpo) (I. G. St-Hilaire). Familia de monstruos dobles caracterizados por la fusión de los cuerpos, en tanto que las dos cabezas permanecen distintas.

sistemática ó **sistematizada (afección)**. En patologia nerviosa, se llaman así las afecciones que « se encuentran limitadas á un sistema de fibras de idéntica significación funcional y cuyo individualismo se revela ya desde las primeras épocas del desarrollo » (Leyden).

sistematizado progresivo(delirio) ó **sistemática progresiva (sicosis)**. Sin. *delirio de persecución con evolución sistemática. delirio crónico con evolución sistemática* (Magnan). Variedad de enajenación mental caracterizada por su marcha regular, en la cual se pueden distinguir cuatro fases: 1° incubación é interpretaciones delirantes; 2° ideas de persecución y alucinaciones; 3° ideas ambiciosas; 4° demencia. Es el verdadero delirio de persecución descrito por Lasègue; por la evolución regular difiere completamente de las ideas de persecución que pueden observarse, como simple episodio, en el curso del alcoholismo subagudo, de la manía, de la demencia senil, de la parálisis general, de la epilepsía, etc.

sístole, *s. f.* (συστολή, contracción). Contracción del músculo cardiaco que se efectúa aisladamente para cada una de las cavidades del corazon, mas de tal suerte que las dos sístoles ventri-

culares son isócronas así como las dos sístoles auriculares.

sitacosis, *s. f.* (ψιτταχός, cotorra). Enfermedad infectiva trasmitida al hombre por cotorras ó loros atacados de ella, y causada por un microbio especial cercano al colibacilo y al tífico (*bacilo de Nocard*). Está caracterizada por fenómenos generales graves (fiebre, adinamia), trastornos intestinales, y una determinación pulmonar predominante (bronquitis, bronconeumonía).

sitiofobia, *s. f.* (σιτίον, alimento; φόβος, temor). Negativa absoluta á tomar alimentos; síntoma frecuente en los enajenados.

sitiología, *s. f.* (σιτίον, alimento; λόγος, discurso). Tratado de los alimentos.

sitiomanía, *s. f.* (σιτίον; μανία, locura). Necesidad irresistible de comer que se manifiesta, ya continuamente, ya por accesos, en algunos degenerados ó locos.

Smith (signo de). Signo observado en los niños atacados de adenopatía bronquica y determinado por la compresión venosa. Consiste en un murmullo venoso percibido por medio del estetoscopio colocado sobre la primera pieza del esternón, cuando la cabeza del niño se halla fuertemente tirada hacia atrás.

sodomía, *s. f.* Véase: *bestialidad.*

sódimo, *s. m.* (ψόα, lomos; δίδυμος, gemelos). Monstruo doble disomiano caracterizado por dos cuerpos distintos hasta la región lumbar, desde donde, y hacia abajo, se efectúa la fusión. Sólo tiene dos piernas y á veces el rudimento de una tercera.

soítis, *s. f.* (*psoas*, de ψόα, los lomos). Inflamación, ordinariamente seguida de abceso, del músculo soas.

solidismo, *s. m.* (Erasostrato). Doctrina de la escuela de Alejandría, según la cual las enfermedades todas provienen de desórdenes de las partes sólidas del organismo.

solitaria (fiebre). En la clasificación de las fiebres palúdicas de Torti se da este nombre á una variedad de accesos perniciosos cuya gravedad resulta de la continuidad ó de la intensidad de los síntomas ordinarios.

soma, *s. m.* (σῶμα, cuerpo). Término empleado en anatomía comparada y en biología para designar el conjunto del organismo, con abstracción del tejido genital ó *germen*.

somática (lámina) ó **somatopleura.** Sin. : *lámina fibrocutánea.* Lámina del mesodermo aplicada contra el ectodermo. Está destinada á formar el dermo, el tejido celular subcutáneo, los músculos y el esqueleto del tronco y de los miembros.

somático, *adj.* (σῶμα, cuerpo). Que es relativo al cuerpo ó le pertenece. Ej. : *síntomas somáticos* (en las enfermedades mentales, por contraposición á los fenómenos síquicos).

sómito, *s. m.* Véase : *metámero.*

somnífero, *adj.* y *s. m.* (*somnus*, sueño; *ferre*, llevar). Narcótico.

sonambulismo, *s. m.* (*somnus*, sueño; *ambulare*, marchar). Estado de automatismo ambulatorio que se produce durante el sueño. Dicho estado puede ser espontáneo, esto es, aparecer fuera de toda causa conocida; ó al contrario, provocado (hipnotismo). Se atribuye actualmente el *sonambulismo natural* ó *espontáneo* á la histeria monosintomática ó á la epilepsía.

sonda, *s. f.* Instrumento rígido ó flexible, cilíndrico, que presenta ó no un canal central, destinado á explorar los canales naturales ó accidentales, ó á practicar el cateterismo.

sonoros (estertores). Sin. : *estertores vibrantes* ó *secos.* Se designa en auscultación con el nombre de *estertores sonoros* ó *brónquicos* á todas las variedades de estertores sibilantes y roncantes, en contraposición á los estertores húmedos ó globulosos.

soplo (ruido de) (Andral). Sin. : *ruido de fuelle* (Laënnec). Nombre colectivo de todos los ruidos producidos, ya en el aparato respiratorio, ya en el circulatorio, y que semejan el ruido hecho por una columna de aire ó de líquido lanzada con fuerza por un canal angosto.

sopor, *s. m.* (en latín, sueño profundo). Término con que se designaba antes cierto estado de adormecimiento profundo en el que, no obstante, el entorpecimiento intelectual era menos notable que en el *coma* propiamente dicho.

sordera, *s. f.* Debilitamiento ó abolición completa del sentido del oído.

sordera musical. Variedad de afasia sensor al en la que el enfermo no reconoce aires de música que le eran familiares.

sordera verbal (Küss-

maul, 1876). Variedad de afasia sensorial, que consiste en la impossibilidad de comprender las ideas expresadas por los sonidos articulares racionales.

sordomudez, *s. f.* Privación del habla á consecuencia de la sordera congénita, ó adquirida en los primeros años de la vida (antes de los ocho años).

sorenteria, *s. f.* (ψώρα, vesícula; ἔντερον, intestino). Lesión constituída por pequeños levantamientos redondeados, opacos, que presentan el aspecto de vesículas diseminadas en la mucosa intestinal, debidas á la tumefacción de los folículos cerrados, que se observa en las fuertes inflamaciones del íleon (cólera, fiebre tifoidea).

soriasis, *s. f.* (ψώρα, sarna, de ψάω, rascar, reducir á polvo). Afección de la piel caracterizada por la aparición, en ciertos puntos de elección y á veces en todo el cuerpo, de elementos redondeados, formados de escamas secas, brillantes y anacaradas, que se desprenden fácilmente al rascarlos, y dejan debajo una superficie roja, luciente, propensa à sangrar.

soriasis bucal. Véase : *leucoplasia bucal.*

sorospermia, *s. f.* (ψώρα ; σπέρμα, semen). Nombre dado á los parásitos animales unicelulares de la clase de los esporozoarios. Una sola variedad, las *coccidias* ó *sorospermia oviforme*, se ha descrito en el hombre en la enfermedad de Páget del pezón, en el molusco contagioso y en ciertas variedades de epitelioma superficial; mas, no todos los autores admiten la existencia de estos parásitos. Véase : *coccidia.*

sorospermosis, *s. f.* Enfermedad producida por las sorospermias.

sorospermosis folicular vegetante (Darier). Variedad de acné sebáceo hipertrófico que sería causado por sorospermias.

Spéncer Wells (facies de). Véase : *facies ovariana.*

spirochete pallida (Schaudinn, 1905). Agente específico de la sífilis. Véase : *treponema.*

spray, *s. m.* (vocablo inglés que significa gotitas, rocío). Pulverización de un líquido antiséptico durante una operación, con el objeto de asegurar la asepsia del ambiente. — Atmósfera cargada de gotitas antisépticas, á consecuencia de esa pulverización.

tica (*succutere*, sacudir). Modo de exploración que consiste en imprimir al tórax del enfermo, sentado éste, movimientos de lateralidad, al mismo tiempo que se practica la auscultación del pecho. En los casos de hidroneumotórax óyese un ruido de ondas característico.

sudación, *s. f.* Provocación del sudor con propósito terapéutico.

sudámina, *s. m.* (*sudamen*, de *sudare*, sudar). Lesión de la piel caracterizada por la formación de pequeñas vesículas muy finas, transparentes, sin rubefacción de los tegumentos, y consecutivas á transpiraciones abundantes. Se observan *sudámina* en gran número de estados morbosos, particularmente en la fiebre tifoidea.

sudor inglés. Enfermedad epidémica que parece haber desaparecido hoy por completo y haber sido especial á Inglaterra; para algunos autores sería idéntica al *sudor miliar*.

sudor miliar. Enfermedad infectiva, endemo-epidémica en Francia, caracterizada clínicamente por sudores, eritema polimorfo con miliar y fenómenos nerviosos, particularmente ahogos y crisis disnéicas.

sudorífico, *adj.* y *s. m.* (*sudor facere*). Sin.: *diaforético*. Sustancia que provoca la sudación.

sueño (enfermedad del). Sin.: *catipnosis*, *hipnosia*, *letargia de Africa*, *narcotismo de los negros*. Enfermedad contagiosa reinante endémicamente sobre las razas indígenas de la costa occidental del Africa. La caracterizan una serie de accesos de sueño que se van acercando más y más y prolongando, con descenso de la temperatura, sin trastornos de la sensibilidad ni de la motilidad, y al cabo de algunos meses sobreviene la muerte. La causa un tripanosoma (*trypanosoma gambiense*) que se encuentra en la sangre y en el líquido céfalo-raquídeo, y la inocularía la picadura de la mosca tse-tsé (*glossina palpalis*).

suero artificial. Solución salina de composición variable, mas en la que entra siempre el cloruro de sodio. Se emplea, después de esterilizarlo, en inyecciones subcutáneas ó intravenosas. El objeto principal es volverle á la sangre su volumen primitivo.

suero sanguíneo. Parte líquida de la sangre que queda después de la separación del coágulo. El

suero de diversos animales sirve de medio de cultivo en bacteriología : se le emplea líquido, ó solidificado (gelatinización del suero).

sufocación, *s. f.* (*suffocare*). Ahogo, asfixia causada por un obstáculo mecánico situado en el interior de las vías respiratorias, ó sobre la boca y la nariz.

sufusión, *s. f.* (*suffundere*, derramar por encima). Derrame.

sugestibilidad, *s. f.* « Aptitud á ser influído por una idea aceptada por el cerebro y á realizarla. » (Bernheim).

sugestión, *s. f.* « Acto por el cual se inculca una idea en el cerebro y se la hace aceptar por él ». (Bernheim).

sugilación, *s. f.* (*sugillare*, aporrear). 1° Ligera equímosis de la piel — 2° *lividez cadavérica*. Manchas violáceas debidas al aflujo sanguíneo á las partes declives del cadáver.

sulciformes (erosiones) (*sulcus*, surco) (Parrot). Lesión dental constituída por una ranura lineal hecha en la corona horizontalmente (sífilis hereditaria).

superalimentación, *s. f.* Modo de tratamiento que consiste en hacer ingerir al enfermo una cantidad de alimentos superior à la ración de manutención.

superembrionamiento, *s. m.* Véase ; *superfetación*.

superfecundación, *s. f.* (*super*, sobre, por encima). Fecundación de dos ó más óvulos (preñeces múltiples), efectuada en varios coitos durante el mismo período de ovulación.

superfetación, *s. f.* (*super*, sobre; *fetare*, engendrar). Fecundación de dos óvulos (preñeces gemelares) efectuada en dos coitos, en distintos períodos de ovulación. Equivale á la concepción de un segundo feto en el curso de una preñez.

superimpregnación, *s. f.* Fecundación de dos ó más óvulos (preñeces múltiples) en varios coitos más ó menos alejados.

superinvolución del útero. Exageración de la involución post-puerperal. El útero se atrofia aun cuando no haya alcanzado el sugeto la edad de la menopausa.

supertuberculización, *s. f.* (P. Carnot). Segunda infección tuberculosa, que sobreviene y evoluciona en el curso de una tuberculosis anterior.

supinación, *s. f.* (*supinus*, echado sobre la es-

palda). Movimiento del antebrazo que hace que la mano ejecute un movimiento de adentro á afuera.

supositorio, *s. m.* (*supponere*, colocar debajo), Preparación farmacéutica de consistencia sólida, en forma de cono, destinada á introducirse en el ano. Los supositorios están compuestos en general de un cuerpo grasoso (manteca de cacao), al cual se añade cera y al que se incorpora una sustancia medicinal.

supra-acromiotomía, *s. f.* (obstetricia). Operación que consiste en cortar profundamente los músculos de la región supraacromial para facilitar la acomodación del tronco (feto muerto), en el caso de pelvis viciada, ó cuando el parto deba practicarse rápidamente (eclampsia).

supramastitis, *s. f.* (*supra*, sobre; μαστός, mama). Nombre dado al flegmón superficial del seno, esto es, que se desarrolla por delante de la glándula, en la piel y tejido celular subcutáneo.

supranasal ó **supraorbitario (punto)**. Véase : *ofrion*.

suprarrenalitis, *s. f.* Inflamación de las cápsulas suprarrenales ; sobreviene ésta en el curso de una infección, generalmente, y se revela por dolores lumbo-abdominales, anorexia, vómitos, diarrea y postración con tendencia al colapso.

supuración, *s f.* Producción de pus.

surco de la sarna. Lesión cutánea característica de la sarna; consiste en un trayecto lineal que penetra oblicuamente en la capa epidérmica y termina en una elevacioncita : es cavado por la hembra del sarcoptes de la sarna que penetra en él para depositar los huevos.

Surmay (operación de) (1878). Véase : *yeyunostomía*.

surra, *s. f.* Tripanosomosis particular á los bovideos, original de la India y que se extiende sobre las Filipinas, Java y la isla Mauricio, donde es un azote análogo á la enfermedad tsetsé; el agente de trasmisión del parásito es igualmente una glosina.

suspensión (método de). Método de tratamiento de la tabes que consiste en colgar los enfermos durante algunos minutos por las axilas, la nuca y el mentón.

suspensorio, *s. m.* (*suspendere*). Vendaje que sirve para sostener los testículos.

suspirosa (respiración). Respiración que hace un ruido análogo á suspiros.

sutura, *s. f.* (*sutura*, costura, de *suo*, coso). Reunión, por medio de hilos, de cualesquiera partes divididas (labios de una herida, extremos de tendón ó de nervios cortados, etc.).

Swediáur (talalgia blenorrágica de). Véase : *talalgia.*

Sydenham (corea de). Véase : *corea.*

T

tabacosis, *s, f.* Neumoconiosis especial á los obreros empleados en la fabricación del tabaco (tamizaje del polvo de tabaco).

tabagismo, *s. m.* Intoxicación crónica por el tabaco.

tabes dorsal (*tabes*, consunción). Sin. *ataxia locomotriz progresiva, esclerosis de los cordones posteriores, leucomielitis posterior, degeneración gris de los cordones posteriores, enfermedad de Duchenne.* Afección caracterizada anatómicamente por la esclerosis de los cordones posteriores de la médula espinal, y clínicamente por trastornos de la motilidad, de los cuales el más importante es la incoordinación motriz con conservación de la fuerza muscular, por la abolición de los reflejos y por diversos desórdenes subjetivos y objetivos de la sensibilidad.

tabes dorsal espasmódica (Charcot, 1875). Sin. : *parálisis espinal espasmódica* ó *espástica* (Erb.). Afección medular caracterizada, desde el punto de vista anatómico, por la esclerosis simétrica de la porción intramedular de los manojos piramidales; y, desde el punto de vista clínico, por una seudoparálisis espasmódica que hiere sobre todo los miembros inferiores. Corresponde en el adulto á la enfermedad de Little de la infancia. Véase : *Little* (*enfermedad de*).

tabes mesentérica. Término que sirve para designar la tuberculosis de los ganglios mesentéricos. — Los antiguos autores franceses llamaban *carreau* (ladrillo) ésta, como otras afec-

ciones de la infancia, que se presentaban con tumefacción y gran dureza del vientre, junto con caquexia generalizada.

tabescencia, *s. f.* (*tabescere*, languidecer). Marasmo, agotamiento de fuerzas, enflaquecimiento.

tabeto-cerebelosa (marcha) (Charcot). Andar particular observado en la enfermedad de Friedreich, y que á la vez participa de la marcha del atáxico vulgar (piernas proyectadas inhábilmente á uno y otro lado) y de la titubeación propia de las lesiones cerebelosas.

tacto, *s. m.* Modo de investigación empleado en obstetricia y cirugía, que consiste en introducir el índice, ó el índice y el dedo medio, y á veces toda la mano, en las cavidades naturales que se quiere explorar. Ej. : *tacto vaginal*, *tacto intra-uterino*, *tacto resical*, *tacto rectal tacto rino-faringeo*. Se combina generalmente con la palpación.

tafofobia, *s. f.* (τάφος, tumba; φόβος, temor) (Morselli). Excesivo temor, con obsesión, de ser enterrado vivo.

talalgia, *s. f.* (*talus*, talón; ἄλγος, dolor) (Desprès). Sin. : *ternalgia*. Dolor de la faz inferior del talón; síntoma que se observa en diferentes afecciones y particularmente en la blenorragia (*talalgia blenorrágica de Swediáur*).

talasofobia, *s. f.* (θάλασσα, mar; φόβος, temor). Aprensión angustiosa que experimentan algunos sugetos (degenerados) en presencia del mar.

talasoterapia, *s. f.* (θάλασσα, mar; θεραπεία, tratamiento). Empleo terapéutico de los baños de mar y del aire del mar.

Talma (operación de). Sin. : *omento-fijación*, *epiplopexia*. Operación que consiste en fijar, después de una laparotomía, el gran epiplón á la pared abdominal anterior; está destinada á impedir la formación de la ascitis en las cirrosis, creando entre el sistema porta y la vena cava numerosas anastomosis por donde se establece una circulación colateral.

talus, *adj* (*talus*, talón). Véase : *pie zambo*.

talla, *s. f.* Sin. : *cistotomía*. Operación que consiste en practicar la abertura de la vejiga á través de las partes blandas para extraer un cálculo. — Por analogía se emplea á veces esta palabra para designar la extrac-

ción de un cuerpo extraño de una cavidad natural por una abertura operatoria. Ej. : *talla articular, talla intestinal, talla estomacal.*

tanatofobia, *s. f.* (θάνατος, muerte; φόβος, temor). Excesivo temor, enfermizo, á la muerte.

tapir (labio de). 1° Nombre dado al labio superior, en sumo grado prominente, que se observa en la *facies miopática.* —2° Este término de comparación se emplea á veces en ginecología en los casos de hipertrofia del labio anterior del cuello del útero.

tapón endodérmico. Sin. : *tapón de Ecker.* Grupo de celulas endodérmicas introducidas en el blastóporo y que llenan este orificio.

taponamiento, *s. m.* Medio de hemostasis que consiste en la introducción de tapones, fuertemente apretados, en una cavidad que es asiento de una hemorragia (fosas nasales, vagina, útero, herida, etc.), de manera de efectuar la compresión de los vasos.

tapotaje (signo del) (H. Erni) (calco del francés *tapotage*). Signo que revela la existencia de una caverna pulmonar superficial. Cuando se percute suavemente el vértice del pulmón de un tísico con el mango de un cuchillo tenido por la extremidad de la lámina, se provoca á veces en ciertos puntos una reacción siempre semejante á sí misma. A cada golpe el enfermo es atacado de una quinta de tos y expectora en seguidas. Se ha preconizado igualmente esta maniobra, que favorece la desecación de las cavernas, como adyuvante terapéutico.

tapoteo, *s. m.* (calco de *tapotement*, en francés : aporreo suave). Modo de masaje que consiste en una serie de choques superficiales ó profundos, ejecutados, ya con los dedos, ya con el borde cubital de la mano, ya con el puño cerrado.

taquicardia, *s. f.* (ταχύς, ligero; καρδία, corazón) (Gerhardt, 1882). Aceleración del ritmo de los latidos cardiacos. Síntoma que se manifiesta en gran número de afecciones del sistema nervioso, de las vías respiratorias, de las digestivas, y del aparato circulatorio.

taquicardia esencial paroxística (Bouveret, 1889). Afección de naturaleza aún desconocida (considerada generalmente como una neurosis bulbar ó

bulbo-espinal), que consiste en el aumento considerable del número de los latidos cardiacos (190 á 200 y aún más, por minuto), con hipertensión vascular y elevación de la temperatura, sin lesión cardiaca apreciable, y que sobreviene bruscamente por accesos de duración muy variable (algunos minutos á varias horas), los cuales traen como resultado, por la frecuencia de su repetición, trastornos asistólicos.

taquicardia ortostática (Huchard). Taquicardia que se manifiesta al ponerse el enfermo de pie, acompañada á menudo de vértigo, cefalea, palpitaciones; todo lo cual desaparece al sentarse ó acostarse. Es debida á una hipotensión arterial muy notable.

taquipnea, *s. f.* (ταχύς, rápido; πνεῖν, respirar). Aceleración considerable del ritmo respiratorio. Síntoma común á gran número de afecciones diversas.

tarantulismo ó **tarantismo**, *s. m.* (tarántula: se creía que la picadura de esta araña venenosa causaba el *tarantulismo*). Variedad de *corea histérica* muy análoga á la *corea saltatoria*, que reinó epidémicamente en Italia por el siglo XVIII.

tarsalgia de los adolescentes. Sin.: *pie chato valgus doloroso, tarsoptosis*. Afección caracterizada por el hundimiento de la bóveda plantar con desviación del pie hacia afuera, acompañado de dolores en el tarso, que sobreviene en jóvenes de 15 á 20 años, á consecuencia de marchas forzadas ó de estación vertical prolongada.

tarsectomía, *s. f.* (ταρσός, tarso; ἐκτομή, excisión). Operación que consiste en la extirpación de una ó de las dos hileras de los huesos del tarso (*tarsectomía anterior* ó *posterior; tarsectomía total*), ó sólo de algunos de los huesos del tarso (*tarsectomía compleja*).

tarsitis sifilítica (Magawly). Afección de los párpados de origen sifilítico, que consiste en un espesamiento considerable de los tarsos con caída de las pestañas.

tarsoptosis, *s. f.* (ταρσός; πτῶσις, caída). Véase: *tarsalgia de los adolescentes.*

tarsorrafia, *s. f.* (ταρσός; ῥαφή, sutura). Sutura de los cartílagos tarsos. Véase: *bléfarorrafia.*

tarsostrofia, *s. f.* (ταρσός; στροφή, inversión). Operación de cirugía ocular

empleada en el tratamiento del tracoma, la cual consiste en disecar un fragmento mirtiforme del cartílago tarso y volverlo á colocar en su puesto, mas, al revés.

tarsotomía, *s. f.* (ταρσός; τομή, sección). Operación de cirugía ocular destinada á corregir el ectropión; consiste en resecar una parte de la cara anterior del cartílago tarso.

tartamudeo, *s. m.* ó **tartamudez**, *s. f.* Dificultad de la pronunciación caracterizada por la repetición de una misma sílaba, la vacilación y la suspensión convulsiva ante ciertas palabras, suspensión que se efectúa más bien al principio de las frases.

tautómeros (neuronas medulares) (ταύτό por τὸ αὐτό, el mismo; μέρος, mitad). Neuronas de asociación, cuyos cuerpo celular, cilindro-eje y terminaciones se hallan comprendidos, por completo, en la misma mitad de la médula.

taxia, *s. f.* (τάξις, ordenamiento). Sin. : *tropismo*. Influencia atractiva ó repulsiva ejercida por ciertas sustancias ó ciertos fenómenos sobre el protoplasma. Estos dos vocablos, *taxia* y *tropismo*, no se emplean generalmente sino combinados con otros. Ej. : *quimiotaxia*, *heliotropismo*.

taxinomía, *s. f.* (τάξις; νόμος, ley). Véase : *biotaxia*.

taxis, *s. f.* (τάξις, ordenamiento). Maniobras que consisten en presiones metódicas hechas con la mano, y destinadas á hacer que un órgano vuelva á ocupar la cavidad que le corresponde. Esta voz se aplica sobre todo á la reducción de las hernias, del fímosis, etc.

tefromielitis, *s. f.* (τεφρός, ceniciento, gris; μυελός, médula). Inflamación de los cuernos del eje gris de la médula espinal. Esta lesión, aislada, no se encuentra sino en los cuernos anteriores; cuando evoluciona rápidamente da lugar al síndroma de la parálisis espinal infantil ó de la parálisis espinal aguda del adulto (más rara).

telangiectasia, *s. f.* (τῆλε, lejos; ἀγγεῖον, vaso; ἔκτασις, dilatación). Dilatación de los vasos lejanos del corazón. Véase : *angioma simple*.

telegonía, *s. f.* (τῆλε, lejos; γονή, generación). Véase : *impregnación 2ª*.

telolecítico (huevo) (τῆλε, lejos; λέκιθος, yema de huevo). Sin. : *huevo meroblástico*. Nombre dado á los huevos en que el vitelo

nutritivo (lecito) se halla distintamente separado del vitelo formativo, y constituye al lado de éste una masa que no participa en la segmentación. Huevo de segmentación parcial (reptiles, peces, pájaros).

telotismo, *s. m.* (τέλος, acabamiento). Se dice de la rigidez de los órganos eréctiles.

telúricas (fiebres) (*tellus*, tierra). Véase : *paludismo.*

temblor, *s. m.* Agitación involuntaria del cuerpo ó de algunos miembros, de pequeñas oscilaciones, compatible con la ejecución de movimientos voluntarios, los cuales no se interrumpen por ella, aunque pierden en precisión.

temperamento, *s. m.* Se entiende actualmente por *temperamento* « todo lo que se refiere á las variaciones individuales de la actividad nutritiva y funcional... El *temperamento* toca pues á la actividad del organismo : es una característica dinámica » (Bouchard).

temporal (signo de la) (Dieulafoy). Signo del pequeño brightismo, que consiste en la dilatación flexuosa de la arteria temporal, con induración del vaso. Este signo es debido á la hipertensión arterial.

tenacilla, *s. f.* Pinza empleada en la operación de la talla para agarrar los cálculos en la vejiga abierta.

tenáculo, *s. m.* (*tenere*, sostener). Instrumento en forma de aguja curva, que sirve para enganchar los vasos que van á ligarse y tirar de éstos (no se emplea ya).

tenalgia, *s. f.* (τένων, tendón; ἄλγος, dolor). Dolor en los tendones.

tenalgia crepitante. Véase : *sinovitis crepitante.*

tenesmo, *s. m.* (τείνειν, tierno). Sensación de tensión, dolorosa, y de ardor, que se experimenta, ya en el ano por la inflamación del recto, ya en el cuello de la vejiga á causa de la cistitis.

tenia, *s. f.* (ταινία, cinta). Familia de gusanos del orden de los Cestodos, que comprende numerosas especies, parásitas del hombre ó de los animales superiores. Los unos se encuentran en estado adulto en el tubo digestivo del hombre (*tænia solium*, *tænia saginata*, etc.) ; otros son parásitos de la especie humana bajo la forma de equinococos ó de hidátides, estadio de evolución intermediario entre el embrión y el estado adulto.

tenífugo, *adj.* y *s. m.* Vermífugo empleado espe-

cialmente contra las tenias.

tenonitis, *s. f.* Véase : *capsulitis*.

tenoplastia, *s. f.* (τένων, tendón; πλάσσειν; forma). Ingerto tendinoso, operación que consiste en interponer un pedazo de tendón de animal (perro) entre los extremos de un tendón seccionado, cuando estos extremos se hallan demasiado alejados el uno del otro para ser suturados directamente.

tenorrafia, *s. f.* (τένων; ῥαφή, sutura). Sutura de los tendones.

tenosinovitis, *s. f.* Inflamación simultánea del tendón y de la vaina sinovial que lo rodea.

tenosinovitis aguda seca (Volkmann). Véase : *sinovitis crepitante*.

tenositis, *s. f.* (τένων, tendón). Nombre colectivo de todas las inflamaciones de los tendones.

tenositis crepitante. Véase : *sinovitis crepitante*.

tenotomía, *s. f.* (τένων, tendón; τομή, sección). Operación que consiste en seccionar un tendón para enderezar un miembro ó un fragmento de miembro. Se aplica igualmente este término á la sección de las bridas fibrosas cicatriciales que dificultan ciertos movimientos ó mantienen un miembro, ó segmento de miembro, en una posición defectuosa.

tensión intermitente del epigastrio (Bouveret, 1801). Signo muy precoz de la estenosis del píloro que consiste en un levantamiento de la parte izquierda del epigastrio. Esta tumefacción más ó menos resistente á la palpación desaparece y reaparece sin ondulación de la pared; es debida á un espasmo tónico de la pared gástrica.

teomanía, *s. f.* (θεός, dios; μανία, manía) (Esquirol). Monomanía religiosa contemplativa.

terabdela, *s. f.* (τηρεῖν, tomar; βδέλλα, sanguijuela). Instrumento compuesto de ventosas unidas á una máquina neumática, que sirve para practicar sangrías locales.

terapeuta, *s. m.* (θεραπεύειν, cuidar). Médico que se ocupa especialmente en la terapéutica.

terapéutica ó **terapia**, *s. f.* (θεραπεύειν, cuidar). Parte de la medicina que trata de los medios propios para curar ó aliviar las enfermedades.

teratogenia, *s. f.* (τέρας, monstruo; γεννᾶν,

engendrar). Producción de monstruosidades.

teratoide (tumor). Véase : *teratoma.*

teratología, *s. f.* (τέρας, monstruo; λόγος, discurso). Estudio de las anomalías y de las monstruosidades de los seres organizados.

teratoma, *s. m.* Sin. : *tumor organoide* (Virchow) ó *teratoide.* Nombre dado á veces á los tumores complejos, mixtos, ó de tejidos múltiples, para recordar su desarrollo á expensas de gérmenes embrionarios (Teoría de la inclusión de Cóhnheim).

teratópago, *s. m.* (τέρας, monstruo; παγείς, unidos). Nombre dado á veces á todos los monstruos dobles.

terciana (fiebre) (*tertianus*, tercero). Variedad de fiebres intermitentes cuyos accesos vuelven cada tercer día, dejando entre sí un día intercalar.

terciana doble (fiebre). Variedad de fiebre intermitente que presenta dos accesos dos días consecutivos, luego un día de intermitencia. — Para la escuela italiana la *terciana doble*, es una *cuotidiana* que resultaría del desarrollo en la sangre de dos generaciones de *hematozoarios de la terciana*, con 24 horas de intervalo. La anterior sería *cuartana doble.*

terebelo, *s. m.* (*terebellum*, trépano). Especie de perfora-cráneo ; instrumento que sirve en obstetricia para practicar la embriotomía.

terebración, *s. f.* (*terebrare*, perforar). Perforación.

terebrante, *adj.* (*terebrare*, perforar). Que tiene propensión á cavar, á adquirir profundidad. Ej. : *ulceración terebrante, fagedenismo terebrante.* — Se emplea también dicho término hablando de un dolor profundo que parece producido por la penetración de un cuerpo vulnerante.

téreon, *s. m.* (πτερόν, ala, apófisis terigoide). Región en que se encuentran las suturas de los huesos frontal, parietal, temporal y esfenoidal, formando comúnmente una H.

terigion, *s. m.* (πτερύγιον, ala pequeña). Sin. : *unglada.* Espesamiento membranoso de la conjuntiva, que presenta la forma de un triángulo de base periférica y de vértice dirigido hacia la córnea, sobre la cual tiende más y más á ganar terreno.

terigoides de la conjuntiva (πτέρυξ, ala;

εἶδος, forma). Pliegues de la conjuntiva que, después de recibir un traumatismo, se ingertan á veces sobre la córnea, y pueden ser tomados por un terigion.

terigoideas(placas) (Parrot). Ulceraciones situadas de una manera perfectamente simétrica sobre las partes laterales de la bóveda palatina de los niños de pecho atrépsicos. Corresponden á la eminencia mamilada que forman en esos puntos, bajo la mucosa, las apófisis terigoides.

termo-analgesia ó **termo-anestesia,** *s. f.* (θέρμη, calor). Abolición de la sensibilidad normal al calor.

termocauterio, *s. m.* (θέρμη, calor; cauterio) (Paquelin). Instrumento que sirve para hacer cauterizaciones ígneas. Está compuesto de un tallo hueco de platino que se mantiene incandescente por una corriente gaseosa, formada de una mezcla de aire y de vapores hidrocarbonados.

termo-estesia, *s. f.* (θέρμη; αἴσθησις, sensibilidad). Sensibilidad al calor. Su comprobación, muy importante en ciertas afecciones nerviosas (siringomielia), se hace por medio de un termómetro cuyo depósito mercurial está cubierto de modo que se puede calentar á voluntad (termo-estesiómetro).

termofobia, *s. f.* (θέρμη; φόβος, temor). Temor á las colchas y vestidos demasiado calientes, que experimentan algunos enfermos (*bocio exoftálmico*, *enfermedad de Párkinson*), á consecuencia de la sensación de calor que constantemente los atormenta.

termogenesia, *s. f.* (θέρμη; γεννᾶν, engendrar). Nombre dado al desarrollo continuo y regular del calor en los seres vivos.

termopalpación, *s. f.* (Benczur y Jonas, 1890). Modo de examen basado sobre la diferencia de las sensaciones térmicas que experimenta la mano que palpa la región precordial; obtendríase así en las zonas mates, normales ó patológicas, una sensación más fría que en las zonas sonoras; por modo que se podría llegar á limitar, con un poco de hábito, los órganos que contienen aire y los que no lo contienen.

termoterapia, *s. f.* (θέρμη; θεραπεία, tratamiento). Empleo terapéutico del calor.

termotropismo, *s. m.* (θέρμη; τρεπεῖν, girar). Propiedad del protoplasma de

responder á la acción del calor.

ternalgia, *s. f.* (πτέρνα. talón; ἄλγος, dolor). Véase: *talalgia*.

testículo irritable (A. Cooper). Neuralgia esencial del testículo, sin lesión aparente, semejante á las neuralgias ováricas de la histeria.

test-object, *s. m.* (inglés: *test*, prueba; *object*, objeto). Preparación microscópica que sirve para comparar el valor de los microscopios y de sus objetivos.

tetania, *s. f.* (τείνειν, tierno) (L. Corvisart). Síndroma caracterizado por contracturas de las extremidades, capaces de extenderse á los miembros y á veces al tronco; proceden por accesos, mas pueden ser provocadas artificialmente por la compresión de los vasos y de los nervios de los miembros atacados. La *tetania* es producida por una intoxicación casi siempre de origen gastro-intestinal (dilatación del estómago, etc.), ó debida á la ablación de la glándula tiroidea ó de las glándulas paratiroides. Se la observa igualmente en las enfermedades infectivas (sarampión, escarlatina, viruela).

tétanos, *s. m.* (τείνειν, tierno). Sin.: *trismus* ó *mal de las mandíbulas*. Enfermedad determinada por un microbio especial (bacilo de Nicolaïer), y debida á la intoxicación por la toxina que segrega este microbio en el punto en que vegeta (generalmente una herida exterior); está caracterizada clínicamente por una contractura dolorosa que por lo común empieza en los músculos masticadores (*trismus*), invade en seguidas progresivamente la nuca, el tronco y los miembros, con accesos convulsivos muy dolorosos que se presentan á la más ligera excitación.

tetrágeno ó **tetracoco**, *s. m.* (*micrococcus tetragenus*). Micrococo de la saliva cuyos elementos se disponen á menudo de cuatro en cuatro.

tetraplejía, *s. f.* (τέτρα, de τέσσαρα, cuatro; πλήσσειν, herir). Sin.: *cuadruplejía*. Parálisis de los cuatro miembros.

Thiersch (ingerto de). Ingerto epidérmico.

Thiriar (método de) (1899). Tratamiento de los forúnculos y ántrax por la inyección intradérmica de oxígeno bajo presión.

Thomsen (enfermedad de) 1876). Sin.: *miotonía congénita*. Afección por lo común familial y heredi-

taria, que forma parte del grupo de las miopatías, y cuya expresión clínica reside en un trastorno particular de la contracción de los músculos voluntarios. Al principiar un movimiento el músculo se pone en estado de rigidez espasmódica, estado que cede pronto y desaparece al reproducir el mismo movimiento; los músculos presentan una reacción eléctrica especial llamada reacción miotónica.

thrill, *s. m.* (inglés *thrill*, estremecimiento). Estremecimiento particular que se percibe en las aneurismas.

Thure-Brandt (posición de). Posición en la que se solicita el relajamiento máximum de la pared abdominal para combinar la palpación con el tacto vaginal. La enferma se coloca en decúbito dorsal con los puños debajo de la cadera, caída la cabeza sobre el pecho y los extremos inferiores doblados sin apoyarse más que en la punta de los pies; así, hace aquélla respiraciones profundas.

tialismo, *s. m.* (πτύαλον, saliva). Sin.: *sialorrea, flujo salival, salivación.* Secreción salival exagerada que puede alcanzar á 4 ó 5 litros (sin contar la saliva tragada). El tialismo se observa en diversas neurosis (histeria, neurastenia, etc.), en la preñez, en ciertas lesiones nerviosas (parálisis labio-glosolaringea, parálisis facial, etc.), en las estomatitis (particularmente en la estomatitis mercurial).

tic, *s. m.* (alemán *ticken*, tocar ligeramente). « Movimiento convulsivo habitual y consciente, que resulta de la contracción involuntaria de uno ó varios músculos del cuerpo, y que reproduce, mas de una manera intempestiva, algún gesto reflejo ó automático de la vida orgánica ». (G. Guinon.) — El *tic* es un síntoma; se asocia á menudo con otros fenómenos (ecomatismo, coprolalia, etc.), de modo que forma un sindroma llamado *enfermedad de los tics convulsivos* (Gilles de la Tourette, 1885), que debe ser clasificado como uno de los sindromas episódicos de la degeneración hereditaria.

tic doloroso de la cara. Sin.: *neuralgia epileptiforme* (Trousseau). Variedad de neuralgia facial caracterizada por crisis excesivamente dolorosas, acompañadas de contracción involuntaria de los músculos de la región atacada.

tífico, *adj.* (τύφος, estupor). Que se refiere á la

fiebre tifoidea. Enfermo atacado de fiebre tifoidea.

tifización urinémica (Peter). Véase: *uremia*.

tiflitis, *s. f.* (τυφλός, ciego). Inflamación del intestino ciego. — La importancia de esta enfermedad ha disminuído mucho desde que se ha demostrado que la mayoría de las *tiflitis* eran peritonitis localizadas al rededor del ciego y de su apéndice (apendicitis y periapendicitis).

tiflostomía, *s. f.* (τυφλός; στόμα, boca) (Folet, 1885). Creación de un ano artificial en el ciego.

tifo ó **tifus abdominal.** Véase: *tifoidea* (*fiebre*).

tifo ó **tifus ambulatorio** (Griesinger). Forma de fiebre tifoidea en la que el paciente se siente tan poco enfermo que continúa en sus ocupaciones. La benignidad de esta forma es puramente aparente; accidentes muy graves (hemorragia, perforación intestinal) pueden sobrevenir.

tifo ó **tifus exantemático.** Sin.: *tifus petequial*. Enfermedad infectiva, contagiosa y epidémica, caracterizada, clínicamente, por el principio brusco con fiebre intensa inmediata, un exantema generalizado con tendencia á las hemorragias, y trastornos nerviosos análogos á los de la fiebre tifoidea.

tifo ó **tifus de los perros.** Variedad de fiebre tifoidea modificada por la malaria, observada en Bosnia y en Herzegovinia.

tifo ó **tifus de los miembros.** Nombre dado á veces á la *osteomielitis de los adolescentes*.

tifo ó **tifus recurrente** ó **de recaída.** Véase: *recurrente* (*fiebre*).

tifobacilosis, *s. f.* Forma de tuberculosis miliar aguda en la que predominan los fenómenos generales, lo que le da cierta semejanza clínica con la fiebre tifoidea.

tifoide ó **tifoideo (estado)** (τύφος, estupor; εἶδος, forma). Que semeja al tifus. Estado particular de estupor y abatimiento que se encuentra en la fiebre tifoidea, el tifus, y en algunas enfermedades agudas designadas á veces, por esta razón, bajo el nombre de *afecciones tifoideas*.

tifoidea (fiebre) (Louis, 1829). Sin.: *dotinenteria*, *fiebre continua*, *tifus abdominal* (en Alemania). Enfermedad infectiva, contagiosa, debida á un bacilo especial (*bacilo de Eberth*),

caracterizada desde el punto de vista anatómico por lesiones de las placas de Peyero y de los folículos cerrados del intestino, y desde el punto de vista clínicó, por el estado tifoideo, la elevación de la temperatura, que evoluciona de una manera cíclica, por trastornos nerviosos é intestinales, y por una erupción discreta de manchas rosadas lenticulares.

tifomalárica (fiebre). Fiebre tifoidea cuya marcha clínica es modificada por el paludismo. Esta forma se observa en los países en que reina la fiebre intermitente. A veces, la fiebre, tifoidea despierta el germen de la enfermedad en un antiguo paludoso; otras, las dos afecciones son contemporáneas.

tifomanía, *s. f.* (τύφος, estupor; μανία, delirio). Delirio con estupor, observado en la fiebre tifoidea y el tifus.

tigeditis, *s. f.* (Séverin). Contractura de los músculos de la nuca en el tétanos.

tilosis gonfosa, (τύλος, callo) (Alibert). Véase : *callo.*

tímica (asma). Véase: *Kopp* (*asma de*).

timpánico (sonido) (τύμπανον, tambor). Sonoridad particular de timbre agudo que presentan normalmente ciertas regiones del cuerpo, cuando se las percute (hipocondrio izquierdo cuando el intestino se halla distendido por gases). Esta sonoridad puede encontrarse á veces en los pulmones y entonces es indicio de un derrame de gas en la pleura (neumotórax).

timpanismo, *s. m.* Estado del abdomen cuando el intestino se halla distendido por gases.

timpanitis, *s. f.* 1° Distensión considerable del abdomen por gases intestinales ó por gases que se desprenden en el peritoneo en ciertos casos de peritonitis. — 2° Inflamación de la caja del tímpano, otitis media.

tindalización, *s. f.* (Tyndall). Procedimiento de esterilización que consiste en llevar varias veces seguidas, con veinte y cuatro horas de intervalo, una sustancia fermentescible (medio de cultivo) á una temperatura (80°-100°) que destruye los micro-organismos, pero que no altera la composición química del medio. Los esporos no destruídos por la primera operación se desarrollan y los microbios engen-

drados por ellos son luego muertos en las sucesivas.

tintín metálico. Véase : *retintín metálico.*

tintura, *s. f.* (*tingere*, teñir). Medicamento compuesto por la disolución de los principios activos de una ó más sustancias medicinales en un líquido apropiado (*tintura acuosa, alcohólica, etérea*).

tiña, *s. f.* (*tinea*, tiña, insecto). Término genérico con el que designaban los antiguos autores todas las afecciones del cuero cabelludo, particularmente las de la infancia; hoy este vocablo no tiene significación precisa en el lenguaje médico; se le emplea aún á veces en la expresíon *tiña favosa* para designar al favus, y en la de *tiña tundente* para designar la tricofitia del cuero cabelludo.

tiraje (mejor : **tiro**), *s. m.* Fenómeno que consiste en la depresión de la pared torácica, ya encima del esternón (*tiraje supra-esternal*), ya debajo (*tiraje subesternal*), en las inspiraciones fuertes, cuando la entrada del aire al pecho encuentra algún obstáculo mecánico. Se debe á que la acción de la presión atmosférica, á consecuencia del vacío intratorácico que en estos casos se produce, no halla el contrapeso normal; es más frecuente en los niños cuyo tórax es menos rígido.

tireofima agudo (thyreophyma acutum). Véase : *tiroiditis.*

tireoptosis, *s. f.* Dislocación de la glándula tiroide, que se encuentra descendida y situada en la parte superior del tórax.

tiriasis, *s. f.* (φθείρ; piojo). Sin. : *afección pedicular, pediculosis.* Dermatosis provocada por la presencia, en una parte del cuerpo ó en toda la superficie, de gran número de parásitos pertenecientes á una de las tres variedades siguientes : *pediculus capitis*, piojo de la cabeza; *pediculus vestimentorum seu corporis*, piojo de los vestidos ó del cuerpo; *pediculus pubis* ó *phtirius pubis*, piojo del pubis.

tiro, *s. m.* Véase : *tiraje.*

tiroidectomía, *s. f.* (tiroide; ἐκτομή, resección). Operación quirúrgica que consiste en la extirpación total ó parcial de la glándula tiroide sana ó enferma.

tiroidismo, *s. m.* (Béclère, 1894). Conjunto de los accidentes provocados por la intoxicación tiroidea y observados á consecuencia de la

ingestión, con un fin terapéutico, de glándula tiroidea. Dichos accidentes recuerdan los síntomas de la *enfermedad de Basedow*.

tiroiditis, *s. f.* Sin : *bocio inflamatorio* ó *agudo*, *thyreophyma acutum*. Nombre genérico de todas las inflamaciones de la glándula tiroidea.

tiroido-eretismo, *s. m.* (Poncet). Operación que consiste en descubrir, en cierta extensión, los lóbulos tiroideos atrofiados y clavar en pleno parenquima glandular cuerpos extraños asépticos (marfil, ebonita). Esta operación, practicada en casos de distiroidismo, excita de manera continua el funcionamiento de la glándula y despierta las funciones adormidas.

tiroidoterapia, *s. f.* (tiroide ; θεραπεία, tratamiento). Empleo terapéutico del cuerpo tiroide.

tiroitoxemia, *s. f.* Sin. : *seudo-basedovismo post-operatorio*. Fenómenos de hipertiroidación que se observan á veces á consecuencia de una intervención en la glándula tiroide, cuando los productos segregados no pueden salir libremente por la herida operatoria.

tirotomía, *s. f.* (tiroide; τομή, sección). Laringotomía practicada sobre el cartílago tiroide, el cual se corta.

tisana, *s. f.* (πτισάνη, cebada molida). Cocimiento de cebada molida que administraban los antiguos á los enfermos. — Infusión ó cocimiento muy diluídos de cualquiera sustancia vegetal, que se da á los enfermos. Las *tisanas* contienen poca sustancia medicinal y se administran como adyuvantes de medicamentos más activos.

tisiofobia, *s. f.* (φθίσις, consunción; φόβος, temor). Miedo morboso á la tuberculosis pulmonar.

tisiología, *s. f.* (φθίσις; λόγος, discurso). Estudio de la tisis.

tisioterapia, *s. f.* (φθίσις; θεραπεία, terapéutica). Terapéutica de la tuberculosis pulmonar.

tisis, *s. f.* (φθίσις, consunción, de φθίω, destruyo). Nombre genérico dado antes á todas las afecciones pulmonares crónicas, que eran acompañadas de supuración abundante y de fiebre héctica y terminaban por la muerte. Actualmente es sinónimo de *tuberculosis pulmonar*, y corresponde tanto á las formas agudas y subagudas como á las crónicas.

tisis aguda. Forma aguda de la tuberculosis en la que la evolución es dema-

siado rápida para que el proceso llegue á la ulceración.

tisis crónica ó ulcerosa. Forma común de la tuberculosis pulmonar, caracterizada desde el punto de vista anatómico por la formación de tubérculos, su reblandecimiento y su transformación en cavernas; desde el punto de vista clínico, por el principio insidioso y la marcha lenta, susceptible de detenerse y de curarse.

tisis dorsal. Véase: *Pott (mal de)*.

tisis galopante. Forma rápida de la tisis ulcerosa. Es una tisis común « que no hace jornadas » (Grancher y Hutinel).

tisis laringea. Laringitis tuberculosa.

tisis de los mineros. Véase: *antracosis*.

tisis ocular. Véase: *oftalmomalacia*.

tisis de los talladores de piedra. Véase: *calicosis*.

tisuria sacarina (φθίσις; οὖρον, orina). Nombre dado á veces al estado particular de caquexia á que llegan los diabéticos flacos en el período terminal; caquexia no sólo debida á la glicosuria, sino también á la pérdida considerable de urea y á la tuberculosis pulmonar concomitante.

tlipsencéfalo, *s. m.* (θλίψις, aplastamiento; ἐγκέφαλος, encéfalo) (I. G. St-Hilaire). Monstruo sendencefálico que en vez de cerebro presenta un tumor fungoso prolongado hacia atrás hasta el agujero occipital, y á veces hasta las primeras vértebras cervicales anchamente abiertas.

tocología, *s. f.* (τόκος, parto; λόγος, discurso). Tratado de los partos.

Todd (marcha de) (1856). Andar del enfermo atacado de hemiplejia histérica. Camina arrastrando el pie por el suelo, y aún frotando á veces el suelo con la punta ó la cara dorsal de los dedos. Marcha *dragando* (Charcot).

Todd (método de). Empleo del alcohol en la neumonía, y, de una manera general, en las infecciones agudas, como alimento « capaz de mantener el calor animal ».

tofo, tofus ó tofáceas (concreciones) (τόφος, toba). Concreciones de urato de soda que se depositan al rededor de las articulaciones y en el borde del pabellón de la oreja en los gotosos.

tokelau, *s. m.* Sin.: *tinea imbricata*. Dermatosis escamosa, muy pruriginosa,

que describe sobre la piel círculos concéntricos que se cortan entre sí y cubren los tegumentos de dibujos extraños. El *tokelau* respeta el cuero cabelludo, mas ataca las uñas. Es causado por una variedad de *aspergillus*, el *lepidophyton*, cuyo tejido miceliano se encuentra constantemente en las escamas epidérmicas. Dicha afección es muy esparcida en Indo-China.

tolosana (deformación) (antropología). Sin. : *deformación anular*. Deformación artificial del cráneo por una banda que, comprimiendo la frente con punto de apoyo en la nuca, estrangula la región media.

tomafagia, *s. f.* (πτῶμα, cadáver; φαγεῖν, comer). Vesania que consiste en comer cadáveres.

tomaína, *s. f.* (πτῶμα, cadáver) (Selmi, 1881). Nombre genérico dado á los numerosos alcaloides (inofensivos ó tóxicos) que se forman en los cadáveres en putrefacción.

Tomaselli (enfermedad de). Sin. : *fiebre quínica*. Fiebre acompañada de ictericia y de hématuria ó de hemoglobinuria, observada en algunos paludosos sometidos al tratamiento por la quinina. Según los médicos italianos, la causaría la intoxicación quínica.

tomentoso, *adj.* (*tomentum*, terciopelo). Se dice de una superficie cubierta de fibrillas cortas y apretadas semejantes al terciopelo.

tonel (signo del). Sensación especial experimentada por el dedo mojado paseado sobre la pared torácica, cuando llega sobre un derrame pleurítico.

tonicidad, *s. f.* (τόνος, tensión). Sin. : *tonus*. Manifestación particular de la elasticidad de los tejidos vivos, y especialmente del tejido muscular, la cual está bajo la dependencia del sistema nervioso central y periférico. Ej. : un músculo vivo (en las condiciones fisiológicas) presenta siempre cierto grado de tensión en virtud de la cual, si se le secciona, sus dos mitades se separan. Esta separación no se efectúa si el músculo está privado de inervación.

tónico, *adj.* y *s. m.* Medicamento que « reconstituye las fuerzas asimiladoras é imprime resistencia vital al organismo » (Trousseau y Pidoux).

tónica (convulsión).

tonismo, *s. m.* Convulsión que consiste en contracciones relativamente dura-

deras, que determinan una rigidez casi permanente interrumpida á veces por sacudidas.

tono, *s. m.* (*tonus*). Véase : *tonicidad.*

tonolisis, *s. f.* (τόνος, tensión ; λύειν, disolver). (Achard y Paisseau, 1905). Nombre dado á las alteraciones de las células consecutivas á las variaciones de la tensión osmótica.

tonsilotomo, *s. m.* (*tonsillæ*, amígdalas ; τομή, sección). Véase : *amigdalotomo.*

tópico, *adj.* y *s. m.* (τόπος, lugar). Medicamento aplicado al exterior.

topoalgia, *s. f.* (τόπος, lugar; ἄλγος, dolor) (Blocq). Dolor fijo cuyo sitio no corresponde á territorio anatómico ó fisiológico alguno. Existe á veces sola y puede considerársele entonces como una neurastenia monosintomática. Lo más á menudo coincide con estigmas neurasténicos.

topofobia, *s. f.* (τόπος; φόβος, temor). Temor mórbido á ciertos lugares; neurosis análoga á la agorafobia.

toracectomía, *s. f.* (θώραξ, pecho ; ἐκτομή, excisión). Resección de varias costillas, operación preconizada en las pleuresías purulentas antiguas.

toracentesis, *s. f.* (θώραξ; κεντεῖν, perforar). Operación que consiste en perforar con un trócar la pared torácica, para dar solida á una colección líquida de la pleura.

toracópago, *s. m.* (θώραξ; παγείς, unido). Monstruo doble formado por dos individuos unidos entre sí por el tórax.

toracoplastia, *s. f.* (θώραξ; πλάσσειν, formar). La resección de una parte del tórax en casos de empiema.

toracotomía, *s. f.* (θῶραξ; τομή, sección). La abertura quirúrgica del tórax.

toracojifópago, *s. m.* Monstruo doble monocefálico, intermediario entre los *toracópagos* y los *jifópagos*, caracterizado por la soldadura de los esternones, de los cartílagos costales y de los hígados, con dextrocardia en uno de los individuos, y comunicación de los dos pericardios.

toradelfo, *s. m.* (θώραξ; ἀδέλφος, hermano) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo doble monocefálico, caracterizado por la presencia de dos troncos netamente separados por debajo del ombligo (cuatro miembros pelvianos), y confundidos en

uno solo por encima (dos miembros torácicos, una sola cabeza).

tormidia intestinorum nervosa (cólicos nerviosos intestinales). Afección poco frecuente, caracterizada por violentas contracciones peristálticas ó antiperistálticas del intestino delgado, acompañadas de ruido de gluglú y de sensación de malestar. Esta afección es probablemente histérica.

torniola, *s. f.* (calco de *tourniole*. francés). Panarizo superficial peri-unguinal con tendencia á dar la vuelta de la uña.

Tórnwald (angina de). Catarro retro-nasal crónico, localizado en uno de los recesos de la amígdala faringea, particularmente en el receso mediano.

tórpido, *adj.* (*torpidus*, inmóvil). Se aplica á las heridas, úlceras, lesiones, y aún á ciertas variedades de afecciones, que no manifiestan propensión alguna á mejorarse ó agravarse.

tortícolis, *s. m.* (*tortum collum*, cuello torcido). Sin.: *caput obstipum* ó *collum distortum*. Nombre dado á cualquiera posición viciosa de la cabeza, cualquiera que sea la causa. Para otros autores, el *tortícolis* está caracterizado por cierto grado de torsión del cuello con inclinación de la cabeza. — Según la causa, el tortícolis se divide en *tortícolis cutáneo, óseo* ó *articular*, y *muscular*. — Es al *tortícolis muscular* permanente, debido á la retracción del esterno-mastoideo, al que comúnnente se designa con el nombre de *tortícolis*. — *tortícolis mental* (Brissaud, 1893). Tic del cuello observado en ciertos degenerados; está caracterizado por el hecho de que el enfermo puede, completa é instantáneamente, enderezar la cabeza por un procedimiento que él elige. — *tortícolis espasmódico*. Tortícolis debido al espasmo de los músculos del cuello (irritación de los manojos piramidales).

tos, *s. f.* (*tussis*). Expiración brusca, en sacudidas, y ruidosa, voluntaria ó refleja, causada lo más á menudo por la irritación del neumogástrico (afecciones de las vías respiratorias). — Este reflejo puede tener otro punto de partida, y la tos ser sintomática de afecciones distintas á las de las vías respiratorias. Ej. : *tos uterina*, tos seca y ahogada que se observa en las lesiones uterinas, *tos histérica*, *tos gástrica*, *tos verminosa*, *tos*

en el espesor de una parte del organismo.

transfixión, *s. f.* (*transfigere*, traspasar). Procedimiento de amputación que consiste en atravesar con el cuchillo la parte que se va á amputar y luego cortar las carnes de dentro á afuera.

transforación, *s. f.* (*transforare*, traspasar). Operación que consiste en perforar el cráneo de un feto por medio de un aparato llamado *transforador*. — Primer tiempo de la basiotripsia.

transformismo, *s. m.* (Lamarck, 1809). Teoría biológica según la cual las especies animales y vegetales derivan las unas de las otras por la transformación lenta causada por la adaptación de los órganos á las condiciones de la existencia.

transfusión, *s. f.* (*transfundere*, verter de un vaso en otro). Operación que consiste en inyectar en las venas de un animal sangre tomada á otro animal de la misma especie ó de especie diferente. — Se da también á veces el nombre de *transfusión* á las inyecciones intravenosas de suero artificial.

transperitoneal, *adj.* Que atraviesa el peritoneo. Se dice de la manera de llegar hasta ciertos órganos profundos del abdomen (riñones, páncreas), por laparotomía.

transpleural, *adj.* Que atraviesa la pleura. Se aplica al método de llegar hasta ciertos órganos torácicos ó abdominales á través de ella.

transposición de las vísceras. Véase : *inversión* 1°.

traperos (enfermedad de los). Infección mal determinada; una de sus formas sería debida á la penetración del vibrión séptico por las vías respiratorias.

tráquea (signo de la) (Olivier, 1878). Signo que se comprueba en las aneurismas del cayado de la aorta y consiste en la sacudida brusca de abajo arriba que, á cada sístole cardiaca, imprime el tumor aneurismático al tubo laringotraqueal.

traqueítis, *s. f.* (τραχεῖα, tráquea, de τραχύς, nudoso). Inflamación de la tráquea. Generalmente coincide con laringitis ó con bronquitis.

traquelematoma, *s. m.* (τράχηλος, cuello; αἷμα, sangre). Hematoma del esterno-cleido-mastoideo en el recién nacido, á consecuencia de los tiramientos y ruptura de este músculo durante el parto. Se presenta bajo forma de un tumor más ó

menos voluminoso en la vaina del músculo, y coincide con tortícolis. Al cabo de unos meses efectúase generalmente la curación completa.

traquelismo, *s. m.* (Marshall Hall). Contracción espasmódica de los músculos del cuello, en el ataque de epilepsía, que pone obstáculo á la circulación venosa, de donde la turgescencia de la cara, la salida y mordedura de la lengua, etc.

traquelopexia ligamentosa (τράχηλος, cuello; πῆξις, fijación) (Jacobs). Operación que consiste en practicar la laparotomía abdominal supravaginal y en fijar el muñón cervical á los muñones de los ligamentos redondos. Su objeto es corregir el prolapso úterovaginal.

traquelorrafia, *s. f.* (τράχηλος, cuello; ῥαφή, sutura). Sin. : *operación de Emmet*. Operación destinada á reparar las desgarraduras del cuello uterino. Consiste en avivar y suturar una de las comisuras del hocico de tenca.

tráqueobroncoscopia, *s. f.* Véase : *broncoscopia*.

tráqueobronquitis, *s. f.* Traqueítis acompañada de bronquitis.

tráqueocele, *amb.* (τραχεία, tráquea; κήλη, tumor). Tumor gaseoso del cuello, formado por un derrame limitado de aire comunicante con la tráquea.

tráqueoscopia, *s. f.* (τραχεία; σκοπεῖν, examinar). Examen de la cavidad de la tráquea por medio de un instrumento análogo al laringoscopio, que se introduce por una abertura hecha por traqueotomía.

tráqueotomía, *s. f.* (τραχεία; τομή, sección). Operación que consiste en abrir la tráquea. Esta palabra se ha convertido en término genérico de todas las incisiones hechas en las vías aéreas superiores (laringotomía, tirectomía, tráqueotomía propiamente dicha), ya para extraer un cuerpo extraño, ya para facilitar la respiración cuando existe obstáculo en las partes superiores del árbol aéreo.

trasonancia percutatoria (Runeberg). Combinación de la auscultación y de la percusión que permite trazar los límites de dos órganos vecinos. El sonido trasmitido al oído por el estetoscopio se modifica cuando el dedo que percute pasa del órgano auscultado al órgano vecino (compárese con la *percusión*

plesimétrica y la *fonendoscopia*).

trasudado, *s. m.* (*trans*, á través; *sudare*, sudar). Líquido orgánico que mana á través de una superficie no inflamada (piel, mucosa, serosa) y obedece sólo á leyes mecánicas.

Traube (doble tono de). Doble ruido que se oye auscultando la arteria femoral, sin comprimirla, con el estetoscopio. Signo de la insuficiencia aórtica.

Traube (espacio de). Región de la pared torácica anterior, situada á la izquierda del esternón, limitada abajo por el borde costal, arriba por la zona mate cardiaca y afuera por la zona mate esplénica. Este espacio corresponde al fondo de saco pleural costo-diafragmático y al estómago situado detrás. Es normalmente sonoro y no se vuelve mate sino en el caso de un derrame pleural izquierdo; su macicez revela un derrame abundante (superior á dos litros).

Traube (ley de). Toda nefritis intersticial tiende á producir la hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón.

trauma, *s. m.* (τραῦμα. herida). Herida, lesión local producida por una violencia exterior.

traumatismo, *s. m.* « Estado general especial, enteramente creado por la acción de una violenca externa sobre el organismo » (Verneuil). Esta palabra se emplea con frecuencia, erróneamente, en el sentido de trauma.

traumatopnea, *s. f.* (τραῦμα, herida; πνεῖν, respirar) (Fraser, 1859). Entrada y salida, por lo general ruidosa, del aire á través del orificio de una herida torácica que hace comunicar la pleura con el aire exterior (neumotórax).

tremulación epileptoide. Véase : *clonus*.

Trendelenburg (posición de). Sin. : *posición dorso-sacra declive*. Posición en la que la enferma reposa sobre el dorso con la pelvis más alta que los hombros (ginecología).

trepanación, *s. f.* Operación que consiste en practicar un orificio en un hueso, con el trépano, con la gubia y el mazo, ó con cualesquiera otros instrumentos.

trépano, *s. m.* (τρυπάω, perforo). Instrumento en forma de berbiquí que sirve para horadar los huesos y más particularmente los del cráneo.

trepidación epilep-

toide ó **espinal** (*trepidare*, temblar). Véase: *clonus*.

treponema, *s. m.* Género de protozoarios flagelados cuyo cuerpo en espiral, no aplanado, se halla desprovisto de membrana ondulante y posee en cada extremo una flagela. La multiplicación se hace por división longitudinal. La única especie cierta es el *treponema pallidum*, clasificado primero en el género *spirochæte* y que parece ser el agente patógeno de la sífilis.

treponemiasis, treponemosis, *s. f.* Nombres genéricos de las enfermedades causadas por el treponema. Actualmente, la única *treponemosis* conocida es la *sífilis*; mas, es probable que el *pian*, la *fiebre amarilla*, y quizás otras afecciones contagiosas, son provocadas por treponemas.

tribadismo, *s. m.* (τρίβειν, frotar). Inversión del instinto sexual en la mujer, que se revela porque ésta busca la satisfacción genésica con personas de su mismo sexo.

tricauxis, *s. f.* (θρίξ. τριχός, cabello; αὔξις, aumento). Véase: *hipertricosis*.

tricéfalo, *s. m.* (τρεῖς, tres; κεφαλή, cabeza). Nombre dado al grupo de los monstruos triples que presentan tres cabezas distintas.

tricocéfalo, *s. m.* (θρίξ, τριχός, cabello; κεφαλή, cabeza). Sin.: *trichocephalus hominis*. Gusano parásito del orden de los Nematodes, cuya parte anterior, delgadísima, es fina como un hilo, y que, adulto, habita el intestino ciego del hombre. Por lo común, su presencia no determina la aparición de síntoma alguno.

tricoclastia, *s. f.* (θρίξ, τριχός, cabello; κλασεῖν, romper). Sin.: *tricoclasta*. Nombres propuestos para designar los distintos tics que consisten en arrancarse ó romperse las pestañas, las cejas, los pelos de la barba ó el cabello.

tricofitia, *s. f.* (θρίξ, τριχός; φυτόν, vegetal). (Hardy). Enfermedad causada por el desarrollo en la superficie cutánea de un hongo parásito, el *trichophyton tonsurans*. Este parásito, que presenta muchas variedades, puede localizarse sobre el cuero cabelludo en donde determina la *tiña tonsurante*, sobre la barba (*sicosis parasitario* ó *tricofitia de la barba*), sobre las regiones sin pelos (*herpes circinado parasitario*), las uñas (*onicomicosis tricofítica*).

Una variedad de tricofitia del cuero cabelludo, la *tiña tonsurante* de pequeños esporos de Gruby-Sabouraud, no pertenece en realidad á este grupo; el hongo que la determina, *microsporon Audouini*, no es un tricófiton; es una seudotricofitia.

tricófiton, *s. m.* Familia de hongos parásitos que se desarrollan sobre la piel y sus anejos (pelos, uñas). Presenta varios tipos diferentes; los principales son el *trichophyton endothrix*, que se encuentra exclusivamente en el hombre, y el *trichophyton ectothrix* (á la vez ectótrix y endótrix), que se encuentra en el hombre y los animales.

tricofobia, *s. f.* (θρίξ, τριχός; φόβος, temor). 1° Aprensión angustiosa (fobia) á tocar ciertas telas (terciopelo, seda, etc.). — 2° Temor excesivo que experimentan ciertas mujeres de verse desfiguradas por el exagerado desarrollo del vello normal del rostro.

tricoma, *s. m.* Véase: *plica*.

tricomanía, *s. f.* (θρίξ; τριχός; μανία, locura) (Besnier). Véase: *tricotilomania*.

tricomicosis nudosa (θρίξ, τριχός; μύκης, hongo) (Juhel-Renoy). Véase: *piedra*.

tricoptilosis, *s. f.* (θρίξ, τριχός; πτίλον, pluma). Sin.: *tricorrexia*. Alteración del cabello que consiste en una sequedad más ó menos grande del pelo, que se hiende, ya en el extremo, ya lateralmente. Esta alteración se observa en diversas afecciones de la piel: tricofitia, seborrea seca, ó aún en afecciones muy lejanas: tisis pulmonar, enfermedades infectivas graves, como fiebre tifoidea, etc.

tricorrexia, *s. f.* (θρίξ, τριχός; ῥήξις, ruptura). Véase: *tricoptilosis*.

tricorrexia, ó **tricorrexis, nudosa.** Afección rara, de naturaleza aún indeterminada, caracterizada por el hecho de que los cabellos se hinchan en uno ó varios puntos de su longitud, luego estallan y se rompen á ese nivel.

tricosis, *s. f.* (θρίξ, τριχός, cabello). Desarrollo anormal de pelos sobre la mucosa de la vejiga ó de la uretra (quiste dermoideo). — *tricosis de la carúncula*. Desarrollo exagerado de los pelos rudimentarios de la carúncula.

tricosporia, *s. f.* (Vuillemin, 1901). Enfermedad de los pelos debida á un parásito, *trichosporum Beigeli*, que forma en la parte

media de aquellos una especie de vaina. Esta rarísima afección es análoga á la *piedra*, de donde el nombre de *piedra nostras*.

tricotilomanía, *s. f.* (θρίξ, τριχός, cabello; τίλω, arranco; μανία, locura) (Hallopeau). Sin. : *tricomanía* (Besnier). Prurito intenso de las parto velludas que hace que el enfermo se rasque constantemente y de consiguiente se arranque el pelo y determine la formación de placas lampiñas.

tricroto (pulso) (τρεῖς, tres; κρότος, latido). Pulso cuya línea de descenso presenta, en el trazo, dos levantamientos. Véase : *catacrotismo*.

tridérmico (blastodermo) (τρεῖς, tres; δέρμα, piel). Blastodermo en el tercer estadio evolutivo. con tres hojillas : endodermo, mesodermo, ectodermo.

tridérmico (tumor). Sin. : *tumor embrionado*. Variedad de quiste dermoideo, desarrollada en el ovario ó el testículo, que contiene elementos derivados de las tres hojillas del embrión.

triencéfalo, *s. m.* Véase : *triocéfalo*.

trigeminado, ó **trigémino (pulso)** (*tri*, tres; *geminatus*, doblado). Se aplica al pulso cuando un grupo de tres pulsaciones dista periódicamente de otro semejante por un intervalo más ó menos largo.

trigonocefalia, *s. f.* (τρεῖς, tres; γωνία, ángulo; κεφαλή, cabeza) (antropología). Deformación craneana, probablemente debida á la sinostosis medio-frontal, y caracterizada por su forma triangular de vértice anterior.

triocéfalo, *s. m.* Sin. : *triencéfalo* (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo otocefálico caracterizado por la ausencia de los aparatos bucal, nasal y ocular. La cabeza no es más que un pequeño muñón cubierto por todas partes de piel casi uniformemente.

triórquida, *s. m.* (τρεῖς, tres; ὄρχις, testículo). Se dice de las personas de que se supone tienen tres testículos (el tercer testículo casi siempre es un tumor).

tripanosoma, *s. m.* (τρύπανον, aguijón; σῶμα, cuerpo). Protozoario flagelado, parásito de la sangre, y agente específico de cierto número de enfermedades de los países cálidos.

tripanosomiasis ó **tripanosomosis**, *s. f.* Nombres genéricos de todas las enfermedades determinadas por las distintas varie-

dades de tripanosoma. Comprenden enfermedades epizoóticas que atacan principalmente á los equídeos y bovideos, notablemente la *enfermedad de la tse-tsé*, la *surra*, el *mal de caderas*, la *durina*, y una enfermedad humana, la *enfermedad del sueño*.

triple cuotidiana (fiebre). Variedad de fiebre intermitente cuotidiana en la que existen tres accesos diarios.

triplejia, *s. f.* (τρεῖς, tres; πλήσσειν, herir). Hemiplejia acompañada de parálisis de un miembro del lado opuesto.

trípode vital. Bichat llamó así los tres órganos esenciales á la vida: corazón, pulmón y cerebro.

tripsina, *s. f.* Sin. *fermento proteolítico*. Fermento, contenido en el jugo pancreático, capaz de peptonizar las materias albuminoides en el curso de la digestión normal.

triquestesia, *s. f.* (θρίξ, pelo; αἴσθησις, sensibilidad). (N. Vaschide y P. Rousseau, 1902). Modo particular de la sensibilidad, observado en las regiones cubiertas de pelo. Ligerísimas variaciones (agujas de peso variable entre 0,80 centígramos y 0,005 milígramos), se perciben por lo común cuando se ejercen sobre la base de los pelos; no provocan, en tanto, sensación alguna si se las ejerce sobre la epidermis vecina.

triquiasis, *s. f.* (θρίξ, τριχός, cabello). 1° Desviación hacia atrás, congénita ó adquirida, de las pestañas hacia el globo ocular, sin que participe el párpado en la deformación. La irritación permanente de la conjuntiva bulbar y de la córnea es una causa de queratitis y aún de entropión. — 2° Véase: *tricosis*.

triquina, *s. f.* (θρίξ, τριχός, pelo). Sin.: *trichina spiralis*. Gusano parásito del orden de los Nematodes, cuyo adulto se encuentra en el intestino del puerco. Los embriones, al nacer, atraviesan la pared del intestino y caminan á través del organismo para detenerse en los músculos, y principalmente en el diafragma, los músculos intercostales, los del ojo, etc. Allí se enquistan, pasan al estado larvario y caen en vida latente. — Han sido encontrados también en el hombre en quien provocan la *triquinosis*.

triquinosis, *s. f.* Enfermedad causada por la ingestión de carne de puerco triquinosa. Como epidemia

es muy rara en Francia y en los países en que se somete la carne de puerco á una cocción prolongada. En Alemania, por lo contrario, es muy frecuente. Se manifiesta primero por trastornos gástricos, luego por calambres, contracturas musculares, y finalmente por edema de los miembros y del tronco. Termina á veces por la caquexia y la muerte.

trismo, *s. m.* (τρίζω, rechino). Constricción intensa de las mandíbulas debida á la contractura de los músculos masticadores; síntoma del tétanos. Esta voz es tomada frecuentemente como sinónimo de tétanos.

trócar, *s. m.* Instrumento que sirve para practicar la punción. Se compone esencialmente de un tallo metálico, cilíndrico, terminado en una punta triangular, cuyas tres aristas son cortantes, contenido en una cánula, de donde sobresale solamente la punta. Después de la punción, déjase esta cánula dentro de la herida hecha por el trócar y por ella se vacía fácilmente el líquido.

trocisco, *s. m.* (τροχός, rueda). Pequeña masa medicamentosa que se dispone en forma de rodela, de pan de azúcar, de cubo, etc.

trococefalia, *s. f.* (τροχός, rueda; κεφαλή, cabeza) (antropología). Deformación craneana caracterizada por la forma redonda del cráneo

trofedema, *s. m.* (Meige, 1898). Sin.: *distrofia edematosa, elefantiasis nostras, mixedema localizado, edema reumatismal crónico* (Desnos), *edema segmentario* (Debove), *seudo-elefantiasis neuro-artrítica* (Mathieu). Variedad de edema crónico, blanco, duro, indoloro, repartido en segmentos, situado lo más á menudo en uno ó ambos miembros inferiores. El *trofedema* es ora aislado, ora hereditario y familial; puede ser congénito.

trófico, *adj.* (τροφή, alimento). Que se refiere á la nutrición de los tejidos. Ej.: *centros, nervios tróficos*: centros nerviosos y nervios cuyas lesiones determinan en la nutrición de los tejidos los desórdenes llamados *trastornos tróficos*.

trofoneurosis, *s. f.* (τροφή, nutrición; neurosis). Nombre colectivo de todo un grupo de afecciones caracterizadas por la existencia de trastornos tróficos que no se pueden atribuir á lesión definida alguna del sistema nervioso. Ej.: *gangrena simétrica de las extremidades*.

ción (Cruveilhier) ó **tubérculo enquistado.** Tubérculo pulmonar fibroso ó calcificado que se encuentra en la autopsia de sugetos curados de tuberculosis pulmonar ligera y cuya enfermedad hasta pudo pasar inadvertida.

tubérculo elemental. Véase : *folículo tuberculoso.*

tubérculo miliar. Véase : *granulación gris.*

tuberculoma, *s. m.* 1° Abceso tuberculoso (Lannelongue). — 2° Dase de preferencia este nombre á los tubérculos conglomerados que forman una especie de tumor y que no sufren indispensablemente transformación caseosa.

tuberculosis, *s. f.* Enfermedad contagiosa é inoculable, común al hombre y á los animales, debida á un microbio especial llamado *bacilo de Koch*, caracterizada anatómicamente por la diseminación del bacilo en una parte ó en la totalidad del organismo, y por la formación al rededor de cada centro bacteriano de un producto inflamatorio que generalmente reviste el aspecto del tubérculo. Clínicamente, la forma es diferente ora invada rápidamente el organismo (*granulia*), ora permanezca más ó menos exactamente circunscrita á un tejido, en donde recorre los diferentes estadios que le son propios (*tuberculosis pulmonar, intestinal, peritoneal, articular, ósea, ganglionar, cutánea*, etc.).

tubo-ovaritis, *s. f.* Véase : *salpingo-ovaritis.*

tubo-timpanitis, *s. f.* Otitis media acompañada de la inflamación de la trompa de Eustaquio.

tubulado (epitelioma). Variedad de epitelioma caracterizada por la presencia de cilindros llenos de epitelio pavimentoso, que no sufren la evolución epidérmica, en medio de un estroma de tejido conjuntivo adulto ó embrionario. El *cilindroma* (Billroth) pertenece á esta variedad de tumor.

tubulematia, *s. f.* (*tubulhématie*, de Parrot). Sin. *enfermedad bronceada hemática* (Laroyenne y Charrin). Forma grave de ictericia infectiva epidémica de los recién nacidos, de origen gastro-intestinal, caracterizada clínicamente por la existencia de hematurias y á veces de otras hemorragias viscerales, y anatómicamente por la presencia de glóbulos rojos de la sangre (hemátidos) en los tubos contorneados de los riñones.

tubulización de los nervios (Vanlair). Método que consiste, tratándose de suturas de los nervios á distancia, en asegurar la regeneración de las fibras nerviosas en buena dirección por el empleo de tubos de hueso decalcificado, destinados á ser reabsorbidos lentamente.

Tuffier (procedimiento de). Véase : *raquicocainización.*

tumor, *s. f.* (*tumere*, inflar). Sin. *neoplasma*. Nombre colectivo de las producciones patológicas constituídas por tejido de nueva formación, y distintas de los procesos inflamatorios.

tumor blanco. Artritis tuberculosa crónica, llamada así á causa de la hinchazón de los tejidos y de la ausencia de reacción inflamatoria, de donde la coloración blanca de la piel.

turbinectomía, *s. f.* Ablación de una de las conchas de las fosas nasales.

turgescencia, *s. f.* (*turgescere*, hinchar). Aumento de volumen de una parte por retención de la sangre venosa.

Turk (célula de). Sin. : *célula de irritación* (Turk). Variedad de glóbulo blanco no observada en la sangre sino en estado patológico (leucemia, viruela), y caracterizada por un núcleo que se colora intensamente de verde-azulino por el triácido, y un protoplasma que se tiñe uniformemente de oscuro por el mismo reactivo. Es un mielocito basófilo no granuloso.

tusípara (zona) (*tussis*, tos; *parere*, determinar) (Marfan). Región susceptible de ser el punto de partida del reflejo que termina en la tos. Fuera de las vías respiratorias, dichas zonas se encuentran en el conducto auditivo externo, en la amígdala, el estómago, el intestino, el hígado, el bazo y los órganos genitales.

U

úlcera, *s. f.* (*ulcus*, ἕλκος). Pérdida de sustancia del revestimiento cutáneo ó mucoso, con poca tendencia á cicatrizarse.

úlcera fagedénica de los países cálidos. Sin. : *llaga* ó *úlcera del Gabón*. Afección de los países cálidos caracterizada

por la formación, en los miembros inferiores ó, más rara vez, en el tronco, de una ulceración de marcha progresiva, susceptible de producir, en las formas graves, necrosis extensas; mas, por lo general, permanece limitada al dermo y termina por la curación.

úlcera simple del estómago (Cruveilhier, 1830). Sin. : *úlcera redonda, enfermedad de Cruveilhier*. Afección estomacal que consiste anatómicamente en una pérdida de sustancia de la mucosa gástrica, más ó menos profunda, y caracterizada clínicamente por dolores muy vivos, netamente localizados, hematemesis y, casi siempre, hipercloridria. El proceso de la úlcera simple puede existir también en el esófago y en la primera parte del duodeno, esto es, en todos aquellos puntos de la mucosa digestiva que están bañados por el jugo gástrico ácido.

ulceración, *s. f.* (*ulcus*). Proceso mórbido que determina soluciones de continuidad ó úlceras. A veces se toma esta palabra en el sentido de úlcera superficial.

ulcus elevatum terciario (Verneuil). Aspecto que toma en algunos sifilíticos la úlcera de la pierna. Debajo de la pérdida de sustancia mamilada, nace un tumor indolente, firme, elástico, adherido á las partes subyacentes, que cede con rapidez ante la acción del tratamiento específico.

ulerítema, *s. m.* (οὐλη, cicatriz ; ἐρύθημα, rubor). Nombre dado por Unna á un grupo de dermatosis caracterizadas por eritema y atrofia superficial de los tegumentos. Ej. : *lupus eritematoso*.

ulerítema ofriógeno (ὀφρύς, ύος, ceja). Nombre dado por Táenzer á la *queratosis pilar* de la cara.

umbilicación, *s. f.* Formación de una depresión en el centro de cualquiera protuberancia de la piel (*umbilicación* de las pústulas vaccinales ó variólicas). — *umbilicación del pezón*. Formación de una depresión circular que circunscribe al pezón, de modo que éste se hunde en el fondo de una especie de cúpula, donde no puede cogerlo el niño.

uncinariosis, *s. f.* Enfermedad producida por la *uncinaria duodenalis* ó *ankylostoma duodenale*. Véase : *anquilostomiasis*.

unción, *s. f.* (*unctio*). Sin. : *inunción*. Acción de embadurnar una parte del cuerpo con cualquier sustancia grasosa.

ungüento, *s. m.* (*ungere*, ungir). Medicamento externo, de consistencia pastosa, que se licúa al calor de la piel.

úngula, *s. f.* Véase : *terigion.*

unicollis (úterus). Variedad de útero doble en que el tabique solo alcanza al cuerpo del órgano ; el cuello es único. Esta anomalía lo más frecuentemente pasa inadvertida.

unicornis (úterus). Sin. : *útero unicorne.* Utero reducido á una sola mitad por la atrofia de uno de los canales de Müller.

unitario(monstruo). Sin. : *monstruo simple.* Clase de monstruo en que no se encuentran más elementos que los de un solo individuo.

uña encarnada. Sin. : *onixis lateral.* Inflamación del surco lateral de la uña del dedo gordo (casi siempre del lado externo). que da lugar á una ulceración supurante y fungosa en la que se hunde el borde de la uña.

uranista, *s. m.* Sin. : *homo-sexual.* Nombre con que se designan, en Medicina Legal, los individuos que presentan la inversión del instinto sexual, aun cuando sus órganos genitales se hallen normalmente conformados.

urano-estafilorrafia, *s. f.* (οὐρανός, paladar ; σταφυλή, campanilla ; ῥαφή, sutura). Sin. : *uranoplastia en doble puente.* Procedimiento de uranoplastia que no toca sino las partes blandas.

uranoplastia, *s. f.* (οὐρανός, paladar ; πλάσσειν, formar) ; ó **uranósteoplastia,** *s. f.* (οὐρανός ; ὀστέον, hueso ; πλάσσειν, formar). Operación autoplástica cuyo objeto es restaurar el velo del paladar y cerrar las perforaciones congénitas ó adquiridas de la bóveda.

uremia, *s. f.* (úrea, ó οὖρον, orina ; αἷμα, sangre). (Piorry, 1847). Sin. : *urinemia* (Gubler), *uroemia, toxuria* (Guéneau de Mussy), *tifización urinémica* (Peter). Conjunto de los accidentes tóxicos (cerebrales, respiratorios, gastro-intestinales, etc.) provocados por la insuficiencia ó la supresión de la función renal (retención de los venenos normalmente eliminados por la orina, y abolición de la secreción interna del riñón). La *uremia* es un modo de terminación frecuente de las afecciones renales ; presenta numerosos tipos clínicos (formas nerviosa, respiratoria, gastro-intestinal, articular, etc.).

úreogenia, *s. f.* ó **ureogénica (función)**. Véase : *úreopoyesis*.

ureómetro, *s. m.* (úrea; μέτρον, medida). Aparato que sirve para evaluar la cantidad de úrea contenida en la orina.

úreopoyesis, *s. f.* ó **úréopoyética (función)** (úrea; ποιεῖν, hacer). Fabricación de la úrea.

uréterectomía, *s. f.* (οὐρητήρ, uréter; ἐκτομή, excisión). Resección de parte del uréter (*uréterectomía parcial*) con sutura de los dos cabos, ó del uréter en totalidad. Esta operación forma entonces parte de la nefrectomía.

ureteritis, *s. f.* Inflamación de los uréteres. Es casi siempre secundaria, ya á una infección vesical (*ureteritis ascendente*), ya á una lesión renal (*ureteritis descendente*).

urétero-cisto-neostomía, *s. f.* Operación que consiste en practicar una nueva abertura del uréter en la vejiga, en los casos de sección accidental del uréter, de estrechez del mismo, ó de fístula urétero-vaginal.

urétero-colostomía, *s. f.* Operación que consiste en poner en comunicación el uréter con el colon, particularmente con el colon transverso.

urétero-énterostomía, *s. f.* Operación que consiste en establecer la abertura del uréter en el intestino.

urétero-pielo-nefritis, *s. f.* Véase : *pielonefritis*.

urétero-pielo-neostomía, *s. f.* Operación que consiste en practicar una nueva abertura del uréter en la pelvis renal (en los casos de estrechez del uréter).

uréterorrafia, *s. f.* (οὐρητήρ; ῥαφή, sutura). Sutura de una incisión hecha al uréter.

uréterotomía, *s. f.* (οὐρητήρ; τομή, sección). Talla del uréter para extraer de él un cálculo.

urétero-vesical (reflejo). Dolor reflejo acompañado de ganas de orinar que, al explorar la cara inferior de la vejiga cerca de la desembocadura de los uréteres, se provoca en sugetos atacados de pielitis ó de pielo-nefritis. Este signo, casi constante, es más fácil de comprobar en la mujer, por la exploración con el tacto vaginal.

uretralgia, *s. f.* (οὐρήθρα, uretra; ἄλγος, dolor). Dolor neurálgico de la uretra sin lesión apreciable de este canal.

uretrectomía, *s. f.* (οὐρήθρα; ἐκτομή, extirpación). Resección de una porción más ó menos considerable de la uretra.

uretritis, *s. f.* (οὐρήθρα, uretra). Inflamación de la mucosa de la uretra. Puede ser causada por microbios varios; más frecuentemente por el gonococo (*uretritis blenorrágica*).

uretrocele, *amb.* (οὐρήθρα; κήλη, hernia). Hernia vaginal de la uretra. Se presenta como un tumor del tamaño de una nuez, en comunicación con el meato. Dicho tumor es simplemente la dilatación de la uretra.

uretrocistitis, *s. f.* (οὐρήθρα; κύστις, vejiga). Uretritis posterior cuya inflamación se extiende á la vejiga y que coincide con síntomas de cistitis del cuello.

uretroplastia, *s. f.* (οὐρήθρα; πλάσσειν, formar). Operación autoplástica destinada á llenar una pérdida de sustancia ó á cerrar una fístula uretral.

uretrorrafia, *s. f.* (οὐρήθρα; ῥαφή, sutura). Sutura hecha á la uretra seccionada.

uretrorragia, *s. f.* (οὐρήθρα; ῥήγνυμι, desgarro). Hemorragia de la uretra.

uretroscopia, *s. f.* οὐρήθρα; σκοπεῖν, examinar). Examen de la cavidad uretral por medio del uretroscopio, instrumento análogo al endoscopio.

uretrostenia, *s. f.* (οὐρήθρα; στενός, estrecho). Estrechez de la uretra.

uretrostomía perineal (οὐρήθρα; στόμα, boca) (Poncet y Delore). Sin. *perineostomía*. Creación en el periné de un meato contra natura, en los casos de estrecheces incurables por la dilatación ó la uretrotomía.

uretrotomía, *s. f.* (οὐρήθρα; τομή, sección). Operación que consiste en abrir la pared de la uretra con el objeto de restablecer el curso de la orina. — *uretrotomía externa*. Uretrotomía hecha de fuera á adentro. Cuando la incisión se hace detrás del escroto, se la llama talla uretral. — *uretrotomía interna*. La que se hace de dentro á afuera por medio del uretrotomo.

uretrotomo, *s. m.* (οὐρήθρα; τέμνειν, cortar). Instrumento que sirve para practicar la uretrotomía interna. Consta esencialmente de una lámina triangular montada sobre un largo tallo, que se introduce en la uretra y que, por una disposición especial, corta sólo el punto estrecho del canal.

uricemia, *s. f.* Auto-

intoxicación por el ácido úrico ó por los cuerpos aloxúricos, por la jantina, la hipojantina, etc.

uridrosis, *s. f.* (οὖρον, orina; ἵδρως, sudor). Sudor que contiene los elementos constitutivos de la orina. Síntoma observado en los casos de insuficiencia renal (uremia).

urinemia, *s. f.* Véase: *uremia*.

urinoso (abceso). Abceso formado á proximidad de la uretra á consecuencia de una ruptura ó una fisura de ese canal.

urobilinuria, *s. f.* (urobilina; οὐρεῖν, orinar). Presencia de la urobilina en la orina. La urobilina, ó pigmento del hígado enfermo, aparece en la orina en ciertas enfermedades febriles y en las afecciones hepáticas. Se reconoce su presencia por medio del espectroscopio (banda de absorción en el límite del azul y del verde).

urocele, *amb.* (οὖρον, orina; κήλη, hernia). Nombre dado á veces al tumor formado por la infiltración de orina en las bolsas.

urodierétero, *s. m.* (οὖρον; διαιρέω, separo) (Luys). Aparato que sirve para recoger separadamente la orina de cada riñón. Consta de dos sondas metálicas separadas por una pieza intermedia provista de una cadena que, al tirar de ella, hace que se levante entre las dos sondas una membrana de caucho, que divide así la vejiga en dos compartimientos, uno para cada uréter.

urología, *s. f.* (οὖρον; λόγος, discurso). Estudio de la orina.

urómelo, *s. m.* (οὐρά, cola; μέλος, miembro) (I. G. Saint-Hilaire). Monstruo simeliano caracterizado por la fusión íntima de los dos miembros inferiores, que no presentan sino un solo pie en su extremidad.

urómetro, *s. m.* (οὖρον, orina; μέτρον, medida). Densímetro que sirve para señalar el peso específico de la orina.

uronefrosis, *s. f.* (οὖρον; νεφρός, riñón) (Kuster). Retención de orina en el riñón y la pelvis renal. Sin. *hidronefrosis*.

uropionefrosis, *s. f.* (Guyon). Distensión de la pelvis renal por la orina pupurulenta.

uropoyesis, *s. f.* **uropoyética (función)**. 1° (úrea; ποιεῖν, hacer). Elaboración de la úrea por el hígado. — 2° (οὖρον, orina; ποιεῖν, hacer). Secreción urinaria.

uroscopia, *s. f.* (οὖρον; σκοπεῖν, examinar). Examen clínico de las orinas.

uroterapia, *s. f.* (οὖρον; θεραπεία, tratamiento). Terapéutica destinada á modificar la composición de la orina.

urotoxia, *s. f.* (Bouchard, 1877). Cantidad de orina que, inyectada en las venas del conejo, es capaz de matar un quilógramo de materia viva.

urotóxico (coeficiente). Peso de materia viva, expresado en quilógramos ó fracciones de quilógramo, capaz de ser intoxicado por la cantidad de orina que emite un hombre en 24 horas y por quilógramo de su peso; inyectada la orina en las venas periféricas del conejo.

urticaria, *s. f.* (*urtica*, ortiga). Sin. : *nidosis*. Erupción caracterizada por la producción de levantamientos rosados ó rojos, a veces descoloridos en el centro, semejantes á picaduras de ortiga, con sensación de ardor y de prurito, y que evoluciona muy rápidamente. Es síntoma observado en diversas afecciones, con particularidad en las intoxicaciones alimenticias ó medicamentosas.

urticaria pigmentada. Dermatosis muy rara, caracterizada por una erupción de urticaria cuyos elementos dejan al desaparecer una mancha saliente ó plana, de coloración oscura y por mucho tiempo persistente.

usagre, *s. f.* Nombre dado al exema, casi siempre de origen pedicular, que invade el cuero cabelludo de los niños mal cuidados.

ustión, *s. f.* (*ustio*, cauterización). Aplicación del cauterio actual (término anticuado).

uteralgia, *s. f.* (*uterus*; ἄλγος, dolor). Neuralgia uterina.

V

vaccinación, *s. f.* Véase : *vacunación* 2°.

vaccinal, *adj.* Lo relativo à la vacuna.

vaccinela, *s. f.* Véase : *accinoide*.

vaccínide, *s. f.* Erupción vaccinal generalizada, ya al rededor del punto de inoculación, ya distante, bajo forma de pústulas ó de eritemas.

vacinífero, *s. m.* (*vaccinum*, *ferre*, llevar). Se dice de la ternera ó del niño que suministran la vacuna para inocularla á otros.

vaccino, *s. m.* (*vaccinum pus*; francés *vaccin*). Se emplea como sinónimo de *vacuna* 2°.

vaccinoide, *s. f.* Sin. : *vaccinela*, *falsa vacuna*. Erupción vaccinal modificada que se observa frecuentemente en los revacunados. Se admite generalmente hoy que la *vaccinoide* confiere inmunidad lo mismo que la vacuna verdadera.

vaccino-sifiloide de la piel. Sin. : *herpes vaccini-forme*. Nombre dado á veces á las *sifiloides posterosivas* (véase esta palabra), á causa de la semejanza de ciertas vesículas con la vacuna.

vacuna, *s. f.* 1° Enfermedad general primitiva de la vaca (*cow-pox*) y del caballo (*horse-pox*), provocada en el hombre por la inoculación de un virus especial, con el objeto de preservalo de la viruela; la caracterizan la aparición de pústulas ordinariamente localizadas en los puntos de la inoculación, y la existencia de algunos síntomas generales poco notables de ordinario. — 2° (*vaccinum pus*). Sustancia que, inoculada á un individuo, le confiere inmunidad contra una enfermedad parasitaria, del mismo modo que la *vacuna* propiamente dicha preserva de la viruela. La *vacuna* (*vaccino*) es ó un agente figurado (microbio) ó un producto soluble. — Empleado solo, este vocablo designa especialmente el agente de transmisión de la enfermedad *vacuna*.

vacunación, *s. f.* 1° Operación que consiste en inocular la vacuna con el fin de preservar el organismo contra la viruela. — *vacunación jeneriana*. Inoculación de la vacuna según el procedimiento de Jénner, esto es, de brazo á brazo. — 2° Sin. : *vaccinación*. Por extensión, equivale á la inoculación de una vacuna cualquiera (*vaccino*) con el propósito de conferir inmunidad contra una enfermedad determinada. — *vacunación* ó *vaccinación pastoriana*. Vacunación por medio de cultivos atenuados (vacunación anticarbonosa).

vacuola, *s. f.* (*vacuus*, vacío). Cavidad que se forma en medio del protoplasma de ciertas células (células glandulares) y que contiene los líquidos elaborados por la célula, antes de excretarlos.

vagabundos (enfermedad de los). Estado particular de la piel de ciertos individuos que no tienen oficio ni domicilio, caracterizado por el espesamiento y la pigmentación de los tegumentos determinados por la tiriasis y el desaseo.

vaginalitis, *s. f.* Inflamación aguda ó crónica de la vaginal (membrana serosa del testículo).

vaginalitis plástica. Véase : *paquivaginalitis.*

vaginismo, *s. m.* Sin. : *vaginodinia.* Hiperestesia de los órganos genitales externos de la mujer, causada lo más á menudo por una lesión, á veces ligerísima, de esas partes (ruptura del himen, fisura del ano, blenorragia, etc.), y que á veces produce la contracción espasmódica de los constrictores de la vagina é impide el coito.

vaginitis, *s. f.* Inflamación de la vagina.

vaginitis enfisematosa. Véase : *paquivaginitis quística.*

vaginodinia, *s. f.* (vagina; ὀδύνη, dolor). Véase : *vaginismo.*

vaginofijación del útero. Histeropexia vaginal.

vagotomía, *s. f.* (vago; τομή, sección). Sección del nervio vago ó neumogástrico (X° par).

vaivén (movimiento de). (Jaccoud). Movimiento ondulatorio, sistólico, de la región precordial, que revela por su progresión instantánea de arriba abajo y de derecha á izquierda la modificación de forma y lugar del corazón, particularmente su rotación al rededor del eje longitudinal; se observa este signo en la sínfisis cardiaca.

valgus, a, um, *adj.* (en latín : vuelto hacia fuera). Se dice del miembro ó segmento de miembro desviado hacia afuera. Ej. : *pie zambo valgus, genu valgum.*

Valleix (leyes de). La localización de los puntos dolorosos en las neuralgias obedece á cuatro leyes establecidas por Valleix. Se determina el máximum de dolor comprimiendo : 1° los puntos de emergencia de los troncos nerviosos ; 2° los puntos en que los filetes nerviosos atraviesan los músculos para llegar á la piel ; 3° los puntos donde las ramas terminales se esparcen en la piel ; 4° los puntos en que los troncos nerviosos se hacen superficiales.

Valleix (puntos de). Puntos dolorosos que en las

diferentes neuralgias se comprueban sobre el trayecto de los nervios enfermos. Su localización obedece á las leyes de Valleix.

valor semiológico. Significación relativa de los diversos síntomas.

Valsalva (prueba de). Insuflación de aire dentro de la caja del tímpano, que se obtiene cuando se hace soplar el enfermo con la boca y la nariz cerradas.

Valsalva (método de) (1731). Tratamiento del aneurisma arterial circunscrita, por emisiones sanguíneas repetidas, acompañadas de dieta severa y de frecuentes purgas, con el fin de hacer más coagulable la sangre.

vanilismo, *s. m.* (*vanilla*, vainilla). Intoxicación provocada por la ingestión de ciertas preparaciones aromatizadas con vainilla (helados y cremas). Los síntomas del *vanilismo alimenticio* semejan un ataque suave de cólera (diarrea, vómitos, calambres). — *vanilismo profesional.* Accidentes cutáneos señalados por A. Layet en los obreros que manipulan las vainas de la vainilla.

várice, *s. f.* (*varix*). Sin. *flebectasia.* Lesión de las venas que consiste en la dilatación permanente de sus paredes.

várice aneurismal. Véase : *aneurisma arterio-venosa.*

várice arterial. Véase : *aneurisma cirsoide.*

varicela, *s. f.* Sin. *lechinas.* Enfermedad infectiva, contagiosa, ordinariamente muy benigna, caracterizada por una erupción de vejiguillas que se presenta en varios flujos, vejigas que se marchitan y secan al cabo de unos días Es una infección muy distinta á la viruela.

varicocele, *amb.* (*varix*, várice; κήλη, tumor). Sin. *cirsocele.* Dilatación varicosa de las venas del cordón espermático. — *varicocele tubo-ovariano.* Dilatación varicosa de las venas útero-ováricas.

varioliforme(acné). Véase : *molluscum contagiosum.*

variolización, *s. f.* Inoculación de la viruela, que antes se hacía con un fin profiláctico. Aún se la practica en el Extremo-Oriente.

variololde, *s. f.* Forma benigna de la viruela caracterizada por la larga duración de la invasión, la ausencia de supuración y la brevedad de la evolución total.

variolo-vacuna, *s. f.* Inoculación de la viruela á un animal (ternera) en el que se atenúa y transforma en vacuna. Modo de regeneración de la vacuna basado sobre la unicidad de la viruela y la vacuna (teoría admitida en Alemania, discutida en Francia).

varus, a, um, *adj.* (en latín, vuelto hacia adentro). Se dice del miembro ó segmento de miembro vuelto hacia adentro. Ej. : *coxa vara.*

vascularitis, *s. f.* Inflamación de los vasos de un órgano.

vasectomía, *s. f.* (*vas,* canal; ἐκτομή, excisión). Resección de los canales deferentes. Operación practicada en los prostáticos con el fin de combatir la hipertrofia de la próstata y facilitar la micción.

vaso-formativas (células). Células especiales, de forma de huso rectilíneo ó encorvado con extremidades afiladas, que contribuyen al desarrollo de los vasos.

vasotripsia, *s. f.* (*vas,* vaso; τρίψις, trituramiento) (Doyen). Sin. *angiotripsia* (Truffier). Aplastamiento de los vasos por medio de un instrumento especial llamado *vasotribo,* con el fin de asegurar la hemostasis inmediata.

vegetación, *s. f.* Papiloma situado en los repliegues de la piel bañados por un líquido irritante.

vegetalismo, *s. m.* (de vegetal). Doctrina dietética derivada del *vegetarismo,* la cual sólo permite el empleo de alimentos provenientes del reino vegetal.

vegetarismo, *s. m.* (*vegetare,* vivificar, ó *vegetus,* vigoroso). Doctrina dietética que excluye en absoluto de la alimentación todo lo que ha vivido vida animal. El *vegetarismo* prohibe la carne de todos los animales; mas, permite los productos del reino animal (leche, manteca, huevos, miel, etc.).

vehículo, *s. m.* (*vehere,* llevar). Excipiente líquido. Sustancia en que se disuelven los otros principios activos del medicamento.

vejiga, *s. f.* (*vesica*). 1° El receptáculo de la orina. — *vejiga de la hiel.* Vesícula biliar. — 2° Lesión elemental de la piel (*bulla*) que no es más que una vesícula de grandes dimensiones. — 3° Sin. *flictena.* Ampolla ó bolsa elevada en el cutis y llena de humor acuoso.

vejigatorio, *adj.* y *s.*

m. (*vesicare*, levantar vejigas). 1° Tópico que sirve para provocar el levantamiento de la epidermis por acumulación debajo de ésta de cierta cantidad de serosidad. Están casi siempre compuestos de polvos de cantáridas ó de cantaridina. — 2° Se suele dar también el nombre de *vejigatorio* á la flictena provocada por algún emplasto vesicante y á la llaga que le sigue.

vejigatorio (prueba del) (Roger y Josué). Prueba clínica basada en el examen histológico de las células contenidas en la serosidad del vejigatorio. En el hombre normal se encuentra una gran proporción de polinucleares eosinófilos; en los atacados de enfermedades infectivas, dichas células son poco numerosas ó faltan completamente. Reaparecen si el organismo vence la infección.

velamentosa del cordón (inserción). Sin. *placenta de Lobstein*, *anomalía de Benckiser* Inserción del cordón umbilical sobre las membranas del huevo. Los vasos umbilicales llegan separadamente á la placenta caminando por entre las membranas.

velvético (aspecto ó estado) (inglés *velvet*, terciopelo). Nombre dado á las superficies de aspecto terciopelado.

venereología, *s. f.* (*Venus*, *eris*; λόγος, discurso). Véase: *cipridología*.

ventosa, *s. f.* Vasos de vidrio que, después de haber rarificado en ellos el aire, se aplican en un punto cualquiera de los tegumentos; sirven para provocar una revulsión local. — *ventosa escarificada* ó *sajada*. La que se aplica sobre escarificaciones ó sajaduras (sangría local).

ventrofijación del útero. Véase: *histeropexia abdominal*.

ventroscopia, *s. f.* (*venter*, vientre; σκοπεῖν, examinar) (Dmitri de Ott, 1901). Examen, en el curso de una operación, de las cavidades abdominal y pelviana, por medio de una lamparita incandescente fija sobre un mango especial ó en la concavidad de una de las valvas que separan los labios de la herida. El paciente debe estar en la posición de Trendelenburg.

verbigeración, *s. f.* Chacharería incoherente en que se repiten indefinidamente las mismas palabras ó las mismas series de palabras; se la observa en ciertos dementes excitados.

vergeteadura ó **veteadura**, *s. f.* (calco de *vergeture*, francés). Sin. : *vibice*. Pequeñas rayas primero rojas, luego blancas y nacaradas, de aspecto cicatricial, que surcan la piel sometida á una distensión exagerada (abdomen de las mujeres preñadas, miembros á la altura de las epífisis cuando el crecimiento se ha efectuado demasiado rápidamente, etc.).

vermífugo, *adj.* y *s. m.* (*vermis*, gusano; *fugare*, expulsar). Medicamento que provoca la expulsión de las lombrices intestinales.

vérnix caseosa. Materia grasa comparada á la manteca de puerco que, en muchos recién nacidos, se extiende en capas más ó menos espesas sobre la región dorsal y los pliegues axilares é inguinales. Parece debida à la hipersecreción del aparato pilo-sebáceo del feto.

verruga, *s. f.* 1° Variedad de papiloma que sale en la piel seca. — 2° Sin. : *pian hemorrágico*, *enfermedad de Carrión*, *botón de Amboine*. Enfermedad endémica de los países cálidos, inoculable, mas no contagiosa, caracterizada por síntomas infectivos graves que pueden producir la muerte, luego por una erupción cutánea compuesta de excrecencias mamilares que semejan fresas y frambuesas. El agente patógeno es aún desconocido.

versión, *s. f.* (*vertere*, voltear). Cambio de posición que se imprime al feto para facilitar la salida del útero. Según la parte fetal que se trae á la pequeña pelvis, se llama aquella *cefálica* (cabeza) ó *podálica* (pies). Se puede practicarla : 1° imprimiendo al feto movimientos á través de la pared : *versión por maniobras externas*; 2° yendo á agarrar con la mano introducida en el útero la parte que se desea traer hacia el estrecho superior : *versión por maniobras internas*; 3° asociando ambos procedimientos : mientras que se introduce una mano en los órganos genitales, la otra obra sobre el feto por encima de la pared abdominal : *versión mixta ó bipolar*.

vertebral (mal). Véase : *Pott* (*mal de*).

vértex, *s. m.* (vértice) (antropología). Punto el más elevado de la bóveda craneana.

vértigo, *s. m.* (*vertere*, girar). « Trastorno cerebral, error de sensación, bajo cuya influencia el enfermo

cree que su propia persona ó los objetos que le rodean se hallan animados de un movimiento giratorio ú oscilatorio ». (N. Guéneau de Mussy.)

vértigo angiopático. Vértigo debido á la esclerosis de las arterias bulbares.

vértigo apoplético. Sin. : *escotodinia, vértigo tenebroso.* Vértigo que á la sensación de giramiento añade el oscurecimiento de la vista, la obnubilación de los otros sentidos y el desfallecimiento. A menudo precede la apoplejía.

vértigo auricular. Sin. : *vértigo de Menière, vértigo ab aure lœsa.* Vértigo de origen laberíntico. determinado por afecciones del oído externo, del oído medio, ó del interno. Este sindroma principia bruscamente; después de un aura que consiste en la percepción de un ruido agudo (silbato, campana, etc.), el paciente vacila y cae del lado enfermo. Se reserva á veces el nombre de *enfermedad de Menière* á los *vértigos auriculares* causados por hemorragias laberínticas.

vértigo estomacal Trousseau, Lasègue) (*vértigo a stomacho lœso*). Vértigo más ó menos pronunciado, acompañado á menudo de náuseas y de vómitos, en relación con trastornos gástricos. Obsérvase, en circunstancias muy diversas, en ciertos dispépticos (atonía, hipocloridria), en los convalescientes de enfermedades graves (fiebre tifoidea), ora ayunas, ora después de la ingestión de determinados alimentos.

vértigo galvánico. Vértigo determinado por la corriente galvánica cuyos dos electrodos se aplican sobre las apófisis mastoides. En el momento de cerrar la corriente parece que los objetos cambiaran de lugar, del polo negativo al positivo, y que el cuerpo girase en el mismo sentido; al abrirla, la rotación parece efectuarse en sentido opuesto.

vértigo laringeo (Charcot, 1876). Sin. : *ictus laringea.* Sindroma caracterizado por la pérdida de conocimiento súbita y completa, mas de corta duración, que sigue á cierta picazón de la laringe y á un acceso de tos. La irritación laringea, que es el punto de partida de los accesos, puede provenir de una lesión local ó de una lejana, pero que repercute en la laringe.

vértigo mental (Lasègue) ó **neuropático.** Angustia precordial, súbita,

consciente, invencible, acompañada de sensación de colapso y de desfallecimiento, con obnubilación de la vista y palidez de la cara. La provoca la vista de un objeto y á cada vez repítese en las mismas condiciones. El *vértigo mental* presenta grandes analogías con las *fobias*.

vértigo paralizante (Gerlier, 1887). Sin. : *enfermedad de Gerlier, kubisagari*. Enfermedad de naturaleza desconocida (infectiva?), que se manifiesta bajo forma de pequeños epidemias muy localizadas (Jura, Japón). Sobreviene por accesos caracterizados por paresias momentáneas, trastornos visuales (obnubilación, diplopia, fotopsias, fotofobia), á veces trastornos del equilibrio y dolores vertebrales y cerebrales. Hanse distinguido tres tipos : *tipo del adormecido* (*vértigo tósico*), *tipo del recogimiento* y *tipo del ciego ebrio*. La inteligencia y la salud general permanecen siempre intactas.

vértigo tenebroso. Véase : *vértigo apoplético*.

vértigo tósico (de πτώσις, caída) (David). Véase : *vértigo paralizante*.

vesania, *s. f.* Sin. : *insania*. Véase : *sicosis* 1°.

vesicular (estertor). Véase : *crepitante* (*estertor*).

vesícula, *s. f.* (dim. de *vesica*, vejiga). Lesión elemental de la piel, que consiste en un levantamiento circunscrito de la epidermis lleno de serosidad transparente.

vesiculectomía, *s. f.* Véase : *espermatocistectomía*.

vesiculitis, *s. f.* Véase : *espermatocistitis*.

vespertilio, *s. m.* (en latín, murciélago). Variedad de *lupus eritematoso*, que se desarrolla simétricamente sobre ambos pómulos y la cara dorsal de la nariz : presenta de ese modo el aspecto de un murciélago con las alas desplegadas.

viabilidad, *s. f.* (*vitæ habilis*, apto para vivir ; Littré). Estado del feto nacido *viable*. « Haber nacido viable, es haber nacido vivo y haber vivido vida distinta á la vida intra-uterina, y presentar además un desarrollo general, una conformación y un estado de salud no incompatibles con la continuación definitiva de la vida » (Tardieu).

viable (feto). Véase : *viabilidad*.

víbice, *s. f.* (*vibicem*, verdugón, marca del azote). 1° Hemorragia cutánea que se presenta con la forma de surcos ó de estrías (variedad

de púrpura). — 2° *vergeteadura*.

vibraciones abdominales (De Brun, 1901). Vibraciones percibidas por la mano, aplicada contra la pared abdominal, en el momento en que habla el sugeto. Estas vibraciones son signo de ascitis incipiente y desaparecen tan luego como es perceptible la sensación de onda.

vibrantes (estertores). Véase : *sonoros (estertores)*.

vibrión séptico (Pasteur). Sin. : *bacilo de la gangrena gaseosa, del edema maligno* (Koch). Bacilo anaerobio, que presenta á menudo la forma de filamentos encorvados, y determina en el hombre la gangrena gaseosa.

vibrisas, *s. f. pl.* (*vibrissæ*). Pelos implantados dentro de las narices.

vicariante, *adj.* Se dice que un órgano desempeña *papel vicariante* respecto á otro órgano que ha llegado á ser insuficiente, cuando el funcionamiento defectuoso de éste último es, más ó menos, suplido por la mayor actividad de aquel. Sería preferible decir que en ese caso el primer órgano es *vicario* del segundo.

Vidal-Brocq (tipo). Variedad de micosis fungoide, caracterizada por la presencia de tumores bien limitados, cuya aparición no es precedida de los períodos exematoso y liquenoide.

vígil (coma). Véase : *coma vígil*.

vigilambulismo, *s. m.* (*vigilia*; *ambulare*, andar). Estado de automatismo ambulatorio con desdoblamiento de la personalidad, producido en la vigilia. Ej. : *automatismo comicial ambulatorio*. (Véase esta palabra).

Vigouroux (signo de). Disminución de la resistencia eléctrica de la piel en el bocio exoftálmico.

Vincent (angina de). Sin. *amigdalitis chancriforme*. Variedad de amigdalitis subaguda en la que la agalla es asiento de una ulceración que simula al chancro indurado; en el exudado difteroide que cubre la ulceración se encuentran al examen microscópico bacilos fusiformes asociados con espirilos (bacilos de Vincent).

vírgula (bacilo). Sin. *bacillus coma*. Bacteria ligeramente encorvada en semi-círculo ó en forma de coma, que también presenta frecuentemente formas alargada ó espirilar, móvil, y

que se cultiva con facilidad en los medios ordinarios. Es el agente patógeno del cólera asiático.

virosa (sustancia) (*virus*, veneno). Sustancia de sabor y olor nauseabundos.

viruela, *s. f.* (*variola*, de *varius*, manchado, mosqueado). Enfermedad infectiva, epidémica y contagiosa, caracterizada clínicamente por la evolución cíclica en tres períodos, en los que se desarrolla con síntomas generales más ó menos graves, y erupción botonosa de aspecto particular, que llega á la supuración en el tercer período. El agente causal de la enfermedad sería un esporozoario (Roger y Weil). Se dice que la erupción es *confluente* cuando las pápulas se confunden desde que aparecen en el rostro; es *coherente* cuando los elementos eruptivos se ponen en contacto, entre sí, sólo en el momento de la supuración.

virulencia, *s. f.* (*virus*, veneno). Aptitud de los microbios á desarrollarse en el cuerpo de los animales y á segregar allí toxinas. El grado de *virulencia*, de que depende la gravedad de los accidentes producidos, varía con la resistencia opuesta por el terreno y con las influencias que han obrado anteriormente sobre el microbio.

virus, *s. m.* (*virus*, jugo, veneno). Nombre que se dió antes del descubrimiento de los microbios patógenos á la sustancia que contiene el agente del contagio y es capaz de trasmitir la enfermedad. Actualmente se emplea dicho término al hablar de las enfermedades contagiosas cuyo micro-organismo no se ha descubierto aún, y en particular refiriéndose á la sífilis.

visceralgia, *s. f.* (*viscera*, vísceras; ἄλγος, dolor). Nombre genérico dado á los trastornos todos de sensibilidad de las vísceras, de origen nervioso.

vísceroptosis, *s. f.* (*viscera*; πτῶσις, caída) (Dalché). Véase : *esplanoptosis*.

vitalismo, *s. m.* Doctrina que explica por la influencia de un *principio vital* (Barthez de Montpellier, siglo XVIII) los fenómenos fisiológicos y patológicos.

vitelina (membrana). Sin. *zona transparente*, *corion del huevo*. Envoltura espesa y trasparente del huevo. Está formada de una sustancia blanda que se deja fácilmente atravesar por los micro-organismos.

vitelo, *s. m.* (*vitellus*, yema de huevo). Masa de protoplasma que forma el cuerpo del huevo. Está compuesto de dos partes muy distintas : el *vitelo formativo* (protoplasma propiamente dicho), que, después de la fecundación se segmenta y forma el embrión; y el *vitelo nutritivo* (deutoplasma, lecito), destinado á nutrir el embrión durante el desarrollo. Hanse clasificado los huevos según contengan mayor ó menor cantidad de vitelo nutritivo.

vitíligo, *s. m.* (*vitiligo*, mancha blanca). Afección caracterizada por un trastorno de la pigmentación de la piel, que consiste en la aparición de placas descoloridas blanco-mates, de contornos precisos, circunscritas por una zona en donde la piel se halla más pigmentada que normalmente.

vítrea (degeneración). Véase : *necrosis de coagulación.*

vivisección, *s. f.* (*vivus*, vivo; *sectio*, acción de cortar). Operación practicada en animales vivos con propósito experimental.

Vólkmann (deformidad de). Lujación congénita tibio-tarsiana.

volvo ó **vólvulo,** *s. m.* (*volvere*, torcer). Sin. *ileus.* Torsión de un asa intestinal al rededor de su mesenterio, que produce la detención de los excrementos y el sindroma de la oclusión intestinal.

vómica, *s. f.* (*vomere*, vomitar). Expectoración súbita y abundante de serosidad, pus, sangre, proveniente de una cavidad natural ó accidental del tórax, cavidad que se abre bruscamente en un bronquio grueso donde vacía más ó menos completamente el contenido. (La abundancia de esta expectoración hizo que se la comparara á un vómito.)—Se da á veces el nombre de *vómica* á la colección torácica susceptible de evacuarse por una vómica.

vómito, *s. m.* Acto por el cual se expele violentamente por la boca el contenido del estómago.

vómitos periódicos ó **cíclicos.** Sindroma observado en los niños artríticos, el cual empieza bruscamente en medio de aparente buena salud por fiebre y vómitos. Hay completa intolerancia de líquidos y sólidos por de dos á ocho días. Los vómitos van á menudo acompañados de dolores de cabeza, agitación y gran abatimiento. Este cuadro clínico, que recuerda el de la meningitis, cesa bruscamente y la

salud se restablece de un día al otro.

vómito negro. Véase: *fiebre amarilla.* — *vómito negro apendicular* (Dieulafoy). Abundantes hematemesis negras debidas á ulceraciones gástricas consecutivas á la apendicitis.

vomiturición, *s. f.* (*vomiturire*, tener ganas de vomitar, Littré). Regurgitación. Vómito incompleto en que las materias se detienen en el esófago, van á veces hasta la boca, mas no son expelidas al exterior.

Vulpián y Prevost (ley de). En el ataque de apoplejía la cabeza y los ojos están vueltos de manera que parecen *mirar su lesión.*

Vulpián (tipo). Atrofia muscular progresiva espinal que empieza por el hombro.

vultuoso. *adj.* (*vultus*, rostro). Se aplica al rostro congestionado y abotagado.

vulvitis, *s. f.* Inflamación de una ó de varias de las partes constitutivas de la vulva.

vulvo-vaginitis, *s. f.* Inflamación de los órganos genitales (vulva y vagina), acompañada frecuentemente de uretritis, y que se manifiesta sobre todo por la hipersecreción de la mucosa.

W

Wálcher (posición de) (obstetricia). Actitud preconizada en Alemania durante el trabajo cuando existe una ligera estrechez pelviana. Consiste en colocar las nalgas de la parturienta en el borde de la cama, sobre un cojín duro, con los miembros pendientes. En esa posición el diámetro antero-posterior del estrecho superior aumentaría en algunos milímetros.

Wáller (degeneración de) ó **degeneración walleriana.** Las lesiones degenerativas que sufre un nervio cuando se le separa de su centro trófico.

Walls (signo de). Ampliación torácica en el lado opuesto á la pleuresía, cuando ésta es debida á un tumor del pulmón ó del mediastino.

Wálton (método de) (1887). Tratamiento indirecto

diferentes neuralgias se comprueban sobre el trayecto de los nervios enfermos. Su localización obedece á las leyes de Valleix.

valor semiológico. Significación relativa de los diversos síntomas.

Valsalva (prueba de). Insuflación de aire dentro de la caja del tímpano, que se obtiene cuando se hace soplar el enfermo con la boca y la nariz cerradas.

Valsalva (método de) (1731). Tratamiento del aneurisma arterial circunscrita, por emisiones sanguíneas repetidas, acompañadas de dieta severa y de frecuentes purgas, con el fin de hacer más coagulable la sangre.

vanilismo, *s. m.* (*vanilla*, vainilla). Intoxicación provocada por la ingestión de ciertas preparaciones aromatizadas con vainilla (helados y cremas). Los síntomas del *vanilismo alimenticio* semejan un ataque suave de cólera (diarrea, vómitos, calambres). — *vanilismo profesional.* Accidentes cutáneos señalados por A. Layet en los obreros que manipulan las vainas de la vainilla.

várice, *s. f.* (*varix*). Sin. *flebectasia.* Lesión de las venas que consiste en la dilatación permanente de sus paredes.

várice aneurismal. Véase : *aneurisma arterio-venosa.*

várice arterial. Véase : *aneurisma cirsoide.*

varicela, *s. f.* Sin. *lechinas.* Enfermedad infectiva, contagiosa, ordinariamente muy benigna, caracterizada por una erupción de vejiguillas que se presenta en varios flujos, vejigas que se marchitan y secan al cabo de unos días Es una infección muy distinta á la viruela.

varicocele, *amb.* (*varix*, várice; κήλη, tumor). Sin. *cirsocele.* Dilatación varicosa de las venas del cordón espermático. — *varicocele tubo-ovariano.* Dilatación varicosa de las venas útero-ováricas.

varioliforme (acné). Véase : *molluscum contagiosum.*

variolización, *s. f.* Inoculación de la viruela, que antes se hacía con un fin profiláctico. Aún se la practica en el Extremo-Oriente.

varioloide, *s. f.* Forma benigna de la viruela caracterizada por la larga duración de la invasión, la ausencia de supuración y la brevedad de la evolución total.

variolo-vacuna, *s. f.* Inoculación de la viruela á un animal (ternera) en el que se atenúa y transforma en vacuna. Modo de regeneración de la vacuna basado sobre la unicidad de la viruela y la vacuna (teoría admitida en Alemania, discutida en Francia).

varus, a, um, *adj.* (en latín, vuelto hacia adentro). Se dice del miembro ó segmento de miembro vuelto hacia adentro. Ej. : *coxa vara.*

vascularitis, *s. f.* Inflamación de los vasos de un órgano.

vasectomía, *s. f.* (*vas,* canal; ἐκτομή, excisión). Resección de los canales deferentes. Operación practicada en los prostáticos con el fin de combatir la hipertrofia de la próstata y facilitar la micción.

vaso-formativas (células). Células especiales, de forma de huso rectilíneo ó encorvado con extremidades afiladas, que contribuyen al desarrollo de los vasos.

vasotripsia, *s. f.* (*vas,* vaso; τρίψις, trituramiento) (Doyen). Sin. *angiotripsia* (Truffier). Aplastamiento de los vasos por medio de un instrumento especial llamado *vasotribo,* con el fin de asegurar la hemostasis inmediata.

vegetación, *s. f.* Papiloma situado en los repliegues de la piel bañados por un líquido irritante.

vegetalismo, *s. m.* (de vegetal). Doctrina dietética derivada del *vegetarismo,* la cual sólo permite el empleo de alimentos provenientes del reino vegetal.

vegetarismo, *s. m.* (*vegetare,* vivificar, ó *vegetus,* vigoroso). Doctrina dietética que excluye en absoluto de la alimentación todo lo que ha vivido vida animal. El *vegetarismo* prohibe la carne de todos los animales; mas, permite los productos del reino animal (leche, manteca, huevos, miel, etc.).

vehículo, *s. m.* (*vehere,* llevar). Excipiente líquido. Sustancia en que se disuelven los otros principios activos del medicamento.

vejiga, *s. f.* (*vesica*). 1° El receptáculo de la orina. — *vejiga de la hiel.* Vesícula biliar. — 2° Lesión elemental de la piel (*bulla*) que no es más que una vesícula de grandes dimensiones. — 3° Sin. *flictena.* Ampolla ó bolsa elevada en el cutis y llena de humor acuoso.

vejigatorio, *adj.* y *s.*

m. (*vesicare*, levantar vejigas). 1° Tópico que sirve para provocar el levantamiento de la epidermis por acumulación debajo de ésta de cierta cantidad de serosidad. Están casi siempre compuestos de polvos de cantáridas ó de cantaridina. — 2° Se suele dar también el nombre de *vejigatorio* á la flictena provocada por algún emplasto vesicante y á la llaga que le sigue.

vejigatorio (prueba del) (Roger y Josué). Prueba clínica basada en el examen histológico de las células contenidas en la serosidad del vejigatorio. En el hombre normal se encuentra una gran proporción de polinucleares eosinófilos; en los atacados de enfermedades infectivas, dichas células son poco numerosas ó faltan completamente. Reaparecen si el organismo vence la infección.

velamentosa del cordón (inserción). Sin. *placenta de Lobstein, anomalía de Benckiser* Inserción del cordón umbilical sobre las membranas del huevo. Los vasos umbilicales llegan separadamente á la placenta caminando por entre las membranas.

velvético (aspecto ó estado) (inglés *velvet*, terciopelo). Nombre dado á las superficies de aspecto terciopelado.

venereología, *s. f.* (*Venus, eris*; λόγος, discurso). Véase : *cipridología.*

ventosa, *s. f.* Vasos de vidrio que, después de haber rarificado en ellos el aire, se aplican en un punto cualquiera de los tegumentos; sirven para provocar una revulsión local. — *ventosa escarificada* ó *sajada.* La que se aplica sobre escarificaciones ó sajaduras (sangría local).

ventrofijación del útero. Véase : *histeropexia abdominal.*

ventroscopia, *s. f.* (*venter*, vientre; σκοπεῖν, examinar) (Dmitri de Ott, 1901). Examen, en el curso de una operación, de las cavidades abdominal y pelviana, por medio de una lamparita incandescente fija sobre un mango especial ó en la concavidad de una de las valvas que separan los labios de la herida. El paciente debe estar en la posición de Trendelenburg.

verbigeración, *s. f.* Chacharería incoherente en que se repiten indefinidamente las mismas palabras ó las mismas series de palabras; se la observa en ciertos dementes excitados.

vergeteadura ó **veteadura**, *s. f.* (calco de *vergeture*, francés). Sin. : *víbice*. Pequeñas rayas primero rojas, luego blancas y nacaradas, de aspecto cicatricial, que surcan la piel sometida á una distensión exagerada (abdomen de las mujeres preñadas, miembros á la altura de las epífisis cuando el crecimiento se ha efectuado demasiado rápidamente, etc.).

vermífugo, *adj.* y *s. m.* (*vermis*, gusano; *fugare*, expulsar). Medicamento que provoca la expulsión de las lombrices intestinales.

vérnix caseosa. Materia grasa comparada á la manteca de puerco que, en muchos recién nacidos, se extiende en capas más ó menos espesas sobre la región dorsal y los pliegues axilares é inguinales. Parece debida á la hipersecreción del aparato pilo-sebáceo del feto.

verruga, *s. f.* 1° Variedad de papiloma que sale en la piel seca. — 2° Sin. : *pian hemorrágico*, *enfermedad de Carrión*, *botón de Amboine*. Enfermedad endémica de los países cálidos, inoculable, mas no contagiosa, caracterizada por síntomas infectivos graves que pueden producir la muerte, luego por una erupción cutánea compuesta de excrecencias mamilares que semejan fresas y frambuesas. El agente patógeno es aún desconocido.

versión, *s. f.* (*vertere*, voltear). Cambio de posición que se imprime al feto para facilitar la salida del útero. Según la parte fetal que se trae á la pequeña pelvis, se llama aquella *cefálica* (cabeza) ó *podálica* (pies). Se puede practicarla : 1° imprimiendo al feto movimientos á través de la pared : *versión por maniobras externas*; 2° yendo á agarrar con la mano introducida en el útero la parte que se desea traer hacia el estrecho superior : *versión por maniobras internas*; 3° asociando ambos procedimientos : mientras que se introduce una mano en los órganos genitales, la otra obra sobre el feto por encima de la pared abdominal : *versión mixta ó bipolar*.

vertebral (mal). Véase : *Pott* (*mal de*).

vértex, *s. m.* (vértice) (antropología). Punto el más elevado de la bóveda craneana.

vértigo, *s. m.* (*vertere*, girar). « Trastorno cerebral, error de sensación, bajo cuya influencia el enfermo

φίλια, amistad). Afinidad por el yodo que presentan los leucocitos en ciertos casos de septicemia, ó á consecuencia de la inyección de esencia de trementina.

yofobia, *s. f.* (ἰός, veneno, ponzoña; φόβος, temor). Miedo morboso á los venenos.

yon, *s. m.* (Faraday). Nombre dado á cada uno de los átomos ó grupos de átomos que resultan de la descomposición de un cuerpo sometido á la electrolisis. El *yon* sólo se encuentra, por lo tanto en los cuerpos susceptibles de ser descompuestos por la electricidad (sales, ácidos minerales, bases minerales). — Algunos autores llaman *yones* los elementos procedentes de la disociación del átomo de un cuerpo simple.

yonización, *s. f.* Introducción electrolítica, en el organismo, de un *yon* determinado. Ej. : tratamiento local del reumatismo por el yon salicílico.

yunque (ruido de). 1° Nombre dado al desdoblamiento del segundo ruido, en la estrechez mitral, que ha sido comparado al « doble bote del martillo sobre el yunque después de golpear el hierro. » Véase : *redoble* (*ruido de*). — 2° Tripier y Devic designan igualmente con este nombre el timbre particular que toma á veces el primer ruido del corazón en la enfermedad de Córrigan (insuficiencia aórtica).

Z

zarcos (ojos). Sin. : *ojizarco.* Nombre dado á los ojos de un individuo cuando el iris del uno es de distinto color al del otro.

Zimmerlin (tipo de). Variedad de miopatía atrófica progresiva de origen familial, que empieza por los músculos de la mitad superior del cuerpo, con predilección por los músculos voluminosos.

zimóticas (enfermedades) (ζυμή, fermento). Nombre dado antes á las enfermedades infectivas é inoculables, cuyos fenómenos se comparaban con los de la fermentación.

zoamilia, *s. f.* Función glicogénica.

zoamilina, *s. f.* (Rouget). Glicógeno.

zoantropia, *s. f.* (ζῶον, animal; ἄνθρωπος, hombre). Nombre genérico dado por algunos alienistas á todas las vesanias en que el enfermo se cree transformado en animal (caballo, perro, lobo, etc.)

zomoterapia, *s. f.* (ζῶμος, jugo de carne; θεραπεία, terapéutica) (Richet y Hericourt). Método de tratamiento que utiliza el plasma muscular, es decir, la carne cruda. Dicho plasma no obraría como alimento, sino que ejercería cierta acción inmunizante contra la infección tuberculosa.

zona, *s. m.* (*zona*, banda, cintura). Sin.: *herpes zóster*. Afección caracterizada por una erupción de vesículas semejantes á las del herpes, dispuestas por grupos, en el trayecto de los nervios sensitivos, acompañada de dolores más ó menos intensos y cuya evolución es rápida. El *zona* parece que debe considerarse como una enfermedad infectiva. — Al lado del zona verdadero, deben distinguirse las erupciones zoniformes, que están bajo la dependencia de lesiones nerviosas centrales ó periféricas y tienen diferente evolución.

zonular (catarata). Variedad de catarata incompleta que presenta una zona opaca al rededor del núcleo del cristalino (siempre de origen congénito).

zoofobia, *s. f.* (ζῶον; φόβος, temor). Temor enfermizo (fobia) á ciertos animales.

zooglea, *s. f.* (ζῶον, animal; γλία, goma). Grupo de bacterias redondeadas (cocos) cuyos elementos están aglutinados por una sustancia glutinosa más ó menos espesa y resistente.

zoo-ingerto, *s. m.* Ingerto dermo-epidérmico cuyos elementos se toman á un animal (perro, cavia, conejo, rana). Rara vez tiene buen éxito, y no está indicado sino cuando se trata de llenar vastas pérdidas de sustancia.

zoomanía, *s. f.* Amor enfermizo y excesivo que ciertos degenerados sienten por los animales (antivivisecionista, etc.).

zoomiliano, *s. m.* (ζῶον, animal; μύλη, mola). Familia única del orden de los monstruos unitarios parásitos, de la clasificación de I. G. Saint-Hilaire. Las piezas descritas por este naturalista como zoómilas no son más que quistes dermoideos.

zoonitos, *s. m.* Nombre dado á cada segmento de un animal anillado y extendido igualmente á los vertebrados, en los cuales representa el tipo ideal elemental de las formas animales. Véase : *metámero*.

zoonosis, *s. f.* (ζῶον; νόσος, enfermedad). Enfermedad que ataca principalmente á los animales.

zóster (herpes). Véase : *zona*.

Paris. — Imp. V. Goupy, rue de Rennes, 71.